



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.















Sol. alt. conuasa intimo centro involuente hie

PENTANDRIA MONOGYNIA.

182. VERBASCUM \*. BOUILLON BLANC. Tournef. 61. Blattaria Tournef.

CAL. Perianthium monophyllum, quinquepartitum, parvum, persistens: laciniis erectis, acutis.
COR. Petalum rotatum. Tubus cylindræus, brevissimus. Limbus patens, quinquepartitus: laciniis ovatis, obtusis.
STAM. Filamenta quinque, subulata, corollâ breviora. Antheræ subrotundæ, compressæ, erectæ.
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, longitudine staminum, inclinatus. Stigma crassiusculum, obtusum.
PER. Capsula subrotunda, bilocularis, superne dehiscens. Receptacula dimidiato-ovata, dissepimento affixa.
SEM. numerosa, angulata.
OBS. In plerisque stamina inclinata sunt, & inæqualia villisque coloratis infernè vestita.

Direx nullus suborando.

183. CORIS \*. Tournef. 423.

CAL. Perianthium monophyllum, campanulatum, ore decemdentato, denticulis alternis, reflexis; persistens.
COR. monopetala ringens. Tubus longitudine calycis, cylindræus. Limbus planus, quinquepartitus: laciniis oblongis, emarginatis, obtusis: superioribus duabus brevioribus, magis distantibus.
STAM. Filamenta quinque, setacea, longitudine corollæ declinata. Antheræ simplices.
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, longitudine staminum, declinatus. Stigma crassiusculum.
PER. Capsula globosa, infundo calycis posita, quinquevalvis.
SEM. plurima, fere ovata, parva.

androsæe familiae cujus capitula hinc accedunt ad femina.

184. RHAMNUS NERPRUN. Tournef. 366. Frangula Tournef. 383. Cervi spina Dill. gen. 8. Paliurus Tournef. 387. Alaternus, ALATERNE. Tournef. 366. Ziziphus, JUJUBIER. Tournef. 403.

CAL. nullus: nisi corollam pro calyce sumas, quod negatur à situ staminum.
COR. Petalum imperforatum, externè rude, internè coloratum, infundibuliforme. Tubus turbinato-cylindræus. Limbus patens, divisus, acutus.
Squamula minima, ad basin singulæ divisuræ; introrsum connivens.
STAM. Filamenta tot, quot laciniæ corollæ, subulata, petalo subulata inserta. Antheræ parvæ.
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma obtusum, divisum in pauciores lacinias quam corolla.

valde direx præsertim suboratio.

fol. lat. utriusque involu- ta subrotundis præsertim ut in alaterno

pl. quæ. col. utro- que. gal. ? Corian

cale calix

1125. Byttæria. Loefl. Eumyos acid. Cal. 5 phyll. conuaso. pat. color. Cor. 5. pet. conuaso. connis. St. 5. brev. apice comata cum petalis ovar. 1. Styl. 1. Atig. 1. Caps. 1. Depressa. Scrota 5. vob. 5. 6. Sem. 5. idem 1. long. 1.01.

1126. hartogia. Liu. faldes. Cal. 5 phyll. pur. Cor. 5. pet. inquirulatis. Nut. 5. pet. hui. St. 5. longa. ovar. 3. gem. 3. car. talibus. Styl. 1. Atig. 1. att. Caps. 3. lobul. .... Sem. ....

Manil... PENT... PER. Bacca subro... la, partes inter... SEM. solitaria, su... OBS. Structura... tuendum, clare... ri conformia, ne... n. Frangula Stig... quefida. Cervispina. S... quadrifida: ma... y. Paliurus. Sty... margine membra... d. Alaternus St... fida. Polygamiâ... corollarum def... i. Ziziphus St... quinquefida. S...



Manil... 225 Manil gale... Penta... 65

PER. Bacca subrotunda, nuda, divisa in pauciores, quam corolla, partes internas.

SEM. solitaria, subrotunda, hinc gibba, inde compressa.

OBS. Structura floris ovo similior, quid de differentiis fructus statuendum, clare, dicitur: vana itaque sunt genera omnia characteri conformia, nec inde excepta per a. b. c. d. e.

a. Frangula Stigmatate emarginato. Bacca disperma. Corolla quinquefida.

b. Cervispina. Stigmatate quadrifido. Bacca tetrasperma. Corolla quadrifida: mares & feminae in Dioecia.

c. Paliurus. Styli tres. Nucleo triloculari. Corolla quinquefida: margine membranaceo, cingente baccam.

d. Alaternus. Stigmatate trifido. Bacca trisperma. Corolla quinquefida. Polygamia dioica per mares & hermaphroditas. Squamulae corollarum deficiunt.

e. Ziziphus Styli duobus. Baccae Nucleus bilocularis. Corolla quinquefida.

185. CHRYSOPHYLLUM †. Cainito Plum. 2.

CAL. Perianthium pentaphyllum, parvum: foliolis subrotundis, persistentibus.

COR. monopetala, campanulata: Limbo decemfido: laciniis alternis subrotundis patulis, alternis erectis interioribus.

STAM. Filamenta quinque, subulata, alternantia cum laciniis corollae interioribus. Antherae simplices.

PIST. Germen subrotundum. Stylus subulatus. Stigma simplex.

PER. Bacca subovata, unilocularis, magna. glob. 10 locul.

SEM. tria, ossea.

OBS. In quibusdam additur una quinta pars numeri in parte omni floris.

Videtur aliquid affine habere cum Rhamno & Sideroxylo.

186. SIDEROXYLUM. Dilb. elth. 265. Hb. 0. Lactuca...

CAL. Perianthium semiquinquefidum, parvum, erectum, persistens.

COR. Petalum quinquepartitum: laciniis subrotundis, concavis, erectis. Denticulis cuspidatis, ferratis, ad basin singulae divisae petali, introrsum spectans.

STAM. Filamenta quinque, subulata, longitudine corollae. Antherae simplices.

PIST. Germen subrotundum. Stylus subulatus, longitudine staminum. Stigma simplex.

PER. Bacca subrotunda, unilocularis.

SEM. quatuor.

Chloroxyllum. Proom. p. 187. 2. 7. fl. Ziziphus...

1822. Caenothus... 2 ad 3 ped. fol. alt. Cal. bilobis. Cor. 5 pet. fimbriata...



ganima. vada suffl. non equamur.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

187. LYCIUM \*. Jasminoides Niss. A. G. 1711. Dill. gen. 12. Mich. 105.

Naxior. Dist. ad Rhodum hisp. specios. Plon. spina. Tracell. in non nullis. fl. alb. anthe. ? ad Solanum.

CAL. Perianthium quinquefidum, obtusum, erectum, minimum, persistens.

COR. Petalum infundibuliforme. Tubus cylindraceus; patens, incurvatus. Limbus quinquepartitus, obtusus, patulus, parvus.

Lycium sp. in...

STAM. Filamenta quinque, subulata, è medio tubi, corollâ breviora, inclinata. Antheræ erectæ.

PIST. Germen subrotundum. Stylus simplex, staminibus longior. Stigma bifidum, crassiusculum.

PER. Bacca subrotunda, bilocularis.

Embryo. ?

SEM. plura, reniformia. Receptacula convexa, dissepimento affixa.

188. CESTRUM \*. Hediunda Fevill. 3. t. 20. & 30. Jasminoidis sp. Dill. elth. 154. f. 186. & 153. f. 185.

CAL. Perianthium monophyllum, tubulosum, teres, obtusum, brevissimum: ore quinquefido, erecto, obsoleto.

COR. monopetala, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, longissimus, tenuis. Faux subrotunda. Limbus planus, plicatus, quinquefidus: laciniis ovatis, æqualibus.

STAM. Filamenta quinque, filiformia, longitudinaliter tubo adnata, in medio denticulum introrsum emittentia. Antheræ subrotundæ, tetragonæ, intra faucem.

PIST. Germen cylindraceo-ovatum, longitudine calycis. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma crassiusculum, obtusum, vix emarginatum.

PER. Bacca ovata, unilocularis, oblonga.

SEM. plurima, subrotunda.

OBS. Bacca unilocularis est, à Lycio diversa.

Solanum. ?

189. PHILYCA \*. Alaternoides H. A. II: 1.

CAL. Receptaculum commune fructificationum in discum colligens flores. Perianthium proprium triphyllum: foliolis oblongis, angustis persistens.

COR. Petalum imperforatum, externè rude; erectum. Tubus conicus, longitudine perianthii. Limbus quinquepartitus; erectus, parvus. Squamula acuminata, ad basin singulæ divisuræ, introrsum connivens.

STAM. Filamenta quinque, minima, sub squamula inserta. Antheræ simplices.

PIST. Germen in fundo corollæ. Stylus simplex. Stigma obtusum.

PER. Capsula subrotunda, triloba, trilocularis, trivalvis.

SEM. solitaria, subrotunda, hinc gibba, inde angulata.

a

PENT  
CHIR  
190.  
CAL. Perianthium, persistens  
COR. monopetala  
lycis. Limbus  
bus.  
STAM. Filamenta  
theræ oblongæ  
PIST. Germen  
declinatus. Sti  
PER. ovatum,  
SEM. numerosa  
OBS. In aliis sp  
191.  
CAL. Perianthium, obtusum  
COR. monopetala  
planus, quinque  
STAM. Filamenta  
oblongæ  
PIST. Germen  
tubi. Stigma  
PER. Bacca glo  
SEM. numerosa  
192.  
CAL. Perianthium  
vum: foliolis  
COR. monopetala  
tibus, obtusis  
STAM. Filamenta  
Antheræ subu  
PIST. Germen  
ceus, corollâ  
extra florem pe  
PER. Bacca subro  
SEM. solitaria,  
OBS. saepe unita  
parte  
foli. alt. potius can  
ganima  
floribus 2  
Lycium  
in Rhodum



PENTANDRIA MONOGYNIA.

67

190. *CHIRONIA* †. vide Breyn. cent. 90. Comm. rar. 8. & 9.

**CAL.** *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, erectum, acutum, persistens: foliolis lanceolatis.

**COR.** monopetala, æqualis. *Tubus* subrotundus, magnitudine calycis. *Limbus* quinquepartitus, patens: laciniis ovatis, æqualibus.

**STAM.** *Filamenta* quinque, lata, brevia, ex apice tubi enata. *Antheræ* oblongæ, erectæ, magnæ conniventes.

**PIST.** *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, staminibus paulo longior, declinatus. *Stigma* capitatum, affurgens.

**PER.** ovatum, biloculare.

**SEM.** numerosa, parva.

**OB.** In aliis speciebus est *Pericarpium* Capsula, in aliis verò *Bacca*.

191. *BRUNFELSIA* †. Plum. 22. *cyli. d. cliv. de Volcanaria*

**CAL.** *Perianthium* monophyllum, <sup>cyli. d. d. cliv. de Volcanaria</sup> campanulatum, quinque-dentatum, obtusum, <sup>parvum</sup> minimum, persistens.

**COR.** monopetala, infundibuliformis. *Tubus* longissimus. *Limbus* <sup>obliquus</sup> planus, quinquefidus, obtusus. <sup>lacin. subrotund.</sup>

**STAM.** *Filamenta* <sup>quinq.</sup> quinque, longitudine tubi, cui inserta. *Antheræ* <sup>longæ</sup> oblongæ. <sup>altitudinem. hanc 2. sup. d. cliv. de Volcanaria. in gradu tubi ut in Volcanaria cup.</sup>

**PIST.** *Germen* <sup>subrotundum</sup> subrotundum, parvum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* <sup>crassiusculum</sup> crassiusculum. <sup>lateral. subglobosum</sup>

**PER.** *Bacca* globosa, unilocularis. <sup>plena</sup>

**SEM.** numerosa, <sup>tunicæ</sup> tunicæ <sup>baccæ</sup> baccæ adposita, subrotunda. <sup>in part. d. cliv. de Volcanaria. ad partem. d. cliv. de Volcanaria.</sup>

*Sol. alt. lacin. subrotund. vult. petiole nigro. flori albo flav. solit. anath. seti. minia. stipite. d. ad. d. cliv. de Volcanaria. flori. d. cliv. de Volcanaria. flori. d. cliv. de Volcanaria.*

192. *MYRSINE*. *ar. nom. grecum myrti. Linnæus adu. a. geria. a.*

**CAL.** *Perianthium* quinquepartitum (rarius quadripartitum: ) parvum: foliolis subovatis, persistentibus.

**COR.** monopetala, semiquinquefida: laciniis semiovatis, conniventibus, obtusis.

**STAM.** *Filamenta* quinque, vix notabilia, medio corollæ inserta. *Antheræ* subulatae, erectæ, corollâ breviores.

**PIST.** *Germen* subglobosum, corollam fere replens. *Stylus* cylindraceus, corollâ longior, persistens. *Stigma* magnum, lanigerum, extra florem pendens.

**PER.** *Bacca* subrotunda, depressa, quinquelocularis. *Stip.*

**SEM.** solitaria. <sup>alvudam 1/10y bud</sup>

**OB.** saepe unitatem omni numero demit in omni fructificationis parte.

*Sol. alt. petiole caudæ glabratae erectæ cum eo articulo punctata. canaliculata in lobis. geminae subrotundæ. fl. involucrata. anther. castany. involuta. flori. d. cliv. de Volcanaria.*

*Linnæus linc. in A. just. flori. d. cliv. de Volcanaria. sed tubo parte longioris. in Plum. capite 292. fol. alt. 99. flori. d. cliv. de Volcanaria. flori. d. cliv. de Volcanaria. flori. d. cliv. de Volcanaria.*







*Solanum. flous d'latu foliorum non anillam.*  
*Dalecarum foliis oppositis non anilla.*  
*Lycocula. huiusmodi fructu lateri plicato. Boerh. Cal et cor 10 pd. et 10.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 69

*gemma o. sur fol. nuda*  
196. SOLANUM \*. MORELLE. Tournef. 62. Melongena  
Tournef. 65. Lycopersicon Tournef. 63. *Lycocula huius*  
*sp. xvos. Rheg.*

*Solanum. huiusmodi. Cal 5 foliis plicatis. Corolla 2 pd. Cor. conubula*  
*limbo intus. ut 5. inaeq. raris alba. Corolla*  
*5. lobis. Ovaria 5. coalita. Stylus 1. Stigma 1. Germe 1.*

CAL. Perianthium monophyllum, semiquinquefidum, erectum, acutum, persistens.  
COR. Petalum rotatum. Tubus brevissimus. Limbus magnus, semiquinquefidus, reflexo-planus, plicatus. *acuta laciniis.*  
STAM. Filamenta quinque, subulata, minima. Antherae oblongae, conniventes, contingentes. *coalita in hypogynio qd alindgment.*  
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma obtusum.  
PER. Bacca subrotunda, glabra, apice punctato, bilocularis: Receptaculo utrinque convexo, carnosio.  
SEM. plurima, subrotunda, nidulantia.

*Solanum huius. Alkekengi. fructu capite. spina nigra. fl. purpureo*  
197. PHYSALIS \*. Alkekengi Tournef. 64.

CAL. Perianthium monophyllum, ventricosum, semiquinquefidum, parvum, pentagonum: laciniis acuminatis, persistens.  
COR. Petalum rotatum. Tubus brevissimus. Limbus semiquinquefidus, magnus, plicatus: laciniis latis, acutis.  
STAM. Filamenta quinque, subulata, minima. Antherae erectae, conniventes.  
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, staminibus fere longior. Stigma obtusum.  
PER. Bacca subglobosa, bilocularis, parva intra calycem maximum, inflatum, clausum, pentagonum, coloratum. Receptaculum reniforme, duplicatum.  
SEM. plurima, reniforma, compressa.

*198. ITE A. Gronov. virg. II.*

CAL. Perianthium monophyllum, quinquepartitum, erectum, acuminatum, minimum, persistens.  
COR. quinquepartita: petalis lanceolatis, acutis, longis, patentibus. *calicis lobis basi.*  
STAM. Filamenta quinque, subulata, erecta, longitudine corollae. Antherae subrotundae.  
PIST. Germen ovatum. Stylus cylindraceus, persistens, longitudine staminum. Stigma obtusum. *hamiph.*  
PER. Capsula ovata, calyce multoties longior, stylo mucronata, unilocularis, bivalvis, apice cohærens.  
SEM. numerosa, minima.

*Ribisoides. fl. huius 403. umbella. humi. 2. 1/2 pd.*  
*arbor. fol. alt. petiol. flavo-purpureo termin.*  
*cal. 5 pd. inaeq.*  
*cor. 5. pet.*  
*ob. 5. 2. 1/2 pd.*  
*ovar. 1.*  
*stigma.*  
*sem.*

*Galium. lina. viticella. mitib. qui 24*  
*fol. o. acaulium. 1/2 pd. 2. 1/2 pd.*  
*cal. 10 phyllis. 5. 1/2 pd.*  
*cor. 1. 1/2 pd. hypogynia. 2. 1/2 pd. 5. 1/2 pd.*  
*st. 5. 1. 1/2 pd.*  
*ovar. 1. 1/2 pd. 2. 1/2 pd. contra*  
*caps. 1. 1/2 pd. 2. 1/2 pd.*  
*sem. 2. 1/2 pd. minima. sem. 1. 1/2 pd.*



































*Plum. 1766. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

**PENTANDRIA MONOGYNIA**  
**STAM.** Filamenta quinque, subulata, erecta, longitudine corollae.  
**AN.** Antherae subrotundae.

**PIST.** Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine staminum.  
**STIG.** Stigma capitatum.

**PER.** Capsula globosa, acuminata, unilocularis, quinquevalvis.

**SEM.** quinque, rotundiuscula. Receptaculum maximum, globosum, seminibus excavatum.

**214. THE VETIA.** Ahouai *Plum.* Tournef. 434. *Carbarahin. andy. hut.*

**CAL.** Perianthium quinquepartitum, acutum, erectum, parvum, persistens.

**COR.** Petalum infundibuliforme. Tubus oblongus. Limbus magnus, quinquepartitus: laciniis obtusis, planis, latis, cum sole flexis.

**STAM.** Filamenta quinque, subulata, intra tubum corollae. Antherae conniventes, in collo corollae.

**PIST.** Germen subrotundum, acuminatum. Stylus simplex, longitudine tubi. Stigma cordatum, acutum, bifidum.

**PER.** Drupa orbiculata, depressa, parte centrali acuminata, unilocularis.

**SEM.** Nux ovato-trigona.

**215. CERBERA †.** vide HM. I: 39. *osollam. wo. Pram. arbor. 15 ped. fol. alt. ovati. flar. corymb. terminalibus. laciniae. lactos. ad coll. auid.*

**CAL.** Perianthium quinquepartitum, acuminatum, erectum, parvum.

**COR.** Petalum infundibuliforme. Tubus clavatus. Limbus magnus, quinquepartitus: laciniis lanceolatis, cum sole obliquis.

**NECT.** Nectarium os tubi terminans, quinquangulare, erecto stellatum, quinqueidentatum.

**STAM.** Filamenta quinque, subulata, in medio tubi. Antherae erectae, conniventes.

**PIST.** Germen globosum. Stylus filiformis, brevis. Stigma capitatum.

**PER.** Drupa maxima, subrotunda, carnosa, à latere sulco longitudinali excavata, bilocularis.

**SEM.** Noces solitariae, ovatae.

**216. RAUVOLFIA \*.** Plum. 40. *on obliqu. drupa. qui anferunt. magna. 7. latere sulcatis 1 loco 2 sp. diam 2. mag. nav. rotat. ad coll. auid. ? and a P. ?*

**CAL.** Perianthium quinqueidentatum, minimum, persistens.

**COR.** Petalum infundibuliforme. Tubus cylindraceus, globosus. Limbus quinquepartitus, planus: laciniis truncatis, subrotundis.

**STAM.** Filamenta quinque, tubo breviora. Antherae erectae, simplices.

**PIST.** Germen subrotundum. Stylus brevissimus. Stigma capitatum.

**PER.** Bacca globosa, lactescens, magna, unilocularis.

**SEM.** duo, cordata, compressa.

*Sanonidat. Kuyshay Colo 25. ? mangarita sp. Cal. 5. sp. 11. inaeq. Cas. sp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*



fol. 97. cruceatione unta concava sic 77. altera altera latera includuntur in 2. alia  
76. PENTANDRIA MONOGYNIA. galiana

217. VINCA \*. PERVENCHE. Pervinca Tournef. 45.

CAL. Perianthium quinquepartitum, erectum, acutum, persistens.

Cor. lacini  
a limbo dentati  
flera.

COR. Petalum hypocrateriforme. Tubus calyce longior, inferne cylindraceus, superne latior; lineis quinque insculptus: ore pentagono. Limbus horizontalis quinque partitus: laciniis apici tubi adnatis, extrorsum latioribus, oblique truncatis.

STAM. Filamenta quinque, brevissima, inflexa, retroflexa. Antheræ membranaceæ, obtusæ, erectæ, incurvæ, margine utrinque fariniferæ.

PIST. Germina duo, subrotunda, quibus ad latera corpuscula duo, subrotunda, adjacent. Stylus utrisque unus communis, cylindraceus, longitudine staminum. Stigmata duo, perpendicularia: inferius orbiculatum, planum; superius capitatum, concavum.

PER. Folliculi duo, teretes, longi, acuminati, erecti, univalves, longitudinaliter dehiscentes.

SEM. numerosa, oblonga, cylindracea, sulcata.

OBS. Licet STYLUS sit unicus, ob germina gemina, ad Digyniam referre necesse est.

Cor. lacini  
a limbo dentati  
flera.

218. NERIUM †. LAURIER-ROSE. Tournef. 374.

CAL. Perianthium quinquepartitum, acutum, minimum, persistens.

COR. Petalum infundibuliforme. Tubus cylindraceus, limbo brevior. Limbus maximus, quinquepartitus: laciniis latis, obtusis; cursum solis respicientibus.

Nectarium Corona tubum terminans, brevis; in segmenta capillaria lacerata.

STAM. Filamenta quinque, subulata, brevissima, in tubo corollæ. Antheræ sagittatæ, conniventes, filo longo terminatæ.

PIST. Germen subrotundum, bifidum. Styli vix ulli. Stigmata simplicia.

PER. Folliculi duo, teretes, longi, acuminati, erecti, univalves, longitudinaliter dehiscentes.

SEM. numerosa, oblonga, coronata pappo, imbricatim posita.

219. PLUMERIA. FRANGIPANIER. Tournef. 439.

CAL. Perianthium quinquepartitum, obtusum, minimum.

COR. Petalum infundibuliforme. Tubus longus, sensim amplius. Limbus quinquepartitus, erecto-patens: laciniis ovato-oblongis, cum sole flexis.

STAM. Filamenta quinque, subulata, è medio tubi. Antheræ conniventes.

PIST. Germen oblongum, bifidum. Styli vix ulli. Stigma duplex, acuminatum.

Handwritten notes at the bottom of the page, including botanical references and dates.

Fragment of the following page, showing botanical descriptions for plants like PENTANDRIA MONOGYNIA, TABERN...























