



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

RIA MONOGYNIA. *Boettger* *Urginea* *Closterium*

Cliff. §. II. 3. vide. H. M. XI. 8.

*Stems several, odorous. X flowers terminal, cyl. glabrous.
Leaves radical. Spica axillary, granular, corolla cylindric,
at the base simple. Corolla cylindric, obtuse, insinuating
abundant stamens. Ovary sessile, insinuating, pointed
sum, minimum, germini insidens. Ovules
ovata, erectiflora, concava, æqualia:
m, magnum, oblongum, tubulofo-infla-
m inferius latius, corolla longius, Lim-
ermedia tripartita. L. superius lanceola-
tum, vices gerens.*

rit nectarii superius labium, cui Anthera
taculum floris, subrotundum. *Stylus* fili-
menti. *Stigma* capitatum compressum.

coronata, **trilocularis**, **trivalvis**. *det. Dr. D.*
2 ann. 20 p. l. caeruleo-^{caeruleo-} purpureo-^{purpureo-} pr.
pet. pedicellus lata petiolata cyl. rosula volut int.
triang. longa 2 ad 3 cm. 7 latu. fl. purp. ceras tenuis
ANTA*. **Plum.** 36. *icones Brun. daed.*
ad segregandas corolla membran. luteas
supradictam beluae sp. p. h.
llum, **lanceolatum**, **parvum**, **germini**
6 p. l. lacin 3 lacin. undulat. aq.
ns. **Tubulus** **oblongus**, **compressus**, **obli-**
sexfidus: **laciniis** **exterioribus** **alternis**
ribus: **quarum** **unica** **infima**, **binæ** **supre-**
teralibus **maximis**, **subrotundis**, **labium**
summa **parva**, **bipartita**.

rgini alteri filamenti.
um, infra receptaculum floris. Stylus
ollæ. *Stigma* ~~arrectum corona evanescens~~ obsolete trigonum, infle-
vans.
obsolete trigona, trivalvis. Plum.
gosum, durum. Plum. de atraffae. 3/pen-
est. *Ang. fons. S. f. t. t. t.*

A. +. Alpina. Plum. II. 2. 20. ~~Leaves~~
interioritatem foli equante, propletis ~~omnigentibus~~
medio-³ foli, parvum, germini impositum.
s. & quasi l.

, et quasi duplicata : *Exterior* trifida :
latelaribus planis ; *tubo* instructa. *Inte-*
, lacinia infima propendente extra di-
ris corollæ : *reliquis emarginatis* ; *basis*

n interioris corollæ assimilans. Antheræ ^{curvæ} 2h
amenti.

Salopeteca *flora* folia expansis planis alredd
ad. flor. en. radice perfoliata stipte squamu. p. ex. longa
ov. l. pet. cyl. l. 6. p. h. r. r. (concretae velut. rugulat.)
copy. **MONANDRIA, MONOGYNI.**
SEM. plurima, ovata, apice prominula, truncata,
Receptaculum pulposum, maximum. centrale cui aui-

MONANDRIA MONOGYNI

flua.
CUDI, acelorum chilidorsium

CURCUMA †. Mus. Cliff. §. II.

6. Radix galanga artificia et grossa. Flores protra cymosa
vaginæ pedunculi ex capitulo exserti non monophylle cavaeori. Infus.
aristata. Petali glauca. Crête cornuta. Interni latuli.
CAL. Spathæ plures, partiales, simplices, caducæ.
COR. Petali tubus angustus. Limbus tripartitus: lac-
latis, patentibus, sinu altero magis dehiscentibus.
Nectarium monophyllum, ovato-acuminatum, la-
majus, ejusdem sinui patentiori insertum.

S T A M. Filamenta (*quinque*, *quorum quatuor* *erecti*
sterilia) *unicum* [*quintum*] *intra Nectarium*, *linear*
me, *apice bifido*. *Anthera adnata*. 1. *crossa* *autore* 300
T *longa* *borei* *pubes* 2 *canescens* *longa* *angust*

Pist. Germen tubrotundum, infra receptaculum
longitudine staminum. Stigma simplex, uncinatum.
P. capsula subrotunda, trilocularis, trivalvis. ^{caeca}
Sem. plurima, glob. in 2 ordines, minor 12 long. lata 6, annua 6, subglob.

7. KÆMPFERIA*. Aro-orchis Burm. zeyl. Ratibula Kelangae

Botanical Description
Spatha simplex, hinc dehiscens, monophylla.
Cor. monopetala. Tubus longus, tenuis. Limbus plati-
tus: laciniiis tribus alternis lanceolatis, æqualibus;
bus laciniiis ovatis: infima bipartita, lacinulis vertic-
tis: æqualibus longitudine æqualibus.

Stam. Filamentum unicum, membranaceum, subov-
ginatum. Anthera linearis, tota adnata, vix è tubo e-
gens.

P I S T. Germen subrotundum. Stylus longitudine tubi
tusum. ~~intervallum~~ annulus laevis et levigatus.

O B S. Raro fructum fert. Germen ~~juxta radicem loci~~
^{falso et in spore}

8. SALICORNIA *. *Tournef.* 48

C A L. *tetragonus*, *truncatus*, *ventricosus*, *persistens*.
C O R. *nulla*.

STAM. *Filamentum unicum*, simplex. *Anthera tubularis*.
PIST. *Germen ovato-oblongum*. *Stylus simplex*,
Stigma bifidum.

Stigma bindum.
P E R. nullum. *Calyx* ventricosus, inflatus.
S E M. unicum. *Tunica intumescens* ^{in centro.} ~~in~~ *nitida*

Cladonia ciliata L. est species membranosa
Latia. Ray. Coctula. Plen. agutigemps-oti. margin. sp. 1.
fol. alt. Crenata. nervi transversi paralleli, pettolo lato tubo
apertus. Semper 1 ad 2 fls. Radice
Feruginea

RIA MONOGYNIA. *caudatum et
longum*

Cliff. §. II. 3. vide. H. M. XI. 8.

*Stylus brevior & carnis simplicis cyl. glabra
et redita. Corolla quamvis convoluta est
atque simplices. Corolla rotata. Interna par-
tum minimum, germini insidens. ex longa
olata, erectiuscula, concava, æqualia-
m, magnum, oblongum, tubulofo-infla-
m inferius latius, corolla longius, Lim-
ermedia tripartita. *L. superius lanceola-*
*vices gerens.**

*rit nectarii superius labium, cui Anthera
taculum floris, subrotundum. Stylus fili-
menti. Stigma capitatum compressum,*

coronata, trilocularis, trivalvis.

NTA. Plum. 36. i canis brev. dacti-
nus ad sagittapede corona membran. lato obli-
llum, lanceolatum, parvum, germini
6 pd. laici 3 *antra* undevig. agn.
ns. *Tubulus oblongus, compressus, obli-*
s sexfidus : laciniis exterioribus alternis
ribus : quarum unica infima, binæ supre-
teralibus maximis, subrotundis, labium
*: summa parva, bipartita.**

oraceum, laciniæ corollæ simile. An-
argini alteri filamenti.

um, infra receptaculum floris. Stylus
collæ. Stigma obsolete trigonum, infle-
vens.

obsolete trigona, trivalvis. Plum.

*gustum, durum. Plum. de alio p. 3 spm
est. *mag. sonans. guttula.**

*A. Alpina. Plum. 11. 2. 20. *longa**

, parvum, germini impositum.

& quasi duplicata : Exerior trifida :

latelaribus planis ; tubo instructa. Inte-

rior, lacinia infima propendente extra di-

ris corollæ : reliquis emarginatis ; basis

n interioris corollæ assimilans. Anthera 2h

lamenti.

sub receptaculo floris. Stylus sim-

*num. *longus* *curvus* *curvus**

*, trilocularis, trivalvis. *apridens?**

*ovata doasa fæc. *longus*.*

{ *Parafroca* *flora* folla se penda planos strad
 w. per en radre pectinata stipte spiculae longa
 cor. pet. cyp. lora 6 pd. hirta concreta rotunda
 cap. lora branca rotunda lata curva
MONANDRIA MONOGYNA
SEM. plurima, ovata, apice prominula, truncata,
 Receptaculum pulposum, maximum. centrale cui aum
 plu.
CURCUMA *Mus. Cliff. §. II.*
 6. Radres galangae artificia de gressi. Flores protra cymosa
 : *Curcuma* pedunculata cerasus apicale non monophylla cerasaria. Infus.
 C A L. Spathæ plures, partiales, simplices, caducæ.
 C O R. Petali tubus angustus. Limbus tripartitus: laci
 latis, patentibus, sinu altero magis dehiscens.
 Nectarium monophyllum, ovato-acuminatum, la
 majus, ejusdem sinui patentiori insertum.
 S T A M. Filamenta (quinq; quorum quatuor erect
 sterilia) unicum [quintum] intra Nectarium, linear
 me, apice bifido. Anthera adnata. 1. crassa autem 3 vel
 P I S T. Germen subrotundum, infra receptaculum
 longitudine staminum. Stigma simplex, uncinatum.
 P E R. Capsula subrotunda, trilocularis, trivalvis.
 S E M. plurima. glb in 2 ordines ab 12 usq; loculis aenam
 fl. alti laevatae 3. interdri et autora per inservientes flava.
 fil. petiolæ apice intumescens cornu brevi membranost. ut in Lingibæ sed minori
KÆMPFERIA **. Åro-orchis Burm. zeyl.*
 Vanhorn Kämpf. jap. 902. H. M. XI. 4 I.
 fibrae raphidæ 1. oblique integ. mediu. fol. 2. 2. radre subr
 a foliorum centri. Sonchus. Augst. 52 69 f. 2.
 7. *Spatha* simplex, hinc dehicens, monophylla.
 C O R. monopetala. *Tubus* longus, tenuis. *Limbus* plan
 titus: laciniis tribus alternis lanceolatis, æqualibus:
 bus laciniis ovatis: infima bipartita, lacinulis vertic
 tis: omnibus longitudine æqualibus.
 S T A M. Filamentum unicum, membranaceum, subov
 ginatum. Anthera linearis, tota adnata, vix ē tubo e
 gens. 2 pd. crassa utilem. apicem cor in etheream
 P I S T. Germen subrotundum. Stylus longitudine tubi
 tufsum. inter fulvum anthers haud raro erit cor
 P E R. Capsula subrotunda, trigona, trilocularis, triva
 S E M. plura.
 O B S. Raro fructum fert. Germen juxta radicem loci
 radens ampli. est pueri Curcumæ, ad eum nullus debet
SALICORNIA **. Tournef. 48*

8. SALICORNIA *. Tournef. 48

CAL. tetragonus, truncatus, ventricosus, persistens.
COR. nulla.
STAM. Filamentum unicum, simplex. Anthera subri-
PIST. Germen ovato-oblongum. Stylus simplex,
Stigma bifidum.
PER. nullum. Calyx ventricosus, inflatus.
SEM. unicum.

RIA MONOGYNIA.

ntia Petit. gen. 49. Glaucis species
mus. 84. f. i.
~~uid, en B; ull' ulia myrtij.~~
ulatum, semi quadrifidum : laciniis acu-
dicas.
r, è medio calycis enata. ^{qui optat} Antheræ sim-
antiam calycis. Stylus simplex, stamin-
siusculum.
ca, quadrilocularis.

NUS*. Tournef. 489. oleander.
fol alt - gambo - foliis angava dicuntur in omnibus
phyllum, vix semiquadrifidum, rectum,
e, scabrum, interne coloratum, deci-

or, brevissima infra divisuras calyci inser-
tum, infra receptaculum. Stylus simplex,
stigma simplex. capitulo velutinum.
usa, glabra, apice punctato.
tusa. bsp. dyplop. auricula erecta.
embryi brevi tenue persistante ex basi cotyledonem via
pediculi intus quod complumentum continet.
vide Breyen. cent. f. 1. Communicavit
H. D. Clifforius.
linearia, obtusa, inferne erecta, tubum
pluta, decidua.
or, capillaria, unguibus petalorum inser-
tum. Antheræ parvæ, lateribus dehiscen-
, villosum. Stylus filiformis, longitudine
crassior. Stigma simplex.
lis, villosa.

, cui satis similis est fructificatio , solo nu-

ma *Plum.* 39. *Solanoides* *Tournef.*
n. II. *Phytolaccæ* species *Boerh.*

*Phyll
artitum*, coloratum, persistens: foliolis
sumas.

TETRANDRIA DIGYNIA.

S T A M. Filamenta quatuor, calyce breviora, per paria
persistentia. Antheræ parvæ. quatuor. 4. calyx & petioles alterna. 1. petiole
P I S T. Germen magnum, subrotundum. Stylus brevissim
simplex, obtusum. *magnum*
P E R. Bacca globosa, calyci viridi reflexo insidens, unil
S E M. unicum, subrotundum, compressum, scabrum.
O B S. Plumierius flores octo staminibus pingit, in quo valde
Rivaria secund. racemosa amplius foliis bacis verbosis plam. ea brachia
122. ALCHEMILLA *. PIED DE LION. Alch
i. *magi.* Tournef. 289.

CAL. Perianthium monophyllum, tubulatum, persistente,
no, octipartito: laciniis alternis minoribus.
COR. nulla.

GO.R. nulla.
ST A M. Filamenta quatuor, erecta, subulata, minima, imposita. Antheræ subrotundæ. extremis minorib. pro

P i s t. Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine
ad basin germinis insertum. Stigma globosum.

P E R. nullum. *Calycis Collum clauditur*, nec dehiscit.
S E M. solitarium, ellipticum, compressum.

S E M. solitarium, ellipticum, comprensum.
fb adgit. et digit. tip. 2. petiol. Flores compacti terminis
in corymbis fasciculis ex 2-5 ramulis ex 2-5 rami

D I G Y N I A.

123. APHANES *. Percepier. Dill. gen.

COR. nulla.
STAM. Filamenta quatuor, erecta, subulata, minima,
imposita. Antheræ subrotundæ. ^{vix 2 lignata A. Dan.} Siliæ filiformes longitu-

Pist. Germina duo; ovata. Styli filiformes, longitum, germinibus ad basin inserti. Stigma capitata. Columna in fundo semina continens, ore c.

P E R. nullum. Calyx in fundo semina continens, ore c
S E M. ^{lunula 2 in centro} duo, ovata, acuminata, compressa, longitudine
Q. ad Alshimillam proximè accedit. ^{? media interea ?}

O B s. Ad Alchimillam proximè accedit. fol. singl. tigr. petiolare flava monopyle ut in alibi coroll.

Pisiola, Brown, p. 147, t. 4 fig. 2. Vitis adutili foli caule rot.

Cal. minima & dent
Cor. levig. cal. pet. coramly rigid.

car. apt. cal. pet. corona, etc.
etc. h. hav.
over 1. stat. fav. May. 1. 1928

over 1. Stgt. zw. 109. - 112.
Bareo glt. 1. zw. 113.
Sct. 1. offens.

Dawn 1. ottobre.
foto altri apertili fiori.

~~1639~~ 1640. Scherma be valli h. m. 7. 2. 11. gelberg a hene 22

1039. *Lecythis* 60. Scherzeria var. *americana*
n. sp. Cal. 1. styl. hyperas. lvs. int. ovate 1040 *Sracum*. fl. lyg. 61
n. sp. lvs. ellipt. cal. int. 2-lobed. 2-lipped.

Cal. infer. 2 phyll. ex
cor. 1 pet. 4 fol. tubo br.
St. 4. mid. tubo int.
st. 1. st. 1. st. 1.

ovari. ligata. obt. 1. styl. 1. ~~att~~ simple
fruit. Bracts glob. at
apex. 1. styl. 1. styl. 1.
Calyx. 2. 60. Basitarsus

Semi-oval. glob.
fol alt. matre ~~longil~~ lata
Cap. 2³³
Semi. even. Receptac.
① capiti 4 gon. fol opp.

A MONOGYNIA.

ELINET. Tournef. 56. Cerinthoides
Boerb.

partitum : laciniis oblongis æqualibus,

bus brevis, crassus. Limbus tubulato-
crassior: ore quinquefido. Faux nuda,
subulata, brevissima. Antheræ acutæ,
um. Stylus filiformis, longitudine sta-
nitida, introrsum planiuscula, extror-
marginata, bilocularia, non dehiscentia.
acuminata.

us quatuor distinctis gaudet.

ab Asperifoliis reliquis distinguitur,
ri: fave nuda pervia.

RTIA †. Pittonia. Plum. 3. *argentea annua.*
Kor. spicæ decumb. non foliati utræ helicop.
partitum, parvum, persistens: laciniis

lubus ovatus, calyce longior. Limbus
laciniis latis, acutis. Limbus
subulata, longitudine tubi corollæ.
ace corollæ. ~~lata~~ alt.
ub receptaculo floris. Stylus simplex,
gma simplex. ~~corolla~~ ^{longior} ~~et~~ ^{longior} ~~et~~ ^{longior}
ularis. annu ⁴ lata. ^{longior} ~~et~~ ^{longior} ~~et~~ ^{longior}
distincta.

SACE*. Tournef. 46.
in caulis foliis ~~disjunctis~~ ^{alternis} ~~radice~~ ^{ad an-} foliis
le, ⁹⁷ polyphyllum, multiflorum mini-
- in intervallo tubae ^{foliis} ~~ad an-~~ foliis
n, pentagonum, semiquinquefidum,
ns. ovarium amplectens velut ipse ciliis, hacten ^{longus} ~~ovatus~~ ^{appresso}
bus ovatus, calyce obvolvutus. Limbus
ciniis ovato-oblongis, obtusis, integris.
previssima, intra tubum corollæ. An-
clusæ. tetragone filum ^{ad an-} cont
tylus filiformis, brevissimus. Stigma

plano infidens, unilobularis, quin-
^{valv. valv. caly. opercul.}
te uti cori.
inc gibba, inde plana. Receptaculum
^{abruptum} exalatum sanguineum (c. 169 mm. l. 203)
III. / *Spiculae* / *Spiculae*

Cal. 1.7 in. $\frac{1}{2}$ 5 fod. per. minian. infus.
Lan. 1. pet. $\frac{1}{2}$ 5 ft.
St. 5. corolla longior media tubi ad eam 2 ft +
2 ft over 1. styl. 1. Hgt 2 ^{cyl. brw.} ~~other~~
Barea ovata 2 br. very low 1-1/2 fol. all
lanceolate ^{Office} 2. corolla 2 lobul. ovata. new f.
and no. ad. Veneraria et Colocianum occurit. ^{magis} tub.

PENTANDRIA MONOGYNYIA

— I⁴⁴. PRIMULA *. PRIME VERE. Primula veris. T
Malp. 139. 147. Pont: 1: 2. Auricula Ursi O
p'OURS. Tournef. 46.

CAL. *Involucrum*, polyphyllum, multiflorum, minimu-
Perianthium monophyllum, tubulatum, pentagonum
dentatum, acutum, erectum, persistens.

*Cor. Petalum unicum. Tubus cylindraceus, longitudi-
nem terminatus collo parvo, hemisphærico. Limbus pat-
quinq[ue]fidus: laciniis obverse cordatis, emarginatis,
brevissima*

S T A M. *Filamenta* quinque, brevissima, intra collum c
theræ acuminatæ, erectæ, conniventes, inclusæ.
P I S T. *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, longitudi
nem ^{Receptaculum} globosum ^{ad apicem}.

Stigma globosum. *utin*
P E R. Capsula teres, longitudine ferme perianthii, tect
laris, dehiscens, apice decemdentato. *utin alline* *any*
embale

*S E M. numerosa, subrotunda. Receptaculum ovato-od-
berum, ^{and que effigie ferrea annulata} ^{in ventre oposta} ^{fl. alt. - f. adsp. et ang. later. fort. levioribus} ^{Nec primula vult. umbra}
^{flor. umbellata invuln. prolypith.} ^{Nec annulata vult. fl. con-}
COR T U S A *. Matth. Boerh.*

CORTUSA *. Matth. Boerh.

CAL. Perianthium patens, quinquefidum, minimum
laciniis obtusis, apicibus reflexis.

Cor. Petalum rotatum. Tubus vix ullus. Limbus planu
partitus, amplius : laciinis subrotundis, ad quarum
nent tubercula quinque.

S T A M. *Filamenta* quinque, brevia, obtusa. *Antheræ* oblongæ, erectæ, exteriori parte affixæ.
Perianthium *campanulatum*. *Stylus* filiformis, staminibus

P I S T. *Germen ovatum. Stylus minoris, Ramis*
Stigma simplex.
P E R. *Capsula ovato-oblonga, acuminata, utrinque lo-*
ter sulcata, unilocularis, bivalvis, valvularum ma-
volutis. utrinq. crenatis.

S E M. numerosa, oblonga, obtusa, parva.
~~Pl. alto flor umbellata Primula. Dicitur ex corollis~~
SOLERNELIA * Tournef. 16

-146-

— 140. *Perianthium* quinquepartitum, rectum, persist. lanceolatis. *tubus breviusculus* *42* *sad 6*
luteum. sensim ampliatum. rec.

Cor. Petalum campanulatum, sensim ampliatum, recto-
cero, acuto. ^{2 tub. long. / obtuso} Filamenta quinque, subulata. ^{long. siccum coherens} Antheræ simpli-

STAM Filamenta quinque, tubulata. Anthers minute
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, longi-

læ, persistens. *Stigma obtusum*.
P E R. *Capsula oblonga*, teres, oblique striata, unilocularis, apice dentata.

cens, apice decem-dentato.
SEM. numerosa, acuminata, minima. Receptaculum
liberum. — ~~Metaphyllum~~ Brounii. 177. 215 f. 3. Lindleyi. Bouvieria
foliacea. — ~~Metaphyllum~~ Brownii. 177. 215 f. 3. Lindleyi. Bouvieria
foliacea. — ~~Metaphyllum~~ Brownii. 177. 215 f. 3. Lindleyi. Bouvieria
foliacea.

Melastomum Brownii 177. 613 g. *Cal. 1. phyl.*
Col. 1. phyl. 5 dent. campion-powis *Abundant* *Stems*
2. l. 199.
Ob. 5. pet. calyx pointed adnate *Abundant* *Stems*
st. 5. leav. petiolis opposite *Abundant* *Stems*
Calyx *integerrim* *velutinum* *tbl. 1. l. 199.*
Lept. glob. 1 or 2 pp.
lobes *aristatae* *stellatae* *or* *obtuse* *acute*
lvs *opposite* *base* *affine* *erect*
foli. 1. 199. *lvs* *opposite* *base* *affine* *erect*
foli. 2. 199. *lvs* *opposite* *base* *affine* *erect*
foli. 3. 199. *lvs* *opposite* *base* *affine* *erect*

A MONOGYNIA.

INET. Tournef. 56. Cerinthoides
Boerh.

titum : *laciniis oblongis æqualibus*,

s brevis, crassus. Limbus tubulato-
ssior: ore quinquefido. Faux nuda,
bulata, brevissima. Antheræ acutæ,
n. Stylus filiformis, longitudine sta-
ida, introrsum planiuscula, extror-
ginata, bilocularia, non dehiscentia.
cuminata.

quatuor distinctis gaudet.

ab Asperifoliis reliquis distinguitur,
fauce nuda pervia.
angula 2 lobi.

TIA †. Pittonia. Plum. 3.
partitum, parvum, persistens: laciniis

us ovatus, calyce longior. Limbus
aciniis latis, acutis. ^{fringed}
subulata, longitudine tubi corollæ.
corollæ. ^{hypothecæ} alt.
receptaculo floris. Stylus simplex,
a simplex. ^{the corolla is divided into two distinct parts.}
aris. annule 4 dent. 4 ppm. ^{the anthers} the anthers
distincta. ^{are distinct}

ACE*. Tournef. 46.

polyphyllum, *multiflorum* mini-
pentagonum, *semiquinquefidum*,
ovatis, calyce obvolutus. Limbus
niis ovato-oblongis, obtusis, integris.
evissima, intra tubum corollæ. An-
us. ligulae filamenta comit
lus filiformis, brevissimus. Stigma

planus insidens, unilocularis, quin-

~~ut cons.~~ gibba, inde plana. Receptaculum
in q. excep. fructus deponit. Cal. 169. latus 2. 203.
IIIq. Chiretia. Branca 168 v. 16 f. t.

Cal. 1. pet. $\frac{1}{2}$ 5 ftd. pers. minian. infus
Can. 1. pet. $\frac{1}{2}$ st.
wall. st. 5. cordell. long. wide tubi ad scand. att
2 ft over 1. styl. 1. May 2 ~~ext. green~~
Base ovata 2 loc. cap. loc. 1. sp. fib.
Cap. loc. 2. ^{Office} capula 2 locul. ovata, ^{dark} green
2 no. 1. long. strut, ^{dark} green
Valvularia et Coldeanum audit. ^{green}

PENTANDRIA MONOGYNIA.

— I⁴⁴. PRIMULA *. PRIME VERE. Primula veris. Tou
Malp. 139. 147. Pont: 1: 2. Auricula Ursi O
d'OURS. Tournef. 46.

CAL. *Involucrum*, polyphyllum, multiflorum, minimum
Perianthium monophyllum, tubulatum, pentagonum,
dentatum, acutum, erectum, persistens.

dentatum, acutum, erectum, per-
C O R. Petalum unicum. Tubus cylindraceus, longitudine
terminatus collo parvo, hemisphærico. Limbus pate-
quinq[ue]fidus: laciniis obverse cordatis, emarginatis, o-
S T A M. Filamenta quinque, brevissima, intrâ collum con-
sumptu[m] errecta conniventes inclusæ.

*Pist. Germen globosum. Stylus filiformis, longitudine
theræ acuminate, erectæ, conniventes, inclinatae.
Stigma globosum. utrum*

P. Capsula teres, longitudine ferme perianthii, tecta
laris, dehiscens, apice decendentato. *ut in aliis, ex quo*
centrale
S. numerosa, subrotunda. Receptaculum ovato-oblo-
berum, *und que et superius quiescere ac nubes levantes operata*
foliis alt. paddr. atque latere long. levigata. In primis vult. umbell.
flora umbellati involucro. prophylli. Vix annulis vult. foliis concavis
SCORTUSA * Martb. Baerh.

CORTUSA *. Matth. Boerh.

CAL. *Perianthium* patens, quinquefidum, minimum,
laciniis obtusis, apicibus reflexis.

COR. Petalum rotatum. Tubus vix ullus. Limbus planus
partitus, amplius : laciinis subrotundis, ad quarum bi-
nent tubercula quinque. *coll. grisea* *Anthera bi-*

STAMI. Filamenta quinque, brevia, obtusa. Antheræ bi-
longæ, erectæ, exteriori parte affixæ.
PIST. Germen ovatum. Stylus filiformis, staminibus v.
Stigma simplex.

Stigma impex.
PER Capsula ovato-oblonga, acuminata, utrinque lon-
ter sulcata, unilocularis, bivalvis, valvularum mar-
ginitis. *utin genitoana.*

S E M. numerosa, oblonga, obtusa, parva.

— 146. ~~SOLDANELLA~~*. Tournet. 16.
Platycodon (Linn.) caulis florib. aperte 1 ad 2 stolido nigro
C. A. L. Perianthium quinquepartitum, rectum, persiste-
lanceolatis. tuba breviter rotundata.

C O R. Petalum campanulatum, sensim ampliatum, recti-
cero, acuto. ^{sub - long / obtus}
S T A M. Filamenta quinque, subulata. ^{farinosa et coherens} Anthers simplices

S T A M Filamenta quinque, ^{filamenta carnea quae in hyphae non dividuntur} longiora.
P I S T. Germen subrotundum. Stylus filiformis, longitu-
læ, persistens. Stigma obtusum. ^{per se} ~~per se~~ ^{per se} ~~per se~~
P E R. Capsula oblonga, teres, ^{oblique} striata, unilocu-

~~Metapium~~ Brown 177. 215 f. 3. Underwriting ~~Opposite~~ 16
Lobularia ~~Stems~~ Cal. 1-phyl. 1-
leaves lob. 1-phyl. 5 dent. campan. parvus Cor. 1-pct. 5
Ost. 5-pct. calyx pointed adnate St. 2-3".
vt. 5. lew. petals opposite slender, gl.
Calyx 5 mm. calyx equal in elevation styl. 1.75" l. acute
Lip. glob. 1 by 1.5". lobes arillate & black 4 cm.
long. ost. base affinis eret. lobes 5 mm. racemes floriferous fol.
fol. 15 stellate revolut. 5 mm. long. racemes floriferous fol.

*luti vero conava antea in petiolis et
caulem ambros non sphyllus.*

MONOGYNYIA.

*. Tournef. 58.

m, ovato-oblongum, tubulatum, inquedentato, persistens.

c. *Tubus cylindraceus, superne an-*
bus quinquefidus, erecto-patens:

membranae tenui cava
culata, libera, intra tubum corollæ,
annexa. Antheræ parvæ, oblongæ,

num. Stylus simplex, longitudine
tenui.

sabat. dñs

um. sumus erectu

rum. stramaria. Reg.
ium Tournef. 43. 44. Pont. 3. 1.

es Fevill. II. 46.

um, oblongum, tubulatum, ventri-
inquedentatum, deciduum horizon-
tanente orbiculata, persistente.

c. *Tubus cylindraceus, calyce ferè*
us, quinque-angularis, quinquepli-
edentato-acuminatus.

culata, longitudine calycis. Anthe-

re. filiformis, rectus. Stigma crassiuscu-

laris, quadrivalvis, basi calycis im-

magna, punctata, dissepimento affixa.

ata asperitas in hoc genere mutantur.

JUSQUIAME, HANNE-BANNE.

Riv. I. 152. 153.

um, cylindraceum, infernè ventri-
to, persistens.

c. *Tubus cylindraceus, brevis. Lim-*
uefidus: laciniis obtusis, unicâ re-

ata, inclinata. Antheræ subrotundæ.

Stylus filiformis, longitudine stami-

nea utrinque insculpta, bilocularis,

natis, tecta, operculo horizonta-

liando ovata, dissepimento affixa.

ad. R. R. B. lib. 6. cap. 16. p. 107.

fot. g. c. cabata nomenclata / d. portulacæ

it. sad. 6. ha. nov 1. 152. 1. 153. 1. 154.

Jaqinæ. Lier. Mediolathin. Dill. Ett. 7123. en me spu. Capota

cal. Sphyll. pers. ineq. fl. se alterna auxili. Cor. 1 pet. tub.

flora alt. membranæ interdys. St. 5. seg. bas. tub. car. lvs. fl.

flora ov. 1. alib. contilaginosa.

Embry. rectus eretus basi apicis. 0 0

PENTANDRIA MONOGYNYIA.

179. NICOTIANA *. TABAC. Tournef. 41.

CAL. Perianthium monophyllum, ovatum, semiquinquefidus, persistens.

COR. Petalum infundibuliforme. Tubus calyce longior. Lipatulus, semiquinquefidus, quinqueplicatus.

STAM. Filamenta quinque, subulata, longitudine ferè co-inclinata. Antheræ oblongæ.

PIST. Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine corollæ capitatum, emarginatum.

PER. Capsula ferè ovata, utrinque linea insculpta, bilocularis dehiscens. Receptacula dimidiato-ovata, punctata, cuncto affixa.

SEM. numerosa, reniformia, rugosa.

OBS. figura acuminata & obtusa in hocce genere nil valet.

ATROPA *. Belladona Tournef. 13.

CAL. Perianthium monophyllum, semiquinquefidum, gibbum, ciniis ovato-acutis, persistens.

COR. Petalum infundibuliforme. Tubus brevissimus. Limb. tricosus, ovatus, calyce longior; ore parvo quinquefido laciniis ferè æqualibus.

STAM. Filamenta quinque, subulata, è basi corollæ enata, tudine corollæ, basi conniventia, superne extrorsum arcuatæ, theræ crassiusculæ, assurgentæ.

PIST. Germen semi-ovatum. Stylus filiformis, longitudine num, inclinatus. Stigma capitatum, assurgens, transversum, longum.

PER. Bacca globosa, calyci magno insidens, bilocularis: taculo carnosæ, utrinque convexo, reniformi, carnosæ.

SEM. plurima, reniformia.

MANDRAGORA *. MANDRAGORE. Tournef.

flor. umbella axill. vad. 5. flor. enby ab flor. cap. flor. lvs. pul.

CAL. Perianthium monophyllum, semiquinquefidum, eretum, magnum, campanulatum, quinquangulare, venosum, periferia laciniis semi-lanceolatis.

COR. Petalum unicum, erectum, sensim ampliatum, calyx majus, ultra medium quinquefidum: laciniis lanceolatis.

STAM. Filamenta quinque, subulata, longitudine calycis, a basi villosa. herba utrinque vobata

PIST. Germen subrotundum. Stylus subulatus, longitudine num, leviter declinatus. Stigma ~~capitatum~~ ^{hinc lumen} _{luteum}.

PER. Bacca globosa, maxima, bilocularis. Receptaculo utrinque convexo.

SEM. plurima, reniformia.

Lombæ. grisea contul. alij. apiculante

Mandragora. ad. a. d. Mandragor. consup. a. Belladona lvs

foliataq. fina velq. alt. minra epule. fl. lvs. 1. flor. lvs.

*et seu vero conuera entia in petiolo tubulatum
caulinum ambros non frigilis.*

MONOGYNIA. *axillifer.*

*. *Tournef.* 58. *alternans*

m, ovato-oblongum, tubulatum,
inquedentato, persistens.

. *Tubus cylindraceus, superne an-*
bus quinquefidus, erecto-patens:

ulata, libera, membrana tenui dura
annexa. Antheræ parvæ, oblongæ,

num. *Stylus simplex, longitudine*
enue. *valv. boli dehinc*

am. *sumus erectum*

et tristitia. Reg.

um Tournef. 43. 44. Pont. 3. I.
es Fevill. II. 46.

n, oblongum, tubulatum, ventri-
quedentatum, deciduum horizon-
nente orbiculata, persistente.

e. *Tubus cylindraceus, calyce ferè*
s, quinque-angularis, quinquepli-
lentato-acuminatus.

ulata, longitudine calycis. Anthe-

iformis, rectus. *Stigma crassiuscu-*

ris, quadrivalvis, basi calycis im-
agna, punctata, dissepimento affixa.

ca asperitas in hoc genere mutantur.

USQUIAME, HANNE-BANNE.

iv. I. 152. 153.

, cylindraceum, infernè ventri-
, persistens.

Tubus cylindraceus, brevis. Lim-
fidus: laciiniis obtusis, unicâ re-

a, inclinata. *Antheræ subrotundæ.*

lus filiformis, longitudine stami-

utrinque insculpta, bilocularis,
tis, tecta, operculo horizonta-
diato ovata, dissepimento affixa.

eadem. Rijati Bont. lib 6. cap 16. p. 107
tot. qm. celesta non cniata / d'paralleli

s ad 6. ha. over 1. lgt 1. iug 1. and.

ovata velutinaria plana planifolia.
rendeli. Cal. 5phyll. latus 3 dent. Cor 1 pet.
monica. latus 3 foliata. etiam 2 pedata. gbs magna
magn. 2 pedata. 2 pet. 2 pedata. 2 pet. 2 pedata.
reducta. 2 pet. 2 pedata. 2 pet. 2 pedata.
hianum valer. seed.

IA MONOGYNIA

AIN DE POURCEAU. Tournef. 68.

quefidum, subrotundum, persistens:

us subglobosus, calyce duplo-major,
sum reflexus, quinquepartitus, maxi-
tatis: collum prominens.

minima, in tubo corollæ. Antheræ re-
x.

Stylus filiformis, rectus, staminibus
ocularis, apice quinquefariam dehis-
centi campanulae bocca rotunda
ngulata. Receptaculum ovatum, libe-

HM. I. 37. VII: 5. VIII. 24.

artitum, minimum, deciduum. us cylindraceus. Limbus patens, quin-

longitudine corollæ. Antheræ simpli-
plex calyx. Stylus simplex, staminibus longior.

glabra, maxima, unilocularis, pul-
losa, villis versus peripheriam radian-
ce vittata. Signatur auct.

IVRE DE GUINE'E. Tournef. 66.

um, quinquefidum, erectum, persi-
s brevissimus. Limbus magnus, se-
catus: laciniis latis, acutis.

bulata, minima. Antheræ oblongæ,

filiformis, staminibus longior. Stigma

tam figuram accedens, bilocularis,
dissepimento adnata, exsucra.

minata est; à congeneribus Pericar-

obato ultimo decadente ceteris. ②

calyx 5phyll. 5pet. 5fr. 5gbs. 5pet. 5fr. 5gbs.

ovar 1. 5locul. 5gbs. 5pet. 5fr. 5gbs.

caps. 1 locul. 5gbs. 5pet. 5fr. 5gbs.

Solanum. flow ad latera foliis non anellata.
Dulcamara foliis oppedit non ante
lycomita. herba. Lycopersicon fructu late striato. Roerh. Cal

PENTANDRIA MONOGYNY

196. SOLANUM *. MORELLE. Tournef. 62.

Tournef. 65. Lycopersicon Tournef. 6
sp. ex var. Rorh.

CAL. Perianthium monophyllum, semiquinquefidum
acutum, persistens.

COR. Petalum rotatum. Tubus brevissimus. Limbus

miquinquefidus, reflexo-planus, plicatus. acutæ lac

STAM. Filamenta quinque, subulata, minima. Anth

conniventes, contingentes. coalitæ in hypanthio qd a

PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, stamin

Stigma obtusum.

PER. Bacca subrotunda, glabra, apice punctato, bilo

ceptaculo utrinque convexo, carnosus.

SEM. plurima, subrotunda, nidulantia.

Solanum hirtum. Plan. panicul. fol. oppedit. sp.

fol. oppedit. lacin. 5pet. 5gbs.

197. PHYSALIS *. Alkekengi Tournef.

CAL. Perianthium monophyllum, ventricosum, se

dum, parvum, pentagonum: laciniis acuminatis, p

COR. Petalum rotatum. Tubus brevissimus. Limbus

fidus, magnus, plicatus: laciniis latis, acutis.

STAM. Filamenta quinque, subulata, minima. Ant

conniventes.

PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, sta

longior. Stigma obtusum.

PER. Bacca subglobosa, bilocularis, parva intra ca

lum, inflatum, clausum, pentagonum, coloratum

lum reniforme, duplicatum.

SEM. plurima, reniforma, compressa.

198. ITÉA. Gronov. virg. II.

Litter. sp. sp. facie opaca fabri fl. rami alt. cyl. fol. alt.

ante opacitatem cornuta entibus basi inclusa. agere subintervale

CAL. Perianthium monophyllum, quinquepartitum

acuminatum, minimum, persistens.

COR. quinquepartita: petalis lanceolatis, acutis, 1

tibus. calyx intus basi.

STAM. Filamenta quinque, subulata, erecta, longitu

Antheræ subrotundæ.

PIST. Germen ovatum. Stylus cylindraceus, periste

dine staminum. Stigma obtusum. hermaph.

PER. Capsula ovata, calyce multoties longior, sty

unilocularis, bivalvis, apice cohærens.

SEM. numerosa, minima.

Ribesioides. fl. herb. 403. umbella hum. 2gbs.

arbor foli. alt. petiol. fl. 2gbs. terminal.

Cal. 5fid. minima

cor. 5pet.

vt. 5. 5gbs.

ovar 1.

fruct.

sem.

PENTANDRIA MONOGYN

STAM. Filamenta quinque, capillaria, longitudine
 - autre à canot. Breton. Cair. Chimalon.

1. cedrus. cedro. cedr. cedro od
l'album. dattat. femina latit. frane. motic
autre à canot. Breton. Cair. Chimalon.

2. Reticum. mag. lab. Natad. Martin. acaj
près moulby, bon à charpentier non
à la casse mais pas à la Jacaiache. can

3. acaj fais outaï

4. cup. acaj micoutoue.

3. cup. Bala canot Cedre an huiba ép. de Cyp
 4. cup. Bal canot. francayar. Mapou on Cypa
goud à la cimone chibou.

6. cup. La Louvoue.

! Soyus impia, spicula

Stigma bisidum. detet stigmen utin conas copo.

P E R. nullum. Receptaculum commune fructification
 villosis perianthia propria distinguit.

S E M. solitaria, villosiuscula. spicula

O B S. Ad Proteam ⁸⁵ proxime accedit, in multis ta

209. CLAYTONIA †. Gronovii. Virgin.

feins Portulacoides cui accedit. 4. ad 6. stylis alta foli. opp. lychnis
flb. spicata termini sing. squamae stipati

C A L. Perianthium bivalve: foliolis subovatis, erectis
 obtusis persistentibus. cauda cauda infructuosa foli

C O R. Petala quinque, ovato-oblonga, erecta, magna

S T A M. Filamenta quinque, setacea, corollâ paulo b
 theræ oblongæ, incumbentes.

I S T. Germen subrotundum. Stylus simplex, longit
 num. Stigma simplex. 3 pedi cyst med.

P E R. Capsula subrotunda, unilocularis. 3 valv. 3 opp.

S E M. plur., subrotunda. 3.

spica piralis utin Gronovii. ad latius folium. am o
foli. alt. linear. ex rot.

Locardi. Amur. Karin-njoti. h. m. 6. 2. 18. Locardi Brach. Robira. foliis
fructu sancta lugidi Koson rostei Rely. multa annuentia, fructu
alt. 30 ped. 1/2 diam. fl. alt. spicata. styl. an 796. lab.

fl. umbella terminalis petiolata

cal. rotund. l. ph. 4. diam. rev. 24. Datura 15. ped. 1/2

cor. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. on 1. g. ment. p. 1/2

angustato. basi angustiora liga. 1/2 caruncul. puncta certa piquet

basi angust. et tenui angust. fructu altissima

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. sol. crassa ab

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. l. sp. 2. 1/2. 1/2

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. fl. exsert. tan

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. cal. 5. phyllip

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. angulo. styl. 1. 6

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. capitula coriace

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. 1. l. levigata

ov. Bas. 5. lig. 5. lig. petiol. opp. et lili. acumin. 2. l. levigata

altis altis lateris insinuante *alata*

RIA MONOGYNIA.

RVENCHE. Pervinca Tournef. 45.

quepartitum, erectum, acutum, persi-

eriforme. *Tubus* calyce longior, inferne
tior, lineis quinque insculptus: ore pen-
talnis quinque partitus: laciniis apici tubi
ribus, oblique truncatis.

ue, brevissima, inflexa, retroflexa. *An-*
tusæ, erectæ, incurvæ, margine utrinque

rotunda, quibus ad latera *corpuscula* duo,
stylus utrisque unus communis, cylindra-
inum. *Stigmata* duo, perpendicularia:
anum; *superius* capitatum, concavum.
es, longi, acuminati, erecti, univalves,
tes.

cylindracea, sulcata.
icus, ob germina gemina, ad Digniam

LAURIER-ROSE. Tournef. 374. 9

quepartitum, acutum, minimum, per-
forme. *Tubus* cylindraceus, limbo bre-
quinquepartitus: laciniis latis, obtusis;

in terminans, brevis, in segmenta ca-

subulata, brevissima, in tubo corollæ.

entes, filo longo terminatæ.

m, bifidum. *Styli* vix ulli. *Stigmata*

longi, acuminati, erecti, univalves,

s. pronata pappo, imbricatim posita.

ANGIPANIER. Tournef. 439.

quepartitum, obtusum, minimum.

ne. *Tubus* longus, sensim ampliatus.

ecto-patens: laciniis ovato-oblongis,

bulata, è medio tubi. *Antheræ* con-

fidum. *Styli* vix ulli. *Stigma* duplex,

fatuus monachus.

altis altis lateris insinuante

alata

PENTANDRIA MONOGYNI

PER. *Folliculi* duo, longi, acuminati, ventricosi, de-
nutantes, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, oblonga, membranæ majori ovatæ ad-
ta, imbricata. *alata*.

CAMERARIA. Plum. 29.

220. *st. opp. fl. conq. tenuis*
luteo-phylla

CAL. *Perianthium* quinquefidum, acutum, connivens

COR. *Petalum* infundibuliforme. *Tubus* cylindraceus,
& apice ventricosus. *Limbus* quinquepartitus, plani
lanceolatis, cum sole flexis.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, è medio tubi. A-
niventis.

PIST. *Germina* duo, cum appendicibus ad latera. ST.
Stigmata obsoleta.

PER. *Folliculi* duo, horizontaliter reflexi, oblongi, ut-
tusi, juxta latera baseos utrinque lobum emittentes
res, univalves. *luteo intedit rau pectin dehinc*

SEM. numerosa, ovata, membranæ majori ovatæ ad b-
imbricata.

221. TABERNÆMONTANA †. Plum. 30.

florib. austri. M. Jan I: 46. Pala ad ex quatuor e-
annulorum. luteo-phylla. flor. p. tenuis.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, acutum, connivens

COR. *Petalum* infundibuliforme. *Tubus* cylindraceus,
& apice ventricosus. *Limbus* quinquepartitus, plani
linearibus, obtusis, cum sole flexis.

STAM. *Filamenta* quinque, minima, è medio tubi. A-
niventis. *subsp. in aptu tubi 3 rugulo.*

PIST. *Germina* duo, simplicia. *Stylus* subulatus. *Stigma*

PER. *Folliculi* duo, horizontaliter reflexi, ventricosi,
uniloculares, univalves. *luteo intedit rau pectin dehinc*

SEM. numerosa, ovato-oblonga, obtusa, pulpâ invol-
cata. *in 2 ordines in inglorio, 1 ordinis in aliis sutura p. illi*
ali. Lactesc. fol. opp. et alii anticoplia. plana aperta sic con-

222. CEROREGIA, vide HM. IX:

4. scand. fol. opp. longi petiolæ ampliæ enne Pala h.m. 1.2. 46. 2. 27

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, acu-
stens.

COR. *Petalum* unicum: basi magna, globosa, quam *for*
draceus, oblongus, terminat. *Limbus* minimus, qui-
tus, acuminatus, apicibus connivens, lateribus dehi-

STAM. *Filamenta* quinque, in basi corollæ, minima
conniventia. *Antheræ* parvæ.

PIST. *Germen* minimum. *Stylus* vix ullus. *Stigmata*

PER. *Folliculi* duo, cylindracei, acuminati, longissimi
uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, imbricata, oblonga, pappo coronata

curvus robust. à Dodeca cicutaria

Salad. m. fol. 2 ad 3. flor. pedata tenuis algens ac-

sitig. 2. laevig. tenuis. curvus robust. pappo gl.

RIA MONOGYNIA.

Dod. de aliis suis monogynis

M*. Dill. elth. 221. f. 289.

tusa, compressa, latere plano rumpens,
yllum, cylindraceo-infundibuliforme,
patente, duodecimfido.
plana, tubo nectarii externe supra basin
subulata, nectarii apici inserta, eoque
gæ, incumbentes.
gonum, sub receptaculo. *Stylus* filifor-
gior. *Stigma* obtusum.
triquetra, trilocularis, trivalvis.
Receptaculum columnare.

Lilio-Narcissus Tournef. 207. Dill.
elth. 162.

Receptaculum columnare. 1. floro.
sa, compressa, emarginata, latere pla-
ta. *Antheræ* oblongæ, incumbentes,
lata. *Antheræ* oblongæ, *filamenta* in dan-
, sulcatum, infra *receptaculum*. *Stylus*
ne & situ staminum. *Stigma* trifidum,
ocularis, trivalvis.

minimum & pistilli in hoc genere admo-
naturi.

†. Sagittariæ similis Moris. III.
M. XI. 44. Michelia Houst. A. A.

longa, latere dehiscens.
, ringens. *Labium superius* rectum,
ali. *Lab. inferius* reflexum, triparti-
æ inserta, quorum unicum minimum,
heræ incumbentes.
supra *receptaculum*. *Stylus* simplex,
gma simplex.
, trilocularis, triangularis, trisulca.

Rad. Tuberosa aperte bell. *epiphyta* fere repens. foli. *semicyl.* car-
omnia radice decant. *folia* radice late tenui crenulatis altero alt-
i. *ipso* rotati. *Zenon* quae *cavaria* et *metraea* (My. 1/2) quae la-
HEXANDRIA MONOGYNIA

323:

~~POLIANTHES~~ ^{molesta est venenosa} Tuberosa

CAL. nullus.

COR. infundibuliformis, monopetala. *Tubus* incurvus.
Limbus patulus: *laciniis* sex, ovatis.

STAM. *Filamenta* sex, crassa, obtusa, ad faucem con-
lineares, filamentis longiores. ^{dimid. dorsi} *flammea* am-

PIST. *Germen* subrotundum, in fundo corollæ. *Sty-
corollæ* fere brevior. *Stigma* trifidum, crassiuscu-
rum.

PER. *Capsula* subrotunda, obtuse trigona, basi coro-
trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, plana, gemino ordine incumbentia-
lata.

324. CRINUM ^{ac utrumque Liliæ in Thym.} * Lilio-Asphodeli species Dil.

CAL. *Involucrum* spathæforme, bifolium, oblongu-
ferum, post dehiscentiam reflexum.

COR. infundibuliformis, monopetala. *Tubus* oblong-
ceus, inflexus. *Limbus* sexpartitus: *laciniis* lanci-
bus, obtusis, concavis, reflexis, quarum tres alter-
lo uncinato distinctæ.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, è basi limbi, long-
conniventia. *Antheræ* oblongæ, lineares, assur-
gentes.

PIST. *Germen* in fundo corollæ. *Stylus* subulatus, st-
vior. *Stigma* trifidum, minimum.

PER. *Capsula* subovata, trilocularis.

SEM. plura.

325.

~~BULBOCODIUM~~ *

CAL. nullus. ^{infusa}

COR. hexapetala, infundibuliformis. *Ungues* longissi-
Faux connectens petala. *Limbus* erectus: petalis
concavis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, limbo dimidio brev-
rum collo inserta. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* ovato-subulatum, obtuse trigonum.
mis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, oblonga-
naliculata.

PER. *Capsula* triangularis, acuminata, angulis, ob-
cularis.

SEM. numerosa.

OBS. Quantum itaque à Colchide differat, patet ex-
Etere 300. cum hoc ~~est~~ ^{est} ~~est~~ non dñe

A MONOGYNYA.

~~Dicitur alii pars monogynia~~

*. Dill. elth. 221. f. 289.

a, compressa, latere plano rumpens;
um, cylindraceo-infundibuliforme,
tente, duodecimfido.
na, tubo nectarii externe supra basin
alata, nectarii apici inserta, eoque
, incumbentes.
um, sub receptaculo. *Stylus* filifor-
m. *Stigma* obtusum.
queta, trilocularis, trivalvis.
colum columnare.

Lilio-Narcissus Tournef. 207. Dill.
h. 162.

~~in Jacobo. 1. flo.~~
, compressa, emarginata, latere pla-
~~batisca~~ ~~syn~~ ~~ovarium~~ ~~irreg.~~ ~~irreg.~~
ta. *Antheræ* oblongæ, incumbentes,
sulcatum, infra receptaculum. *Stylus*
& situ staminum. *Stigma* trifidum,
ularis, trivalvis.

inum & pistilli in hoc genere admo-

. Sagittariæ similis Moris. III.

xii. 44. Michelia Houst. A. A.

nga, latere dehiscens.

ringens. *Labium superius* rectum,

li. *Lab. inferius* reflexum, triparti-

inserta, quorum unicum minimum,

ræ incumbentes.

pra receptaculum. *Stylus* simplex,

na simplex.

trilocularis, triangularis, trisulca.

Rad. tuberosa aperte bellum *gymnos* fere repens. foli semperl. cardu
omnia radiz. excaul. scuta radiz. late tota involuculata altero att. ay
H. portati. 2 centrum quaeque cœlaria et petraea (Mz. 1/2) quæ latum

HEXANDRIA MONOGYNYA

~~male deo et non de~~
323. ~~POLIANTHES~~ *. *Tuberosa* Ha

CAL. nullus.

COR. infundibuliformis, monopetala. *Tubus* incurvus
Limbus patulus: *laciniis* sex, ovatis.

STAM. *Filamenta* sex, crassa, obtusa, ad faucem coro
lineares, filamentis longiores. ~~invenit~~ ~~dorsi~~ ~~flamant~~ ~~annu~~

PIST. *Germen* subrotundum, in fundo corollæ. *Stylus*
corollâ fere brevior. *Stigma* trifidum, crassiusculu
rum.

PER. *Capsula* subrotunda, obtuse trigona, basi coroll
trilocularis, trivalvis.

SEM. plurima, plana, gemino ordine incumbentia
lata.

324. ~~CRINUM~~ *. Lilio-Asphodeli species Dill.

CAL. *Involucrum* spathæforme, bifolium, oblongum
ferum, post dehiscentiam reflexum.

COR. infundibuliformis, monopetala. *Tubus* oblongu
ceus, inflexus. *Limbus* sexpartitus: *laciniis* lancea
bus, obtusis, concavis, reflexis, quarum tres altern
lo uncinato distinctæ.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, è basi limbi, longit
conniventia. *Antheræ* oblongæ, lineares, assurgen
entes.

PIST. *Germen* in fundo corollæ. *Stylus* subulatus, stan
vio. *Stigma* trifidum, minimum.

PER. *Capsula* subovata, trilocularis.

SEM. plura.

325. ~~BULBOCODIUM~~ *. ~~Theys~~

CAL. nullus. *infus*.

COR. hexapetala, infundibuliformis. *Ungues* longissimi
Faux connectens petala. *Limbus* erectus: petalis
concavis.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, limbo dimidio brevi
rum collo inserta. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* ovato-subulatum, obtuse trigonum. *S*
mis, longitudine staminum. *Stigmata* tria, oblonga
naliculata.

PER. *Capsula* triangularis, acuminata, angulis, obso
cularis.

SEM. numerosa.

OBS. Quantum itaque à Colchide differat, patet ex
etere 300. cum hoc ~~in his~~ ~~casu~~ ~~non~~ ~~difer~~