



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.


Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.



Institute for Botanical Documentation

AD 85

Digitized by the Institute for Botanical Documentation



Hunt Institute for Botanical Documentation

AD 85

Hunt Institute for Botanical Documentation

E·D

Hunt Institute for Botanical Documentation

C A

S: E R: GIAE
PROFESS
nec no
UP

S

PL

PLA

G

Fleunt Institute for Botanical Documentation

ST

Cum Privilegio S.

IMP

2^o ed

3^o ed

1753.

CAROLÍ LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

Hunt Institute for Botanical Documentation

CUM
DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

(No 68 editione ad avion 1754)

illust. Botanico
D. Bernh. de Jug.
Author.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIAE,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

2^a edit. prodit 1762. 2. vol. le revol. annua. p. p. 1763
de 1784 p. p. in syst. nat. ED. 12. 1767.

3^a edit. prodit. 1784

Ignoto Genere proprio
nulla descriptio, *quis accuratā tradita,*
certām demonstrat,
sed plerumque fallit.

CÆSALP. præfat:

Hunt Institute for Botanical Documentation

STORMÄGTIGSTE ALLERNÅDIGSTE
KONUNG OCH DROTTNING
ADOLPH FRIDERIC,
LOVISA ULRICA,
SVERIGES GÖTHES OCH VENDES
KONUNG OCH DROTTNING!

tradita,
istrat,
fallit.
æfat:

Hunt Institute for Botanical Documentation



DRA MAJESTETER är jag
allerunderdåigst skyldig detta verk,
frukten af min måsta och båsta lef-
nad, det jag nu under EDRA
MAJESTETERS milda regering fått med
nögd och roligt sinne fullborda.

*EDRE MAJESTETER hafva, i-
från första lyckeliga ankomsten til riket, stådse
ansett mig med blida strålar, kallat mig som of-
taft til Sit Hof, och betygat emot mig all Kon-
gelig nåd.*

*EDRE MAJESTETER hafva ock
gifvit den Vetenskapen, som jag idkat ljus och anse-
ende i Sit Rike, då EDRE MAJESTE-
TER ej allenast allernågft låtit Skaparens
underverk för sig beskrifvas, utan ock hopkallat
allehanda jordenes inbyggare af alla tre Natu-
rens riken, samt befalt dem inlogeras uti sina
präktiga lust-slott Ulriksdahl och Drottningholm,
der desse, liksom deputerade från bela vida verl-
den, få dageligt företräde för MAJESTE-
TERNS ögon.*

*Tror mig altså ej såga för mycket, då jag
rent ut bekänner, at ifrån den visa Konung Sa-
lomens tid och Drotningens af rika Arabien, in-
ga Potentater gjordt på den Alsmågtiga Skapa-
rens underverk större akning.*

*Ty bör och skal denna Vetenskapen täfla med
alla andra minnesmärken, at göra EDRA
MAJESTETERS namn odödeliga, då den
in-*

inpræglar dem i Naturens egen bok, som årligen
å nyo uplägges, at blifva med Jordklotet lika
beständig.

Himmelen göre *EDRA MÄJESTE-
TERS* dagar och regering lång och lyckelig,
så vist jag lefver och dör

EDRA KONG. MAJESTETERS

allerunderdånigste och tropliktigste
tjänare och undersåte
CARL LINNÆUS.

LECTORI ÆQUO.

Homo sui conscius observat MUNDUM esse omnipo-tentis theatrum, undique adornatum summis Om-nisciæ sapientiæ miraculis, se vero in hunc, tamquam Hospitem introductum, ut hisce deliciis sese delectan-do magnificentiam Domini agnoscat. Indignus profecto-is censendus hospes, qui, pecoris instar, tantum gulæ in-servit, nec magnalia possessoris intueri atque æstimare novit.

HOSPITES ut digni evadamus orbis, opera hæc Crea-toris scrutari nobis necesse est, quæ ita cum nostris com-modis combinavit sumnum Ens, ut eis, unde omnia no-stra bona desumimus, carere nulla ratione quæamus; & quo magis hæc intelligimus, eo etjam plura in usum generis humani cedunt.

COGNITIONEM horum ut rite acquiramus, singula distincta Idea & distincto Nomine complecti oportet, qui-bus sepositis copia rerum nos obruat necesse est, & com-mercium omne, deficiente communi lingua, cessabit.

SCIENTIA NATURÆ inde inter Homines nata est, quæ comprehendit sub *Physica* & *Chemia* Elementa, sub *Zoologia*, *Botanica*, *Lithologia* tria Naturæ regna.

REM HERBARIAM heic libare lubet, quæ quondam paucarum plantarum erat Scientia; hodie vero copia delectorum evasit omnium amplissima.

INVENTORUM recentioris ævi indefessis laboribus notitiam debemus plurium Plantarum, quam omnibus priscorum temporum eruditis, inter quos imprimis no-minandi *Clusius*, *Columna*, *Bauhini*, *Hermannus*, *Rheede*, *Sherardus*, *Rajus*, *Plukenetius*, *Tournefortius*, *Plumierus*, *Vaillantius*, *Dillenius*, *Gmelinus*. &c.

NOTI-

LECTORI.

NOTITIA plantarum constabat quondam Nominibus arbitriis, memoriae tabulæ infixis, quam vacillantem *I-*cones sublevabant.

SYSTEMATICORUM sapientia indagavit ordinem qui memoriæ succurreret, & scientiam solidis fundamentis inædificaret, quem debemus Principibus Viris *Gesnero*, *Cæsalpino*, *Baubino*, *Morisono*, *Hermanno*, *Tournefortio*, *Vaillantio*, *Dillenio*, aliisque.

ARIADNEUM hoc filum Systematicorum terminatur *Generibus*, quod tentavi ad *Species* usque extende-re, confectis legitimis harum differentiis, ut etjam in hisce sua sibi constaret certitudo, quum *omnis vera cognitio cognitione specierum innatur*; hac enim difi-
ciente vacillat & historia, ut in plerisque *Peregrinatorum* diariis.

SPECIES plantarum ut mihi familiares redderem, per-
gravi Alpes *Lapponicas*: totam *Sueciam*: partem *Nor-
vegiae*, *Daniae*, *Germaniae*, *Belgii*, *Angliae*, *Gallicæ*: per-
quisivi deinde HORTOS Botanicos: *Parisinum*, *O-
xonensem*, *Chelsejanum*, *Hartecampensem*, *Leidensem*, *Ul-
trajecitum*, *Amstelædamensem*, *Upsaliensem* aliosque: e-
volvi etjam HERBARIA *Burseri*, *Hermannii*, *Cliffor-
tii*, *Burmanni*, *Gronovii*, *Royeni*, *Sloanei*, *Sherardi*, *Bo-
barti*, *Milleri*, *Suriani*, *Tournefortii*, *Vaillantii*, *Jussiæ*,
Bækii &c. Meo suasu DISCIPULI quondam dile-
ctissimi: *P. Kalmius Canadum*, *F. Hasselquist Ægyptum*, *Toren Scandie*
P. Osbeck Chinam, *P. Læfling Hispaniam*, *Solandum ang-*
tin Lapponiam adire, plantasque lectas mecum com-*Mon-ticium*
municarunt. E variis terris demum misere Amici
BOTANICI semina plantasque siccas non paucas, u-*Particula ma-*
ti *B. Jussieu*, *Royenus*, *J. Gesnerus*, *Wachendorfius*, *Sib-
torpius*, *Montius*, *Gleditschius*, *Krascheninnikoffius*, *Minuartius*, *Velezius*, nec non *Q. Munchhausen L.*
B. S. C. Bielke L. *B. J. Ratgeb Equ.* *Demi-
Kleinhoff ortga, illa, szpaly allianies* *i fortaloni*
Zizanius, *gouanus*, *geocaudex* *doff*

LECTORI.

doff Nob. Collinson, Torèn, Braad, aliisque. Clifford omnes quas in duplo habuit: Lagerström indiae orientalis plurimas: Gronovius plerasque Virginicas & Gmelinus Sibericas facile omnes, at Sauvagesius integrum suum thesaurum plantarum dedit, exemplo raro & inaudito, unde factum, ut copiam plantarum obtinuerim non mediocrem.

DIFFERENTIAS Specificas antehac Plantis non paucis imposui in Flora Lapponica, Suecica, Zeylanica, in Horto Cliffortiano, Upaliensi. Iisdem principiis institere prætantissimi Botanici Gronovius, Royenus, Walther, Coddendorff, Gorter, B. Jussieus, Le Monier, Guettard, Hill, Loddon, Dalibard, Sauvages, Colden, Hill, inque non paucis Haller, Mees, Hallerus, Gmelinus aliique, quorum opera plurimæ Species evasere ratæ & evidentes. Lallierius, Seguier, Scopoli, Guérard, Burmannus.

NOMINA hæc passim dispersa in gratiam studiosorum consultum duxi colligere, acquisitas dein plantas addere, inque unum Systema reducere, at vero pluribus Speciebus observatis, prætantioribus notis detectis, aptioribus Terminis cisis, debui interdum differentias emendare, antea quamvis optimas.

Characteres essentiales pro NOMINE SPECIFICO constituere non levidense opus est; requirit enim Specierum plurium accuratam cognitionem, harum attentissimam partium indagationem, differentium selectionem, Terminorum denique artis propriam applicationem, ut evadant compendiosissimi tutissimique.

NON VISAS plantas heic omisi, toties elusus ab auctoribus, ne dubia certissimis miscerem; si vero aliquando contigerit non sufficienter inspexisse plantam, vel specimen imperfectum obtinuisse, signo + hoc notavi, ut alii eandem accuratius examinent.

Non

LECTORI.

Non nominatas in hoc Libello plantas, si quis ad me mittere velit, eas in proxima editione V. D. recensembo cum honorifica recensione datoris.

NUMERUM plantarum totius orbis longe parciorem esse, quam vulgo creditur, satis certo calculo intellexi, utpote qui vix ac ne vix 10000 attingat.

TRIVIALIA nomina in margine apposui, ut missis ambagibus, uno quamlibet Herbam nomine complecti queamus; hæc vero absque selectu posui, quippe quem aliis dies poscit. Caveant autem quam sanctissime omnes sani Botanici, umquam proponere nomen triviale sine sufficienti differentia specifica, ne ruat in pristinam barbariem scientia.

SYNONYNA paucissima in EUROPÆIS plantis adhibui, contentus C. Baubino & Iconographo præstantiore; in EXOTICIS vero plura, quum difficiliora minusque trita sint.

DESCRIPTIONES tantum in obscuris adhibere necesse fuit, easque sine ambagibus, ut obtinerem compendium tironibus gratum.

LOCA natalia more meo adjeci, inque notissimis *Fruticantes* ♂, *Perennes* ♀, *Biennes* ♂, *Annuas* ☽ notavi.

GENERALA nonnulla *nova*, nonnulla *immutata* adhibui, quæ in nova editione Generum plantarum propediem sistere animus est.

ADVERSARIORUM tela nunquam retorsi: acerrima convitia, insimulationes, cavillationes, buccinationes, (præstantiorum longe Virorum, omni ævo, laboris præmia) tranquillo animo sustinui, nec suis auctoribus hæc invideo, si inde ipsis apud vulgus gloria maior.

Zai a entrare du 3. vol. annoeuit. ad. loc. D'hort. 98. p. 415 - 441.
Nomenclator Plantarum. d. Bergelii. 1759. les nomis Germaniques Plantarum
in 6 langus. 1^o Latin 2^o Nederl. 3^o français 4^o anglais 5^o hollandais 6^o allemand
LECTORI. Petrus genom

jor. Fero hæc, quæ in me ne capillum quidem mutant, & cur non ferrem iniquos, qui a veris Botanicis & quidem consummatissimis, quibus assurgere debent illi, summis cumulatus sum encomiis. Parem deinde adversariis referre gratiam, nec anni ingraevcentes, nec munus, quo fungor, nec mei mores patiuntur. Quod mihi supereft brevioris ævi, tranquillus utilioribus observationibus impemdam. Res naturales enim proprio privilegio munitæ persistunt, ut quemadmodum errores in his commissi a nullo defendi, ita nec veritates observationibus innixæ a toto eruditorum orbe conculcari possint; judices itaque provoco seros Nepotes:

*Pascitur in vivis litor, post fata quiescit,
Tum suus ex merito quemque tuetur bonos.*

Dabam 1753 d. 2 Maii. Upsaliæ.

Scopoli. Noen. aut. media Iðria. Flora Carniolica
Vienna 1760. 8°. 607 pag. classes 23. juxta fragmenta Bot. Linnae,
vid. Caracteres classis plantarum non sufficiunt, plerique coronas, paucissimi
mi generales seu exclusivi vel raro classi proprie. Nomina ab descrypt.
ex hisque dispensantes plerique, et ad eam. normam. Catalogus singulæ uti
utique fore oportet intrepidus.

* Leyser. Flora halensis. Halæ 1761. 8°.
Lee. introd. in. Rotan. London 1760. 8°
miller. Dictionar. herbarium Lond. 1760. fol
gerard. Flora gallo-Britannica Lond. 1761. 8°
Linne. Herbar. Goetting. - Goetting 1757. 8°
allomius. Stirps medicamentariae - Lauræ 1755. 4°
Vitruvius medicinalis - Sand - 1757. 8°
herbar. Caminius. - - - - - 8°.

Plautz
Seder flora Sandra. Hafford 1761. fol
Plautz icones per Brennerum ameliorata 1755. fol

AU-

critica Botanica. Lugd. 1737. 8.
Clavis plantarum 1738. 8.
Syst. Nat. 2nd. folio 1759. 8.

AUTORES
Genera plantarum. 1755. 8.

2nd. 1762. folio 2.

REFORMATORES.

- PROPRIA Genera plantarum. *Lugd. 1752. oct. Holmiae. 2nd 1754-8.*
 Philosophia Botanica. *Holmiae. 1751. oct.*
 Hortus Cliffortianus. *Amstel. 1737. fol.*
 Hortus Upsaliensis. *Holmiae 1748. oct.*
 Flora Suecica. *Holmiae 1745. oct.*
 Flora Lapponica. *Amstel. 1737. oct.*
 Flora Zeylanica. *Holmiae 1747. oct.*
 Viridarium Cliffortian. *Amstel. 1737. oct.*
 Materia Medica. *Holmiae 1749. oct.*
 Amœnitat. Academ. 1. *Lipsiae. 1749. oct. 3 vol. 1756 | 6. Vol. 1763.*
 Amœnitat. Academ. 2. *Holmiae 1751. oct. 4 — 1759 | 7. 1760.*
 Iter Oelandicum. *Holmiae 1745. oct. suec.*
 Iter Gotlandicum. *Holmiae 1745. oct. suec.*
 Iter Westrogothicum. *Holmiae 1747. oct. suec.*
 Iter Scanicum. *Holmiae. 1751. oct. suec.*
 Acta Upsaliens. R. soc. *Holmiae 1740. &c. quart.*
 Acta Stockh. R. soc. *Holmiae 1739. &c. oct. suec.*

* *

- KALM PETR. Plantæ canadenses propediem edendæ. *iter americ. 1753. 3*
 HASSELQUIST FR. Pl. ægypti in act. ups. & epistolis. *iter egyptiensem 1757. 8. 4.*
 OSBECK PETR. Pl. chinenses in literis, Msc. iter ind. orii 1757. 8. 4.
 LOEFLING PETR. Pl. hispanicæ in epistolis, Msc. iter hispan. 1758. 8. 4.
 * * *

- GRONOVIUS J. F. Flora virginica 1. 2. *Leide 1739. oct.*
 ROYEN ADR. Flora leidenensis. *Leide 1740. oct.*
 GORTER DAV. Floræ gelro-zulphan. *Harderv. 1745. oct. 1757. 8. 2.*
 JUSSIEU B. Pl. rariores variæ in lit. & act. paris. *Floræ ingrica*
 GUETTARD M. Observations sur les plantes. *Paris. 1747. oct. 1761.*
 DALIBARD M. Flora parisiensis. *Paris. 1749. duod.*
 SAUVAGES FR. Flora monspeliensis. *Hagæ 1751. oct.*
 COLDEN CONR. Plantæ coldinghamiæ. *act. ups. 1743. quart.*
 WACHENDORFF E. J. Hortus Ultrajectinus. *Traject. 1747. oct.*
 HALLER ALB. Stirpes helveticae. *Götting. 1742. fol. 1749. 8.*
 LUDVIG. C. G. Genera Aphorismi. *Lips. 173. oct. 1750. 8.*
 GMELIN J. G. Flora Sibirica 1. 2. *Petrop. 1750. &c. quart.*
 MONIER. LUD. GUIL. cat. des pl. en Auvergne &c. Par. 1745. q.
 BÜTTNER D. G. Plantæ cunonis. *Amstel. 1750. oct.*
 HILL JOH. Historis of plants. *Lond. 1751. fol.*
 MITCHEL JOH. Genera pl. virginic. *E. N. C.*
 MONTI CAJET Genus Aldrovandæ &c. *Inst. Bonon. Vol. 2.*
 SESLERUS LEONH. Epistola de vitaliana. *Venet. 1750. fol.*

- Zingaro. Encom plant. aureae. *Lugd. ful. 1760. 8. USI Vienna. 1762.*
 Drassn. her. lat. Jaenq. — *Lond. 1756. pl.*
 Meesha flora drifia — *transf. 1760. 8. Sept. H. Andra.*
 Lille Alabardito vnde — *Lond. 1760. 8. viii. 1750. 8.*
 Hudson. ac. oayra — *Lond. 1762. 8.*
 gourau flora meravelist. *transf. 1762. 8.*
 Kraemer flora arboresca. *Vienna. 1766. 8.*

Bauple malacea. } Specimens measured 12 and 15 µm - capsule 1.9 mm. - wings 1.6 mm. - body 1.6 mm.
Rough. S. 2. 71. f. 1. } placed at Liverpool. Reddy Ring's Hill. fol. petiolata crenata. Sp. 1.9 mm.
cavities tender 1.1 µm. thin fibrous lamellæ with hyaline tissue crusty, albid.
Hab. Australia. **USITATORES.** *influence here* *fibres,*
placed into *wings*.

USITATIORE

Bauhini	pinax.	
Bauhini	Historia pl.	
Camerarii	epitome.	
Columnæ	ecphrasis.	
Clusii	bistoria.	
Dodonæi	pemptades.	Lobelii
Fuchsii	historia.	Brunsfelsii
Dalechampii	historia.	Tabernæmontani
Marcgravii	brasilia.	
Alpinus	exotica.	Cornuti
Lœselii	prussica.	Renealmi
Morisoni	historia. 2. 3.	Specimen.
Raji	historia. 1. 2.	Supplementum 3. Synopsis 3:tia
Plukenetii	Almagestum, Phytographia.	
Petiveri	gazaphylacium.	
Sloani	Jamaica.	
Hermannii	Hort. lugdbat. Paradisus.	
Rheede	Hort. malab.	
Commelinii	Hort. amstel. 1. 2 Præludia.	
Breynii	Centuria.	Prodromus a filio.
Dodartii	memoires.	Rivini Ordines.
Tournefortii	institutiones.	
Plumierii.	Genera, Species, Americana; Filices.	
Fewillæi	peruviana.	
Isnard	acta parisina.	
Bocconis	Museum,	Siculae plantæ.
Barrelieri	Icones.	

Boerhavii	<i>Hortus lugd-batavus.</i>
Kæmpferi	<i>Amœnitates exoticæ.</i>
Scheuchzeri	<i>Gramina; Itinera alpina.</i>
Michelii	<i>Genera nova.</i>
Vaillantii	<i>Acta parisina. Flora parisina.</i>
Monti	<i>Gramina. Zodiaca. ad. Redovam</i>
Buxbaum	<i>Centuria.</i>
Catesby	<i>Carolina 1. 2. 3.</i>
Burmanni	<i>Zeylanica, africanarum decades.</i>
Amanni	<i>Ruthenica, Herbarium.</i>
Dillenii	<i>Elthamenses, Musci.</i>
Seguieri	<i>Verona.</i>

Glas-

Bangla malana pughe 5' 2.71 fl. minatae petiole.
fl. protaetaria virginalis
Ruday alba dentata fl. 6 primus. capitulo. ^{area Globularia} 7 ovata. 2. Valva

Ranunculus *contortus* Ruph. s. 2-6g. tuber ad 2. cyp. arct. repeat. foli) angusti ringens' ad 20)
(quadr) 2 (longus, longus, cuneolati. Cor. 6pd. 3 pet. cylind. 3 dites conduplicat.
lef. lacin. ped. termin. 4 quatuor foliis longis, glandul. Cio. 6pd. 3 pet. cylind. 3 dites conduplicat.
Ranunculus *contortus* s. albi arcte flws.

MONANDRIA

MONOGYRIA

Cordamomum simpliciter officin. dictum B. Pin.
Cordamomum enchy. vulg. cordi.

herb
Taco lat. comb
Sacouba, avic
Etachi, mauritanus

} helbaea. arab.

Katubala ad 67

~~CANNA~~. *Dupa* est un nom de *Tang*. Katubala ad 67

1. CANNÀ foliis oxyatis utrinque acuminatis nervosis. *Katubala* h.m. +
Roy. lugdb. II. Fl. Zeyl. I. Hort. upsi. I.
Canna Ipatulis bifloris. Hort. cliff. I. Katu bala. h.m. 11.1.43. Rana Keri. Arun-
Arundo indica latifolia. Baub. pin. 19. fl. ferruginea / latititidinaria. Danidogua Zaper
Habitat inter tropicos Asiae, Africæ, Americæ. 4 5 pd. fl. caud. oval aestata
 2. CANNÀ foliis lanceolatis petiolatis nervosis. *angustifol. Katubala*
Canna foliis lanceolatis petiolatis. Hort. cliff. i. Meeme. fig. 116. ad. 67
 Arundo indica florida angustifolia. *Moris hist. 3. p. 250.*
f. 8. t. 14. f. 6. folia uti 7.63 paulangustiora fl. lutei granulatis spica.
Habitat inter tropicos Americæ: Umbrosis spongiosis. 4 4 pd.
 3. CANNÀ foliis lanceolatis petiolatis enervibus. *Roy. glanca. - Katubala*
lugdb. II. folia 7. vel alangustiora fl. prati lutei valde sericei.
Canna foliis enervibus. Virid. cliff. 104. albava { *albava* { *Meeme. fig. 116. ad. 67*
 Cannoides. *Hort. cliff. 488.*
 Canna Acorus glaucophylius, ampliore flore, iridis pa-
 lustris facie. *Dill. elth. 69. t. 59. f. 69.*
Habitat in Carolinis. Sagavino. Madagascarii.

Habitat in Carolina? Found with noisy birds.

AMOMUM, AMOMIUM sordidum.

Zingiber 66.
Hort. cliff. 3. *Zingiber*.
Hort. up. I. Flor. 2 ey. 3 d. Mat. med. I. Roy. lugd. *Zingiber* 244. 3 d.
12. cal. o. lvs. 4 mm. lvs. 4 pr. ineq. rev. lvs. ovat. obtus. usq. *Zingiber* 31.
Zingiber 2 ad. 3 Bals. ppr. 25. *Zingiber* 57. 66. ad. 2 ad. 3 Bals. ppr. 25. *Zingiber* amb.
Habitat in Indus inter tropicas 2 radice velut in bello conch. foliis cypri cypri floribus.

2. AMOMUM scapo nudo, spica oblonga obtusa. Hort. Zeylanicus

3. AMOMUM scapo bracteis alternis laxis caule bre- Cardamom.
viole. Fl. zey. 4. Mat. med. 2. ^{cavu} membran coquid q. vallibus. uij. Radix rugosa. ^{Cardamomum}
Elettaria. Rhead. ^{4-5t nodos. Hb. app. calyx rbus. uirg. 1. allat}

Lancea galanga. L. 183. ex type de Tijoux acutifl. var. Lancea galanga glauca L. 183. ex type de Tijoux acutifl. var. Lancea galanga glauca L. 183. ex type de Tijoux acutifl. var. Lancea galanga glauca L. 183. ex type de Tijoux acutifl. var.

Mater ovata pungens tenuis flavus rubor edulis solida caerulea
quagatia universa gymn adhesiva erecta

Graec. parad. 4. AMOMUM scapo vestito racemoso. 

Amomum caule racemoſo. Mat. mea. 3.
Grana paradisi officinarum. Bauh. pin. 413.
Habitat in Madagascar, Guinea.

racemosa. ALPINIA Roy. lugdb. 12.
alpinia ad. 66 Alpina racemosa alba, cannacori foliis. Plum. Gen. 26.
Paco feroca Marcgr. bras. 48.
Habitat in America calidiore. 2

MARANTA.

~~maranta ad 60~~. MARANTA. Hort. cliff. 2 * Roy. lugdb. II.
~~Bambanum.~~ Maranta arundinacea, cannacori folio. Plum. gen. 16.
Mart. cent. 39. O

*Habitat in America calidiore. 2-3 p. caulis sub 4 gm. foliis
pubes foliatis ovatis basi obtusis angustiatis. petioles longi late reditantes et flexi-
biles petiolata, media petiolis longi. foliis exstans foliis apicem modo alto vel de-
currens basi terminis. vagina tota hispa capite corona crenata - brevis obt.*

CURCUMA ad. 66.

rotunda.

manja-kua. hin

manja. malab

Davikka. Braem

Raij do Lapaon. lug N

Zamponi cont. ji. malayi.

Terumbat cladodictyon Rumph. 1697

Alangutte. Terumbat.

Kuah kueong longa.

Tumket. Indi

Ganti. chinensis

Zamponute. Ind.

Curcumba. Ind.

mat. med. 5. 17. 67. 1. 7. 67. per a crux

I. CURCUMA foliis lanceolato-ovatis; nervis laterali-
bus rarissimis.

Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis: nervis late-
ralibus paucissimis. Roy. lugdb. 12. Fl. zeyl. 6.

*Manja-kua. Rheed. mal. II. p. 19. t. 10. *Braem. Davikka.*

*Habitat in India. 2-3 p. Raij do Lapaon. 17 p. Rad. tuber tunice
foliacea. aculeo rotundata. corma ex med. floro. foliis. vix grandiorata.*

27. CURCUMA foliis lanceolatis. nervis lateralibus nu-
merofiliis foliis nervis et. cunctis sent. sed alineatis p. 1. vnt.
Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminatis: nervis
lateralibus numerofiliis. Roy. lugdb. 13. Fl. zeyl. 7.

*Hiapata. guiana herba Hiapata in guiana abundans. Radice gingiberis sapore, ad diarrhoeam
enim sedandam utilis. B. Pin. 326.*

MONANDRIA DIGYNIA.

4

*Kali geniculatum majus. Baub. pin. 289. Moris. hist. 2.
p. 610. f. 5. t. 33. f. 7. Raj. hist. 211.
Habitat in Arabia.*

virginia.

3. SALICORNIA articulis apice compressis emarginatis bifidis.

Salicornia caulum ramorumque articulis apice bicornibus. Gron. virg. 129.

Habitat in Virginia, & ad Salinas Saxoniae. ○

caspica.

4. SALICORNIA articulis cylindricis, spicis filiformibus.

Kali arborescens, tamarisci facie. Buxb. cent. 1. t. 11. f. 1.

Habitat in squalidis maris Caspii & Mediæ t.

Linnopenea. ad. 80.

vulgaris.

1. HIPPURIS. Fl. lapp. 1. Fl. suec. 2. Hort. cliff. 3.

Linnopenea cordata. Linnopenea cordata. 15. Roy. lugdb. 205. Dalib. paris. 1.

Equilettum palustre, brevioribus foliis, polyspermum.

hippny. Linn.

Baub. pin. 35.

Pinastrella. Dill.

Habitat in Europæ fontibus. 2

HIPPURIS.

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

Corispernum. ad. 261.

hysopifol.

1. CORISPERMUM floribus lateralibus. Hort. upf. 2.

Corispernum floribus alternis. Hort. cliff. 3. Jt. gotl.

316. Roy. lugdb. 205. Sauv. monsp. 52.

Corispernum hysopifolium. Juss. act. 1712. p. 244.

Habitat ad Volgam Tartariæ, Gillan Borussiæ, Monspeli arenosis. ○

Corispernum. ad. 261. squarrosum.

2. CORISPERMUM spicis squarrosis. Hort. upf. 3. *

Rhagrostis foliis arundinaceis. Buxb. cent. 3. p. 30. t 55.

Habitat ad Wolgam Tartariæ, inque desertis Cossacorum. ○

Morocarpus. ad. 25 capitell. Blitum. 1. BLITUM capitellis spicatis terminalibus. Hort. upf. 3.

Morocarpus. Buxb. ad. 261. Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis,

chrysanthemum. Buxb. capitulis summis nudis. Virid. cliff. 1. Roy. lugdb. 206.

Blitum foliis triangularibus dentatis. Hort. cliff. 28.

Atriplex baccifera. Ray. hist. 197.

Habitat in Europa: præsertim in comit. Tyrolensi. ○

Morocarpus. ad. 25 capitatum.

2. BLITUM capitellis sparsis lateralibus. Hort. upf. 3.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis,

tis,

ad Diandriaem
IA.
Moris. hist. 2.
ffis emarginatis
apice bicorni-
nae. ○
picis filiformi-
t. I. t. II. f. I.
ediae 5.

Hort. cliff. 3.
polyspermum.

Hort. upf. 1.
F. 3. ft. gotl.
712. p. 244.
liæ, Monspe.

ort. upf. 3.
3. p. 30. t 55
rtis Cossaco

annunti 6.

. Hort. upf. 3.
ibus baccatis,
oy. lugdb. 206.
cliff. 28.

yrolensi. ○
Hort. upf. 3.
ycibus bacc-
tis.

Mon

Di

DIANDRIA MONOGYNIA.

5

tis, capsulis summis foliosis. Hort. cliff. 495. Roy.
lugdb. 206.

Atriplex sylvestris, mori fructu. Bauh. pin. 119

Habitat in Tataria, Hispania. ○

~~Cult 61. Moroza~~
~~sup. adan~~

CINNA.

I. CINNA.


Habitat in Canada, unde semina per D. Kalm. 2.

Gramen magnitudine Avenæ sativæ. Folia fere arundinacea, læviuscula. Panicula densa, flaccida. Flores conferti, secundi, lateribus calycis & petalo majore scabri. Arista infra apicem Glumæ majoris petali brevissima. Gramen inamœnum stamine unico spectabile.

abola. adan
arundinacea.

Riva. Dic. grecorum
et altera species graminis
parvulus in ciliacæ resur-
cujus viventes etu boas
inflammantur.

? plantæ ad
Parvulus et Ramulus
accedit. Ramulus mult
ramulus parvulus ut int.



alluvia Shum. species curvatae. Radix ab tuberosis eruditæ majoribus
edulis. fol. 5 ad 6 rad. curvatae petiolæ 2 pdoli.
Sequuntur radicellæ 3 pd. curvatae.

curvata

alluvia

champæ. garz. { champæ flors odore gravior q̄. lilium albus, et magni apud Ind. B. fin 470.
Tulle. Livat { arbor Indias q̄. flors tota anno forent traximini odoris. Lys. B. fin 470.

DIANDRIA MONOGYNIA.

Floribus. auct^o arbor indica que negramin festu ad flor^o gigant^o litionum specie auct B. Pinck 1700.

Classis II.

DIANDRIA

MONOGYRIA.

— *Pit. jegan multa h. m. 6. 2. 32. Sali. Mach. Jasminum bimaculatum* *fl. luteo-purpureo* *fol. lato* *l. 395*
Jasminum catalinianum. Jasmin d'Espagne. fol. opp. 1. pinn. 7. fl. exsert. fl. & corolla ter-
fl. mag. quam. officinali.

DIANDRIA MONOGYNIA.

JASMINUM.

1. JASMINUM foliis oppositis pinnatis. *Hort. cliff. 5.*

Hort. upf. 5. Mat. med. 9. Roy. lugdb. 397.

Jasminum vulgatius, flore albo. Baub. pin. 397.

Habitat in India. ♂ ⚡ ligata 2-lob. longa.

2. JASMINUM foliis oppositis ternatis. *Hort. cliff. 5.*

Fl. zeyl. 13. Roy. lugdb. 397.

Jasminum azoricum trifoliatum. Comm. hort. I. p. 159.

t. 82.

Habitat in India.

3. JASMINUM foliis alternis ternatis simplicibusque, *fruticaceo*.

ramis angulatis. Hort. cliff. 5. Hort. upf. 5. Roy.

lugdb. 397. Sauv. monsp. 174.

Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. Baub. pin.

398. Bacc. ⚡ ligata 1. luteo-purpurea

Habitat in Europa australi. ♂ ⚡ ligata 2-lob. longa 2-pinn.

clavata 2-lob. obtus. radulae infundibulatae

4. JASMINUM. foliis alternis ternatis pinnatisque, *ra-humile*.

mis angulatis. Hort. upf. 5.

Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort. cliff.

6. Roy. lugdb. 398.

Jasminum humile luteum. Baub. pin. 397.

Habitat in Europa. ♂ ⚡ ligata

5. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, *ra-odoratissimum*.

mis teretibus. Hort. upf. 5.

Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. Hort. cliff. 5.

Roy. lugdb. 397.

Jasminum indicum flavum odoratissimum. Ferr. cult. 93.

Habitat in India? ♂

LIGUSTRUM.

1. LIGUSTRUM. *Hort. cliff. 6. Fl. svec. 4. Roy. lugdb. vulgare.*

398. Dalib. paris. 2.

Ligustrum germanicum. Baub. pin. 475.

Habitat in Europæ collibus glareosis. ♂

Cypri. in vico. foliis glab. olive-labiatis. in vides evanescitibus. fl. alba. odore

parvissima. indigo. Shanxi. fracti. simili.

PHILLYREA.

1. PHILLYREA foliis lanceolatis subintegerrimis. *Hort. angustifol.*

upf. 5.

Mari vett. h. M. 42-54. Pada daligni. Brach. Queriles hujus. Rarten haran hujus.
 Rarten sol. opp. orat ob. sentis. Rami alt. rot. flor. corymb. exalt. alt.
 fl. andini 8 galii. Rama orat rava rorculant. ramales flos. nova spec. superius
DIANDRIA MONOGYNIA.

Phillyrea ad 223 *latifolia*. 1. *Phillyrea* foliis ovato-lanceolatis vix crenatis. *Hort. cliff.*
 4. *Roy. lugdb.* 398.

Phillyrea ligustri folio. *Baub. pin.* 476.

2. *Phillyrea* foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 4.
 Roy. lugdb. 398.

Phillyrea angustifolia 1. 2. *Baub. pin.* 476.

Habitat in Europæ australioris collibus. 5

Phillyrea ad 223

• *latifolia*. 2. **PHILLYREA** foliis cordato-ovatis serratis. *Hort. cliff.*

Phillyrea 3. *Dalech* 4. *Hort. upf.* 6. *Roy. lugdb.* 398.

Phillyrea latifolia spinosa. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea folio leviter serrato. *Baub. pin.* 476.

Habitat in Europa australi. 5

OLEA.

Olea ad 223 • *europea*. 1. *OLEA* foliis lanceolatis.

Olea foliis lanceolatis, ramis teretiusculis. *Hort. cliff.* 4.
 Mat. med. 10. *Roy. lugdb.* 398.

Olea lativa. *Baub. pin.* 472. *Olea* lativa officinum. *B. pin.* 472.

2. *OLEA* foliis lanceolatis, ramis tetragonis. *Hort. cliff.* 4.
 Roy. lugdb. 399.

Olea lystellis, folio duro subtus incano. *Baub. pin.* 472.

Habitat in Europa australi. 5. *Vestigia* ad *olea* capiuntur. *olea* manuina triplena. *B. pin.* 472. *olea*, sed alia *oleaceae*, ad *oleum*. *Hegel.*

? *olea* capensis. 2. *OLEA* foliis ovatis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 399.
Ligustrum capense sempervirens, folio crasso subrotundo. *Dill. elth.* 193. t. 170. f. 194.

Habitat ad Cap. b. Spei. 5. *sud. fava* *casuarina* t. *feruginea* p. 268.

CHIONANTHUS.

Chionanthus ad 223

• *virginica*. 1. **CHIONANTHUS** pedunculis trifidis trifloris.
Chionanthus. *Hort. cliff.* 17. *Gron. virg.* 10. *Roy. lugdb.* 17.

Amelanchier virginiana, laurocerasi folio. *Pet. sicc.*

241. *Catesb. carol.* 1. p. 68. t. 68.

Habitat in America septentrionali. 5

zeylonica. 2. **CHIONANTHUS** pedunculis paniculatis multifloris.
Fl. zeyl. 14.

Arbor zeylanica, cotini foliis subtus lanagine villofis.

Burm. zeyl. 31.

Habitat in Zeylona. 5

S Y-

VERONIC
nisve.

1753

alina. adans. Vimen. Brown. 369. 722 f. 5. arb. scand. fruct. citri.
 fl. racemis Cal. syring. sp. 26. cor. 2 pet. unigyn. calyx und. at.
 var. infum caps. succub. glb. 1 cor. 2 valv. apod. Dab. 2. Sunt. orig. lusit.
 pulpa vera test.

DIANDRIA MONOGYNIA.

SYRINGA.

1. SYRINGA foliis ovato cordatis. Hort. cliff. 6. Hort. vulgaris. +
ups. 6. Roy. lugdb. 397. Dalib. paris. 2.
Syringa carulea. Baub. pin. 398.
Habitat versys Persiam. alba flore tricoloris. adans. 1754.
2. SYRINGA foliis lanceolatis.
a. Syringa foliis lanceolatis integris. Hort. cliff. 6. Hort. persica. +
ups. 6. Roy. lugdb. 397.
- B. Syringa foliis lanceolatis integris dissectisque laciniata. — Laciniata ad.
Hort. cliff. 6. Hort. ups. 6. Roy. lugdb. 397.
- ... Ligustrum foliis laciniatis. Baub. pin. 476.
Habitat in Persia? 5

Lilac. ad 223

Lilac. matth.

Lilac. Dab.

Syringa. Dab. 66. tab

persica. +

Lilac. ad

Cantab. adans.

ERANTHEMUM.

1. ERANTHEMUM. Fl. zeyl. 15. * Amoen. acad. 385. * capense.
Ephemerum lychnidis flore africanum. Herm. parad. 153.
Amm. herb. 232.
Habitat in Aethiopia.

Daphne. Dab.

Lilac. ad

Pigafetta. adans.

223.

CIRCAEA.

1. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus.
Circaea. Fl. suec. 5. Hort. cliff. 7. Roy. lugdb. 303.
Dalib. paris. 3.
Solanifolia Circaea dicta major. Baub. pin. 168. It. w-
goth. 213.
- B. Circaea canadensis latifolia, flore albo, Tournef. inst. canadensis. +
301.
Habitat in Europæ & Americæ borealis nemoribus. 2
Hæc sesquipedalis caule erecto, Racemis terminali & la-
teralibus; Perianthium consistentia calycina, s. corol-
la longe crassius, rufiusque, nec corollæ concolor.
2. CIRCAEA caule adscendente, racemo uno.
Circaea calyce colorato. Fl. lapp. 3. ^{Circaea minima colum} Circaea. ad
Solanifolia Circaea alpina. Baub. pin. 168.
Habitat ad radices montium in frigidis Europæ. 2
Planta vix digitæ longitudine, magis procumbens, calyce
colorato, uti corolla; differt quidem a priori, attamen
nimis affinis.

Circaea ad 85.

Lilaciana.

Circaea.

Can.

Circaea ad

diplobot.

specie.

Can.

alpina. + Circaea.

Can.

Circaea. ad

Circaea.

Can.

Circaea.

Can.

Circaea.

Can.

Circaea.

Can.

VERONICA.

* Spicata.

1. VERONICA spicis terminalibus, foliis quaternis qui-
nisve.

Veronica. 209

virginica.

Vero-Veronica. 209

Veronica. 209

1753

DIANDRIA MONOGYNI

H. p. t. longa compacta pauciflora
 10. *Veronica foliis quaternis quinisve.* Hort. cliff. 7 * Gron.
 cal. 1700. 300. 4. Roy. lugdb. 301. Cold. noveb. 3.
Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis &
 etiam quinis caulem amplexantibus, spicis florum
 candidissimis. Pluk. alm. 383. t. 70. f. 2.
Habitat in Virginia. 2. 3rd. pl. fol. 4 ad 5. sub fl. alt.

spuria.
Veronica ad. 209. 2. VERONICA spicis terminalibus, foliis ternis æquali-
 ter serratis. Hort. ups. 7. *

Veronica spicata angustifolia. Baub. pin 246.
Veronica mas surrecta elatior. Barr. rar. 155. t. 891.

Veronica maritima. 3. VERONICA spicis terminalibus, foliis ternis inæqua-
 liter serratis:
Veronica floribus spicatis, foliis ternis. Fl. suec. 6.
Veronica foliis sæpius ternis. Virid. cliff. 2. Hort. cliff.

7. Roy. lugdb. 301.
Veronica caule erecto, spicis pluribus, foliis lanceolatis

serratis. Fl. lapp. 4.
*Habitat in maritimis Europæ macris apri-
 cis.* 2. 2nd. pl. fol. 3 ad 4. virid.

longifolia. 4. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis lan-
 ceolatis ferratis acuminatis. Hort. ups. 7. *
Veronica spicata latifolia. Baub. pin 246.
Veronica i erectior latifolia. Clus. hist. I. p. 346.

Veronica spicata longifolia altera. Amm. ruth. 26.
Veronica spicata, urticæ folio. Amm. ruth. 26.
Habitat in Tataria, Austria, Suecia. 2.

incana.
Veronica ad. 5. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis cre-
 natis obtusis, caule erecto tomentoso. Hort. ups. 7. *
Veronica caule fruticoso, foliis oblongis: inferioribus cre-
natis petiolatis; superioribus sessilibus integerrimis.
Roy. lugdb. 530.

*Veronica spicata lanuginosa & incana, floribus cær-
 leis.* Amm. ruth. 30.
Habitat in Ucrania, Samara. 2. 3rd. pl. fol. 3 pp. incana

spicata.
Veronica ad. 6. VERONICA spica terminali, foliis oppositis crenatis
 obtusis, caule adscendente simplicissimo.
Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule erecto.
Fl. suec. 7. Dalib. paris. 3.

Veronica foliis oppositis, caule spica terminato. Hort.
 cliff. 8. Roy. lugdb. 302.

Veronica spicata minor. Baub. pin. 247.
Habitat in Europæ borealis campis. 2. 1st. ed.
 fol. 3 pp. opp. alt. fl. canto spica terminata.

7. VE-

1. VERONICA
 tuse serrata
 Veronica folio. Ra
 Habitat in Ob. Folia
 spicæ mag
 United States
 8. VERONICA
 positis, ca
 Veronica fl
 bente. Fl.
 Veronica ca
 vatis strig
 302. Veronica m
 Habitat in E
 nately radiata.
9. VERONICA
 Veronica fo
 lugdb. 302.
 Veronica alp
 t. 117. t. 1
 Veronica par
 t. 114. f. 3
 Chamædrys
 Habitat in al
 fl. caput. 302.
10. VERONICA
 diphyllo.
 Veronica ca
 ribus conge
 helv. 531.
 Veronica alpi
 Burs. XIV
 Habitat in H
- II. VERONICA
 ferrato dent
 Bonarota. Mi
 Pæderota Ger
 Chamædrys a
 Habitat in alp
12. VERONICA
 lycibus hispi

Veronica anomala sive Syrenaria. R. Pin. 145. In montib. gallicis. Veronicae.

DIANDRIA MONOGYNIA.

II

7. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis obtusis serratis scabris, caule erecto. *hybrida.* *Veronica ad. 209*
Veronica spicata cimbobritannica, bugulæ subhirsuto
folio. Raj. syn. 3. p. 278. t. II. f. I.
Habitat in Europa rarius.
- Obs. Folia veronicæ sequentis, Caulis precedentis, sed spicæ majores pallidiores. *Veronica* *varia* *flavescens* *quercina* *face* *parvum*, *tota* *incana* *pubescens*. foliis crenatis obtusis, oblongis, officinalis.
8. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Mat. med. II.* *Veronica* *procumbens*
Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente. Fl. suec. 8. Dalib. paris. 3. *Veronica gal. 209*
Veronica caule repente, scapis spicatis, foliis oppositis ovatis strigosis. Fl. lapp. 5. Hort. cliff. 8. Roy. lugdb. 302. *Veronica ad*
- Veronica mas supina & vulgatissima. Baub. pin. 246.
Habitat in Europæ sylvestribus sterilibus. *Veronica* *mas* *veronicae* *caule* *nudo*.
- ** Corymbo-racemosæ.
9. VERONICA corymbo terminali, scapo nudo. *Veron-corymba ad*
Veronica foliis ovatis radicalibus, caule nudo. Roy. apphylla. *Veronica ad.*
lugdb. 302. Papaver delaceo color tingit. foliis.
- Veronica alpina pumila, caule aphyllo. Bocc. mus. 2. p. 17. t. I.
- Veronica parua saxatilis, caulinis nudis. Pluk. alm. 384. t. II. f. 3. Segu. ver. 241. t. 31. f. 2.
- Chamædrys alpina minima hirsuta. Baub. pin. 247.
Habitat in alpibus Europæ australioris. *Veronica* *alpina* *hirsuta* *helvetica* *heller* *no 341.* *Veron-corymba ad*
10. VERONICA corymbo terminali, caule adscendente bellidioides. *Veronica ad*
diphylo.
- Veronica caule non ramoso, foliis obtusis crenatis, floribus congestis terminato, foliis ovatis subasperis. Hall. helv. 531. t. 12. f. 1.
- Veronica alpina, bellidis folio. Baub. pin. 247. prod. 116. Burs. XIV: 27.
- Habitat in Helvetia, Pyrenæis. *Veronica* *alpina* *bellidis* *foliis* *ovatis* *subasperis*.
11. VERONICA corymbo terminali, foliis oppositis ferrato dentatis, calycibus linearibus. Bonarota. Mich. gen. 19. t. 15. f. 12. *Veronica* *bonarota* *mich* *1759*
Bonarota. Mich. gen. 19. t. 15. f. 12. *A. latice* *Veronica* *bonarota* *mich* *1759*
Pæderota Gen. pl. II. Chamædrys alpina saxatilis. Baub. pin. 248. *Pæderota* *ad. 209*
Habitat in alpibus Italicos. *Veronica* *alpina* *1759*
12. VERONICA corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispidis. *Veronica*.

Vc.

7. VE-

DIANDRIA MONOGYNIA.

Veronica floribus corymbosis terminalibus, calycibus hispidis. *Fl. suec.* 13.

Veronica caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis. *Fl. lapp.* 7. *t.* 9. *f.* 4.

Veronica caule inferne procumbente fruticoso, foliis ovatis oppositis, racemo terminali. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica alpina frutescens. *Bauh. pin.* 247.

Habitat in alpibus Europæ. 2*ypm.* 1*ypm.* 1*ypm.* 1*ypm.*

* *serpyllifolia.* 13. VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis.

Euphrasia notabilis. Brunf. *Veronica ad 209.* Veronica floribus solitariis subcorymbosis, foliis ovatis glabris crenatis. *Fl. suec.* 14. *Dalib. paris.* 4.

Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis. superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9.

Gron. virg. 4. *Roy. lugdb.* 302. *Cold. noveb.* 1.

Veronica floribus sparsis, foliis ovatis crenatis glabris. *Fl. lapp.* 6.

Veronica pratensis serpyllifolia. *Bauh. pin.* 247.

Habitat in Europa & America septentrionali ad vias, agros. 2*ypm.* 1*ypm.* 1*ypm.* 1*ypm.*

Veronica ad

* *Beccabunga.* 14. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. suec.* 11. *Dalib. paris.* 7.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus racemosis lateralibus. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus lax spicatis ex alis. *Hort. cliff.* 8. *Gron. virg.* 4.

Anagallis aquatica major (minorque), folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europa ad rivulos. 2*ypm.* 1*ypm.* 1*ypm.*

Anagall. v 15. *Veronica ad*

Anagall. maj. 2ab.

VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Fl. suec.* 10. *Dalib. paris.* 7.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus lax spicatis ex alis. *Gron. virg.* 4.

Veronica aquatica major, folio oblongo. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europa ad fossas. 2*uti 14 ab. eruto. flia latim.*

Veronica ad

VERONICA racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Fl. suec.* 9. *Dalib. paris.* 7.

Veronica foliis linear-lanceolatis integris, racemis lax floriferis. *Fl. lapp.* 9. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica aquatica angustifolia scutellata. *Bauh. pin.* 252.

Habitat in Europæ inundatis. 2*uti 14 ab. fl. graminea.*

17. VE-

- DIA
 11. VERONICA
 Veronica mont
 t. 38.
 Habitat in Arm
 12. VERONICA
 sis dentatis,
 Veronica foliis
 inferioribus I
 Veronica foliis
 xe floriferis.
 Chamædrys spu
 Habitat in Eur
 13. VERONICA
 gnis dentatis
 Veronica foliis
 superioribus I
 303.
 Veronica prater
 23. t. 34.
 Chamædrys spu
 Habitat in Hel
 10. VERONICA
 pedunculo b
 Veronica foliis
 dunculatis. R
 Veronica foliis
 riis. Hort. cli
 Alfine chamædi
 dentibus. Bau
 Habitat in Eur
 21. VERONICA
 sis pedunculo
 Veronica foliis
 tariis sessilibu
 lugdb. 303.
 Alfine veronicae
 Bauh. pin. 25
 Habitat in Eur
 12. VERONICA
 quinquelobis.

DIANDRIA MONOGYNIA.

13

17. VERONICA racemis lateralibus, foliis multifidis. *multifida*. X
Veronica montana, folio vario. *Buxb. cent. I. p. 24.*
t. 38.
Habitat in Armeniæ, Iberiæ graminosis. 2

18. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugo-
sis dentatis, caule debili. *Fl. suec. 12. Dalib. paris. 4.*
Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis
inferioribus laxe spicatis. *Hort. cliff. 8. Roy. lugdb. 303.*
Veronica foliis cordatis sessilibus oppositis, racemis la-
xe floriferis. *Fl. lapp. 8.*

Chamædrys spuria minor rotundifolia. *Bauh. pin. 249.*
Habitat in Europæ pratis. videlicet vniuersitatibus & dianonibus multitudinibus, sed non in pratis siccis.

19. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis ru- latifolia. +
gosis dentatis, caule stricto.
Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis
superioribus laxe spicatis. *Hort. cliff. 9. Roy. lugdb.*
303.
Veronica pratensis omnium maxima. *Buxb. cent. I. p.*
23. t. 34.
Chamædrys spuria major latifolia *Bauh. pin. 248.*
Habitat in Helvetia, Bithynia. 2

Veronica ad 249
Chamædrys. • *Dwarf*
Hierobane foli. id.
Verbenæa mag. gal
Steno-chamædrys. Thal-
chamædrys vid. lob.

Hunt Institute for Botanical Documentation

20. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis agrestis. +
pedunculo brevioribus. *Fl. suec.* 17. *Dalib. paris.* 6. *Veronica* foliis cordatis crenatis, floribus solitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 303. *Veron. fl. solit. pedunc. oblong. crenat. folio. mon.*
Veronica. ad

Veronica foliis alternis cordatis crenatis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9.
Alfinae chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. *Baub. pin.* 250.
Habitat in Europæ cultis, arvis. *O* *γραν. monach. fol. inf. gr.*
Hyperb. fl. crenat.

21. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. *Fl. suec.* 16. *Dalib. paris.* 5. *Veronica* foliis oppositis cordatis crenatis, floribus solitariis sessilibus. *Hort. cliff.* 9. *Gron. virg.* 4. *Roy. lugdb.* 303. *Veronica. arvensis.* *Slyphid. dubius.*
Veronica. ad

Alfinae veronicæ foliis, flosculis caulinis adhærentibus. *Baub. pin.* 250.
Habitat in Europæ arvis, cultis. *○*

22. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Fl. suec.* 18. *Dalib. paris.* 6. *Veronica. ad* *bederæfolia.* *Dick*
Elatum. gal. Dod. Her

- Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. *Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 303.*
Alsfne hederulæ folio. Baub. pin. 250.
- B. Veronica chia, cymbalariæ folio, verna, flore albo: umbilico virescente. *Tournef. cor. 7. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 39. f. 1.*
Habitat in Europæ ruderatis. ◎
** Obs. Semina umbilicata sunt huic propria.*

+ • triphylos.
Veronica ad. 209

23. VERONICA floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Fl. suec 19. Dalib. paris. 6.*
 Veronica foliis alternis: inferioribus quinquepartitis; superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 302.*

- Veronica triphylos cærulea. *Baub. pin. 250.*
Habitat in Europæ agris. ◎ mpo. fol. chamaephyti alt. florib. annill. p. 1. coen. 1. apud flor. in monte monte. 15 mai invenit.

24. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. *Fl. suec. 20.*

- Veronica humilis erecta montana, flore parvo cæruleo. *Dill. app. 38.*

- Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Hispaniæ aridis apricis. ◎*

25. VERONICA floribus solitariis subsessilibus, foliis oblongis subdentatis, caule erecto.

- Veronica minima, clinopodii minoris folio glabro, romana. *Bocc. mus. 2. p. 29. t. 102. Vaill. paris. 201. t. 23. f. 3. Raj. suppl. 423.*

- Veronica erecta, acini folio glabro, floribus cæruleis. *Dill. app. 39.*

- Habitat in Europæ australioris agris. ◎*

- Planta nostra gerit folia magis oblonga, quam illa a Vallantio picta.*

26. VERONICA floribus solitariis sessilibus, foliis lanceo-lato-linearibus glabris obtusis integerimis, caule erecto. *Fl. suec. 15. **

- Veronica terrestris annua, folio polygoni, flore albo. *Moris. hist. 2. p. 322. s. 3. t. 24. f. 19.*

- Habitat in Europæ hortis, arvisque. ◎* mpo. fol. alt.

- marilandica. 27. VERONICA floribus solitariis sessilibus, foliis linearibus, caulis diffusis.

- Veronica caulis procumbentibus, foliis linearibus, floribus sessilibus lateralibus. *Gron. virg. 4.*

- Habitat in Virginia.*

herba de Campania *{ Adatoda spicata odoreta sericea foliis. Dacnis, Cayena.*

JU-

Je maran
Ribova.
DIA

Justicia
concava.

Adhatoda zey

Pluk. alm. 9

Habitat in Zey

JUSTICIA

ovatis persist

zeyl. 16. He

Justicia foliis o

lea concava.

Adhatoda zey

Pluk. alm. 9

Habitat in Zey

JUSTICIA

ovatis decidu

Fl. zeyl. 17.

Adhatoda, spic

7. t. 4. f. 1.

Carim-curini.

126. t. 171 f

Habitat in Ma

JUSTICIA

ovatis acumini

18. *

Betonica frutesc

Bem-curini. RH

Habitat in Indi

JUSTICIA

dunculis triflo

bus.

Justicia foliis lin

Hort. cliff. 10

Ebolii indici f.

hyssopifolia p

132. t. 280.

Habitat in insul

JUSTICIA

mis; spicis ter

eteis setaceis.

Euphrasia, alfine

golcondea. P

Habitat in Zeyl

JUSTICIA rep

minalibus, bra

Adhatoda spicat

Burm. zeyl. 7

Habitat in Zeyl

Gandruella

Ceva campana. t

W. floppa

Adhatoda

spicata

Burm. zeyl. 7

Habitat in Zeyl

DIANDRIA MONOGYNIA.

1. JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis Adhatoda.
ovatis persistentibus, corollarum galea concava. Fl. zeyl. 16. Hort. upf. 7. adatoda ad 209.

Justicia foliis ovato-lanceolatis, spicis foliosis, florum galea concava. Hort cliff. 9. Roy. lugdb. 291.

Adhatoda zeylanensium. Herm. lugdb. 642. t. 643.
Pluk. alm. 9. t. 173. f. 3.

Habitat in Zeylona. 5

2. JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis Ecbolium.
ovatis deciduis mucronatis, corollarum galea reflexa. Carim-curini. adatoda ad
Fl. zeyl. 17. ^{Carim-curini. malab}

Adhatoda, spica longissima, flore reflexo. Burm. zeyl.
7. t. 4. f. 1.

Carim-curini. Rheed. mal. 2. p. 31. t. 20. Pluk. alm.
126. t. 171 f. 4.

Habitat in Malabarria, Zeylona. 5

3. JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolato-ovatis, bracteis Betonica.
ovatis acuminatis venoso-reticulatis coloratis. Fl. zeyl.
18. *

Betonica frutescens. Bont. jav. 146.

Bem-curini. Rheed. mal. 2. p. 126. t. 21.

Habitat in India. 5

4. JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. hyssopifolia.

Justicia foliis linear-lanceolatis, floribus saepius solitariis.
Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 291.

Ecbolii indici s. Adhatodæ cucullatis floribus aemula,
hyssopifolia planta ex insulis fortunatis. Pluk. alm.
132. t. 280. f. 1.

Habitat in insulis Fortunatis. 5

5. JUSTICIA procumbens, foliis lanceolatis integerrimis, spicis terminalibus lateralibusque alternis, bracteis setaceis. Fl. zeyl. 19. *

procumbens.

Euphrasia, alines angustiore folio, rubiae modo spicata,
golcondea. Pluk. alm. 142. t. 56. f. 3.

Habitat in Zeylona. 2

6. JUSTICIA repens, foliis ovatis subcrenatis, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis. Fl. zeyl. 20. *

repens.

Adhatoda spicata, flosculos ex foliolis membranaceis.
Burm. zeyl. 7. t. 3. f. 2.

Habitat in Zeylona. 2

Gaudichaudia Rupr. sp. 2-2g what abouty bracts fls. 2 bracts
Cava canina. h. m. 2-36. Bracts cava. Nam. @ 2nd. in arid. areas. coats begin
semi opp. flopp. and. fl. spic. / glandular. termin. 2 bracts. sub. cal. 3-4 bracts st. 2.
opp. and. bracts 2 bracts. 1 cm. 2 ad h. 1 styl. super. bracts.
spic. varieg. vires. in bracts only 2 bracts. 19269.

Yada Nod. 2. 42. Ralo adalatto. Aram. 2. 43 ad 4 p. in oreund. ram et fl. opp. ex
vix angust. fl. portent. alt. vix sub. 2 lab. Cal. 3 phyl. cor. 2 lab. et 2.
ap. 1. 60 15 p. nov. gen. ad utricular. aed.

ad 201.

16

DIANDRIA MONOGYNIA.

7. JUSTICIA herbacea, foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis trifloris, bracteis ovalibus.

Habitat in China.

Caulis angulati, pedales, inferne ramosi. folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, obtusiuscula, vix crenata. Ex alis pedunculi duo s. tres, singuli breves apice triflori, involucro diphyllo, setaceo, nudo, bracteis ovatis, obtusis, longitudine floris, minimis.

- echioides. 8. JUSTICIA foliis lanceolato-linearibus obtusis sessili- bus, racemis adscendentis-secundis, bracteis setaceis. Fl. zeyl. 21. *

capula Barlowae
sed etiam. ? q. val 2
var. D. & mal.
flia topica contra
venena animalia ratibus
camer. jeptrumia alba
Suec. jeptrumia alba
sexangular.

Euphrasiæ affinis indica echioïdes. Herm. lug db. 668. t. 669.

Peetumba. Rheed. mal. 9. p. 87. t. 46. Butumbo-Braun

Habitat in India. 3 ped. in vidi. culles. hymen. fol. pub. opp. ornat

per. 2 emend. ali. hirsutis (exstipitate floribus album) albo-purp.

9. JUSTICIA foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis sexangularibus.

Justicia annua, hexangulari caule, foliis circæ conjugatis, flore miniato. Amm. herb. 274. Hort. cliff. 10.

Euphrasia, alsines majori folio, flore galeato pallide luteo, jamaicensis. Pluk. alm. 142. t. 279. f. 6.

Habitat in Vera cruce, Jamaica. ◎

- nasuta. 10. JUSTICIA foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis.

W. ac. Caneanum. Pulcolli. Rheed. mal. 9. p. 135. t. 69. Dadumpi. Aram
quidvisq. 26b. p. 15. Habitat in India Toren.

Rami obsolete angulati. Folia lato-lanceolata s. lanceolato-ovata, obtuse acuminata, integerrima, minus glabra. Pedunculi dichotomi, longitudine foliorum. Flores sessiles, bracteis minimis, lineatis. Calyces minimi. Corollæ tubus filiformis, longus. Limbi labium superius lineare, angustum, brevius, reflexum; L. inferius æquale, trifidum. Stamina extra fauces prominentia. Stylus capillaris, persistens.

- purpurea. 11. JUSTICIA foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis.

Habitat in China. Osbeck.

Caulis herbaceus, brachiatus. Folia lato-ovata, apice & basi mucronata, glabra, petiolata, integerrima. Articuli caulis & rami supra basin Geniculo tumido, quod supra angustius evadit, notantur. Spicæ ad latera & apices ramorum, secundæ. Bracteæ angustæ, lanceolatae, longitudine capsularum. Corollæ purpureæ: labiis erectis; altero linearis angustissimo; altero lato trilobo. Stamina duo, purpurea, longitudine corollæ.

Yada qu. II M. 10. R. 37. Conspicua vel hinc figura en 2. Plant. GRA-

1^a lae parvæ vel scitæ aurantii. Den hybrida pl.

2^a lae parvæ diffusa lata. specim ad atode ypsas

histoia 2a lae Ectdien Lin sp. p. 15.

1. GRATIOL

serratis. Ma-

Gratiola. Riv-

Dalib. parif

Gratiola centa-

Habitat in Lu-

humidiuscula

2. GRATIOL

natis. Gron.

Ruellia pedun-

rum. Gron.

Habitat in Vil-

Foliola duo ista

in hac desunt

3. GRATIOL

Gron. virg.

Habitat in Vil-

calophylla cap. m.

4. GRATIOLA

Gratiola latiore

Habitat in Peru

5. PINGVICU

Viola palustris,

Habitat in Lu-

6. PINGVICU

tali. Fl. lapp.

Sanicula monta-

Habitat in Eur-

7. PINGVICU

lapp. 12. t. 1.

Pingvicula flore-

bis. 752.

Habitat in Alpib-

8. PINGVICU

lapp. 12. t. 1.

Pingvicula flore-

bis. 752.

Habitat in Lapp-

Katu pie 2/3 yanya pur-

humi 4 gen. pl.

st. 2. int. al. 2/3

Yanya reginae:

4 gen. fl. opp.

cl. 4. 1. st. 2. ambo

Portion en Malacca ad fables attynday. Ind. or. A. S. 245

Són flors en polímer que corren i creixen cap a la llum, contra vent i tempesta.

Sodongaya. In lava obtinendo corpori idonea. Bala 246

} Boutin Adm

46.3 Sai. Indra

জোনেবায়া মি

DIANDRIA MONOGYNIA.

GRATIOLA.

cont'd

- gratiola ad. 212

 1. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis officinalis.
ferratis. Mat. med. 18.
 - Gratiola. Riv. mon. 157. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 292.
Dalib. paris. 8. Sauv. monsp. 137.
 - Gratiola centauroides. Bauh. pin. 279.
 - Habitat in Lusatia, Gallia & australioribus Europe
humidiusculis. 2
 2. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis ovatis cre-
natis. Gron. virg. 129.
 - Ruellia pedunculis solitariis unifloris longitudine folio-
rum. Gron. virg. 73. *
 - Habitat in Virginie aquosis.
 - Foliola duo ista floralia, que in precedente & sequente,
in hac desunt.
 3. GRATIOLA foliis lanceolatis obtusis subdentatis. virginiana;
Gron. virg. 6. *: Yidia manga var. h. m. g. 2. 85. enhius. ead est. ○ sp. id. annuaque
Habitat in Virginia. radix fibro. rami 3gmi. fl. opp. cib. dent. vob. lippia fl. pl. decumb.
cal. Sph. cap. oval. - Lvs. - Scm. rurae rurae rot.
 4. GRATIOLA floribus subsessilibus.
Gratiola latiore folio, flore albo. Fewill. peruv. 3. t. 47. peruviana;
 - Habitat in Peru.

e for Botan PINGVICULA

1. PINGVICULA nectarii apice incrassato. *Pinguicula ad lusitanica* 208
Viola palustris, *Pinguicula dicta*, *lusitanica*. *Gris. lusit.*
Habitat in Lusitania. 2.

2. PINGVICULA nectario cylindraceo longitudine petali. *Fl. lapp. 11. Fl. suec. 21. Roy. lugdb. 304.* *Pinguicula ad vulgaris* ~~menthes ferme~~
Sanicula montana, flore calcari donato. *Baeh. pin. 243.* *Pinguicula* ~~genu~~
Habitat in Europæ uliginosis 2. *Laponia* — *genu*
crias. apud eam
anastata. dulch.
Dodecatheon. Min. gen.
20 roypos. sviola humida. gen.

3. PINGUICULA nectario conico petalo breviore. *Fl. alpina.* • *Pinguicula ad*
*lapp. 12. t. 12. f. 3. *.* *Fl. suec. 22.* *Pinguicula ad*
Pingvicula flore albo minore, calcari brevissimo. Raj.
bist. 752.
Habitat in Alpibus Lapponicis. 2

4. PINGVICULA scapo villoso. *Fl. lapp. 13. t. 12. f. 2. villosa.*
Fl. suec. 23.
Habitat in Lapponia, Sibiria. 2

Uganda specimen

Kate pie Uganda specimen. long 2.54. ♂ hyp. and. in a nest.
Keni legni - flagr. varonice male fl. bl. and the large palm. purplei 2 lab. cl. sp. 208
Oct. 2. inflo at a thrys 5 fl. cap. and. 1. loc. 2 val. **UTRI** - sp. Singule.

Sherardia ad
orientalis
Linnae. 52.

18

Tertina h. A. Sav. Sich. ad orobanchae.

2. 2 pud. subpetiolata. 2. nectary acute, acute. lobula longipetala
spica terminalis, two bracts peduncularis. flowers roseo-roseo. Corolla linearis, imbricata
alternis, cingulum petiolaris. 1. bracts 2. bracts. calyx tubular. lobes 5 dentatus. bracts 2. linearis,
longitudo longa. 2. bracts 1. bracts longitudo longa. Stam 4. per bracts. stigmas 2. camellae
longitudine.

DIANDRIA MONOGYNYA

Lentibularia gen. ad 208

+ vulgaris.

Lentibularia gosm.

mon

utricularia. Lin.

+

minor.

subulata.

gibba.

bifida.

carnnea.

Nelipu.

foliosa.

Sherardia ad 198. Verbenaceae

• rubra.

Sherardia Vail ad 198.

UTRICULARIA.

1. UTRICULARIA nectario conico. Fl. lapp. 14. Fl. suec. 24. Fl. zeyl. 22. Roy. lugdb. 304.

Lentibularia. Riv. mon. 18. *ns.

Millefolium aquaticum lenticulatum. Bauh. pin. 141.

Habitat in Europæ fossis paludibus profundioribus. 2

Nectarium subulatum, longitudine labii inferioris, cui approximatum; faux clausa palato gibbo. Planta nobis duplex: altera MAJOR a Rivino delineata, calyce postice rotundato. Altera MINOR calyce postice transverso, & quasi truncato; crescent conjunctim.

2. UTRICULARIA nectario carinato. Fl. suec. 25. * Millefolium palustre galericulatum minus. Pluk. alm. 251. t. 99. f. 6.

Aparine aquis innatans trevisana, foliis percepier capreolus donata. Bocc. mus. 1. p. 23. t. 4.

Habitat in Europæ fossis rarius.

Nectarium obsoletum, deorsum spectans; faux absque gibbo palato, pervia & bians.

3. UTRICULARIA nectario subulato. Gron. virg. 6. Habitat in Virginia.

4. UTRICULARIA nectario gibbofo.

Utricularia florum nectario gibbofo, scapo nunc unifloro nunc bifloro. Gron. virg. 129.

Habitat in Virginia.

5. UTRICULARIA scapo nudo bifido.

Habitat in China. Osbeck.

Caulis filiformis, digitæ longitudine, bifidus s. dupli raccemo, nudus. Flores alterni, lutei: labio superiore lateribus acuto.

6. UTRICULARIA scapo nudo, squamis alternis vagis subulatis. Fl. zeyl. 23. *

Nelipu. Rheed. mal. 9. p. 137. t. 70.

Habitat in Zeylona. mudy convolvulace. rad p. tuberosa r. tuberosa r. fr. grand. urticaria 136. fl. p. mag. carol. 26.

7. UTRICULARIA caule folioso. †

Linaria palustris, fœniculi folio. Plum. spec. 6.

Habitat in Americes Gallia æquinoctiali.

VERBENA.

* Diandræ disperma.

1. VERBENA diandra, spicis longissimis foliosis.

Ver-

{ atra colyppe
engnathula
longa tenera

DI

Verbena foli
cliff. 10.

Verbena oru

quis & ser

f. 4. & t.

Sherardia in

Ebret. pic

Habitat in C

2. VERBEN

dis.

Verbena foli

cliff. 10.

Verbena foli

hist. 171.

Habitat in Ja

3. VERBENA

serrato-plic

Sherardia no

sex. 49.

Lavandula,

scens. Plu

Habitat in A

4. VERBENA

prismaticis

Verbena minir

Habitat in Jam

5. Verbena dian

pendulis sub

Verbena mexic

elth. 407. t.

Habitat in Me

6. VERBENA

lis, feminib

Scorodonia flor

loides. S

Blairia Honst.

Habitat in Jam

7. VERBENA

foliis ovatis

Veronicæ simili

Kempfera. Hou

Habitat in Cur

tate. Sp. tenui

ab inflorescere in

can. sp. inova etab

ell. cyl. lyza 264.

leaves Dr. cyl

DIANDRIA MONOGYNIA.

二〇

- Verbena foliis ovatis acuminatis, spica fallosa! Hort.
cliff. 10. *

Verbena orubica, teucrii folio, primulæ veris flore, fili-
quis & semenibus longissimis. Pluk. alm. 383. t. 228.
f. 4. & t. 327. f. 7.

Sherardia urticæ folio subtus incano, floribus violaceis.
Ebret. pict. t. 5. f. 1.

Habitat in Oruba insula americes septentrionalis.

2. VERBENA diandra, spicis longissimis carnosis subnudis.
Verbena foliis obtuse ovalibus, spica carnosa nuda. Hort. Sherardiae præ-
cliff. 10. Roy. lugdb. 327.

Verbena folio subrotundo terrato, flore cæruleo. Sloan.
hist. 171. t. 107. f. 1.

Habitat in Jamaica & Caribæis. 2 ◎

3. VERBENA diandra, spicis ovatis, foliis lanceolatis stœchadifol.
serrato-plicatis, caule fruticoso. Roy. lugdb. 327. Sherardiae præ-
Sherardia nodiflora, stœchadis ferratifolii folio. Vaill.
sex. 49.

Lavandula, foliis crenatis latioribus, americana frute-
scens. Plum. spec. 6.

Habitat in America Gallie æquinoctialis.

4. VERBENA diandra, spicis laxis, calycibus alternis prismatica. Blaria houst.
prismaticis truncatis aristatis, foliis ovatis obtusis. Blaria præ-
Verbena minima, chamædryos folio, Sloan: jam: 64.

Habitat in Jamaica.

5. Verbena diandra, spicis laxis, calycibus fructus reflexo- mexicana.
pendulis subglobosis hispidis. Blaria præ-
Verbena mexicana, trachelii folio, fructu aparines: Dill. Blaria.
elth. 407. t. 302. f. 389.

Habitat in Mexico.

6. VERBENA diandra calycibus subrotundis erectiuscu- lappulacea.
lis, semenibus echinatis. Scrophulariaceæ. Blaria houst.
Scorodonia floribus spicatis purpurascenscentibus pentapeta- Nov. gen. abus.
loidibus. Sloan: jam: 66. Prov. p. 116. No. 5. Blaria houst.
Blaria Houst. Amm. herb: 277.

Habitat in Jamaica.

7. VERBENA diandra, spicis longis, calycibus aristatis, curassavica.
foliis ovatis argute serratis. Kempfera. houst
Veronicæ similis fruticosa curassavica. Herm. parad. 240. Kempfera. houst

Kempfera. Houst. m. ff.

Habitat in Curassao Americes. 21. 1'p. Iuen foliis longa
dilata. Spic. termin. ann. Bzg. v. v. v. fl. imbricata. T. quity
cobs in foliis prosp. impres. reupt. cal. 1'p. fl. ad. capitulo 2'p. dyp. } Sherardia
car. 5'p. iuiva v. t. 4. que. 2'p. dyp. Sherardia
Spic. cap. longa 2'p. l. 1'p. long. 1'p. long. floridib. coerulei } Sherardia
Vanderbyl. que. 3'p. 4'p. 4'p. alt. 2'p. d. fl. lat. long. br. 2'p. sp. 1'p. tenuis
fl. lat. long. br. 2'p. sp. 1'p. tenuis

alga lagunc. linn. 2. 1. fuit sp. Ram. et fol. griseo-sordidit
fl. solit. antropomorpha magis cæruli. digitat.
Cul. tenuis. 5 p. 2. 1. ab. sp. inay
20. *lippia* houtt. *ad. 198.* *caeruleum* & *volubile canescens* sordid.
fasciculatae verticillatae.

DIANDRIA MONOGYNIA.

* TETRANDRÆ, TETRASPERMÆ.

- nodiflora.* 8. VERBENA tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis ser-
ratis, caule repente. *Fl. zeyl.* 399.
Sem 2. tantum
Lippia. houtt
ad. 198. Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis globosis. *Hort.*
cliff. II.
Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis solitariis ovatis.
Roy. lugdb. 327.
Verbena caule repente, foliis oblongis superne crenatis,
pedunculis solitariis capitatis. *Gron. virg.* 7.
Verbena nodiflora. *Bauh. pin.* 269. *prodr.* 125.
Habitat in Virginia. ☺

Verbena *vera*

- bonariensis.* 9. VERBENA tetrandra, spicis fasciculatis, foliis lanceo-
latis amplexicaulibus. *Hort. upf.* 8.
Verbena. ad. 198. Verbena foliis lanceolatis, floribus congestis fastigiatis.
Hort. cliff. II. *Roy. lugdb.* 326..
Verbena bonariensis altissima, lavendulæ canariensis fo-
lio, spica lavendulæ. *Dill. elth.* 406. t. 300. f. 387.
Habitat in agro Bonariensi. ✎

- Verbena* *hastata*
Verbena *americana* 10. VERBENA tetrandra, spicis longis acuminatis, foliis
hastatis. *Hort. upf.* 8.
Verbena foliis lanceolatis serratis, spicis filiformibus pa-
niculatis. *Roy. lugdb.* 327.
Verbena americana altissima, spica multiplici, urticæ fo-
liis angustis, floribus cæruleis. *Herm. parad.* 242. t.
242.
Habitat in Canadæ humidis. ✎

- urticifolia.* 11. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis,
foliis indivisis serratis petiolatis. *Hort. upf.* 9.
Verbena foliis ovatis, caule erecto, spicis filiformibus
paniculatis. *Hort. cliff.* II. *Gron. virg.* 7. *Roy. lugdb.*
327.
Verbena recta canadensis, urticæ foliis. *Morif. hist.* 3.
p. 418. f. 11. t. 25. f. 3.
Habitat in Virginie, Canadæ aridis. ✎

- spuria.* 12. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus, foliis mul-
tiplici, foliis multifido-laciniatis, caulis numerosis. *Hort. upf.* 8.
De plantæ nuda la *Veronica humilior* foliis incisis. *Clayt. virg.* 8.
Habitat in Canada. Virginia. *Acinos syriaca*, *Acinos syriaca*,
• officinalis. 13. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus panicula-
tis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario.
Verbena foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus
Hort

- Hort. cliff.*
paris. 9.
Verbena *com*
Habitat in H
14. VERBEN
foliis bipin
Verbena tenui
Verbena supi
Habitat in H
1. LYCOPUS
Lycopus foliis
Lycopus. *Hor*
Marrubium p
Habitat in Eu
2. LYCOPUS
Lycopus foliis
virg. 8.
Habitat in V

1. AMETHYS
Amethystina m
dis serratis,
Amm. ruth.
Habitat in Sib

1. ZIZIPHOR
Ziziphora foliis
Hort. cliff.
Clinopodium
summo caule
Habitat in Syri

2. ZIZIPHOR
Ziziphora foliis
305.
Ziziphora foliis
lugdb. 313.
Acinos syriaca,
ris. hist. 3. p.
Habitat in Syr
? *Ziziphora*
Deponre