



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

101

Indigo quies altera manu. 58. 21. 2. ad 3 ped. canderat. quadruplicata
pinnatis foliis rari. fol. opp. hedysotis hirti. tip. ciliatae caulin. inter flor.
fl. corymb. cap. ondul. etli. Note plante cum raro pinnatis est, et fracta
pinnatis foliis caulinum. Ex hac contundens clavaria affundit. rotundat
obt. corollas qui sole creantur, et auro aequaliter perducere

Ex sp. Hedysotis.

TETRANDRIA MONOGYNIA. bente fruticoso, foliis laciniatis hirsutis, pappo plurimo.

Pterocephalus perennis humilis laciniatus & incanus.

Vaill. act. 1722. p. 184.

Habitat in Græcia?

Caulis vix e terra prominens Scapis brevissimis, unifloris.

17. **SCABIOSA** corollulis quinquefidis radiantibus, foliis *ochroleuca*.
bipinnatis linearibus. *actinophylax*.
- Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis superne incisis. Sauv. monsp. 241.
- Scabiosa multifido folio, flore flavescente. Baub. pin. 270. Moris. hist. 3. p. 48. f. 6. t. 13. f. 23.
- Scabiosa VII. Clus. hist. 2. p. 3. Sub. *ochroleucus* Monsp.
- Habitat in Germaniæ pratis siccis. 2
18. **SCABIOSA** corollulis quinquefidis, caule herbaceo, *papposa*. *Starophylax*.
- calycibus foliosis florem superantibus, calyce plumo- 152
so. Roy. lugdb. 189.
- Scabiosa cretica, capitulo pappos mentiente. Tournef. inst. 34. Boerb. lugdb. 1. p. 130.
- Habitat in Creta.

KNAUTIA.

1. **KNAUTIA.** Hort. cliff. 32. Hort. ups. 27. Roy. orientalis. *Knautia* ad 151
lugdb. 190.
- Lychni Scabiosa, flore rubro, annua. Boerb. lugdb. 1. p. 131.
- Scabiosa orientalis, caryophylli flore. Vaill. act. 1722.
p. 241.
- Habitat in Oriente. ○
- Conferatur Scabiosa cœrulea virginiana, flosculis tetrapetalis caryophyllorum more patulis & laciniatis.
- Pluk. alm. 335.

HEDYOTIS.

1. **HEDYOTIS** foliis lanceolatis petiolatis, corymbis ter- *fruticosa*.
minalibus involucratis. Fl. zeyl. 63. * Amœn. acad.
1. p. 392.
- Valerianella foliis nervosis acutis, flosculis iu caulum
summo quasi involucratis. Burm. zeyl. 227. t. 107.
- Habitat in Zeylona. 5
2. **HEDYOTIS** foliis lanceolato-ovatis, floribus verticil- *Auricularia*.
latis. Fl. zeyl. 64. * Mat. med. 47. Amœn. acad. 1. p.
391. G 3 V 2-

24 june tenuis annua. h. m. 10 25. 1/2 pud. & arvensis gland. rami 4 genit. alt. flagge subtenuis
 glabrescens fl. coquuntur tenuis gallus. cal. 4 dent. ovar. 1. cor. tubul. 4 dent. 4. ovar. 1. 3. 3. 3.
 glabrescens fl. coquuntur tenuis gallus. cal. 4 dent. ovar. 1. cor. tubul. 4 dent. 4. ovar. 1. 3. 3.
 TETRANDRIA MONOGYNIA. 103 Kraenpl. ad 245.

2. SHERARDIA foliis floralibus binis oppositis binis floribus.

Asperula verticillata luteola. Baub. pin. 334.

Asperula verticillata muralis minima. Column. ecphr. 302. t. 300.

Habitat in Italia. ○

3. SHERARDIA foliis quaternis æqualibus, caule fruticoso.

Habitat in insula Adscensionis. Osbeck. 5

Frutex torosus, inæqualis, scaber, Ramis obtuse tetragonis. Folia quaterna, angusto-lanceolata, integerrima, glabra, marginibus revoluta, articulis ramorum paulo longiora, interstincta Stipulis brevissimis, subulatis. Flores oppositi, sessiles, axillares. Calyx tetraphyllus, germini innatus, persistens foliolis lanceolatis. Corolla infundibuliformis, quadrifida, alba, longitudine germinis. Antheræ quatuor, oblongæ. Pericarpium decocum. Clinopodium africanum procumbens psyllii foliis. Pluk. mant. 51. t. 344. f. 3. demta hirsutie & dentibus foliorum, nostram refert.

ASPERULA.

1. ASPERULA foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. Fl. suec. 114. Mat. med. 45. Dalib. paris. 46. apenninatae. humilis in Europa. Nut.

Asperula foliis pluribus, floribus pedunculo elevatis. Hort. cliff. 33. Roy. lugdb. 255.

Asperula s. Rubeola montana odorata. Baub. pin. 334.

Habitat in Sveciæ, Germaniæ umbrosis. 2

Asperula gallica
alpina 3 gen.
asperula lobata
matronyka. Ray.
capitellata 3 Brunf.
s. bellaria 3 Brunf.

2. ASPERULA foliis senis, floribus sessilibus aggregatis terminalibus. Hort. ups. 27. gallure 2. arvensis. acerula. 144. Asperula foliis pluribus, floribus sessilibus. Hort. cliff. 33. Roy. lugdb. 255. Dalib. paris. 47.

Asperula cærulea arvensis Baub. pin. 334.

Asperula cærulea. Dod. pempt. 355.

Habitat in Gallia, Flandria, Germania, Anglia. ○

3. ASPERULA foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus fasciculatis terminalibus. 144. Asperula foliis quaternis ovato-lanceolatis, ramis alter-

nis. Hort. cliff. 33. Virid. cliff. 9. Roy. lugdb. 255.

Hall. helv. 457. Sauv. monsp. 164.

Rubia quadrifolia & latifolia lævis. Baub. pin. 334. Morris. hist. 3. s. 9. t. 21. f. 1.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Italix, 2

asperula

144.

4.

- tinctoria.* 4. *ASPERULA* foliis linearibus: inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis.

cynanchica. Asperula foliis quaternis linearibus, floribus saepius trifidis. *Fl. suec.* 115. *Sauv. monsp.* 163.

Rubeola quadrifolia, caule ramoso flaccido, floribus trifidis, *Hall. rupp.* 8.

Gallium album tripetalum, *Moris. praelud.* 267. *Dalib. paris.* 49.

Gallium album 3. *Tabern. hist.* 433. t. 733. f. 1. bona. *Habitat in Sueciæ, Tyringiæ, Galliæ, Sibiriæ collibus aridis saxosis.* 2.

- pyrenaica.* 5. *ASPERULA* foliis quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, floribus saepius trifidis.

Rubia cynanchica saxatilis. *Bauh. pin.* 333. *prodr.* 146. *Burs. XIX.* 9.

Habitat in Pyrenæis versus Hispaniam & prope Valentiam Gallorum. 2.

Caules erecti, spithamei, quadrangulares. Folia omnia in caule quaterna, linearia, carinata, acuta, levia; inferiora etiam quaterna, sed breviora lanceolata obtusiora; folia summa & floralia opposita, latiora, acuta, lanceolata. Flores tubulosi, rubri, saepius trifidi. 2.

- cynanchica.* 6. *ASPERULA* foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis.

Asperula foliis linearibus quaternis, summis oppositis.

Roy. lugdb. 255. *Sauv. monsp.* 163.

Rubeola foliis quaternis, seminibus glabris, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 458.

Rubia cynanchica. *Bauh. pin.* 333. *Bauh. hist.* 3. p. 723.

Gallium montanum latifolium cruciatum. *Col. ecphr.* 1. p. 296. t. 297. f. 1.

Gallium album minus. *Tabern. hist.* 433. t. 433. f. 2.

Habitat in Europæ pratis aridis. 2.

fol. 4 haec quoniam 2 minima ac flor. 2. aut 3. folia 2. determinatae vix similes.

DIODIA.

- virginiana.* 1. *DIODIA.* *Hort. cliff.* 493. * *Gron. virg.* 71.

Habitat in Virginie aquosis.

KNOXIA.

- zeylanica.* 1. *KNOXIA.* *Fl. zeyl.* 400.

Dentellaria zeylanica, flore minimo, antirrhini folio.

Raj. suppl. 246.

Habitat in Zeylona supra truncos arborum putridarum.

1. *HOU-*

Rubia strumosa. *fluitantea.* *H. Hall.*

TETRANI

HOUSTONIA
posito, floribus

Houstonia. *Hort.*
Rubia parva virgi-

catulæ fistulæ
Paronychia facie

ceruleo. *Moris.*
Chamejasme inode-

loides, quadrat-

mant. 45. t. 97.
Habitat in Virgin-

HOUSTONIA
terminalibus.

Rubia mariana, al-

flore purpuro-rul-

262.
Habitat in Virgin-

* GALLIUM foliis
tuberos scabris, ca-

Habitat in Europa

Facies Galii boreal-

subtus scabra, C-

vis, conglomerat-

GALLIUM foliis
libus diffusis. Fl.

Gallium caulis di-

lapp. 52.
Gallium palustre al-

Habitat in Europa

GALLIUM foliis
bente scabro, co-

MONOGYNIA.

ibus: inferioribus senis, in
accido, floribus plerisque

nearibus, floribus sapu-
c. monsp. 163.

e ramoso flaccido, fo-

Morif. prælud. 267.

bif. 433. t. 733. f. 1.

Gallia, Sibiria

rnis lanceolato-linea-
tus trifidis.

Bauh. pin. 333. pro-

Hispaniam & prope

drangulares. Folia om-

arivata, acuta, levia,

terior lanceolata obtu-

posita, latiora, acuta,

ubri, sapius trifidi.

tribus senis, intermedio-

floribus quadrifidis

ternis, summis oppo-

s. 163.

imibus glabris, floribus

333. Bauh. bif. 3. p. 1.

m cruciatum. Col. ap-

IA. * Gron. virg. 71.

minimo, antirrhini fo-

mentum arborum patridar-

I. HO

Rubrasternum. feuill. 1. R. 45. Aparine spec. ut. foli. quin annuatæ. } Rubrasternum.
luteæ. fl. solit. opp. cor. lab. bract. petiol. petiol. Scur. 2. hirsutæ. } fructu.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 105

HOUSTONIA. ad 225.

1. HOUSTONIA foliis radicalibus ovatis, caule com- cœrulea.
posito, floribus solitariis. Gron. virg. 15.

Houstonia. Hort. cliff. 35.

Rubia parva virginiana, foliis ad genicula binis, flore
cœruleo fistuloso. Pluk. alm. 324. mant. 164.

Paronychiæ facie planta tetrapetaloides virginiana, flore
cœruleo. Morif. hist. 3. p. 614. f. 15. t. 4. f. 1.

3. Chamejasme inodora, alsines facie, dispermos tetrapeta-
loides, quadrato caule, virginiana. Pluk. alm. 97.
mant. 45. t. 97. f. 9. Raj. suppl. 502.

Habitat in Virginia.

2. HOUSTONIA foliis ovato-lanceolatis, corymbis purpurea.
terminalibus. Gron. virg. 15.

Rubia mariana, alsines majoris folio ad caulem binato,
flore purpuro-rubente. Pluk. mant. 164. Raj. suppl.
262.

Habitat in Virginia.

GALIUM.

* Fructu glabro.

1. GALIUM foliis quaternis lanceolato-ovatis æqualibus. rubioides. galla.
subtus scabris, caule erecto, fructibus glabris.

Habitat in Europa australi. D. Bæck.

Facies Galii borealis, sed folia duplo latiora, nervis
subtus scabra, Caulis firmus erectus. Panicula bre-
vis, conglomerata. Semina lævia.

2. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, cau- palustre.
libus diffusis. Fl. suec. 119.

Gallium caulinis diffusis, foliis quaternis verticillatis. Fl.
lapp. 52.

Gallium palustre album. Bauh. pin. 335.

Habitat in Europæ rivulis limosis. 2

3. GALIUM foliis quaternis linearibus obtusis, ramis bermudense.
ramosissimis.

Aparine foliis quaternis obtusis lævibus. Gron. virg. 16.

Rubia tetraphylla glabra, latiore folio, bermudensis,
seminibus binis atropurpureis. Pluk. alm. 324. t. 248.

Raj. suppl. 261.

Habitat in Virginia.

4. GALIUM foliis quaternis linearibus, caule procum- trifidum.
bente scabro, corollis trifidis.

Habitat in Canada. Kalm.

Caulis procumbens, ramosissimus, Ramis ternis quaternisve, divaricatis. Folia linearia, obtusa, latiuscula, glabra, subtus parum scabra. Pedunculi saepius terni, tenuissimi, foliorum longitudine, uniflori; Flores minimi, albi, tripartiti. Stamina tria; Fructus didymus, globosus, laevis.

• *zinctorium.* 5. *GALIUM* foliis linearibus: caulinis senis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunculis subbifloris, fructibus glabris. *Rubia virginica* C. B. P. 1524.

Habitat in America septentrionali. Kalm.

• *uliginosum.* 6. *GALIUM* foliis senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. Aparine foliis linear-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Roy. lugdb.* 255. *Fl. svec.* 121. Aparine minor palustris parisensis, flore albo. *Tournef. inst.* 114. *Vaill. paris.* 14. *Fl. lapp.* 58.

Habitat in Europæ pascuis aquosis sterilibus. 2

• *spurium.* 7. *GALIUM* foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Hort. upf.* 28. *
Aparine femine læviore. *Raj. hist.* 484.
Aparine foliis crebrioribus & femine læviore. *Morif. hist.* 3. p. 332.

Habitat in Europæ cultis. ◎

• *saxatile.* 8. *GALIUM* foliis senis obovatis obtusis, cauleramissimo procumbente.
Gallium caule ramosissimo, foliis quinis obverse ovatis. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 257.
Gallium saxatile supinum, molliore folio. *Juss. act.* 1714. p. 492. t. 15.

Habitat in Hispaniae maritimis lapidosis.

• *minutum.* 9. *GALIUM* foliis octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis glabris incurvis.
Gallium foliis senis cuneiformi-lanceolatis mucronatis glabris. *Hort. upf.* 28. *
Gallium saxatile minimum supinum & pumilum, flore luteo. *Tournef. inst.* 1152.

Habitat in imperio Ruthenico. 2

• *pafillum.* 10. *GALIUM* foliis octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunculis dichotomis.

Rubeola

TETRAN-

Rubeola faxatilis.
Habitat in montibus.
Caules numerosi,
ta foliolis 8. f. 6;
acatis, uti can-
Rami rariores,
conferti, ut fol-
Panicula rario-
dichatomis.

ii. *GALIUM* foliis floriferis brevibus

Mat. med. 46.

Gallium caule erec-

ribus, Fl. lapp. 6.

Gallium luteum. L.

Habitat in Europa

ii. *GALIUM* foliis patentissimis

patentibus.

Gallium foliis pluri-

tentissimis. Horri-

svec. 117. *galleru-*

Mollugo montana

Rubia sylvestris læv-

Mollugo belgarum

Habitat in Europa

13. *GALIUM* foliis dichotomis su-

256. Hort. upf. 2

Gallium saxatile,

t. 116.

Rubia montana ang-

Habitat in Tataria

14. *GALIUM* foliis dunculis folio le-

lugdb. 256.

Gallium nigropurpu-

ecphr. I. p. 298.

Habitat in Italia.

15. *GALIUM* foliis brevissimis.

Gallium rubrum. B.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

107

Rubeola saxatilis. Bauh. pin. 334. prodr. 145.

Habitat in montibus Galloprovinciæ.

Caules numerosi, digitales, angulati; Folia verticillata foliolis 8. s. 6, lanceolato-linearibus vel linearibus, acutis, uti caulis undique pilis patentibus hispida. Rami rariores, alterni; Foliorum verticilli saepe ita conferti, ut folia imbricatim digesta conspiciantur. Panicula rariores, fere terminalis ex pedunculis bis dichatomis.

11. *GALIUM* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis verum floriferis brevibus. Hort. cliff. 34. Fl. svec. 116. Mat. med. 46. Roy. lugdb. 256.

Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. Fl. lapp. 61.

Gallum luteum. Bauh. pin. 335.

Habitat in Europa frequens. 2

12. *GALIUM* foliis octonis ovatis linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus.

Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentissimis. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 257. Fl. svec. 117. gallum album vulgare. 7. inst.

Mollugo montana latifolia ramosa. Bauh. pin. 334.

Rubia sylvestris laevis. Bauh. pin. 333.

Mollugo belgarum. Lob. ic. 802.

Habitat in Europa mediterranea. 2

3. *GALIUM* foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis summo caule floriferis. Roy. lugdb. 256. Hort. upf. 27. Sauv. monsp. 161.

Gallum saxatile, glauco folio. Bocc. mas. 2. p. 172. t. 116.

Rubia montana angustifolia. Bauh. pin. 333. prodr. 145.

Habitat in Tataria, Helvetia, Austria, Monspelii. 2

4. *GALIUM* foliis verticillatis linearis-setaceis, pedunculis folio longioribus. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 256.

Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium. Col. ecphr. 1. p. 298. Bauh. pin. 335.

Habitat in Italia.

5. *GALIUM* foliis verticillatis linearibus, pedunculis brevissimis. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 256.

Gallium rubrum. Bauh. pin. 335. Moris. bist. 3. p. 332.

Gallium

gallum

gallinae ad

144.

gallum luteum matth

yanior. dict.

+

gallinae

ad

gallum.

Gallium rubro flore. Clus. hist. 2. p. 175.

Habitat in Italia. camoli.

** Fructu hispido.*

- boreale. 16. GALIUM foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, seminibus hispidis. Fl. lapp. 60. Fl. svec. 118. Hort. cliff. 64. Roy. lugdb. 257. Hall. helv. 450.

Rubia pratensis lœvis, acuto folio. Baub. pin. 333. prodr. 145.

Habitat in Europæ borealis pratis. 2

- scabrum. 17. GALIUM foliis quaternis ovatis aculeato-ciliatis, seminibus hispidis.

Lappago. Slin. Rubia semine dupli hispido, latis & hirsutis foliis. Bocconi. Moris. hist. 3. p. 329. f. 9. t. 21. f. 5.

Habitat in Europa australi. 2

- aparine ad. rotundifol. 18. GALIUM foliis quaternis ovatis lœvibus obtusis, panicula dichotoma, seminibus hispidis.

Rubia quadrifolia f. rotundifolia lœvis. Baub. pin. 334. prodr. 145.

Rubia quadrifolia, semine dupli hispido. Baub. hist. 3. p. 718. Moris. hist. 3. f. 9. t. 21. f. 4.

Habitat in alpibus Helvetiae, Styria. 2 222.

- Aparine. Aparine. Aparine. 19. GALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido.

Aparine foliis lanceolatis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. Roy. lugdb. 455. Fl. svec. 120.

Aparine foliis lanceolatis. Hort. cliff. 34.

Aparine vulgaris. Baub. pin. 334.

Habitat in Europæ cultis & ruderatis. ②

- parisense. 20. GALIUM foliis verticillatis linearibus, pedunculis bifidis, fructibus hispidis.

Aparine foliis linear-lanceolatis acuminatis flaccidis, corollis fructu minoribus. Roy. lugdb. 255.

Aparine minima. Ray. angl. 3. p. 225. t. 9. f. 1.

Gallium parisense tenuifolium, flore atropurpureo. Tour. nef. inst. 664.

Habitat in Anglia, Gallia. 2

CRUCIANELLA.

- Rubella ad 124 1. CRUCIANELLA erecta, foliis senis linearibus. Hort. upf. 27. * Sauv. monsp. 164.

Cru-

Walter 1700 heft 9
B. fin. 113.

TETRAN-

Crucianella foliis
Rubia angustifolia
Habitat Monspelii

1. CRUCIANELLA
ceolatis, floribus
164

Crucianella foliis
Rubia latifolia spic
Habitat, in Creta

3. CRUCIANELLA
ribus subverticil
Crucianella erecta,
nivente. Sauv.

Rubia maritima. E
Rubia f. Aparine 1
Habitat in Creta 3

4. CRUCIANELLA
Sauv. monsp. 21
Rubia spicata reperi
Habitat Monspelii

1. RUBIA foliis se
Mat. med. 44.
Rubia perennis, fol

2. Rubia tinctorum fa
Habitat Monspelii
dantia apriac

2. RUBIA foliis qu
Rubia quadrifolia af
523.
Habitat

SIP

1. SIPHONANTH
Amm. ruth. 173
Habitat in India.

Folia alterna, lance
pediti folii, umbel

1. CATESBÆA

Waleswawa herba quam decurrent pro rube coloris tinctum in Virginie } *Waleswawa. Kingia.*
D. Bon. 113. *gabrum & tinctum.*

TETRANDRIA MONOGYNIA.

109

Crucianella foliis linearibus. *Hort. cliff.* 32.

Rubia angustifolia spicata. *Baub. pin.* 334 *prodr.* 145.

Habitat Monspelii. ◎

2. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis lanceolatis, floribus spicatis. *Hort. upf.* 27. * *Sauv. monsp.* *Rubola ad.*
164

Crucianella foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 33.

Rubia latifolia spicata. *Baub. pin.* 334.

Habitat, in Creta & Monspelii. ◎

3. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis, foliis subverticillatis. *Rubola ad.*
mariima.

Crucianella erecta, foliis quaternis, corolla ad solem concinente. *Sauv. monsp.* 164.

Erythronium. lugd.
cruicali. cas.

Rubia maritima. *Baub. pin.* 334. *Dod. pempt.* 357.

Rubia s. Aparine spicata cretensis. *Clus. hist.* 2. p. 176.

Habitat in Creta & Monspelii. D. *Sauvages.*

4. CRUCIANELLA repens, foliis seris, spicis longis. *monspeliaca.*
Sauv. monsp. 225.

Rubia spicata repens. *Magn. monsp.* 225.

Habitat Monspelii.

RUBIA. ad. 144.

1. RUBIA foliis seris. *Hort. cliff.* 35. *Hort. upf.* 28. *tinctorum.*
Mat. med. 44. *Roy. lugdb.* 254.

Rubia perennis, foliis saepius quinis. *Sauv. monsp.* 161.

Rubia sylvestris aspera. *Baub. pin.* 33.

3. Rubia tinctorum sativa. *Baub. pin.* 33.

Habitat Monspelii & ad Danubium. 2

Dimidiat apice acuminata in contusionibz et ab alto casibz laudabilis.

2. RUBIA foliis quaternis. *Roy. lugdb.* 254.

Rubia quadrifolia asperrima lucida peregrina. *Herm. lugdb.* *peregrina.*

523.

Habitat - - - - 2

SIPHONANTHUS. ad 177.

1. SIPHONANTHUS salicis folio, flore flavescente. *indica.*

Amm. ruth. 1736. p. 214. t. 15.

Habitat in India. b

Folia alterna, lanceolata; Pedunculi saepe e regione oppositi folii, umbellati.

CATESBÆA.

1. CATESBÆA

spinosa.

Frutex

*S. Camellii utr. canni h.m. 102.5. fructu artus. incep. videri inter
fl. corymb. jnt. ramo calycoviridis. & dura tam rubra. & dent. 114. t.
159. 110 TETRANDRIA MONOGYNIA.*

Frutex spinosus, buxi foliis plurimis simul nascentibus,
flore tetrapetalo pendulo sordide flavo tubo longis-
fimo, fructu ovali croceo semina parva continente.
Catesb. carol. 2. p. 100. t. 100.

Habitat in Providentia. 5

IXORA.

*Schetti ad 146
coccinea.
flor. corymb. tam
laur. oval.
fol. minor*

*Ixora ad 146.
americana.
parasitica.*

1. IXORA foliis ovalibus semiamplexicaulibus. Fl. zeyl.

22.84

Jasminum flore tetrapetalum, Ixora linnæi, Schetti horti
malab. Burm. zeyl. 125. t. 57.

Jasminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum,
floribus coccineis. Pluk. alm. 196. t. 59. f. 9.

Schetti. Rheed. mal. 2. p. 17. t. 13.

Habitat in India. 5

2. IXORA foliis ovato-lanceolatis.

Jasminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum,
floribus albicantibus & Schetti album. Pluk. alm. 196.
t. 109. f. 2. *Pavetta Malabarica 2.6 ft.*

Bemschetti. Rheed. mal. 2. p. 19. t. 14.

Habitat in India. 5

3. *Nhum ic. 175. f. 2. fl. 3 na lati petiol. glab. intz. Stigma 1. p. 112.*

integerrata. Catt. Rub. Bur. SCURRULA.

1. SCURRULA.

Viscum vitici innascens. Camell. Iuz. 3. n. 36. Pet.
gaz. t. 63. f. 8.

Habitat in China. 5

Arbor. Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima, al-
tero latere paulo latiora, glabra. Flores axillares, 3
ad 6, propriis pedicellis. Germina inferne attenuata.

Pavata.

PAVETTA. h.m.

• indica.

*Pavata. Raj. L.m.
malleomoth. b.m.*

1. PAVETTA. Fl. zeyl. 56. * Amoen. acad. 1. p. 388.

Arbbr malabariensis, fructu lentisci. Bauh. pin 399.

Pavate. Raj. hist. 1581. ? *Pavetta Mamm 2.6 ft.*

Pavetta s. Malleomoth. Rheed. mal. 5. p. 19. t. 10.

Habitat in India. 5 arbor Egyptiaca curv. lignaria.

Corymbi trichotomi, fastigiati, pedunculo filiformi longo
insidentes. Stigma oblongum, bifidum.

Djang. Djang. En Ruph. 42. 46. et 47. Brava rad 2 onda contum ad rufa 2.

AVICENNIA.

officinalis.

1. AVICENNIA. Fl. zeyl 57. Mat. med. 42.

*Anacardium. Bauh. pin. 511. avacardio. graecum
accione. que differt ab upata.*

*Pete
fia
ad* { *Bruzelii. h.m. 2.42. ex Sertice culpea pro flor. sp. Oepata*

elat. subcord. 2.6 m. 2.11.

175 { *Kilekola. Yotti h.m. 102.57. ex 2. pro in corona. exst. fl. capae bull. petal.
fl. corymb amillat. fl. varia. 4 fl. ex tubo brev. lefd. et 4.
Brava glb. 3 syn 2.6 m. 2.11. pro. Sertice. Brava. et Bruzelii.*

Larsella. Lachyne
friable. sand
TETRAN
system intelligit. chrys
Purpur. concreta. alba
Oepata. Rheed. m
Habitat in India.
Salabacca. con
Baldan. Ayer. en car
murrata. tenuis. minima
Chamædaphne, M
Lonicera foliis ful
terne hirsutis, fl
Syringa baccifera,
bis gemellis. P
corol. 1. p. 20. t.
Baccifera mariann
Pet. gaz. 1. t.
Habitat in Caroli
C

CALICARPA
Sphondylococcus.
Anonymos baccifer
ex america. Pl
Frutex baccifer ve
& conjugatis. C
Frutex foliis amp
binis, viminibus
etis. Gron. virg
Habitat in Virgin

PO
POLYPREMU
Linum carolinianu
Habitat in Caroli

PENÆA foliis
Tithymali myrsinif
tundis foliis e st
ro lacrymam fi
Habitat in Æthio
Folia obtusiuscula;
flori nullus; Sty

PENÆA foliis
Penæa foliis ovatis
Penæa. Hort. cliff
end. hellot an

- MONOGYNIA.
 pluriñis simul nascen-
 tulo sordide flavo tubo lo-
 co semina parva contin-
 t. 100.
- Sarcolla. Lachyne arbor. Perice Phae cimicif., subfulva rubra, nera,
 fructuosa, exodora, purpurea. B. Pin. 298. an Seneca. & sarcolla.
- TETRANDRIA MONOGYNIA.
 vegetum intelligent. hepatic. 4. c. 8. circa. Zoot. boom. Rep. Kandale. ^{Bridur} ^{contorta} ^{arborescens} ^{fructuosa} ^{arbor magna} ^{fructuosa} ^{arborescens}
 Qepata. Rheed. mal. 4. p. 95. t. 43. ^{andreae} ^{multiflora} ^{sparsa} ^{sparsa}
 Habitat in India. 5.
- Salal aucto conditum fructus. gen. Saman Tel. tunc achen. dr.
 Balobar syror en carnelli. ut puer acajou major fructu et folio floribus
 pendulatis, terminalibus. MITCHELLA. fit alt. orbiculari. DNA
 major. ins. id. Excedens ligas iudor ellipsois minoris rotunda calix et cor. Spat. avaxapdia greci recent.
 Chamædaphne, Mitch. gen. 27. asanav sedet valde ab acajou et quod illi genis vera
 Lonicera foliis subovatis, germine biforo, corollis in- *Mitchella* ad
 terne hirsutis, stylo bifido, Gron. virg. 22. 146.
- Syringa baccifera, myrti subrotundis foliis, floribus al-
 bis gemellis. Pluk. amalh. 198. t. 444. f. 2. Catesb.
 corol. 1. p. 20. t. 20.
- Baccifera mariana, clematis daphnoides minori folio.
 Pet. gaz. 1. t. 1. f. 13.
- Habitat in Carolina, Terra Mariana, Virginia. 5. 2. pd.
 repens in ali. umbros. Ram. cil. levig. ruf. laev. Solanella puer. orbicul.
- CALLICARPA. Lin.
1. CALLICARPA. Act. upf. 1741. p. 80.
 Sphondylococcus. Mitch. E. N. C. 8. p. 218.
 Anonymos baccifera verticillata, folio molli & incano,
 ex america. Pluk. alm. 33. t. 136. f. 3.
 Frutex baccifer verticillatus, foliis scabris latis dentatis
 & conjugatis. Catisb. carol. 2. p. 47. t. 47.
 Frutex foliis amplis subrotundis acuminatis ex adverso
 binis, viminibus lentis infirmis quasi leni canitie te-
 Etis. Gron. virg. 138.
- Habitat in Virginia, Carolina. 5
- POLYPREMUM. ^{en} ^{Plante non Valerianella.}
 1. POLYPREMUM. Act. upf. 1741. p. 78.
 Linum carolinianum. Pet. gaz. 9. t. 5. f. 6.
 Habitat in Carolina, Virginia. ①
- PENÆA.
1. PENÆA foliis ovatis planis.
 Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, subro- *Sarcocolla*. ^{dis. gal}
 tundis foliis e stœchadis arabicæ squamato capitulo du-
 ro lacrymam fundens. Pluk. mant. 183. t. 44.
- Habitat in Æthiopia. 5
- Folia obtusiflora; Corollæ obtuse, Calyx intermedio
 flori nullus; Stylus magis subulatus quam in reliquis.
2. PENÆA foliis cordatis acuminatis. Mat. med. 48. mucronata.
 Penæa foliis ovatis acuminatis. Roy. lugdb. 399.
 Penæa. Hort. cliff. 37.
- Ericæ
 end. hellot dracardien pichtale. Dr. Bito. maleb
Sarcocolla. Grosswendel.

Erica africana, unedonis flore ampio, foliis cordiformibus in acumen desinentibus. *Raj. dendr.* 97.

Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, flore parvo & lata basi in acutissimum mucronem subito desinente, capitulis origani. *Pluk. mant.* 183.

Habitat in Æthiopia. ♂

squamosa.

3. *PENÆA* foliis rhombæo-cuneiformibus carnosis.

Habitat in Æthiopia

*Hæc reliquias minor; Corolla (ut in præcedente) acuta.
Folia parte dimidia superiore patula.*

~~BLÆRIA~~ *lin. alnomum Verbascæ ex Hort.*

ericoides.

1. *BLÆRIA* *Hort. cliff.* 49.

Kotzia adan *Erica carneæ, promontorii bonæ spei, foliis & floribus villosis.* *Pet. gaz. t. 2. f. 10.*

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

Buddleia ad

americana.

1. *BUDDLEJA*. *Amm. herb.* 577. *Hort. cliff.* 35.

Ophioxylon americanum, foliis oblongis mucronatis leviter serratis bardanæ instar subtus lanuginosis. *Pluk. alm.* 270. *t. 210. f. 1.*

Verbasci folio minore arbor, floribus spicatis luteis, seminibus singulis oblongis in singulis vasculis siccis.

Sloan. jam. 139. hist. 2. p. 29. f. 1. Raj. dendr. 97.

Habitat in Caribæis ad ripas & torrentes.

EXACUM.

1. *EXACUM* floribus sessilibus. *Fl. zeyl.* 25. *

*Exacum. Amœn. acad. 1. p. 391. **

Planta annua, facie centaurii æthiopici. Pluk. pbyt. 275. *f. 3.*

Habitat in Asia & Africa.

pedunculat.

2. *EXACUM* floribus pedunculatis.

Centaurium minus hypericoides, flore luteo, lini capitulis. *Pluk. mant.* 43. *t. 343. f. 3*

Habitat in India. ○

PLANTAGO.

* *Scapo nudo.*

1. *PLANTAGO* foliis ovatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis.

Plantago foliis ovatis glabris. Hort. cliff. 43. *Fl. suec.*

122.

Plantago ad. 225.

• *major.*

TETRAN

122. *Mat. med*
Dalib. paris. 50

Plantago scapo sp

Plantago latifolia

Plantago major.

Plantago latifolia

MONOGYNIA.
ore ampio, foliis cordato-
bus. Raj. dendr. 97.
cie arbuscula ethiopica
ffimum mucronem sub-
Plak. mant. 183.

cuneiformibus carnoso-
lla (ut in precedente)
ire patula.

RIA. Lin. aln.
Yerba... 12. foliis & florib.
bona speci, foliis & florib.
10.

LEJA.
rb. 577. Hort. cliff.
foliis oblongis mucro-
star subtus lanuginosus.

or, floribus spicatis lo-
gis in fugalis vascu-
l. p. 29. f. 1. Raj. d.
pas & torrentes.

CUM.
libus. Fl. zeyl. 25.
p. 391. *
ri ethiopici. Plak. ph.

unculatis.
coides, flore luteo, lin-
2. 343. f. 3

TAGO.
o nudo.
tis glabris, nudo scapo
is. Hort. cliff. 43. f.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

113

122. Mat. med. 49. Roy. lugdb. 401. Hall. helv. 470. Dalib. paris. 50. *Plantago scapo spicato, foliis ovatis. Fl. lapp. 62.* *Garden obacco vegi, Japan.*
πεταλευρος πολυγενες. Thal.
centauria. Cey
- Plantago latifolia sinuata. Bauh. pin. 189. *trapotek. carniol*
- Plantago major. Cam. epit. 261.
3. Plantago latifolia glabra minor. Bauh. pin 189. *Plantago ad. 225*
- Y. Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis. Bauh. pin. 189. Hort. upf. 29. *Saxothodes, gamma, 221.*
5. Plantago latifolia rosea, flore expanso. Bauh. pin. 189. *Separia 47. 221.*
- Plantago latifolia, spica multiplici sparsa. Bauh. pin. 189. *annaeaphora*
- Habitat in Europa ad vias. & astringent. *Plantago ad. 225*
2. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo angulato; spica flosculis distinctis. *Plantago ad. 225*
- Habitat in China, Sibiria.
- Planta ita refert P. majorem, ut quivis facile eandem diceret. At differt Spica longiore, floribus remotis & distantibus, Foliis sepius basi subdentatis, Scapo angulato.
3. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, media: spica cylindrica, scapo tereti. Hort. cliff. 36. Fl. suec. 123, Roy. lugdb. 401. Hall. helv. 472. Dalib. paris. 50. *Plantago ad. 225*
- Plantago latifolia incana. Bauh. pin. 189. *Plantago. Plantago hirta*
- Plantago major incana. Clas. hist. 2. p. 109. *μυριδη γενικη Δαλι*
3. Plantago latifolia hirsuta minor. Bauh. pin. 189. *αρνούλα ελον δεν*
- Plantago latifolia incana, spicis variis. Bauh. pin. 189. *Plantago ad. 225*
- Moris. hist. 3. f. 8. t. 15. f. 9.
- Habitat in Europæ pascuis sterilibus apricis argillofisis. &
4. PLANTAGO foliis lanceolato-ovatis pubescentibus virginicae. subdenticulatis, spicis laxis pubescentibus, scapo angulato. Gron. virg. 16. *Plantago ad. 225*
- Plantago media incana virginiana, ferratis foliis, annua. *6: apetina*
- Moris. hist. 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 8.
- Plantago virginiana, pilosellæ foliis angustis, radice turbinata. Plak. alm. 298.
- Plantago myosotis f. trinervia hirsuta carolina. Raj. hist. 2. p. 1889.
- Habitat in Virginia.
- PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nudâ, lanceolata. scapo angulato, Vir. cliff. 9. Hort. cliff. 36. Roy. lugdb. 401. Hall. helv. 471. Dalib. paris. 50. *Plantago ad. 225*
- Plantago angustifolia major. Bauh. pin. 189. *πεταλευρος. Thal*
- Plantago minor. Dod. pempt. 102. *Lanceola. Cey*

H

β Plan-

114 TETRANDRIA MONOGYNIA.

B. *Plantago trinervia*, folio angustissimo. *Baub. pin.* 189.
prodr. 98.

C. *Plantago angustifolia major*, caulum summitate foliosa.
Baub. pin. 189.

Habitat in Europæ campis sterilibus. 2

Plantago ad. 225

• lagopus.

Catarractæ la. Dicte. Raw. xotavayx.

D. *PLANTAGO* foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta,
scapo angulato.

Plantago angustifolia, paniculis lagopi. *Baub. pin.* 189.
prodr. 98. *Moris. hist.* 3. f. 8. t. 16. f. 13.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania.

*Bractæ s. squamæ in spicas sunt densissimo tomentoso-hir-
sutæ; Basis foliorum pilosa.*

• albicans.

Plantago ad

E. *PLANTAGO* foliis linear-lanceolatis hirsutis, spica
cylindrica erecta, scapo tereti foliis longiore.

*Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo longitudine
foliorum, spica oblonga.* *Hort. cliff.* 37. *Roy. lugdb.*
401.

*Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo foliis duplo
longiore, spica oblonga.* *Sauv. monsp.* 26.

F. *Holosteum hirsutum albicans majus.* *Baub. pin.* 190.
Holosteum salmanticense majus. *Clus. hist.* 2. p. 110.

G. *Holosteum hirsutum albicans minus.* *Baub. pin.* 190.
Habitat in Hispanie & Narbonæ aridis.

H. *PLANTAGO* foliis linearibus planis hirsutis, spica ob-
longa erecta.

I. *Plantago foliis linearibus, spica oblonga.* *Hall. helv.*
471.

J. *Holosteum hirsutum nigricans.* *Baub. pin.* 190.

Habitat in Helvetiæ alpibus. 2. *Det.*

K. *PLANTAGO* foliis linearibus, scapo brevissimo lana-
to nutante, spica subrotunda, scapo tereti. *Hort. cliff.*
36. *Roy. lugdb.* 401.

L. *Holosteum s. Leontopodium creticum.* *Baub. pin.* 190.
Leontopodium creticum. *Clas. hist.* 2. p. II.

Habitat in Creta. *Carolinæ consuetu-*

carinæ poterat ad Cretam, nequa glauca.

M. *PLANTAGO* foliis semicylindraceis integerrimis:
basi lanatis, scapo tereti. *Fl. suec.* 127.

N. *Plantago* scapo spicato, foliis linearibus subtus conve-
xis. *Fl. lapp.* 63. *Lob. obs.* 163.

O. *Coronopus maritimus major.* *Baub. pin.* 190.

Habitat in littoribus maritimis Europæ borealis.

Basis foliorum pilosa est, unde affinitas summa specierum

6. 7

Plantago Indica
Lobatum antennatum

TETRAND

6. 7. 8. 9. II. se
an locus; an cop

II. PLANTAGO

tereti. *Roy. lug*

Plantago foliis tria-
p. 428. *Plantago man*

Holosteum, stricti

Serpentina omniu

Holosteum massili

Habitat in mariti

12. PLANTAGO

Plantago foliis lin

37. *Fl. suec.* 12

Coronopus sylvest

Herba stella. f. C

Coronopus horten

Habitat in Europæ

13. PLANTAGO

reti, spica ovata: b

Habitat in Hispani

Differt a P. Coro

Spica ovata, ejus v

bracteis glabris

angustissimis pub

Calycis foliolis ac

Foliis linearibus,

pus pilosus est. 1

14. PLANTAGO

128. *Dalib. parij*

Plantago floribus fe

niflori maris. Fl

stamp. 2. p. 26.

Gramen junceum,

tis donatis, Pluk

3. f. 8. t. 9. f. 30

Habitat ad Europæ

15. PLANTAGO

cis foliosis. *Hort.*

Plantago caule ram

Plantago annua, fo

cto. Hort. cliff. 3

MONOGYNIA.
gustissimo. Bauh. pin.
caulium summittate
eribus. 2
ceolatis, spica ovata
alis lagopi. Bauh. pin.
f. 8. t. 16. f. 13.
Hispania, Lusitania,
unt densissimo tomento
ri-lanceolatis hirsutis
creti foliis longiore.
nearibus, scapo longo
Hort. cliff. 37. Roy.
earibus, scapo foliis
laur. monsp. 26.
s majus. Bauh. pin.
ius. Clus. hist. 2.
s minus. Bauh. pin.
arbona aridis.
ibus planis hirsutis.
spica oblonga. Hall.
ns. Bauh. pin. 190.
2. Quiblet.
ibus, scapo brevissimi.
ta, scapo tereti. Hor.
creticum. Bauh. pin.
hist. 2. p. II.
p. 163.
Bauh. pin. 190.
Europe borealis.
affinitas summa sp.

Plantago Indica c. A.D. 189
Lobatum antennatum c. A.D. 190

{
} Payco. Monard.
} habbar. caen
gotne. P. alp.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

115

6. 7. 8. 9. 11. sed quæ vis naturæ efficeret tam varia?
an locus; an copula.

11. PLANTAGO foliis subulatis triquetris rigidis, scapo *Plantago ad 225*
tereti. Roy. lugdb. 402

Plantago foliis triangulari-prismaticis. Guett. stamp. 2. *Leprotna. Dod.*
Plantago mert. minor tem. folia. T. Int. 127. *coronopus. matth.*
p. 428.

Holosteum, strictissimo folio, minus. Bauh. pin. 191.

Serpentina omnium minima. Lob. ic. 439.

12. Holosteum massiliense. Bauh. pin. 190.

Habitat in maritimis Mediterranei arenosis.

12. PLANTAGO foliis linearibus dentatis, scapo tereti. *Plantago ad*
Coronopus. Roy.

Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. Hort. cliff.

37. Fl. suec. 126. Roy. lugdb. 401. Dalib. paris. 50. *xepwot. 85. Thym. Dod.*

Coronopus sylvestris hirsutior. Bauh. pin. 190.

Herba stella. f. Cornu Cervinum. Dod. pempt. 109.

13. Coronopus hortensis. Bauh. pin. 190.

Habitat in Europæ glareosis.

13. PLANTAGO foliis linearibus subdentatis, scapo te- *loßlingit.*
reti, spica ovata: bracteis carinatis membranaceis. Lœfl. 9. *holsteon. don.*

Habitat in Hispanie collibus agrorumque marginibus. ○

Differt a P. Coronopo quod sit minor & praecocior;

spica ovata, ejus vero longa. Floribus rariis imbricatis:

bracteis glabris navicularibus; ejus vero subulatis

angustissimis pubescentibus. Staminibus brevioribus.

Calycis foliolis acutioribus; colore corollæ magis fusco.

Foliis linearibus, nec lanceolatis, parce dentatis. Sea-

pus pilosus est. Lœfl.

14. PLANTAGO scapo unifloro. Fl. lapp. 64. Fl. suec. *uniflora.*

128. Dalib. paris. 50. *Plantago pubescens. folia monanthos. T. Int. 128.*

Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris. Fuss. act. 1742. p. 131. t. 7. Guett.

stamp. 2. p. 26.

Gramen junceum, capitulis quatuor longissimis filamen-

tis donatis. Pluk. alm. 180. t. 35. f. 2. Moris. hist.

3. f. 8. t. 9. f. 30.

Habitat ad Europæ littora lacuum.

B. Caule ramoso.

5. PLANTAGO caule ramoso, foliis integerrimis, spi- *Polygonum*
cis foliosis. Hort. upf. 29. *

Plantago caule ramoso. Vir. cliff. 9. Roy. lugdb. 401.

Plantago annua, foliis integerrimis, caule ramoso ere-

cto. Hort. cliff. 37. Dalib. paris. 51.

H 2

Pfyl-

Polygonum
Plantago ad.

Cypera Thym.
Polygonum Sabice

- { *Psyllium majus* Linn. sp. n. C. R. 191. 21. et.
- Bassia* *guineensis* { *cubitalis* in apice ramosa, foliis ex parte que quinquefolia aderit, rami cernue.
Dasyuris *guineensis* foli app. 2 ad 4. vermiculatae, non dentatae, moniliformes opp. 2 ad 4. ordinatae inter se. nig. aliud cernue.
- Typoscava* *Brasil. P.* 116 **TETRANDRIA MONOGYNIA.**
Eius viridi fructuatae, rami possunt vel matris praefaci potest. huius deocto, *Balnea*, *Syphonia*.
Psyllium *dioscoridis* *ad. 223* *indicum* *Psyllium majus* *erectum*. *Bauh. pin. 191.*
Habitat in Europæ australis sepibus. ○
- Plantago* *affinis*, *Cynops. theraph.* 16. **PLANTAGO** caule ramoso, foliis dentatis, spicis aphyllis. *Hort. upf. 28. Mat. med. 50.*
- ~~*Salicornia* *halophila*~~ *Psyllium dioscoridis* *vel indicum*, foliis crenatis. *Bauh. pin. 191.*
- Scorodonia* *mutt.* *Habitat in India.* ○
- Capraria* *spurcata* *var. 628.* *Scorodonia chrysanthemoides* *Scoparia gen. p. 221.* **SCOPARIA.** *Fl. 18. A.*
- Samoloides* *dulcis.* 1. **SCOPARIA.** *Gen. nov. 1098.*
- Phytenuoides* *Pluv.* *Capraria* foliis ternis, corollis quadripartitis. *Hort. cliff. 320. Roy. lugdb. 301.*
- Kreidels. Quab.* *Samoloides. Boerb. lugdb. 2. p. 265.* * *Veronica americana* *erecta* *frutescens & ramosa.* *Herm. parad. 241. t. 241.*
- ad. 225.* *Veronica fruticosa* *erecta* *dulcis*, hexangulari caule. *Sloan. hist. 1. p. 195. t. 108. f. 2.*
- Tamnoides* *Boerb.* *Phyteuoides americanum*, flore albo tetrapetalo. *Pluk. alm. 296. t. 215. f. 1.*
- Habitat in Jamaica, Curassao.* ○
- Anagallis* *atrum* *minima* *ad. 230.* **CENTUNCULUS.** *Fl. suec. 129. Dalib. paris. 52.*
- anagallidatum.* *minima* *ad. 230.* *Centunculus* foliis alternis ovatis. *Fl. suec. 129. Dalib. paris. 52.*
- Anagallidium* *exiguum*, foliis lanceolatis alternis. *Mitch. gen. 14. t. 18.*
- Anagallis paludosa* *minima.* *Vaill. paris. 12. t. 4. f. 2.*
- Alpine palustris* *minima*, flosculis albis. *Mentz. pug. t. 4. f. 5.*
- Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ, Scaniæ arenosis.* ○
- SANGUISORBA.**
- Sanguisorba* *ad. 293.* 1. **SANGUISORBA** spicis ovatis. *Hort. cliff. 39. Fl. suec. 130. Mat. med. 51. Roy. lugdb. 240. Dalib. paris. 51.*
- officinalis.* *Sanguisorba officinalis* *ad. 293.* *Pimpinella sangvisorba* *major.* *Bauh. pin. 160.*
- Sanguisorba officinalis* *ad. 293.* *Pimpinella sylvestris* f. *sangvisorba major.* *Dod. pempt. 105.*
2. **PIMPINELLA** *major* *rigida* *præalta* *auriculata* *subnuda.* *Bocc. mus. 2. p. 19. t. 7.*
- Habitat in Europæ pratis siccioribus.* 2
2. **SANGUISORBA.**
- Cornus* *arborescens* *cordatis.* *Fl. suec. 129. Dalib. paris. 52.*
- Cornus* *sylvestris* *virginiana* *tetrapetala.* *Fl. suec. 129. Dalib. paris. 52.*
- Cornus* *pumila* *hortsensis* *ad. 293.* *Habitat in sepibus.*
- Cornus* *arborescens* *umbellifera* *cliff. 38. Roy. lugdb. 240. Dalib. paris. 52.*
- Cornus* *femina* *ad. 293.* *Habitat in sepibus.*

2. SANGUISORBA spicis longissimis. Hort. cliff. 39. canadensis.
Roy. lugdb. 240.

Pimpinella sanguisorba canadensis major, spica longiore alba. *Moris. hist.* 3. p. 264. f. 18. t. 8. f. 12.

Pimpinella maxima canadensis longius spicata. *Corn. canad.* 175. t. 174. *Barr. rar.* 18. f. 739.

Habitat in Canada. 2 3 pd. ~~ex~~ ¹ locale 1 pp.

CISSUS. *as in men grecum hedera.*

- I. CISSUS. Fl. zeyl. 60. * Amoen. acad. 1. p. 390. * vitiginea. Vitj. prae
 Arbuscula baccifera circumPLICATILIS, vitigineo folio
 subtus lanato, fructu racemoso fervidiore odoro. Pluk. ad. 408
 mant. 27. t. 337. f. 2. sadavalli. Bram. uvadlypiformis typ. Snop druijan. Htg.
 Schunambu-valli. Rheed. mal. 7. p. . t. II. Scinde oddi. Augst. 37. 44. f. 2.
 Habitat in India. h[ab]it[u]t in Indiā. origine l. ierbacea. fructuata onata udang. Augst. 37. 44. f. 1.
 caule rot. foli. riliis. dibr. aplo. cint le cylind. caule subacida. non nigr. plante.
 caput cyl. foli. rot. h. 1. st. 4.
 h[ab]it[u]t l. glab. put. pauc. glab. nigr. fructu. h[ab]it[u]t l. glab.
 EPIMEDIUM. ad 432.

CORNUS.

1. CORNUS arborea, involucro maximo: foliolis ob-^{florida.}
verse cordatis. Hort. cliff. 38. Hort. upf. 29. Roy. Cornus ad 158.
lugdb. 249. Gron. virg. 17.

Cornus mas virginiana, flosculis in corymbo digestis a
perianthio tetrapetalo albo radiatim cinctis. Pluk. alm.
120. Catesb. car. 27. t. 27.

Habitat in Virginia. ♂

2. CORNUS arborea, umbellis involucrum æquantibus. mas. Cornus ad 1
Hort. cliff. 38. Hort. upf. 29. Roy. lugdb. 249. Dalib. Cornus. Brupf. Virg +
paris. 52.

Cornus sylvestris mas. Bauh. pin. 447.

Cornus mas pumilio. Clas. hist. I. p. 13.

β. Cornus hortensis mas. Bauh. pin. 447.

Habitat in sepibus Austriæ. ♂ ^{15 apud flor. ponte adh.}

3. CORNUS arborea, cymis nudis. it. W-goth. 32. sanguinea. Cornutus,
Cornus umbellis involucro multoties longioribus. Hort. hartriegel. Virg ^{herb.} +
cliff. 38. Roy. lugdb. 249. Hall. helv. 463. Dalib. Ligustrum. Thelyp.
paris. 52.

Cornus femina. Bauh. pin. 447. ^{fr. lana delia.}

~~Cornus~~ ^{Sanguin}
~~offic. Lin. C. cornu~~
~~Tang. venetis ad 158~~
~~Thelypoma~~
~~Mandocaria. quib. can~~
~~Ligustrum Brupf.~~

H 2

H 3 Vir-^{Nor. sordid. fr. r. n. d. alij}
Daucus capitolon. Aug. 5. 1866. f. 2. Karotte ^{Ujoni valli. h. mag. R. 45.} Dose der Ber. vall. Arende
caulis rot. cibis, rucini, cypri. v. d. fol. pubente 3 p. l. cal. velutin. st. 4 } Vittad.
Daucus glb. ^{mag.} Trich. 1. condensata. glb. 408

Cannavabaya Bras. major 31. 4 ped. lata subhirsute rami alt.
fol. alt. folia tuberculata fl. flavi solit. anelli. folia pauci longior 2 docebantur.
Cannavabaya Bras. major 31. 4 ped. lata subhirsute rami alt.
folia tuberculata fl. flavi solit. anelli. folia pauci longior 2 docebantur.

TETRANDRIA MONOGYNIA, 119

Ludwigia. Gron. virg. 17.

Lysimachia non papposa, flore luteo majore, siliqua caryophylloide minore, ex virginia. Pluk. alm. 235. t. 203. f. 2.

Habitat in Virginia. ○

2. LUDVIGIA foliis oppositis lanceolatis, capsulis perennis.
dunculatis. *juliian ad 165.*

Ludwigia caule diffuso, foliis lanceolatis, capsulis pedunculatis folio dimidio brevioribus Fl. zeyl. 66. *

Carambu. Rheed. mal. 2. p. 49. Lad. planta cirtata just ad madagascarij poterit
Habitat in India. 2

p. 368.

OLDENLANDIA.

1. OLDENLANDIA pedunculis simplicissimis, fructi unifloris.
bus hispidis.

Oldenlandia calycibus fructuum maximis coloratis. Gron.
virg. 138.

Alsine aquatica major repens, foliis acuminatis, virginiana. Pluk. alm. 20. t. 74. f. 5. mala.

Habitat in Virginia.

Caules ramoso-subdivisi, repentes. Folia opposita, lanceolato-ovata, subpetiolata, integerrima. Flores axillares, pauci, pedunculis propriis. Germina hispida.

2. OLDENLANDIA pedunculis bifloris petiolo longioris.
oribus, foliis lanceolatis. Fl. zeyl. 68. *

Habitat in India. ○

3. OLDENLANDIA umbellis nudis lateralibus alter-umbellatis.
nis, foliis linearibus. Fl. zeyl. 67. *

Lysimachia adfinis, satureja folio, maderaspatensis, capsulis in summitate fere umbellatis. Pluk. alm. 236.
t. 119. f. 4.

Habitat in India. 2

4. OLDENLANDIA pedunculis multifloris, foliis line-corymbosa.
ari-lanceolatis. + ? *autorrhizum* Schult. Tab. 258. f. 1.

Oldenlandia humilis hyssopifolia. Plum. gen. 42. Erhet.
pict. t. 4. f. 1. *hyssopifolia*

Habitat in America meridionali. ○

AMMANNIA.

ammannia ad 234

1. AMMANNIA foliis semiamplexicaulibus, caule tetra-latifolia.
gono, Hort. cliff. 344. Hort. ups. 30.

Ammannia palustris, caule quadrangulari, foliis angustis.
Amm. herb. 344. *foranella angusta* Apa-

- umbu Brasil. { *umbu*. Brasil. Pl. 76. cor. med. trunks nullo decibus siccis spiculis amictibus
 dentellis. fol. und. eleagni laeva late virg. anida astrov. flar. paxwell. tenuin.
 fructu. pruni et membr. alto flavo. Drupe. tenuis & obtusa. in umbra. dentata.
 Drupe. watera anida grisea membr. alba. / rufa. vire austro. vire adusta.
 radice. utr. eleagni. tubera. crassa. Batatas. cuncta alta. vallis
 citrulli. sapo. dulci. et. subtili. dulcis. profusa. Videret. Eleagni. prae.
 Aparines folio anomala, vasculo seminali rotundo, se-
 mine minutissimo. Sloan. hist. I. p. 44. t. 7. f. 4.
 Habitat in Caribæis, locis humidis. ○ 2nd.
 cent. 4th. v. 2d. loc. v. 1st. r. 1st. p. 1st. 1st. 1st. 1st.
 ramosior. 2. AMMANNIA foliis subpetiolatis, caule ramoso.
 Ludvigia aquatica erecta, caule rubente, foliis ad geni-
 cula binis longis angustis hyssopi instar, flore tetrape-
 talo albo. Clayt. 774.
 Habitat in Virginia. D. Gronovius. ○
 Planta pedalis, inferne Ramis oppositis, teretibus, sim-
 plicibus. Calyces ex alis foliorum solitarii (nec ut in
 precedenti terni), ad apices ramorum magis conferti
 & ferme spicati.
 baccifera. 3. AMMANNIA foliis subpetiolatis, capsulis calyce ma-
 joribus coloratis.
 Anonymos, linariæ folio, orientalis, gallii lutei flore, her-
 ba capsularis verticilata. Pluk. alm. 33. t. 136. f. 2.
 at non ramosa.
 Habitat in China. Osbeck. ○
 Planta tenera, digitæ longitudine, erecta, absque ramis;
 caule rufescente, tereti. Folia opposita, lanceolata, sub-
 petiolata, integerrima. Flores verticillati, ad axillas
 foliorum plurimi propriis pedunculis insidentes, min-
 imi. Capula globosa, rubra, calyce major.

ISNARDIA.

- Pen. • palustris.
Dantia. Pet. 244. I. ISNARDIA. Dalib. parif. 53.
Ynerdia. Lin. Dantia palustria. Petit. gen. 49. t. 49.
 à D. Danti d'Israël Dantia foliis subovatis pediculatis, floribus in foliorum
 Bot. Parisino. alis sessilibus. Guett. stamp. 2. p. 115.
Dantia alter Dotanum. Ocytophyllum. Buxb. act. 4. p. 277. t. 27.
 cum eo nomine debat Glaux major palustris, flore herbaceo. Moris. præl. 268.
 compedi. ob similitudinem f. 2. Raj. hist. 1102. suppl. 635. Bocc. mus. 105. t. 84.
 Alfine palustris rotundifolia repens, foliis portulacæ pin-
 givibus. Lind. alsat. 114. t. 2.
 Habitat in Galliæ, Alsatiæ, Russiæ, Virginiam fluvii, ○

Trapa ad 84. 84. ^{oldenlandiae} ^{petiolaris} ^{2a forma} ^{146. in Linn.} TRAPÆ.

- C. natans. I. TRAPA ad 84
 Trapa petiolis foliorum natantium ventricosis. Hort.
 Trichos. aquat. Berg. cliff. 483. Fl. suec. 134. Mat. med. 52. Dalib. pa-
 nitaria. Damocly. sive ris. 52.
 Rijns. japon. Kempt. Tribulus aquaticus. Bauh. pin. 194.
 Jap. 91. Tadib. Theophr. L. 4. c. n.
 Savoy. Vicenza. Vena.
 Zel. ham

Pano-

she multica legitima
 fructu. part. ovulae,
 subulae argentea venae
 tenui. TETRAN
 Hap. auct. 769.
 Panover-Tsieraua.
 Habitat in Europæ

DORSTENIA
 med. 53.
 Dorstenia dentaria
 vali. Houst. act.
 Dorstenia sphondylii
 Drakena radix. Cl.
 Cyperus longus od.
 Tuzpatlis. Hern. n.
 Dorstenia dentaria
 in quadrangulari
 Habitat in nova Hi
 insula Vicentii.

DORSTENIA P
 Parietaria racemosæ
 10.
 Habitat in Americ
 Clavus. Urtic. 4. c. 11. p.
 subtilis. illigatus utr
 cap. Thym. flue
 ELEAGNUS fo
 Hort. up. 31.
 Elæagnus. Cam. ep
 Olea fylvestris, foli
 Habitat in Bohemia

ELÆAGNUS fo
 58.
 Eleachnus foliis ro
 t. 39. f. 2.
 Habitat in Zeylon

BRABEJUM. H
 Amygdalus æthiopi
 t. 1.
 Arbor æthiopica he
 tervalla senis. P
 Habitat in Æthiop

RIVINA. Hort.