



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Lycopodium caule repente, ramis spica foliis patula instructis. *Fl. lapp.* 421.

Selaginoides foliis spinosis. *Dill. musc.* 460. t. 88. f. 1.

1. Haller. 1717.

Habitat in Europæ pascuis muscosis. Ant.

*alopeuroi-
des.*

7. LYCOPODIUM foliis sparsis ciliatis linearibus, spicis terminalibus foliosis.

Lycopodium ramis reflexis, apicibus radicatis: foliolis subulatis basi ciliatis. *Hort. cliff.* 476.

Lycopodium terrestre repens, caule rotundo foliis dense obsito, radices ad summitatem emittens & se late propagans. *Gron. virg.* 126.

Lycopodium alopecuroides, flagellorum extremitatibus radicosis. *Dill. musc.* 464. t. 62. f. 8.

Muscus terrestris repens virginianus humi diffusus, viticulis longioribus, foliolis tenuibus vestitis. *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 12. *Raj. suppl.* 32.

Habitat in Virginia, Canada.

inundatum.

Lycopodium ad

8. LYCOPODIUM foliis sparsis integerrimis, spicis terminalibus foliosis.

Lycopodium caule repente, spicis solitariis sessilibus foliolis, foliolis lævibus. *Fl. suec.* 862. *Dalib. paris.* 340.

Lycopodium palustre repens, clava singulari. *Vaill. paris.* 123. t. 16. f. 11. *Dill. musc.* 452. t. 62. f. 7.

Habitat in Europæ inundatis.

9. LYCOPODIUM foliis sparsis octifariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis.

Lycopodium caule erecto dichotomo. *Fl. lapp.* 420. *Fl. suec.* 857. *Mat. med.* 487. *Hort. cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 506.

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. musc.* 435. t. 56. f. 1.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.* 360.

Muscus erectus abietiformis. *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 5. t. 5. f. 9.

Habitat in Europæ borealis sylvis acerosis.

obscurum.

10. LYCOPODIUM foliis sparsis decurrentibus, farnentis repentibus, surculis erectis dichotomis.

Lycopodioides radiatum dichotomum. *Dill. musc.* 274. t. 67.

Habi-

Habitat in Philadelphia.

Sarmenta erecta, dichotoma at non fastigiata: ramis lateralibus scilicet brevioribus. Folia sparsa at tamen rariora; situ indeterminato, glabra, rigidiuscula, linearia, acuta, basi decurrentia s. adnata cauli, deinde patula. Fructificatio neque a me visa fuit.

11. LYCOPODIUM foliis sparsis quinquefariis subser-ratis, furculis annotino-articulatis, spicis terminalibus glabris erectis. *annuotinum.*

Lycopodium caule erecto, spica glabra terminali. *Fl. lapp. 419. Fl. suec. 858. Hall. helv. 93.*

Lycopodium elatius juniperinum, clavis singularibus sine pediculis. *Dill. musc. 455. t. 63. f. 9.*

Muscus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis singularibus sine pediculis. *Morif. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 3.*

Muscus terrestris repens, clavis singularibus erectis. *Pluk. alm. 248. t. 258. f. 5.*

Habitat in Europæ nemoribus.

12. LYCOPODIUM foliis sparsis curvatis, caule ramo-cernuum.

sissimo, spicis nutantibus.

Lycopodium erectum ramosissimum, spicis ovatis sessilibus nutantibus. *Fl. zeyl. 387. f. 6.* *Badalvanaha Zeylon. Bellan patija mal. Badalvanaha Zeylon.*

Lycopodium frutescens capillaceum crispum, spicis brevibus nutantibus. *Dill. musc. 456. t. 63. f. 10.*

Lycopodium zeylanicum erectum ramosissimum. *Burm. Zeyl. zeyl. 144. t. 66.*

Muscus zeylanicus erectus perpetuo virens, in arboris proceritatem excrecens. *Pluk. alm. 257. t. 47. f. 9. Morif. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 6.* *Zeylon. Zeylon.*

Muscus zeylanicus terrestris clavatus erectus. *Morif. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 6.*

Muscus clavatus erectus, crispatis foliolis. *Pluk. alm. 149. t. 431. f. 3.* *Zeylon. Bellan patija.*

Muscus maximus, coridis folio, viticulis late ramosis. *Plum. fil. 144. t. 165.* *Zeylon.*

Bellon-patija. *Rheed. mal. 12. p. 73. t. 39.*

13. LYCOPODIUM foliis sparsis imbricatis, ramulis convolutis. *Bryopteris.*

Lycopodioides squamosum hispidum: extremitatibus convolutis. *Dill. musc. 472. t. 66. f. 11.*

Muscus erectus indicus platyceros filicem referens. *Morif. hist. 3. p. 628. f. 15. t. 7. f. 51.*

Butterjoory. hottentorum. Pluk. alm. 100. f. 13. *Mu-*

Muscus filicinus elegans f. Bryopteris. *Pluk. alm.* 247.
t. 100. f. 3. *Raj. suppl.* 32.
Habitat in India.

sanguinolentum. 14. LYCOPODIUM foliis quadrifariis imbricatis, caulibus repentibus dichotomis, spicis sessilibus tetragonis. *Amœn. acad.* 2. p. 363. f. 26. *
Habitat in Camtschatca.

alpinum. 15. LYCOPODIUM foliis quadrifariam imbricatis acutis, surculis erectis dichotomis, spicis sessilibus teretibus.
Chaonocyperis. Tur.
Saxina. Bog.
Silago. s. selago 1a. Min.
Lycopodium caule repente, ramis tetragonis. *Fl. lapp.* 417. t. 91. f. 6. † *Fl. suec.* 861. * *Hort. cliff.* 476.
Roy. lugdb. 506. *Hall. helv.* 93. 1719.
Lycopodium sabinæ facie. *Dill. musc.* t. 58. f. 2.
Muscus clavatus, foliis cupressi. *Raj. hist.* 121.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ,

complanatum. 16. LYCOPODIUM foliis bifariis connatis: superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis.
Lycopodium caule repente, ramis triquetro-planis. *Fl. lapp.* 416. *Fl. suec.* 860. *
Lycopodium sabinæ facie. *Dill. musc.* 445. *synonyma.*
Muscus clavatus, foliis cupressi. *Bauh. pin.* 360.
Muscus terrestris ramosus pulcher. *Bauh. hist.* 3. p. 759.
Lycopodium digitatum, foliis arboris vitæ, spicis bigemellis teretibus. *Dill. musc.* 448. t. 59. f. 3.
Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis sylvæ acerosis.
Confer. Lycopodium altissimum, spicis bigemellis quadrangulis. *Dill. musc.* 449. t. 60. f. 4.

carolinianum. 17. LYCOPODIUM foliis bifariis patulis: superficialibus solitariis, scapis longissimis monostachyis.
Lycopodium pinnatum repens, spicis & pediculis singularibus longis. *Dill. musc.* 452. t. 62. f. 6.
Habitat in Carolina.

helveticum. 18. LYCOPODIUM foliis bifariis patulis: superficialibus distichis, spicis geminis pedunculatis.
Lycopodioides denticulatum pulchrum repens, spicis pediculis insidentibus. *Dill. musc.* 465. t. 64. f. 2.
Lycopodioides foliis ellipticis alterne majoribus. *Hall. helv.* 93.
Muscus denticulatus major. *Bauh. pin.* 360.

Lycopodioides denticulatum erectum filicinum minus et argenteum. } *Emuycus, Peltis*
Dill. musc. p. 470. t. 75. f. 7. musc. denticulatus Emuycus minus
erectus. Pers. musc. 526.

CRYPTOGAMIA MUSCI. 1105

Muscus repens, foliis alternis subrotundis per siccitatem
falcatis. *Moris. hist. 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 34.*
Habitat in Alpibus Helvetiæ. Haller 1718.

19. LYCOPODIUM foliis bifariis: alternis minoribus, *apodum;*
caule repente, spicis sessilibus.

Lycopodioides denticulatum pulchrum repens, spicis a-
podibus. Dill. musc. 467. t. 64. f. 3.

Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania.

20. LYCOPODIUM foliis bifariis: superficialibus di- *stibellatum.*
stichis, caule erecto tereti.

Lycopodioides dentatum erectum filicinum, caule te-
reti ramosissimo. Dill. musc. 468. t. 65. f. 5.

Muscus squamosus erectus. Plum. amer. 35. t. 24. fil.
t. 43. Raj. suppl. 31.

Habitat in America calidiore.

21. LYCOPODIUM foliis bifariis: superficialibus di- *canalicula-*
stichis, caule erecto *canaliculato.*

Lycopodioides erectum filicinum, pinnulis acaciæ, cau-
le sulcato. Dill. musc. 469. t. 65. f. 6.

Muscus denticulatus major ex Ceram. Pluk. amalb.
app. t. 453. f. 8.

Habitat in Amboina.

22. LYCOPODIUM foliis bifariis patentibus: superfi- *plumosum.*
cialibus distichis, furculis erectiusculis, spicis termi-
nalibus tetragonis.

Lycopodioides dentatum dichotomum rigidum minus.
Dill. musc. 471. t. 66. f. 10.

Muscus squamosus repens. Plum. amer. 36. t. 24. fil.
43. Raj. suppl. 31.

Planta muscosa & plumosa guyanensis perelegans minor.
Breyn. cent. 1. p. 194. t. 101.

Habitat in Indiis.

Confer. Lycopodioides dichotomum taxiforme. Dill.
musc. 471. t. 66. f. 9.

Lycopodioides dentatum dichotomum rigidum minus.
Dill. musc. 471. t. 66. f. 11.

Lycopodioides Lonchitidis auriculatis foliis. Dill. musc.
470. t. 66. f. 8.

23. LYCOPODIUM foliis bifariis patentibus: superfi- *ornithopodæ*
cialibus distichis, furculis repentibus, spicis sessili- *oides.*
bus.

Lycopodium procumbens repens, ramis subspicatis, folio-
lis

lis distichis alternis ovatis appendiculatis. *Fl. zeyl.* 388.

Lycopodioides repens, pinnulis ornithopodii. *Dill. musc.* 464. t. 66. f. 1. B.

Muscus lycopodioides denticulatus scandens repensve, in extremitatibus ramulorum polyspermos. *Raj. suppl.* 32.

Habitat in India. en chinâ.

denticula-
tum.

Mandyn. 200

24. LYCOPODIUM foliis bifariis: superficialibus imbricatis, furculis repentibus, floribus sparsis.

Lycopodioides imbricatum repens. *Dill. musc.* 462. t. 66. f. 1. A

Muscus denticulatus minor. *Baub. pin.* 360.

Muscus terrestris lusitanicus. *Clus. hist.* 2. p. 249.

Habitat in Lusitania, Hispania, Iberia.

PORELLA.

pinnata.

1. PORELLA. †

Porella pinnis obtusis. *Dill. musc.* 459. t. 68. f. 1. *Habitat in Pennsylvania.*

Hanc neque ego vidi, nec eam in solo natali investigare potuit D. Kalm.

SPHAGNUM.

palustre.

1. SPHAGNUM ramis deflexis. *Fl. lapp.* 415. *Fl. suec.* 864.

Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. *Dill. musc.* 240. t. 32. f. 1.

Muscus palustris in ericetis nascens. *Pluk. phyt.* 101. f. 1. *Vaill. paris.* 139. t. 23. f. 3.

β. *Sphagnum palustre molle deflexum*, squamis capillaceis. *Dill. musc.* 243. t. 32. f. 2.

Habitat in Europæ paludibus profundis sylvaticis.

greenw. alpinum.

2. SPHAGNUM subramosum erectum.

Sphagnum subulatum viridissimum, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 245. t. 32. f. 3.

Habitat in Angliæ summis alpium paludibus.

PHASCUM.

Saxra. acaulon.

1. PHASCUM acaule, anthera sessili.

Sphagnum acaulon bulbiforme majus. *Dill. musc.* 251. t. 32. f. 11.

Mu-

Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Pet. gaz.*
126. t. 95. f. 14.

β. Sphagnum acaulon bulbiforme minus. *Dill. musc.* 252.
t. 32. f. 12.

Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Vaill. paris.*
128. t. 27. f. 2.

Habitat in Europæ agris, hortis & ad fossas.

Confer Sphagnum acaulon maximum, foliis in centro
ciliaribus. *Hall. itin. alp.* 83. t. 1. *Dill. musc.* 253.
t. 32. f. 13.

Sphagnum acaulon trichodes. *Dill. musc.* 251. t. 32. f. 10.

Muscus² trichodes minor acaulos, capillaceis fo-
liis. *Vaill. paris.* 128. t. 29. f. 4.

2. PHASCUM caulescens erectum.

caulescens.

Sphagnum foliis tenuibus gramineis pellucidis. *Dill.*
musc. 550. t. 85. f. 15.

Habitat in Pennsylvania.

3. PHASCUM caulescens repens.

repens.

Sphagnum vermiculare repens, capsulis intra foliorum
squamosorum alas minimis. *Dill. musc.* 550. t. 85. f.
16.

Habitat in arborum truncis.

FONTINALIS.

1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis a-
cutis, antheris lateralibus. *Fl. suec.* 866. *antipyretica*

Fontinalis capitulis lateralibus. *Roy. lugdb.* 506.

Fontinalis triangularis major complicata e foliorum alis
capsulifera. *Dill. musc.* 254. t. 33. f. 1.

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens.
Vaill. paris. 140. t. 33. f. 5.

Muscus aquaticus, terrestri vulgari similis, major. *Buxb.*
cent. 3. p. 39. t. 69. f. 2.

Muscus aquaticus, viticulis longis minus ramosis luci-
dis. *Moris. hist.* 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 32.

Muscus aquaticus denticulatus. *Læs. pruss.* 173. t. 52.
Habitat in Europæ fluviis.

2. FONTINALIS foliis ovatis concavis trifariis acutis, *minor.*
antheris terminalibus.

Fontinalis triangularis minor carinata, e cymis capsulife-
ra. *Dill. musc.* 257. t. 33. f. 2.

Fontinalis capitulis terminalibus. *Roy. lugdb.* 506.

*Habitat in Europæ fluviis,
Præcedenti nimis affinis.*

- *squamosa.* 3. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capitulis lateralibus.
Fontinalis squamosa tenuis sericea atrovirens. *Dill. musc.* 259. t. 33. f. 3.
Fontinalis minor lucens. *Bauh. hist.* 3. p. 778.
Habitat in Britannia, Gallia.
- pennatum.* 4. FONTINALIS foliis bifariis patentibus, capsulis lateralibus.
Sphagnum pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. t. 32. f. 9.
Muscu⁷ terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Vaill. paris.* 129. t. 27. f. 4.
Habitat in Helvetiæ arboribus.
Confer SPHAGNUM pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. t. 32. f. 8.
SPHAGNUM pennatum undulatum, vagina pilosa. *Dill. musc.* 249. t. 32. f. 7.

SPLACHNUM.

- rubrum.* 1. SPLACHNUM umbraculo convexo. *Amœn. acad.* 2. p. 272. t. 3. f. 2. *
Muscus norvegicus, umbraculo ruberrimo insignitus. *Pet. mus.* 70. t. 1. f. 10. *Dill. musc.* 547. t. 83. f. 9.
Muscus coronatus norvegicus, pediculo longissimo, umbraculo amplo. *Moris. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 10.
Habitat in Norvegia, Finlandia, Russia, Sibiria.
- luteum.* 2. SPLACHNUM umbraculo plano. *Amœn. acad.* 2. p. 277. t. 3. f. 1. *
Habitat in Sueciæ paludibus sylvaticis.
- ampullaceum.* 3. SPLACHNUM umbraculo ampullaceo clauso. *Amœn. acad.* 2. p. 280.
Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo strictiore. *Dill. musc.* 343. t. 44. f. 3.
Muscus capillaceus minor, capitulis geminatis. *Vaill. paris.* 130. t. 26. f. 4.
Muscus aureus capillaris minor, capitulis geminatis erectis mutuo incubitu adnatis. *Pluk. alm.* 246. *Moris. hist.* 3. p. 629. f. 15. t. 16. f. 10.

*Mibi videtur hæc splachnum (in. nam stellij
fominis in alta indivis. nec in eo. caret.
est. Bryum in cap. Dill. nam antea trium
raris.*

Muscus capillaceus, capitulis pyriformibus tubulosis.

Buxb. cent. 2. p. 1. t. 1. f. 1.

Habitat in Europæ frigidioris paludibus sylvaticis.

POLYTRICHUM. *ad. 492*

1. POLYTRICHUM caule simplici (*Fl. lapp. 395.*) anthera parallelepipedâ. *Fl. suec. 868. Dalib. paris. 316.*

Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ferratis. *Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.*

Polytrichum aureum majus. *Bauh. pin. 356. Regi. 802.*

Muscus juniperifolius, capitulo quadrangulo. *Vaill. paris. 131. t. 23. f. 8.*

β. Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. *Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.*

Polytrichum aureum medium. *Bauh. pin. 356.*

Muscus coronatus humilis. *Moris. hist. 3. p. 630. J. 15. t. 7. f. 6. 8.*

Muscus erectus, juniperi folio glauco. *Vaill. paris. 131. t. 23. f. 6.*

γ. Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pilosis. *Dill. musc. 426. t. 54. f. 3.*

Habitat in Europæ α. uliginosis, β. pascuis, γ sterilissimis. 4

2. POLYTRICHUM caule ramosissimo, pedunculis alpinum terminalibus.

Polytrichum alpinum ramosum, capsulis e summitate ellipticis. *Dill. musc. 427. t. 55. f. 4.*

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Snowdon.

3. POLYTRICHUM caule ramosissimo, pedunculis axillaribus.

Polytrichum caule ramoso, capsulis basi destitutis apophysi. *Fl. suec. 870. Dalib. paris. 315.*

Polytrichum ramosum setis ex alis urnigeris. *Dill. musc. 427. t. 55. f. 5.*

Muscus ramosus erectus, calyptra villosa. *Vaill. paris. 131. t. 28. f. 13.*

Habitat in Europa, Jamaica.

MNIUM.

1. MNIUM caule simplici, foliis ovatis. *Fl. suec. 911. pellucidum. . .*

Mnium serpilli foliis tenuibus pellucidis. *Dill. musc. 232. t. 31. f. 2.*

Bryum alternans calyptra variegata & scyphulis foliosis. *Hall. helv. 118. t. 4. f. 8.*

communis.
Polytrichum. *Dod. Bray*
πολυτριχον. Dill. musc.
Capitulum variegatum. Brunt

Mausflam
na. antena terminali
et axillari.

Hunt Institute for Botanical Documentation

Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. Vaill. paris. 130. t. 24. f. 7.
Habitat in Europæ pascuis succulentis umbrosis.

fontanum.
Nov. genus. Jac. 3.
Splaenum hinc

2. MNIUM caule simplici geniculis inflexo. Fl. lapp. 414. Pl. suec. 913.

Bryum palustre scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. Dill. musc. 340. t. 44. f. 2.

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascente, capitulo rotundiore. I. Vaill. paris. 134. t. 24. f. 10.

Muscus trichodes palustris erectus coronatus, capitulis sphaericis amplioribus. Moris. hist. 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 8.

Muscus parvus stellaris. Pluk. alm. 255. t. 47. f. 6.
Habitat in Europa ad fontes paludosos frigidos.

n. 6. id. 2. palustre.
Bryum adans.
ram. capit. femina in
alt. planta. stella et
Splaenum hinc.

3. MNIUM caule dichotomo, foliis subulatis. Fl. lapp. 413. Pl. suec. 912.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. Dill. musc. 233. t. 31. f. 3.

Muscus palustris erectus flavescens, capillaceo folio. Vaill. paris. 135. t. 24. f. 1.

Muscus palustris, flagellis erectis luteolis raro divisis, capitulis oblongis adianti. Moris. hist. 3. p. 629. f. 15. t. 6. f. 9.

Muscus stellaris ramosus palustris, pediculo aureo erecto, capitulo magno sphaerico. Buxb. cent. 1. p. 45. t. 6. f. 1. 2. 3. 4.

Habitat in Europæ paludibus.

androgynum

4. MNIUM, caule ramoso, androgynum. Fl. suec. 910.
Mnium perangustis & brevibus foliis. Dill. musc. 230. t. 31. f. 1.

Bryum angustiori folio, capsula longa pyriformi inclinata. Hall. helv. 114.

Muscoides: muscus capillaris minimus, capitulo minimo pulverulento. Vaill. paris. t. 29. f. 6.

Muscus trichodes parvus, capitulo glomerato f. botryoide. Mich. gen. 108. t. 59. f. 8. H. K.

Muscus coronatus humilis minimus, foliolis pediculis & capitulis minimis erectis. Moris. hist. 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 20.

Habitat in Europæ sylvis.

Bryum ad.
bygrometri-
cum.
Mullerian. ad.

5. MNIUM acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. 1. 4 ad 5 sula

Bry-

Bryum capsula nutante turbinato-ovata, calyptra reflexa quadrangulari. *Fl. suec.* 903. *Dalib. paris.* 324.

Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 407. t. 52. f. 75.

Muscus foliis scutellatis, capitulo pyriformi nutante. *Vaill. paris.* 135. t. 26. f. 16.

Muscus coronatus minor, foliolis latiusculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtusis aureis. *Morif. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 17.

Habitat in Europæ sylvis apricis sterilibus.

6. MNIUM caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthe-^{purpureum.} ra erecta, foliis carinatis.

Bryum capsula erectiuscula oblonga, caulium divisuris pedunculiferis: summitatibus stellatis, foliis carinatis. *Fl. suec.* 896. *Dalib. paris.* 325.

Bryum tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc.* 386. t. 49. f. 51.

Muscus trichodes parvus, foliis musci vulgaris, capitulis longis acutis. *Morif. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 4. 16.

Habitat in Europæ pascuis.

7. MNIUM antheris erectis, operculis filiformibus lon-^{setaceum.} gitudine capitulorum.

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. musc.* 381. t. 48. f. 44.

Habitat in Europæ muris, aggeribus, sepibus.

Caules erecti, brevissimi. Pedunculi atropurpurei, flexuosi, Antheræ cylindricæ, lividæ. Opercula & Calyptræ filiformes, longiores & angustiores, quam in reliquis.

8 MNIUM foliis arefactione revolutis.

Bryum cirratum & stellatum, tenuioribus foliis. *Dill. musc.* 379. t. 48. f. 42.

Muscus muralis minimus roseus stellaris. *Vaill. paris.* 130. t. 24. f. 8.

Habitat in Europæ sylvis & ad sepes.

9. MNIUM foliis ovatis acuminatis pellucidis, peduncu-^{annotinum.} lis subradicalibus, anthera nutante.

Bryum annotinum lanceolatum pellucidum, capsulis oblongis pendulis. *Dill. musc.* 399. t. 50. f. 68.

Habitat in Europæ humidiusculis.

Solla

5500. *hornum.*

10. MNIUM antheris pendulis, pedunculo curvato, furculo simplici, foliolis margine scabris.
 Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.
 Muscus capillaceus major stellatus. *Vaill. paris.* t. 24. f. 4. 5.

Muscus polytrichoides humilior, foliis brevioribus raris pallide viridantibus et vix pellucidis. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 3. 4.

Habitat in Europæ sylvis, aggeribus. *Lall. herb.* 1846
maill. haller. schony.

cruciatum.

11. MNIUM antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis.

Bryum capsulis pendulis, calyptra recurvata, foliis subulatis acutis integerrimis, caule simplicissimo. *Fl. suec.* 907.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 51. f. 7.

Habitat in sylvis & declivitatibus.

pyriforme.

12. MNIUM antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis setiferis.

Bryum antheris nutantibus turbinatis, foliis ensiformibus nitidis. *Fl. suec.* 902.

Bryum trichodes aureum, capitulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 391. t. 50. f. 60.

Habitat in Europæ rupibus.

Polytrichoides.
Polytrichum
des.
aw

13. MNIUM calyptra villosa.
 Polytrichum nanum, capsulis subrotundis galeritis, aloes folio non serrato. *Dill. musc.* 428. t. 55. f. 6. *Dalib. paris.* 315.

Muscus capillaceus minor, calyptra tomentosa. *Vaill. paris.* 131. t. 26. f. 15.

Muscus coronatus rigidus minor & humilior, capitulis villosis brevioribus. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 7.

β. Polytrichum parvum, aloës folio serrato, capsulis oblongis. *Dill. musc.* 429. t. 55. f. 7.

Adiantum aureum medium, in ericetis proveniens. *Vaill. paris.* 131. t. 29. f. 11.

Muscus, adianti aurei facie, humilis, capitulo rotundo turgido, calyptra villosa incana. *Buxb. cent.* 1. p. 43. t. 63. f. 1.

γ. Polytrichum acaulon capillaceum, capsulis cylindricis. *Dill. musc.* 434. t. 55. f. 12.

Habitat in Europæ ericetis subudis.

14. MNIUM pedunculis aggregatis, foliis patentibus pel- *serpyllifoli-*
lucidis. *um.*
- α. Mnum pedunculis aggregatis foliis obovatis integerrimis obtusis punctatis. *punctatum.*
Bryum capsulis nutantibus, foliis subovatis obtusis pellucidis punctatis, caulibus sterilibus procumbentibus, pedunculis aggregatis. *Fl. suec. 901. Dalib. paris. 323.*
Bryum caule procumbente, foliis alternis ovatis pellucidis. *Fl. lapp. 404.*
- β. Bryum pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc. 416. t. 53. f. 81.*
Muscus folio lato subrotundo, capitulo singulari nutante, pediculo longo subrubenti insidente. *Vaill. paris. 136. t. 26. f. 5.*
Muscus polytrichoides palustris major, serpilli latioris folio pellucido. *Moris. hist. 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 39. 40.*
- γ. Mnum pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis ser- *cuspidatum*
ratis.
Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc. 413. t. 53. f. 79.*
Muscus palustris, foliis subrotundis. *Vaill. paris. 26. f. 18.*
Muscus polytrichoides pellucidus fere, foliis denticulatis ad margines veluti crispis. *Pluk. alm. 257. t. 98. f. 8.*
- δ. Mnum pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis *proliferum,*
lanceolatis acutis.
Bryum stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc. 411. t. 52. f. 77.*
Muscus stellaris roseus. *Bauh. pin. 361. prodr. 151. Buxb. cent. 2. p. 2. t. 1. f. 3.*
Muscus coronatus humilis, foliolis latioribus stellatim nascentibus donatus. *Moris. hist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 9.*
- ε. Mnum pedunculis aggregatis, foliis oblongis undula- *undulatum.*
tis.
Bryum caule adscendente, foliis ovato-oblongis patulis pellucidis. *Fl. lapp. 399. Roy. lugdb. 502. Guett. stamp. 90. Dalib. paris. 324.*
Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc. 410. t. 52. f. 76.*
Muscus roseus polycephalus, linariae foliis undulatis. *Vaill. paris. 135. t. 24. f. 3. Mich. gen. 108. t. 59. f. 5.*

Habitat in Europa fere ubique.

Varietates has pro distinctis speciebus sumunt varii; ego ob suas causas ita conjunxi, ut qui distinguendas velit, facile distinctas tradat.

Sekra. ad. triquetrum. 15. MNIUM foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis.

Fontinalis 2 Dillen

Bryum annotinum palustre, capsulis ventricosus pendulis. *Dill. musc.* 404. t. 51. f. 72?

Muscus denticulatus lucens fluviatilis maximus, ad ramorum apices adianti capitulis ornatus. *Vaill. paris.* 135. t. 24. f. 2. 2?

Habitat in Sueciæ paludibus turfosis.

Caules plurimi, in cespitem congesti, digitales & longiores, tomentosi. Folia trifariam posita, unde ramuli triquetri patuli, recentia pallide viridia, antiqua fusca, parva, distantia, carinata, acuminata. Pedunculi solitarii, terminales, purpurei. Capsulæ erectæ, obliquæ s. arcuatæ, obtusissimæ, flavæ. Stellæ femineæ ramos terminant in eadem planta cum capsula, sed distinctis ramis.

Mnium trichomanis 16. MNIUM foliis distichis integerrimis.

Mnium trichomanis facie, foliolis integris. *Dill. musc.* 236. t. 31. f. 5.

Habitat in Sueciæ, Angliæ udis.

D. ju. s. sum.

17. MNIUM foliis distichis bifidis.

Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. *Dill. musc.* 237. t. 31. f. 6.

Jungermannia terrestris repens, foliis ex rotunditate acuminatis bifidis: apertura pene visibili. *Mich. gen.* 8. t. 5. f. 14.

Habitat in Europæ riguis.

D. ju. s. sum.
ju. s. sum.
ju. s. sum.

18. MNIUM foliis distichis, pinnis subtus auriculatis.

Mnium caule procumbente simplici, foliis imbricatis integerrimis alternis antice appendiculatis. *Fl. suec.* 914. *

Lichemastrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. *Dill. musc.* 479. t. 69. f. 1.

Jungermannia alpina palustris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuissime denticulatis. *Mich. gen.* 6. t. 5. f. 16.

Habitat in Europæ subhumidis.

BRYUM. *Spoon musci. veter. s. Brya. a G. de Bry det.*

* *Antheris sessilibus.*

1. BRYUM antheris sessilibus terminalibus, calyptra apocarpum. *anima.*

minima.

Sphagnum caulibus ramosis, foliis undique imbricatis capsulas obtegentibus. *Fl. suec. 865.* *anthera commun. anill.*

Sphagnum foliis pilo terminales. *Roy. lugdb. 500.*

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. *Dill. musc. 245. t. 32. f. 4.*

Muscus apocarpos hirsutus saxis adnascens, capitulis obscure rubris. *Vaill. paris. 129. t. 27. f. 15.*

β. Sphagnum nodosum hirsutum incanum. *Dill. musc. 246. t. 32. f. 5.*

Muscus squamosus saxatilis tortuosus ac nodosus. *Vaill. paris. 123. t. 27. f. 18.*

Habitat in Europæ saxis, arboribus.

anima. ad

2. BRYUM antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis fursumve pilosis. *striatum. Donkadin*

Polytrichum calyptra striata fursumve pilosa *Fl. suec. 869. Dalib. paris. 314.*

Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus majus. *Dill. musc. 430. t. 55. f. 8.*

Muscus apocarpos arboreus ramosus. *Vaill. paris. 129. t. 25. f. 5. 6.*

β. Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus minus. *Dill. musc. 431. t. 55. f. 9.*

Muscus capillaceus minimus acaulos, calyptra striata. *Vaill. paris. 30. t. 27. f. 10.*

Muscus humilis tectorum subfuscus, capitulis brevibus, pileolis erectis, pedunculis curtis. *Moris. hist. 3. p. 629. f. 15. t. 6. f. 13.*

γ. Polytrichum capsulis sessilibus, foliis brevibus rectis carinatis. *Dill. musc. 432. t. 55. f. 10.*

δ. Polytrichum capillaceum crispum, calyptris acutis pilosissimis. *Dill. musc. 433. t. 55. f. 11.*

Muscus capillaceus minimus, calyptra villosa. *Vaill. paris. 130. t. 26. f. 9.*

Habitat in Europæ α. arboribus β. saxis, γ. rupibus, δ. sylvis.

Donkadin
Nexar. ad

Donkadin

Mauckam

* *Antheris pedunculatis erectis.*

3. BRYUM antheris erectis sphaericis. *Fl. suec. 888. Dalib. pomiforme. paris. 317.*

Bryum caule erecto, foliis setaceis, capitulis globosis. *Bry- Fl. lapp. 400.*

Bryum capillaceum, capsulis sphaericis. *Fl. lapp.* 400.
Dill. musc. 339. t. 44. f. 1.

Muscus trichodes minimus sericeus capillaceus, capitulis sphaericis. *Moris. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 6.
Vaill. paris. 129. t. 24. f. 9. 12.
Habitat in Europæ scopulis humosis.

pyriforme, 4. BRYUM Antheris erectis obovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis.

Bryum antheris erectis turbinato-ovatis: opereulo obtusiusculo. *Fl. suec.* 890. *Dalib. paris.* 317,

Bryum serpillifolium pellucidum, capsulis pyriformibus.
Dill. musc. 345. t. 44. f. 6.

Muscus capillaceus minimus, capitulis pyriformibus turgidis. *Vaill. paris.* 129. t. 29. f. 3.

Muscus minimus latifolius, capitulis erectis turgidis.
Buxb. cent 1. p. 44. t. 64. f. 1.

Muscus coronatus humilis stellaris, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus erectis turgidiusculis. *Moris. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 16.

Habitat in Europæ pratis ad aggeras.

extinctorium 5. BRYUM anthera erecta oblonga minori calyptris laxis æqualibus. *Fl. suec.* 891. *Dalib. paris.* 325.

Bryum calyptra extinctorii forma, minus. *Dill. musc.* 349. t. 45. f. 8.

Muscus capillaceus minimus, calyptra longa conoide nitida. *T. Vaill. paris.* 137. t. 26. f. 1.

Muscus capillaris minimus cucullatus. *Magn. hort.* 139. t. 82.

Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo maguo acuto infra aperto, extinctorium referente. *Moris. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 12.

β. Bryum calyptra extinctorii figura, majus & ramosum.
Dill. musc. 350. t. 45. f. 9.

Habitat in Europæ arenosis.

• subulatum. 6. BRYUM antheris erectis subulatis surculis acaulibus. Bryum capsulis longis subulatis. *Dill. musc.* 350. t. 45. f. 10.

Muscus capillaris, corniculis longissimis incurvis R.
Vaill. paris. 133. t. 25. f. 8.

Habitat in Europæ aggeribus humidiusculis.

• rivale. 7. BRYUM antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Fl. suec.* 900. *Dalib. paris.* 320. *It. scan.* 118.

Bryum caule erecto, foliis reflexis seta terminatis, capitulis falcatis. *Fl. lapp.* 397.

Bryum

Bryum rurale ungviculatum hirsutum elatius & ramosius. *Dill. musc.* 352. t. 45. f. 12.

Muscus capillaris tectorum, densis cespitibus nascens, capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinentibus. *Vaill. paris.* 133. t. 25. f. 3.

Muscus erectus hirsutus, capitulis longis acutis ungviculis avicularum similibus, vulgatissimus. *Morif. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 12.

Habitat in Europæ muris, rusticorum tectis, arborum truncis. 2

8. BRYUM antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, *murale.* furculis simplicibus cespitosis.

Bryum tegulare humile pilosum & incanum. *Dill. musc.* 355. t. 45. f. 14.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissimus, foliis in pilum desinentibus. *Vaill. paris.* 133. t. 24. f. 15.

Muscus vulgaris omnium vulgatissimus non villosus. *Vaill. paris.* 133. t. 24. f. 14.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis vulgatissimus non villosus. *Vaill. paris.* t. 25. f. 4.

Habitat in Europæ saxis, muris, tectis, tegulis.

9. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Fl. suec.* 898. *Dalib. paris.* 319 *scoparium.*

Bryum caule inclinato, foliis arrectis subulatis, capitulis erectiusculis. *Fl. lapp.* 398. *axill. solida (plena)*

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie. *Dill. musc.* 357. t. 46. f. 16.

Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo tenuioribus. *Vaill. paris.* 132. t. 28. f. 12.

Muscus capillaceus, foliis pallidis, pediculis pluribus ex communi theca egredientibus. *Buxb. cent.* 2. p. 8. t. 4. f. 1.

Habitat in Europæ sylvis arenosis, in truncis putridis. 2

10. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis. *Fl. suec.* 899. *Dalib. paris.* 320. *undulatum.*

Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis incurvis. *Dill. musc.* 360. t. 46. f. 18.

Muscus erectus, linariæ folio, major. *Vaill. paris.* 132. t. 26. f. 17.

Habitat in Europæ sylvis, aggeribus, pratis umbrosis.

11. BRY-

• glaucum.

— *Kimgraku Japan*
Iswagoki
Iwariba.

11. BRYUM antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, furculis ramosis.

Bryum albidum & glaucum fragile majus, foliis erectis, setis brevibus. *Dill. musc.* 362. t. 46. f. 20.

Muscus trichodes montanus albidus fragilis. *Moris. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 22.

Muscus erectus capillaceus densissimus, glauco folio. *Vaill. paris.* 131. t. 26. f. 13.

Muscus saxatilis ericoides. *Bauh. pin.* 362. prodr. 151. *Habitat in Europæ ericetis apricis.*

albidum.

12. BRYUM antheris erectis foliis lingulatis obtusis patulis. †

Bryum nanum, lariginis foliis albis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 21.

Habitat in Insula Providentia.

pellucidum.

13. BRYUM antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto.

Bryum palustre pellucidum, capsulis & foliis brevibus recurvis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 23.

Muscus polytrichodes elatior, foliis angustis pellucidis & fere membranaceis. *Pluk. alm.* 247. t. 44. f. 7.

Muscus polytrichodes angustifolius pellucidus ramosus. *Pluk. alm.* 247.

β. Bryum erectis capitulis brevibus, foliis reflexis. *Dill. musc.* 365. t. 46. f. 24.

Habitat in Europæ paludibus.

aciculare.

14. BRYUM antheris erectis: operculo aciformi, foliis erectis subsecundis.

Bryum montanum hemiheterophyllum, operculis acutis. *Dill. musc.* 366. t. 46. f. 25.

Habitat in Anglia.

• flexuosum.

15. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. *Fl. suec.* 892.

Bryum pilosum molle, setis intortis. *Dill. musc.* 373. t. 47. f. 33.

Habitat in Europæ sylvis.

Pilobum heteromallum.

16. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Fl. suec.* 895.

Bryum heteromallum. *Dill. musc.* 375. t. 47. f. 37.

Muscus capillaceus, foliis unam partem spectantibus. *Vaill. paris.* 132. t. 27. f. 7.

Muscus trichodes, foliis capillaceis, capitulis minoribus. *Moris. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 5. 7.

Habitat in Europæ ericetis, juniperetis.

17. BRY-

17. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis imberbibus: *tortuosum*.
siccitate retorquentibus. *Fl. suec.* 497.

Bryum alpinum, crinium crispum simile, capsula barbata. *Hall. helv.* 110. t. 4 f. 2. *N 1787.*

Bryum cirratum, setis & capsulis longioribus. *Dill. musc.* 377. t. 48. f. 4.

Muscus alpinus cirrhosus s. crinium tortorum instar crispatus. *Scheuch. alp.* 65. t. 19. f. 15.

Muscus helveticus trichodes crispatus. *Pet. gaz.* 159. t. 65. f. 8.

Habitat in montibus Helvetiæ, Sveciæ, Cambriæ.

18. BRYUM antheris erectis subrotundis: operculo *mu-truncatulum*.
cronato. *Fl. suec.* 889. *Dalib. paris.* 313.

Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc.* 347. t. 45. f. 7.

Muscus capillaceus, omnium minimus. *Vail. paris.* 130 t. 26. f. 2.

Muscus stellaris minimus, pediculo brevissimo, capitulis turgidis. *Buxb. cent.* 2. p. 4. t. 2. f. 2.

Muscus coronatus minimus, foliis & capitulis oblongis in pediculis brevissimis. *Moris. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 18.

Habitat in Europa ad agros, fossas, sepes.

Capsulæ amisso operculo apparent valde truncatæ, obovata & rufa, quibus manifeste differt a sequente.

19. BRYUM antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis *a-viridulum*.
cuminatis imbricato-patulis. *Fl. suec.* 893.

Bryum capillaceum breve, pallide & læte virens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 380. t. 48. f. 43.

Muscus ^{20x}capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & angustioribus. *Vaill. paris.* 130. t. 29. f. 5.

Habitat in Europæ agris, aggeribus.

Folia viridissima. Capsulæ flavescentes, ciliatæ.

20. BRYUM acaulon, foliolis setaceis, antheris obtu-*paludosum*.
pissimis patulis.

Bryum trichodes acaulon palustre minimum, setis & capsulis brevissimis. *Dill. musc.* 387. t. 49. f. 53.

Habitat in Europæ humidis.

Differt a Viridulo, capsulis fuscis & foliis siccitate minime crispis.

21. BRYUM antheris erectis, caule erectiusculo, ramis la-*Hypnoides*.
teralibus brevibus fertilibus. *Fl. lapp.* 396. *Fl. juec.* 894. *Dalib. paris.* 326.

Bry-

Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. *Dill. musc.* 372. t. 47. f. 32.

Muscus alpinus ramosior erectus, flagellis brevioribus, lanuginosus. *Pluk. alm.* 255. t. 47. f. 5.

Muscus terrestris vulgari similis lanuginosus. *Morif. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 7.

β. Bryum hypnoides hirsutiae virescens, fasciculare alpinum. *Dill. musc.* 370. t. 47. f. 28.

γ. Bryum hypnoides, ericæ facie, capsulis barbatis, alpinum. *Dill. musc.* 371. t. 47. f. 31.

Habitat in Europæ frigida rupibus, saxis, sabulosis.

verticillatum.

22. BRYUM antheris erectis, pedunculis siccitate contortis, foliis piliferis, furculis fastigiatis.

Bryum pilosum verticillatum. *Dill. musc.* 374. t. 47. f. 35.

Habitat ad latera collium.

celsi.

23. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis longissimis, foliis setaceis, furculis acaulibus.

Bryum trichodes acaulon minimum, setis & capsulis oblongis. *Dill. musc.* 388. t. 49. f. 54.

Habitat Upsaliæ.

trichodes.

24. BRYUM antheris erectiusculis: ore ciliato absque annulo, pedunculo longissimo.

Bryum trichodes aureum, capsulis incurvis obtusis in setis longis. *Dill. musc.* 389. t. 49. f. 58.

Habitat in Suecia, Germania.

squarrosum.

25. BRYUM antheris obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo-tomentoso.

Muscus palustris, foliis reflexis cauliculos quinqueangulos formantibus. *Buxb. cent.* 4. p. 36. t. 65. f. 1.

Habitat in Europæ borealis paludibus apricis. Læst.

Muscus distinctissimus ab Hypno squarroso. Surculi plures, conferti, erectiusculi, undique fusco pubescentes: Ramo uno alterove brevi. Folia minima, sessilia, ovata, acuminata, subcarinata, late viridia, imbricata, revoluta, quinquefariam exstantia. Pedunculus terminalis purpureus, longus. Capsula oblonga, obliqua.

Sed. Muscus w
• argenteum.

* Antheris nutantibus.

26. BRYUM antheris pendulis, furculis cylindricis imbricatis lævibus *Fl. suec.* 909. *Dalib. paris.* 321.

Bry-