



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.



Uvack. nov. <sup>algae latif. corvacea. C. D. N. 364.</sup> <sup>Paluifolium giganteum f. fucus giganteum. Imper.</sup> } <sup>Paluifolium. Imper</sup>  
<sup>manuum</sup> } <sup>Uvack. nov. manuum. Lib.</sup>  
<sup>musci maritimus viscidis multifido folio. Sibb. 363. ? 19 ae 20.</sup> } <sup>Paluifolium Imper</sup>  
**CRYPTOGAMIA ALGÆ. 1161**

16. **FUCUS** vesiculis oblongis pedunculatis: terminatis <sup>barbatus.</sup> } <sup>Uvack. nov. manuum</sup>  
 foliolis linearibus. } <sup>gongularis. Imper</sup>  
 Fucus folliculaceus, foliis abrotani. *Baub. pin. 365?*  
 Fucus maritimus, foliis tumidis barbatis. *Baub. pin. 365.*  
 Quercus maritima barbata. *Baub. prodr. 154.*  
*Habitat in Oceano.*

17. **FUCUS** vesiculis ovatis pedunculatis, foliis multi-feniculaceis } <sup>717.</sup>  
 fidis linearibus. } <sup>717.</sup>  
 Fucus folliculaceus, fœniculi folio. *Baub. pin. 365.*  
*Habitat in Oceano.*

18. **FUCUS** fronde bipinnata subfiliformi: apicibus ve- <sup>abrotanifo-</sup>  
 ficulosis dilatatis. *Læst. epist. 1. 4.* } <sup>lius.</sup>  
*Habitat in mari Anglico.*

\* *Fruetificationibus non vesicariis.*

19. **FUCUS** caule tereti ramosissimo, ramis sparsis spi- <sup>Muscoides.</sup>  
 nis mollibus alternis. } <sup>Muscoides.</sup>  
 Fucus folliculaceus fuscus s. nigricans ex insula cypro.  
*Pet. mus. 219? Raj. suppl. 13.*  
*Habitat ad Insulam Adscensionis. Osbeck.*

*Refert ita Muscum, ut exsiccatum nequeat a muscis*  
*distingui. Madidus constat substantia coriacea fuci,*  
*diaphana: caulibus ramisque confertis, filiformibus,*  
*undique adpersis rudimentis ramulorum; spinis mol-*  
*libus, substantia & colore totius, brevissimis, inertibus.*

20. **FUCUS** cartilagineus, caule tereti usculo compres- <sup>cartilagineus • C</sup>  
 so: frondibus supradecompositis pinnatis: laciniis li- <sup>alga tinctoria. Salich</sup>  
 nearibus coloratis. *Roy. lugdb. 515. Guett. stamp. 2.*  
*p. 404.*

Fucoides rubens varie dissectum. *Raj. angl. 8. p. 37.*  
 Muscus marinus tenuissime dissectus ruber. *Baub. pin.*  
 363.  
*Habitat in Oceano australiore.*

21. **FUCUS** caule tereti brevissimo, folio maximo en- <sup>saeccharinus. • C</sup>  
 siformi subsimplici. *Fl. lapp. 460. Fl. suec. 1010. It. Phalganoides. Sibb.*  
*w:goth. 169.*

Fucus longissimo latissimo crassoque folio. *Baub. prodr.*  
 154. *Raj. hist. 74.*  
 Fucus alatus s. phalgagoides. *Baub. pin. 364.*  
 Fucus scoticus latissimus edulis dulcis. *Sibb. scoth. 26.*  
*Habitat in Mari Atlantico.*

*musci marini purpurei rugosum; edulis quinquem substantia*  
*durois et membranacea. D d d d 5 Kempt. amoy. 832. 22* } <sup>Sisai Sijm</sup>  
 } <sup>amaroni</sup>  
 } <sup>muwafaki mari</sup>

*musci marini lanceolati forata, organa longiora margine dentata,*  
*Rupibus adhaerens in mari superfluo fluctuat, tunc genti post preparationem*  
*exulsiu, quoniam coriacea substantia. Kempt. amoy. 833.* } <sup>Sisima Japon</sup>  
 } <sup>Konbu vulgo.</sup>

*musci lanceolati 3 cubitibus elongiora, striata, ora integra, mucosa,*  
*altranea cortice edulis. omni ripium adhaerens, in superfluo mari fluctuat.* } <sup>Kaitai. Sijm</sup>  
 } <sup>arame. vulgo</sup>  
*Kempt. amoy. p. 833.*



Seliqua Japon  
Kokoro buto vulgo  
it. Kokoro Langusa

Mycus submarinus sive alga rugosa capillaris, ramosa lutea, in part  
in japonia et sine equita gelatinae quae per cribrum in vermiculato  
bucillo coacta aspicitur ubique prodest venalis. Japonia Kokoro sine  
Kokoro Langusa dicta. Kempt. dender. p. 438.  
1162

## CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- *palmatus.* 22. FUCUS frondibus planis palmatis. Roy. lugpb. 515.  
*ceranoides. C.B.* Fucus membranaceus ceranoides. Bauh. prodr. 155.  
Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens.  
Moris. hist. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 1.  
Habitat in Oceano.
- *rubens.* 23. FUCUS caule tereti ramoso, frondibus oblongis un-  
dulatis sinuatis. Roy. lugdb. 514.  
Alga minor suave rubens varie divisa. Mart. cent. 32.  
t. 32.  
Habitat in Oceano.
- *pavonicus.* 24. FUCUS fronde sessili reniformi decussatim striata.  
*11.9. Ladina a dary.* Fucus maritimus gallopavonis pennas referens. Bauh.  
prodr. 155. Moris. hist. 3. p. 645. f. 15. t. 8. f. 7.  
Alga marina gallopavonis plumas referens. Bauh. pin.  
364.  
Fungus auricularis. Bauh. pin. 368.  
Habitat in Mari Europæ australis.
- *fastigiatus.* 25. FUCUS dichotomus ramosissimus teres uniformis  
fastigiatus. It. æl. 120. Fl. suec. 1008.  
Fucus caule lineari dichotomo. Roy. lugdb. 514.  
Fucus palmaris tenuis in orbem expansus, in segmenta  
bifida breviora teretia divisus. Moris. hist. 3. p. 649.  
f. 15. t. 9. f. 9.  
Fucus marinus polyschides. Læs. pruss. 77. t. 15.  
Habitat in Oceano Balthico.
- *filum.* 26. FUCUS filiformis simplex subfragilis opacus.  
Fucus filiformis simplex. Fl. lapp. 459. Fl. suec. 1009.  
Loster. Rhynch. idem circiter.  
Loster. Dalesh. Roy. lugdb. 513. It. w-goth. 168. Guett. stamp. 2. p.  
395.  
Fucus f. Filum maritimum germanicum. Bocc. mus.  
1. p. 271. t. 9. f. 9.  
Alga nigro capillaceo folio. Bauh. pin. 364.  
Filum maritimum germanicum. Bauh. prodr. 155.  
Linum marinum. Bart. act. 1671. p. 118. f. 8.  
Habitat in Oceano Atlantico.
- *filum ad tendo.* 27. FUCUS filiformis simplex tenuissimus subdiaphanus.  
Fucus indicus teres, setam piscatoriam referens, lon-  
gissimus. Pluk. alm. 160. t. 184. f. 3.  
Gramen sparteum setas equinas referens, e quibus java-  
nenses tapetia texunt. Bauh. prodr. 11.  
Habitat in China.



Tremella palustris vulgari marina similis ad minor et tenuior Dill.  
 musc. 48. f. 2.  
 Conferva 5. gelatinosa omnium tenuiora et minorum agrorum  
 limo inveniuntur Raj. syn. 3. app. p. 277. Dill. musc. p. 15. tan. figur.  
 Dill. rheumat. 3. p. 2. secundat.  
 Usus ad emolliendum et candorem sanis omnibus. Dill. musc. p. 15. tan. figur.  
 Dill. rheumat. 3. p. 2. secundat.

**CRYPTOGAMIA ALGÆ. 1163**

**ULVA. Ee nomen Lypha angustata.**

Tremella adanf.  
 vide in deusyt.  
 p. 117.

Lutemb. ad  
 Placum 204

1. ULVA tubulosa simplex. Fl. lapp. 458. Fl. suec. 1013. intestinalis. C  
 It. œl. 33. Hort. cliff. 478. Roy. lugdb. 515. Gron. ~~Tubulosa~~ 13  
 virg. 204. 128.  
 Tremella marina tubulosa intestinorum figura. Dill. ~~labur~~ ad C  
 musc. 47. t. 9. f. 7.  
 Fagus cavus. Bauh. pin. 364. ~~Tenuior~~ ad C  
 Habitat in Mari omni.

2. ULVA tubulosa ramosa compressa. It. gotl. 262. Fl. compressa.  
 suec. 1014. \*  
 Tremella marina tenuissima & compressa. Dill. musc. ~~1014~~  
 48. t. 9. f. 8.  
 Habitat in Europæ mari & tectis maritimis.

3. ULVA filiformis articulata: articulis alternatim com- confervoides  
 pressis. Hort. cliff. 478. \*  
 Conferva marina fistulosa. Dill. musc. 34. t. 6. f. 39.  
 Habitat in Mari.

4. ULVA oblonga plana undulata membranacea viridis. latissima.  
 It. wigotl. 160.  
 Fucus longissimo latissimo tenuique folio. Bauh. prodr.  
 154.  
 Habitat in Mari Europæ.

5. ULVA palmata prolifera membranacea: ramentis in- Lactuca. C  
 ferne angustatis. ~~huc Lactuca~~ Berapidian. frater  
 Ulva marina lactucæ similis. Raj. angl. 3. p. 62. S. Therapidian  
 Tremella marina vulgaris, lactucæ similis. Dill. musc. ~~huc~~ Therapidian  
 42. t. 8. f. 1. quæ res)  
 Muscus marinus lactucæ similis. Bauh. pin. 364.  
 Habitat in Oceano.

Fronde aggregatæ, membranacæ, pallidæ, palmatæ: se-  
 gmentis singulis iterum in frondes palmatas enatis,  
 undatis, obovatis, obtusis, pellucidis.  
 6. ULVA fronde dilatata subsinuata, centro radicata. ~~Thaikon~~ ad  
 Tremella marina umbilicata. Dill. musc. 45. t. 8. f. 3. umbilicalis. C  
 Fucus umbilicus marinus dictus. Bauh. pin. 364.  
 Habitat in Oceano.

7. ULVA fronde oblonga bullata. Linza. Imper  
 Tremella marina fasciata. Dill. musc. 46. t. 9. f. 6.  
 Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ similis. Bauh.  
 hist. 3. p. 81.  
 Muscus lactucæ marinæ similis. Bauh. pin. 364.  
 Habitat in Oceano. 8. UL-



- pruiniformis.* 8. ULVA subglobosa solitaria. *Fl. suec.* 1015. \*  
Fucus globosus sessilis mollis. *Gleditsch. monogr.*  
*Habitat in lacubus Sueciæ, Boruffiæ.*
- granulata.* 9. ULVA solitaria aggregata. *Fl. suec.* 1016. \*  
Tremella palustris, vesiculis sphaericis fungiformibus.  
*Dill. musc.* 55. t. 10. f. 17.  
*Habitat in Europa ad ripas fluviorum.*

## CONFERVA.

- \* *Filamentis simplicibus æqualibus geniculis destitutis.*
- ~~*Conferva*~~ *2.* *Myrtus ad 3.*  
*virularis.* 1. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus longissimis. *Fl. suec.* 1023.  
*Conferva*  
Conferva capillaris simplicissima enodis. *Roy. lugdb.* 511. *Guett. stamp.* 1. p. 45.  
Conferva fluviatilis sericea vulgaris & fluitans. *Dill. musc.* 12. t. 2. f. 2.  
*Habitat in Europæ rivulis fluviisque pacatioribus.*
- Bryozoa ad 3.*  
*fontinalis.* 2. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus.  
Conferva minima, byssi facie. *Dill. musc.* 14. t. 2. f. 3.  
*Habitat in Europæ fontibus.*
- \* *Filamentis ramosis æqualibus.*
- godalia ad 3.*  
*bullosa.* 3. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, bullas aëreas includens.  
Conferva filis ramosis æqualibus radicatis. *Fl. suec.* 1024.  
Conferva palustris bombycina. *Dill. musc.* 18. t. 3. f. 2.  
Alge bombycina. *Baub. pin.* 363.  
Muscus aquaticus bombycinus, tenuissimis filamentis.  
*Loes. pruss.* 173. t. 55.  
*Habitat in Europæ aquis stagnantibus.*
- canalicularis.* 4. CONFERVA filamentis æqualibus basin versus ramosioribus.  
Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. *Dill. musc.* 21. t. 4. f. 15.  
Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Baub. pin.* 364.  
*Habitat in Europæ rivulis, tubulis, canalibus molen-dinariis.*
- amphibia.* 5. CONFERVA filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coëuntibus in aculeos.



Conferva amphibia, fibrillosa & spongiosa. *Dill. musc.*  
22. t. 4. f. 17.

*Habitat in Europæ udis, fossis, umbrosis, ubi aquæ vicissitudines servant.*

6. CONFERVA filamentis æqualibus ramosissimis e-littoralis.  
longatis scabriusculis.

Conferva maritima filiformis longissima fusca, ramis alternis simplicibus brevioribus pallidis. *Fl. suec.* 1028.

*It. goth.* 261. n. 3.

Conferva marina capillacea longa ramosissima. *Dill. musc.* 23. t. 4. f. 19.

*Habitat in Europæ marinis rupibus.*

7. CONFERVA filamentis ramosis mollibus digito brevioribus viridissimis. *æru ginosa.*

Conferva marina capillacea brevis viridissima mollis.

*Dill. musc.* 23. t. 4. f. 20.

*Habitat in Angliæ fucis.*

8. CONFERVA filamentis æqualibus dichotomis. *dichotoma.*

Conferva dichotoma, setis porcinis similis. *Dill. musc.*

17. t. 3. f. 9.

*Habitat in Angliæ fossis pratorum.*

9. CONFERVA filamentis proliferis fastigiatis hirtis. *scoparia.*

Conferva marina pennata. *Dill. musc.* 24. f. 23.

*Habitat in mari Europæo.*

10. CONFERVA filis ramosis: filamentis alternis brevibus multipartitis digitatis. *Ranipura ad cancellata.*

Conferva marina cancellata. *Dill. musc.* 24. t. 4. f. 22.

*Habitat in mari Europæo.*

Filamenta lateralia quasi intra totidem vesiculas aërem recondunt.

\* *Filamentis anastomosantibus.*

11. CONFERVA filamentis reticulatim coadunatis. *Reticula ad B. reticulata. C.*

Conferva reticulata. *Dill. musc.* 20. t. 4. f. 14. *Fl. suec.*

125. *Guett. stamp.* 1. p. 45. *conferva reticulata Ry.*

Conferva reticulata crispa. *Pluk. alm.* 113. t. 24. f. 2.

*Moris. hist.* 3. p. 644. f. 15. t. 4. f. 4.

Muscus aquaticus bombycinus retiformis. *Læs. pruss.*

173. t. 54.

*Habitat in Europæ fluviis ad eorum littora.*

\* *Filamentis nodosis.*

12. CONFERVA filis simplicissimis setiformibus rectis: geniculis crassioribus angulatis. *Consperta ad 2. fluviatilis. C. Conferva Plin. de arbor.*



Conferva filis simplicissimis setiformibus rectis, tuberculis sparsis. *Fl. suec.* 1026.

Conferva fluviatilis lubrica setosa, equiseti facie. *Dill. musc.* 39. t. 7. f. 47.

*Habitat in Europæ fluviis confragosis.*

*caprona ad gelatinosa.*

13. CONFERVA filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis.

Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major & fusca. *Dill. musc.* 36. t. 7. f. 42. *Guett. stamp.* 1. p. 46.

Conferva fontalis geniculata lubrica major. *E. N. C. cent.* 5. 6. app. 60. t. 13. f. 3.

Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, minor & viridis. *Dill. musc.* 37. t. 7. f. 43.

Corallina pingvis ramosa viridis. *Vaill. paris.* 40. t. 7. f. 6.

*Habitat in Europæ fontibus præstantissimis limpidissimis.*

*Confer.* Conferva stagnalis, globulis virescentibus mucosis. *Dill. musc.* 38. t. 7. f. 44.

Conferva alpina lubrica, filamentis nodosis cæruleis. *Dill. musc.* 38. t. 7. f. 45.

Conferva fontana nodosa lubrica, filamentis tenuissimis nigris. *Dill. musc.* 39. t. 7. f. 46.

\* *Filamentis geniculatis.*

*capillaris.*

14. CONFERVA filis geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis.

Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. *Dill. musc.* 25. t. 5. f. 25.

Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. alm.* 113. t. 84. f. 9. *Moris. hist.* 3. p. 644. f. 15. t. 4. f. 3.

*Habitat in Europæ lacubus, stagnis, vadis, fossis.*

*Ramifera ad corullinoides*

15. CONFERVA filis geniculatis dichotomis.

Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata crassior. *Dill. musc.* 33. t. 6. f. 36.

*Habitat in Mari Europæo, colore albo & rubenti.*

*Confer.* Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata tenuior. *Dill. musc.* 33. t. 6. f. 37.

*catenata.*

26. CONFERVA filis geniculatis, articulis cylindricis. Conferva ramosa, geniculis longioribus cateniformibus. *Dill. musc.* 27. t. 5. f. 27.

*Corallina marina geniculata ramisissima habita longa/paulatim ramulis - Ray.*

*conferva marina nodosa lubrica, ramisillorum delinquentibus in vasis - Ray.*



*Habitat in Mari Europam australem & Americam meridionalem alluente.*

17. CONFERVA filamentis geniculatis, ramis fascicu- *polymorpha.*  
latis.

Conferva marina articulata capillacea ramosissima viridis. *It. gotl.* 261. n. 2. *Fl. suec.* 1031.

Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. musc.* 32. t. 6. f. 35.

Corallinae affinis s. Muscus coralloides, multifido capillaceo folio, palmites pelagica nigra. *Pluk. alm.* 119. t. 47. f. 10.

Muscus tridactylites capillaceus maritimus multifidus niger, radice fibrosa. *Bocc. mus.* 1. p. 268. t. 5. f. 11.

Muscus marinus crispus pachycaulos loricatus niger. *Bocc. mus.* 315. t. 7. n. 1.

Fucus crispus loricatus nigricans. *Barr. rar.* 1323. t. 1301.

*Habitat in Mari Europæo.*

18. CONFERVA filamentis geniculatis flexuosis, ramis *vagabunda,*  
ramulisque brevioribus.

Conferva marina trichodes, lanæ instar expansa. *Dill. musc.* 30. t. 5. f. 32.

*Habitat in Mari Europæo, libera vagatur in aquarum medio.*

19. CONFERVA filamentis geniculatis, ramulis brevi- *Ramosa ad.*  
oribus multifidis. *glomerata.* • Ç

Conferva fontinalis ramosissima glomeratim congesta. *Dill. musc.* 28. t. 5. f. 34.

Conferva viridis capillacea, brevioribus fetis, ramosior s. Conferva minor ramosa. *Moris. hist.* 3. p. 644. f. 15. t. 4. f. 2.

Alga fontalis trichodes. *Baub. pin.* 364.

*Habitat in Europæ fontibus, fossis, rivulis.*

20. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis vi- *rupestris.*  
ridibus. •

Conferva marina trichodes ramosior *Dill. musc.* 28. t. 5. f. 29.

Conferva marina trichodes s. Muscus marinus virens tenuifolius. *Pluk. mant.* 53. t. 182. f. 6.

*Habitat in Europæ marinis rupibus copiosissima.*

21. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis e *agagropila.*  
centro confertissimis globum constituentibus.

Con-



Conferva globosa, filamentis articulatis ramosissimis e centro prodeuntibus rectis. *Fl. suec.* 1027.

*Habitat in Sueciæ lacubus Dannemora, Stockholmiaë &c.*

## BYSSUS.

\* *Filamentosa.*

*Zinnella ad 2.*  
χ • *Flos aquæ.*

1. BYSSUS filamentis plumosis natantibus.

Byffus farinacea virescens aquæ insparfa. *Fl. lapp.* 532.  
*Fl. suec.* 1128. *Guett. stamp.* 1. p. 3. *Roy. lugdb.* 520.

β. Byffus membranacea aquatica. *Fl. lapp.* 529.

Byffus latissima, papyri instar supra aquam expansa. *Dill. musc.* 1.

*Habitat in Mari & omni aqua, prima æstate; nocte descendit parum, die natat fere.*

*Constat farina cujus moleculæ, Confervæ instar, capillares, ramosæ, plumæ similes, niveæ. P. Bergius*

*Byffus ad 3.*  
phosphorea.

2. BYSSUS lanuginosa violacea lignis adnascens. *Dill. musc.* 4. t. 1. f. 6. *Fl. suec.* 1130.

*Habitat in Europæ lignis putrescentibus.*

*velutina.*

3. BYSSUS filamentosa viridis.

Byffus tenerrima viridis velutum referens. *Dill. musc.* 7.

*t. 1. f. 14.*  
Byffus terestris viridis herbacea & mollissima, filamentis ramosis & non ramosis. *Mich. gen.* 211. t. 89. f. 5.

*Habitat in Terra.*

*aurea.*

4. BYSSUS capillacea pulverulenta, fructificationibus sparsis, filamentis simplicibus ramosisque. *Gleditsch. fung.* 1.

Byffus petræa crocea, glomerulis lanuginosis. *Dill. musc.* 8. t. 1. f. 16.

Byffus aurea derbensis humifusa. *Pet. gaz.* 1. t. 15. f. 3.

Byffus minima saxatilis inodora, filamentis partim simplicibus partim ramosis. *Mich. gen.* 210. t. 89. f. 2.

*Habitat in rupibus Arvonix, Italiæ.*

*cryptarum.*

5. BYSSUS capillacea perennis cinerea tenax rupi innata. *Fl. lapp.* 527. *Fl. suec.* 1127.

*Habitat in spelunca rupestri Medelpadiæ.*

\* *Pulverulenta.*

*Pulvis ad*

*antiquitatis.*

6. BYSSUS pulverulenta atra. *It. gotl.* 298. *Fl. suec.* 1126.

*Habitat in ædium muris antiquissimis.*

7. BYSS-



7. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes operiens. *saxatilis.*  
*Habitat in Saxo omni, diutius aëri exposito, quod perenni cinereo colore obducit, ipsa vix manifesta.*
8. BYSSUS pulverulenta sanguinea faxis innascens. *Folithus.*  
 Byssus perennis pulverulenta rubra lapidibus innascens.  
*Fl. lapp. 528. Fl. suec. 1125. \* Gvett. stamp. 1. p. 3. Roy. lugdb. 520.*  
 Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ odorem spirans. *Mich. gen. 210. t. 89. f. 3.*  
 Jolithus s. lapis violaceus. *Swenck. foss. 382. It. w:got. 9. 250. \* 254. 263.*  
*Habitat in Europæ frigida sylvis opacis, supra saxa ante unum alterumve annum eversa & supinata.*
9. BYSSUS pulverulenta flava lignis adnascens. *Dill. candelaris. Pulina*  
*musc. 3. t. 1. f. 4*  
 Byssus farinacea flava. *It. w:goth. 159. 52. It. æl 30.*  
*Habitat per omnes quatuor mundi plagas in corticibus arborum, parietibus antiquis, tectis diutius vento humido expositis.*
10. BYSSUS pulverulenta viridis. *botryoides. Pulina*  
 Byssus botryoides saturate virens. *Raj. angl. 3. p. 5. 6.*  
*Dill. musc. 3. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in terra diutius humida, umbrosa, ut in ollis Hortulanorum.*
11. BYSSUS pulverulenta incana, farinæ instar strata. *incana,*  
*Dill. musc. 3. t. 1. f. 3. Fl. suec. 1131.*  
*Habitat solo glareoso, ad latera fossularum, juxta vias publicas.*
12. BYSSUS pulverulento-crustacea albissima. *lactea.*  
 Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc. 2. t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Muscis & arborum corticibus.*

## SPONGIA.

\* Tenaces.

*Regne animal*

1. SPONGIA tenax subramosa, ramis difformibus per-*officinalis.*  
*tufis. Roy. lugdb. 521. Mat. med. 527.*  
 Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exiguis per-  
*via. Tournef. inst. 575.*  
 Spongiæ compressæ Schiacciatæ. *Bauh. hist. 3. p. 818.*  
 Spongia globosa. *Bauh. pin. 362.*  
*Habitat in Oceano australiore.*

E e e e

2. SPON-



- oculata.* 2. SPONGIA tenax ramosissima erecta: ramis tereti-  
sculis obtusis. *Hort. cliff.* 480. *Roy. lugdb.* 521.  
Spongiosus fucus. *Bauh. pin.* 369.  
*Habitat in Italia.*
- nodosa.* 3. SPONGIA scabra ramosa tenacissima: ramis nodosis  
perforatis. *Roy. lugdb.* 522.  
Spongia dura ramosa nigra suberis instar. *Boerb. lugdb.*  
1. p. 9.  
*Habitat in Mari australi.*
- flabelliformis.* 4. SPONGIA flabelliformis rigidiuscula, fibris capillari-  
bus densissime reticulatis. *Roy. lugdb.* 522.  
Spongia flabelliformis, caule teretiustulo, disco com-  
presso-plano vix diviso. *Hort. cliff.* 480.  
Keratophyton majus nigrum, fibris tenuioribus elegan-  
tissime & densissime reticulatum. *Boerb. lugdb.* 1.  
p. 6.  
*Habitat in Indiis.*
- fistulosa.* 5. SPONGIA tubulosa simplex. *Hort. cliff.* 480. *Roy.*  
*lugdb.* 522.  
Spongia dura f. spuria major alba fistulosa, fibris cras-  
sioribus. *Sloan. jam.* 6. *hist.* 1. p. 62. t. 23. f. 2.  
*Habitat in mari ad Antillas.*
- tubulosa.* 6. SPONGIA tubulosa ramosa. *Roy. lugdb.* 522.  
Spongia ramosa fistulosa millepora. *Boerb. lugdb.* 1.  
p. 9.  
*Habitat in Indiis.*
- aculeata.* 7. SPONGIA cavernosa extus aculeata. *Roy. lugdb.* 522.  
Spongia dura f. spuria, superficie apicibus acutis exstanti-  
bus aspera, intus cavernosa. *Sloan. jam.* 7. *hist.* 1. p.  
63. t. 23. f. 4.  
*Habitat in mari ad Americam.*
- muricata.* 8. SPONGIA ~~ramosissima~~, poris cylindricis subulatis  
prominentibus æqualibus, multifidis hispidis. *Tess.*  
*mus.* 118. t. II. f. I. \*  
*Habitat in India.*
- infundibuli-  
formis.* 9. SPONGIA turbinata cava.  
Spongia forma infundibuli. *Bauh. pin.* 369.  
Spongia elegans. *Clus. exot.* 125.  
*Habitat in Europa australi.*



\* *Fragiles.*

10. SPONGIA repens fragilis, ramis teretibus obtusis. *lacustris.* •  
*Hort. cliff. 480. \* Fl. suec. 1132. Roy. lugdb. 522.*

*It. scan. 422. \**

Spongia ramis teretibus obtusis. *Fl. lapp. 535.*

Spongia ramosa fluviatilis. *Raj. hist. 81.*

*Habitat in fundo Lacuum.*

11. SPONGIA erecta fragilis, ramis teretiusculis. *Fl. fluviatilis.*  
*suec. 1133.*

Spongia fluviatilis ad confervam accedens. *Rupp. jen. 308. t. 3. f. 1.*

Spongia fluviatilis anfractuosa perfragilis ramosissima.  
*Pluk. alm. 356. t. 112. f. 3.*

Badiaga major. *Buxb. act. 2. p. 343.*

Muscus aquaticus ceratoides. *Læs. pruss. 172. t. 54.*

*Habitat in Europæ fossis, paludibus.*

FUNGI.

*Naba? japon. fungus  
 si*

AGARICUS.

\* *Stipitati, pileo orbiculato.*

1. AGARICUS stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Chantarel-  
 Fl. suec. 1049. It. w. goth. 215. Dalib. paris. 364.*

*ad. 11.  
 luc.  
 galluacery. cap*

Agaricus caulescens fulvus, pileo concavo: margine re-  
 flexo, lamellis erectis, stipite brevissimo. *Fl. lapp. 493.*

Elvela pediculata pileata, pileo subtus reticulato. *Gvett.  
 stamp. 1. p. 12.*

Fungus minimus flavescens infundibuliformis. *Bauh.  
 pin. 373. Vaill. paris. t. 11. f. 9. 10.*

β. Fungus pileo per maturitatem inter agarici intybacei.  
*Vaill. paris. t. 11. f. 11. 12. 13.*

γ. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus. *Vaill. pa-  
 ris. t. 11. f. 14. 15.*

*Habitat in Pratis.*

*Variat mire ex Agarico in Elvelam.*

*(erroneum ad annum 1754)*

2. AGARICUS stipitatus, pileo subflavescente partito *quinquepar-  
 lamellis albidioribus interne dentato-connexis. titus.*

Agaricus caulescens, pileo cinereo quinquepartito, la-  
 mellis albis. *Fl. suec. 1063. \**

*Habitat in Pratis.*

3. AGARICUS stipitatus, lamellis omnibus magnitudi-  
 ne æqualibus. *Fl. suec. 1071.*

E e e e 2

Aga



Coniuncte. Negre...  
? Scarioy. Colap...  
\* Bruni. Co...  
cu t m...  
C...  
1172

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Agaricus caulescens, pileo plano-concavo purpureo, lamellis stipiteque albis. Fl. lapp. 486.

Agaricus major, pediculo longo modice crasso, lamellis albis creberrimis superne ad margines apparentibus. Raj. suppl. 18. Buxb. cent. 4. p. 12. t. 19.

β. Agaricus caulescens, petiolo crassiusculo albo, pileo plano sanguineo, lamellis albis. Fl. lapp. 487. Habitat in Sylvis.

Co...  
wuscarius.

4. AGARICUS stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis, stipite volvato: apice dilatato, basi ovato. Fl. suec. 1076.

Muschenz. } austro.  
muchne gobe } scopoli.

Agaricus caulescens, pileo sanguineo: verrucis lamellis-que albis, stipite albo basi globato. Fl. lapp. 595.

Fungus pileo sanguineo verrucoso, lamellis albis, annulo fugaci, pediculo bulboso. Hall. helv. 39.

Fungorum perniciosorum genus 12. n. 4. Clus. hist. 2. p. 280.

Habitat in Pratis. Solitarius inter abietes fagos. inuenta autumn...  
Cimices necat & eradicat promptissime. It. scan. 430.

Musc...  
am... ad  
dentatus.

5. AGARICUS stipitatus, pileo convexo, lamellis basi mucrone dentatis.

Agaricus caulescens, pileo flavo lævi margine inflexo, lamellis pallidioribus basi angulatis. Fl. suec. 1048.

Habitat in Sylvis.

Pileus flavescens, levis, subviscidus. Lamellæ basi a Stipite discedentes, ubi denticulo acuminato instructæ. Stipes fistulosus, angustus, cylindricus, nudus, versus pileum striatus, confertim natus.

6. AGARICUS stipitatus, pileo testaceo succo lutescenti.

deliciosus. Jap... 431.

Amanita lateritii coloris, croceo succo turgens. Dill. giff. 179.

Reiserling. genu...  
ur gomba...  
Sung...  
Jap... 431.

Fungus perniciosus, lateritio colore varians, succum acrem & croceum fundens. Mich. gen. 141. Hall. helv. 49.

Habitat in Montibus, sterilibus, sylvis.

7. AGARICUS stipitatus, pileo plano carneo lactescente, lamellis ruffis, stipite longo carneo. Fl. lapp. 484.

lactifluus.

Fungus flavo-rufus in medio depressus, lacte non acri manans. Hall. helv. 50.

Habitat in Sylvis.

\* Mon...  
Bign...  
C...  
Sung...  
C...  
J... 423.

Biffette }  
Columbette }

Fungus major albus...  
Columbette...  
J... 426.



Richione. Port. } *Changre candidus odoratissimus oris magno. C. B. P. 371. } Richione. Port.  
Editur erudis elegans innotuit guttu suavissimus.*

CRYPTOGAMIA FUNGI.

8. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo lactescente: *piperatus. 5800.*  
margine deflexo lamellis incarnato-pallidis. *Fl. suec. Spreti. Sata.*  
1036.

Fungus piperatus albus crassus, lacteo succo turgens. *10. 82.*  
*Mich. gen. 141. Hall. belv. 34. n. 1.*  
Fungus albus acris. *Baub. pin. 371.*  
*Habitat in Pascuis, Sylvis.*

9. AGARICUS stipitatus, pileo convexo squamato al-*campestris. Sappal*  
bido, lamellis ruffis. *Fl. suec. 1045.*

Agaricus caulescens, pileolo sordido lacero, petiolo al-  
bo membranaceo, lamellis rufescentibus. *Fl. lapp. 482.*

Agaricus pediculo annulato, pileo superne albus, infer-  
ne rubens. *Guett. stamp. 1. p. 22.*  
Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *Baub.*  
*hist. 3. p. 824. Mich. gen. 174. Hall. belv. 50.*  
*Habitat in Pratis.*

10. AGARICUS stipitatus, pileo rimoso: margine vio-*violaceus.*  
laceo tomentoso, stipite cærulescente lana ferruginea.  
*Fl. suec. 1066. Dalib. paris. 371.*

Fungus esculentus bulbosus dilute purpureus. *Mich. gen.*  
*149. t. 49. f. 1.*  
Fungus cæruleus major. *Buxb. cent. 4. p. 7. t. 11.*  
*Habitat ad margines Sylvarum.*

11. AGARICUS stipitatus, pileo fordide flavo, lamellis *cinnamome.*  
luteo-ruffis. *Fl. suec. 1047. \**  
Agaricus caulescens flavus, pileo plano. *Fl. lapp. 594.*  
*Habitat in Sylvis.*

12. AGARICUS stipitatus, pileo purpurascente fusco *viscidus.*  
viscido, lamellis fusco-purpurascensibus.

Agaricus caulescens, pileo convexo purpurascente, la-  
mellis ruffis, stipite brevi crassiusculo albo. *Fl. lapp.*  
*485. Fl. suec. 1070.*  
*Habitat in Sylvis.*

13. AGARICUS stipitatus, pileo pallido: disco stella-*equestris.*  
tim luteo, lamellis sulphureis. *Fl. suec. 1060. \**

Agaricus caulescens, pileo convexo sordido: margine  
inflexo, lamellis pallidis: basi remotis, stipite cylin-  
draceo. *Fl. lapp. 502.*  
*Habitat in Pascuis, Sylvis.*

14. AGARICUS stipitatus, pileo flavo convexo, lamel-*georgii.*  
lis albis. *Fl. suec. 1052.*

E e e e 3

Agar-

*Fungus pileolo lato exortudo livido. B. Pin. 370. } 39. Bolati } Magi*

*Fungus planus orbicularis auratus. B. Pin. 371. } Volens Plin. }  
Defert rotam celati, cum que angust ovum candore et figura refert; et alla ceta } Elveta. Cicconi }  
quam volvens vocant lacerta, parvulam in planam orbicularem formam la angustat; } Bolati euf. appall. }*



*Boletus. Cordi. { Fungus pileolo lato orbiculari candido. B. Riv. 370.  
Capredini. Rab. { Fungus pileolo lato orbiculari flavo. B. Riv. 370.*

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Agaricus caulescens, pileo plano sulphureo, lamellis albis, stipite crassiusculo. *Fl. lapp. 496.*

Fungus orbicularis exalbidus pratensis. *Baub. pin. 370. Hall. helv. 38.*

Fungus divi georgii, coloris exalbidi cum pauca flavitie, esculenti pratensis 1. *Baub. hist. 3. p. 824.*

Fungus ~~croceus~~ <sup>griseus</sup> magnus. *Sterb. fung. 83. t. 41. f. 3.*

*Habitat in Sylvis. Epulentes pratium medorum. vlyarij pidi in pabla baw.*

*mammiosus.*

15. AGARICUS stipitatus, pileo convexo acuminato griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo.

Agaricus caulescens, pileo convexo sordido: umbilico prominente, lamellis pallidis, stipite cylindraceo. *Fl. lapp. 501.*

Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente, pediculo longiore. *Buxb. cent. 4. p. 13. t. 21. f. 1.*

*Habitat in Sylvis.*

*clypeatus.*

16. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphaerico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Fl. lapp. 506. Fl. suec. 1057. Dalib. paris. 373.*

Fungus viscidus papillaris striatus terreus, subtus albus. *Hall. helv. 41.*

*Habitat in pratis sylvaticis.*

*extinctorius.*

17. AGARICUS stipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso subulato nudo.

Agaricus caulescens albus, pileo conico, stipite cylindraceo. *Fl. lapp. 481. Fl. suec. 1037. 1044.*

Agaricus caulescens albus, petiolo longissimo, pileo conico. *Fl. lapp. 480.*

*Habitat in fimetis & ad pagos.*

*fimetarius.*

18. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosus, stipite fistuloso.

Agaricus caulescens, pileo conico cinereo, lamellis nigris: margine lacero, stipite longissimo albo. *Fl. lapp. 503. Fl. suec. 1056.*

Fungus comatus. *Sterb. fung. 218. t. 22. f. 7. K. L.*

Fungus albus ovum referens. *Buxb. cent. 4. p. 16. t. 27. f. 1.*

Fungorum perniciosorum genus 14. spec. 3. *Clas. hist. 2. p. 282.*

*Habitat in Fimetis. novus ad m. C. B.*

*muscarum. Nag.*

*Fungus muscarum interpres. B. Riv. 375. novus ut.*

19. A-

*albidus. Lab.*

*Fungus clypeiformis major. B. Riv. 375. venenatus ut.*



Fungi plures simul alti ad arborum radices, exsurgunt. j. B. 3. 834  
medicinis petiolis bulbosis plures simul imbricatione nati 2 ad 5. sub populis.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- 19. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato striato *campanulatus.*  
pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo.  
Agaricus caulescens, pileo conico cinereo lamellis ai- *Aspergillari Dod*  
bis, stipite longo. *Fl. lapp. 507. Fl. suec. 1054.* *Populneis*  
Fungus multiplex obtuse conicus, colore griseo muri- *caluccii Sotta*  
no. *Vaill. paris. 71. t. 12. f. 1. 2.* *Curini. Casp*  
*Habitat in Pratis.* *Fungi sunt locum ingruentibus plures* *Sylfa. hungari*  
*unus alti P. Pin. 370.*
- 20. AGARICUS stipitatus, pileo lævi livido, lamellis ni- *separatus.*  
gricantibus separatis, stipite bulboso volvato.  
*Habitat in Stercoratis.*
- 21. AGARICUS stipitatus, pileo convexo viscido pellu- *fragilis.*  
cido lamellis que luteis, stipite nudo.  
Fungus pileo croceo splendoris particeps *Vaill. paris.*  
*t. 11. f. 16. 17. 18.*  
*Habitat ad ambulacra.*
- 22. AGARICUS stipitatus, pileo plicato membranaceo, *umbelliferus*  
lamellis basi latioribus. *Fl. suec. 1033.*  
Agaricus caulescens albus parvus, stipite longo, pileo  
plano pellucido: margine multifido. *Fl. lapp. 471.*  
Agaricus minimus, capitulo turbinato plano albo, la-  
mellis margine fuscis. *It. æl. 38.*  
Fungus minimus totus albus, pileo hemisphærico utrin-  
que striato, lamellis rarioribus. *Mich. gen. 166. t. 80.*  
*f. 11.*  
*Habitat inter Folia congesta, semiputrida.*
- 23. AGARICUS stipitatus albus, pileo plicato membra- *Androsaceus*  
naceo, stipite nigro. *Fl. suec. 1034. It. w:goth. 215.*  
*Dalib. paris. 374.*  
Agaricus caulescens albus minimus, petiolo angusto,  
pileo plano verrucoso: margine octofido. *Fl. lapp.*  
*472.*  
Fungus caule nigro capillari, androsaces capitulo. *Bocc.*  
*mus. 143. t. 104.*  
Fungus pileo candicante, lamellis paucis, pediculo fu-  
sco splendente. *Vaill. paris. 69. t. 11. f. 21. 22. 23.*  
*Habitat in foliis dejectis Pini.*
- 24. AGARICUS stipitatus, pileo luteo convexo striato, *clavus.*  
lamellis stipiteque albis. *Fl. suec. 1053.*  
Fungus minimus aurantius mammillaris. *Vaill. paris.*  
*76. t. 11. f. 19. 20. Hall. belv. 38.*  
*Habitat in Nemoribus, inter folia decidua.*



*Valsa ad C.*

*Quercinus.*

25.

AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus.

*Fl. suec. 1082.*

Agaricus villosus, lamellis sinuosis & invicem implexis.

*Buxb. cent. 5. p. t. 4. f. 1.*

Agarico fungus lamellis crassissimis rigidis. *Hall. helv. 57.*

*57. agaricus 2 lichens sub terra*

*Habitat in Quercubus.*

*Betulinus.*

26.

AGARICUS acaulis coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Fl. suec. 1085.\**

*Habitat in Betulis.*

*Huful ad*

*Alnus.*

27.

AGARICUS acaulis, lamellis bifidis pulverulentis.

*Fl. suec. 1083.*

Agarico-Fungus lamellis bifidis pulverulentis. *Hall. helv. 58.*

*Habitat in Alno.*

*Paucas species Fungorum recenseo,, ut evitem varietates, quae plures sunt, quam vulgo creditur, & quidem saepe aliena genera constituentes, ut in his etiamnum valde deficiat Res herbaria.*

BOLETUS.

*\* Acaules, parasitici.*

*• suberosus.*

1.

BOLETUS acaulis pulvinatus albus laevis, poris acutis difformibus.

Boletus acaulis coriaceo-convexus villosus albus, poris difformibus rotundis flexuosisque. *Fl. suec. 1093.*

*Habitat in Betulis.*

*• fomentarius.*

2.

BOLETUS acaulis pulvinatus inaequalis obtusus, poris teretibus aequalibus glaucis. *Fl. suec. 1092.\**

*Habitat in Betulis.*

*• igniarius.*

3.

BOLETUS acaulis pulvinatus laevis, poris tenuissimis.

Agaricus pedis equini facie. *Tournef. inst. 562.*

*Habitat in Betulis aliisque arboribus.*

*• versicolor.*

4.

BOLETUS acaulis: fasciis dicoloribus poris albis. Agarico-polyporus versicoloribus lineis variis, poris albis tenuissimis. *Hall. helv. 26.*

*Habitat ad truncos Arborum antiquarum.*

*• Boletus*

*Boletus varius candidus. Fl. suec. 1074. Boletus ad truncos antiquarum. BO-*



*Suaque porus magni crassus. P. 3. 833.*  
*adipis et optimis qui lactis colorem non mutant.*

*Sep. gallen*  
*amanita pauli. j. B.*

*Fungus Boletus. B. B. 1771*

*Salaginum. Lob. adu.*  
*Spongula. Myces. Dal.*

**CRYPTOGAMIA FUNGI.**

1177

5. BOLETUS acaulis, superne lævis, salicinus. *Fl. juaveolens.*  
*lapp. 522. Fl. suec. 1095.*  
*Habitat in Salice.*

\* *Stipitati.*

6. BOLETUS stipitatus perennis, pileo utrinque planiu- *perennis.*  
*sculo. Fl. lapp. 519. Fl. suec. 1086. Dalib. paris. 383.*  
*Fungus lignosus fasciatus. Vaill. paris. t. 12. f. 7.*  
*Habitat in sylvis super terram, subjectis caudicibus ar-*  
*borum putridis.*

7. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinateo viscido, poris *viscidus.*  
*teretibus convexis immeris distinctis, stipite lacero.*  
*Boletus caulescens, pileo luteo, poris teretibus distinctis*  
*lividis, stipite lacero. Fl. suec. 1089.*  
*Habitat in Sylvis.*

8. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinateo subviscido, po- *lutens,*  
*ris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido.*  
*Boletus caulescens, pileo livido subviscido, poris flavis*  
*convexis, stipite albido. Fl. suec. 1088. Dalib. paris.*  
*381.*  
*Suillus annulatus terreus, inferne flavescens. Hall.*  
*helv. 29.*  
*Fungus porosus autumnalis viscidus. Buxb. cent. 5. p.*  
*7. t. 14.*

9. BOLETUS stipitatus, pileo glabro pulvinateo margina- *bovinus.*  
*nato, poris compositis acutis: porulis angulatis bre-*  
*vioribus.*  
*Boletus caulescens, pileo testaceo, poris compositis*  
*angulatis griseis. Fl. suec. 1087. Dalib. paris.*  
*382.*  
*Boletus julii mensis. Dill. giff. 188.*  
*Suillus fulvus inferne ex flavo virescens. Hall. helv. 29.*  
*Habitat in Pratis.*

10. BOLETUS stipitatus, pileo viscido pulvinateo, po- *granulatus.*  
*ris teretibus subangulatisque truncatis: angulo granu-*  
*lato.*  
*Habitat in Sylvis.*  
*Pileus convexus, viscidus, carnosus, lividus, margine*  
*acuto cinctus. Pori flavi, difformes, inaequales, tere-*  
*tes & subangulati, truncati: margine laterali ad an-*  
*gulos quasi farinae particula solitaria aucti. Stipes fla-*  
*vus, pileo brevior.*

E e e e s

11. BO-

*agaricus sive fungus laniger. B. B. 1775*

*est Boletus praevalens. } agaricus sive laniger*  
*agaricus sive laniger. } agaricus sive laniger*



subtomentosus. 11. BOLETUS stipitatus, pileo flavo subtomentoso, poris subangulatis difformibus fulvis planis, stipite flavo. *Fl. suec.* 1091. \*  
*Habitat in sylvis.*

subsquamosus. 12. BOLETUS stipitatus, pileo albido, poris difformibus oblongo-flexuosis niveis. *Fl. suec.* 1090.  
*Habitat in Sylvis.*

*et unum fraxum Tabacis.* HYDNUM.

*Erinaceus* imbricatum. 1. HYDNUM stipitatum, pileo convexo imbricato. *Fl. lapp.* 523. *Fl. suec.* 1097. *It. W:goth.* 215. *Roy. lugdb.* 519.

*Erinaceus* esculentus albus crassus. *Mich. gen.* 132. t. 72. f. 2.

Fungus pæne candidus, prona parte erinaceus. *Bauh. hist.* 3. p. 828.

*Habitat in Sylvis acerosis.*

repandum. 2. HYDNUM stipitatum, pileo convexo lævi flexuoso. *Fl. suec.* 1098. *Dalib. paris.* 383.

*Hydnum* pediculatum, pileo inæqualiter laciniato scabro flavo. *Guett. stamp.* 1. p. 383.

*Erinaceus* esculentus pallide luteus. *Mich. gen.* 132. t. 72. f. 3.

*Habitat in Sylvarum desertis.*

tomentosum 3. HYDNUM stipitatum, pileo plano-infundibuliformi. *Fl. suec.* 1099.

*Habitat in Sylvis acerosis.*

auriscalpium. 4. HYDNUM stipitatum, pileo dimidiato. *Fl. lapp.* 524. *Fl. suec.* 1100. *Roy. lugdb.* 519.

5. *Erinaceus* parvus hirsutus ex fusco fulvus, pileo semi-orbiculari, pediculo tenuiore. *Mich. gen.* 132. t. 72. f. 8.

Fungus erinaceus parvus in conis abietis nascens. *Buxb. cent.* 1. t. 57. f. 1.

Fungus erinaceus parvus, pediculo longiore auriscalpium referens buxei coloris. *Buxb. hall.* 129. t. 129.

*Habitat in Sylvis acerosis supra terram, subjacente ramo aut strobilo.*

## PHALLUS.

esculentus. 1. PHALLUS pileo ovato, stipite nudo rugoso. *Fl. suec.* 1102. *Dalb. paris.* 383.

Phal-



*Phallus draconium Brito Scythia. Ray. b. 256. p. 7. # apud. 17. Mr. Crullus. totus cancellatus  
capitulis ovato apice frumine apertis. subtus calyptrae / hollandicae flavae.  
f. 1. d. 1. in sole utraque*

**CRYPTOGAMIA FUNGI. 1179**

Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique annexo. Hort. bliff. 379. Roy. lugdb. 517.  
Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infertus. Tournef. inst. 561. t. 329. f. A.  
Boletus esculentus rugosus 1, 2, 3. Mich. gen. 203. t. 85. f. 1. 2.  
Fungi esculenti species tres. Clus. hist. 2. p. 164.  
Habitat in Sylvis antiquis. *ed. 1727.*

*Merulius. 7. D. 3. 836  
morille  
jaune de Serap  
Ramech*

2. PHALLUS volvatus stipitatus, pileo celluloso.  
Phallus volvatus pileo apice clauso. Aët. stockb. 1732. p. 20. t. 2. f. 1. Fl. suec. 1101.  
Phallus volva exceptus, pilei apice pervio. Hort. cliff. 478. Roy. lugdb. 517. Guett. stamp. 1. p. 17.  
Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato. Mich. gen. 201. t. 83.  
Phallus hollandicus s. batavicus. Dalech. hist. 1398.  
Fungus foetidus penis imaginem referens. Baub. pin. 374.  
Habitat in Sylvis. *non videtur et foetidissimus.*

*impudicus.  
Phallus hadr. Dalech. Pin.*

**CLATHRUS.**

*\* Acaules.*

1. CLATHRUS acaulis subrotundus. Hort. cliff. 479. Roy. lugdb. 518.  
Clathrus ruber. Mich. gen. 214. t. 93.  
Boletus cancellatus purpureus. Tournef. inst. 561: t. 329. f. 6.  
Fungus coralloides cancellatus. Clus. app. alt.  
Fungus rotundus cancellatus. Baub. pin. 375.  
Habitat in Europa australiori. *non videtur.*

*cancellatus.  
Merulius 7. D. 3.  
f. 1. d. 1.*

*\* Stipitati.*

2. CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo volvato. Clathrus pediculatus purpureus, capite oblongo. Guett. stamp. 1. p. 16.  
Clathroides purpureum pediculo donatum. Mich. gen. 214. t. 94. f. 1.  
Habitat in Europa australiore.

*denudatus.*

3. CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo axiali longitudinali adnato. †  
Clathroidastrum. Mich. gen. 214. t. 94.  
Habitat in Italiae lignis putridis.

EL-



2. au Sp' bax. dicitur } androsaceae matth. } ~~androsaceae~~ ~~in~~ ~~caerumine~~ ~~quo~~ ~~tenum~~ ~~continetur~~, ~~in~~ ~~montan~~ ~~lyria~~  
 androsaceae matth. } ~~androsaceae~~ ~~in~~ ~~caerumine~~ ~~quo~~ ~~tenum~~ ~~continetur~~, ~~in~~ ~~montan~~ ~~lyria~~  
 Callophilophum }  
 hydrosaceae. }

ELVELA.

\* Stipitata,

+  
 Pileo ad 6  
 Mitra.

1. ELVELA pileo deflexo adnato lobato difformi. Fl. suec. 1103.  
 Fungoides fungiforme crispum laciniatum & varie complicatum. Mich. gen. 204. t. 86. f. 7.  
 Fungus autumnalis velut apex flaminis. Mentz. pug. t. 6.  
 Habitat in Truncis putridis.

\* Acaulis.

Peziza ad 6  
 Pineti.

2. ELVELA acaulis.  
 Agaricus acaulis utrinque planiusculus. Fl. lapp. 517. Fl. suec. 1084.  
 Habitat in Pinu, Abiete.

PEZIZA.

\* Acaules.

lentifera.

1. PEZIZA campanulata lentifera.  
 Peziza calyce campanulato. Hort. cliff. 479. Roy. lugdb. 518.  
 Peziza caliciformis lentifera laevis. Dill. giff. 195. Fl. suec. 1109.  
 Cyathoides cyathiformis cinereum & veluti sericeum. Mich. gen. 222. t. 102. f. 1.  
 Fungoides infundibuli forma, femine foetum. Vaill. paris. 56. t. 11. f. 6. 7.  
 Fungus campaniformis niger parvus, multa semina in se continens. Pluk. phyt. 184. f. 9.  
 Fungus pyxoides feminifer. Laes. pruss. 98. t. 16.  
 Fungus caliciformis feminiferus. Mentz. pug. t. 6.  
 2. Peziza calice campanulato, interne striato, externe squamoso. Guett. stamp. 1. p. 15. Dalib. paris. 387.  
 Habitat in Agris, Lignis, Sepimentis.

punctata.

2. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato. Fl. suec. 1111.  
 Elvela petiolo brevissimo, pileo turbinato, disco punctato. Hort. cliff. 479. Roy. lugdb. 518.  
 Fungus minimus infundibuliformis, superne nigris punctis notatus. Raj. suppl. 21.  
 Muscus minimus lignosus, disco punctato Bocc. mus. 2. p. 25. t. 107.

Ha-