



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

141

Pittonia ad 177.

5. TOURNEFORTIA foliis lanceolatis sessilibus, spiculis simplicibus recurvis lateralibus. Pittonia humilis, anchusæ folio. *Plum. gen. 5. 4. t. 4 p.*
Habitat in America calida. Sp. 5. 4. t. 4 p.
foliis lanceolatis sessilibus, spiculis simplicibus recurvis lateralibus. Pittonia humilis, anchusæ folio. Pl. gen. 5. 4. t. 4 p.
 6. TOURNEFORTIA foliis ovatis integerimis nudis, glabra, spicis cymosis. Heliotropii flore frutex, folio maximo oblongo acuminato glabro. *Sloan. jam. 173. hist. 2. p. 109. t. 212 f. 2. Raj. dendr. 76.*
Habitat in Jamaica. 5.
7. TOURNEFORTIA foliis lanceolatis, floribus corimbosis, caule herbaceo. *Messerschmidia. Hort. upf. 36.* Arguzia montana, *Amm. ruth. 38.*
Habitat in Dauriæ apricis glareosis aridis. 2
Planta dubii etjamnum generis, interim hic relata.

Pittonia ad Sibirica.

arguzia. amur messerschmidia lin.

DIAPENSIA.

1. DIAPENSIA floribus pedunculatis. *Diapensia. Fl. lapp. 88. t. 1. f. 1. * Fl. suec. 172. Rambur. ad 226.*
Habitat in alpibus Lapponicis. 2
 2. DIAPENSIA floribus subsessilibus. *Androsace caulescens, foliis alternis, pedunculis unifloris. Amœn. acad. 1. p. 164.*
Aretia caulis teretibus foliis imbricatis, floribus sessilibus. Hall. helv. 486. t. 8. f. 4. 11. 617
Habitat in alpibus Helyticis Gemmi & Pyndtnerberg. 2
Habitus antecedentis; fructum non vidi.

ARETIA.

aretia. ad. 230.

1. ARETIA villosa, scapis unifloris. *Hall. helv. 486. f. 4. alpina.*
Habitat in Vallesiæ monte Loch dicto. 2
Fructus anatome nobis deest in hac planta. Hall. p. 618. andrea. ad 230.

ANDROSACE.

1. ANDROSACE perianthiis maximis. *Hort. upf. 36. maxima.*
Androsace calycibus fructuum maximis. Hort. cliff. 50. androsace, alt. matth. salic. Roy. lugdb. 414.
Androsace foliis lanceolato-ovatis dentatis, calycibus corolla longioribus. Wachend. ultr. 28.
Androsace altera. Cam. epit. 639. Clus. hist. 2. p. 134.
Alpine affinis Androsace dicta major. Barth. pin. 251.
Habitat inter Austriæ segetes. ②

2. AN-

- septentrio-* 2. **ANDROSACE** foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. *Fl. suec.* 160.
nalis. Androsace calyce fructus parvo. *Fl. lapp.* 78.
Androsace montana, flore minore. *Buxb. act.* 2. p. 369. t. 23. f. 2.
villofa. Alsine verna, androsaces capitulis. *Bauh. pin.* 251. prod. 118.
ame. Dalech. Alsine minor, androsaces alterius facie. *Bauh. pin.* 251. prodr. 118.
balleri. Alsine adfinis Androsace dicta minor. *Bauh. pin.* 251.
ea. ad. 230. *Habitat in alpibus* Lapponiæ, Russiæ apricis glareosis. 0
lactea.

3. **ANDROSACE** foliis pilosis, perianthiis hirsutis.
villofa. Aretia villosa, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 486.
ame. Dalech. Sedum alpinum hirsutum, lacteo flore, *Bauh. pin.* 284.
balleri. Sedum minus X, alpinum IV. *Clus. hist.* 2. p. 62.
ca. ad. 230. *Habitat in alpibus* Rheticis, Pyrenæis.

4. **ANDROSACE** foliis ciliatis.
villofa. Aretia foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 486. t. 7.
ame. Dalech. *Habitat in alpibus* Helvetiæ.

5. **ANDROSACE** foliis linearibus glabris, umbella involucris multoties longiore.
lactea. Androsace alpina perennis angustifolia glabra, flore singulari. *Tournef. inst.* 123.
carnea. Sedum alpinum, gramineo folio, lacteo flore. *Bauh. pin.* 284. *Raj. hist.* 1042.
ca. ad. 230. Sedum minus XI. *Clus. hist.* 2. p. 61.
ame. Dalech. *Habitat in Austriæ alpibus.* 2. *Historia 2. Britt.*

6. **ANDROSACE** foliis subulatis glabris, umbella involucris breviore.
lactea. Androsace alpina perennis angustifolia glabra & multi-flora. *Tournef. inst.* 123.
carnea. Sedum alpinum, angustissimo folio, flore carneo. *Bauh. pin.* 284.
ame. Dalech. Sedum alpinum ejusdem. *Column. ecphr.* 2. p. 64. t. 65. f. 2.
ca. ad. 230. Sanicula alpina, angustissimo folio. *Pluk. alm.* 332. t. 108. f. 5.
ame. Dalech. *Habitat in alpibus* Pyrenæis, Helveticis. 2

PRIMULA.

- i. PRIMULA foliis dentatis rugosis. Hort. cliff. 51. Fl.
suec. 161. Roy. lugdb. 415. Dalib. paris. 62. limbo
corollarum concavo. mat. med. 64. Pri

Verbascum apicum umbellatum warg. B. pin. 243
Si multa varis alto floribus floris color variat, alios rubri, raro et candentes. } *Ranuncula. Simulari*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

- Bollen. minim. ovat. stylus annuis. tuberosus. antera filamenta pectinatum.* 143 *Rubra paralytica. Anag. Roy.*
Primula veris odorata, flore luteo simplici. Baub. hist. *anthratica. gen.*
3. p. 495. fl. umbella pedunculata pendula. corolla calice longior. umbella subflora. tripl. ligule. bracts bracteas ut magenta.
Verbasculum pratense odoratum. Baub. pin. 241. *Paralytica. lab.*
B. *Primula. - - - - - limbo corollarum plano.* elatior.
Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum. Baub.
pin. 241.
Primula veris, pallido flore, elatior. Clus. hist. I. p. 301.
γ. *Primula - - - scapo nullo.* acaulis. *Primula. math.*
Primula veris, pallido flore, humilis. Clus. hist. I. p. 302.
Verbasculum sylvestre majus, singulari flore. Baub. pin.
241. fl. uti. flore luteo carmine. fl. luteo plumbi radiata. tan umbella bellis granis.
Habitat in Europæ pratis. 2 *Leptochila blutaria. gen. ca.*
2. **PRIMULA** foliis crenatis glabris, florum limbo plano. farinosa. • *Per.*
Hort. cliff. 50. Fl. suec. 162. fl. umbella pedunculata. corolla erut. uti. γ. acaulis.
Primula foliis crenatis glabris. Vir. cliff. 12. Roy. lugdb. 415.
Primula foliis erectis fastigiatis. Fl. lapp. 79.
Primula veris rubro flore. Clus. pan. 340.
Verbasculum umbellatum alpinum minus. Baub. pin. *Majale. cord.*
242. *Habitat in Alpinis frigidisque Europæ pratis uliginosis. 2* *Gentianum. cord.*
3. **PRIMULA** foliis serratis glabris. *Vir. cliff. 12. Hort. Ann. 230.* *Auricula. ur. 230.*
ups. 36. Roy. lugdb. 415. *Annicula. math. c. 230.* *Paralytica. lab.* +
Primula foliis serratis carnosis glabris. Hort. cliff. 50.
Sanicula alpina lutea. Baub. pin. 242.
B. *Sanicula alpina purpurea Baub. p. 242.* *Britannica angusti.*
γ. *Sanicula alpina, foliis rotundis. Baub. pin. 242.*
δ. *Sanicula alpina, flore variegato. Baub. pin. 242.*
ε. *Sanicula alpina angustifolia. Baub. pin. 243.*
ζ. *Sanicula alpina, foliis quasi farina adspersis. Baub. pin.* 243.
Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis. 2
4. **PRIMULA** foliis cuneiformibus dentatis minimis co-minima.
rolla longe minoribus. *+ na flora, lutea, sunt en. 151.*
Sanicula alpina minima carneæ. Baub. pin. 243.
Auricula ursi VIII. minima. Clus. hist. I. p. 305.
Habitat in Sneeberg, Tauro, Judenberg inque altissimo
monte propes salinas Austriæ superioris, qua tenditur in
Styriam. 2
5. **PRIMULA** foliis linearibus integerrimis; floribus *Vitaliana. Pet.*
sessilibus. *Pri- auricula ursi ad*

144 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Primula flore subfessili, foliis linearibus. *Amoen. acad. I.*
p. 160.

*Vitaliana. Sels. epist. 69. t. 10. f. 1. **

Sedum alpinum exiguis foliis. Baub. pin. 284.

*Sedum alpinum & gregorii ragiensis 1. Column. ecphr.
2. p. 63. t. 65. f. 1. Raj. hist. 1044.*

Habitat in alpibus Pyrenæis & Italicis. 2.

*Calyces longitudine tubi corollæ, ultra medium quinque-
fidæ, corolle limbis quinquefidis, lobis ovato oblongis.*

auriculacea ant' huter helv. No 616.

*• integrifolia. 6. PRIMULA foliis integerrimis glabris oblongis, caly-
cibus tubulosis obtusis.*

*l. sign. Primula foliis glabris carnosis integerrimis. Hall. helv.
485.*

*Sanicula alpina rubescens, folio non ferrato. Baub. pin.
243.*

Auricula ursi IV. Clus. hist. I. p. 303. t. 304.

Habitat in alpibus Helyeticis, Styriacis, Pyrenaicis. 2.

cortusoides. 7. PRIMULA foliis petiolatis cordatis sublobatis crenatis.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.

Herba foliis sequentis, floribus antecedentis.

CORTUSA.

matthioli. 1. CORTUSA calycibus corolla brevioribus.

*Cortusa foliis cordatis petiolatis. Hort. cliff. 50. Roy. lugdb.
414.*

Cortusa matthioli. Clus. hist. I. p. 307.

Sanicula montana latifolia lacinata. Baub. pin. 243.

Habitat in alpibus Austriæ, Sibiriæ.

Gmelini.

*Cortaria ad. à D. Cortario Rotan
acad. 2. p. 340. **

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 2.

SOLDANELLA.

*alpina. 1. SOLDANELLA. Hort. cliff. 49. Roy. lugdb. 414
Hall. helv. 488.*

*golia ad. 251. Soldanella alpina rotundifolia. Baub. pin. 295. Moris.
hist. 2. p. 285. f. 3. t. 15. f. 8.*

Soldanella alpina. Cam. epit. 254.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Austriæ, Pyrenæorum. 2

Meadia ad 251 ex nonn. Singulare
Meadia. DODECATHEON.

I. DODECATHEON.

Meadia. Gatesb. car. 3. p. 1. t. 1.

PENTANI

Oxybaphus. Urtica à tige

Auricula ursi virgin-

tis, cyclaminum

f. 6. Rubus alpinus bruni-

bus. Laurus Joffre

Habitat in Virginia

Muricea auricula ursi

Pyrolætum laevigatum

CYCLAMEN co-

Cyclamen foliis cor-

Mat. med. 65.

Cyclamen. Hort.

Cyclamina omnia

Cyclaminus. Cam.

Habitat in Austria,

ss. 2.

Varierates sic conjun-

do, ut vix ac ne-

CYCLAMEN co-

Habitat in Zeylona

ME

MENYANTHES

lis ciliatis. folia à 7

Menyanthes foliis o-

Hort. cliff. 53. R

Nymphaea lutea mi-

Habitat in Belgii, D

Umbella simplex, se-

MENYANTHES

lis interne pilosif.

Nedel- ambel. Rhee

Habitat in Malabari

Umbella p. 163. consp

MENYANTHES

163. Hort. cliff.

Hall. helv. 487.

Trifolium palustre.

Habitat in Europæ p

HO

HOTTONIA Boer

164. Roy. lugdb.

Millefolium aquatici

Baub. pin. 141.

MONOGYNIA.

in earibus. Aman. ac.

D. f. I. *

Baub. pin. 284.

gientis I. Column. 1044.

Italicis. 2

ultra medium quin

sidus, lobis rotato oblongis,

glabris oblongis,

integerrimis. Hall.

non serrato. Baub.

p. 303. t. 304.

Styriacis, Pyren.

datis sublobatis or-

ntecedentis.

A.

brevioribus.

Hort. cliff. 50. Roy.

p. 307.

ata. Baub. pin.

in excedentibus.

LA.

49. Roy. lugdb.

Baub. pin. 295.

Pyrenæorum.

CON.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

145

Olyp. long. digita at typ. nudribus to brach. plenum. Cyp. 1 loral. 3 valv.
Auricula ursi virginiana floribus boraginis instar rostratis, cyclaminum more reflexis. Plak. alm. 62. t. 79.
f. 6. subsp. calyx brach. petiol. inerasata latibus nutante inedi. Contab.
Habitat in Virginia. 2 1/2 yds. 1 aperte flor. vesp. 19 mai.
foliis auricula ursi 1 plicata seu concava extens. inedi. velutina
fl. umbellata laevi in petio. tota granatae flore.

CYCLAMEN.

1. CYCLAMEN corolla retroflexa.

Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. Hort. upf. 47. Mat. med. 65.

Cyclamen. Hort. cliff. 49. Roy. lugdb. 414.

Cyclamina omnia 1 --- 13. Baub. pin. 308.

Cyclaminus. Cam. epit. 357.

Habitat in Austriae, Tatariæ, Europæ australis nemorosis. 2

Varietates sic conjungunt plantas folio anguloſo & rotundo, ut vix ac ne vix limites dentur.

2. CYCLAMEN corollæ limbo nutante. Fl. zeyl. 401. indicum.

Habitat in Zeylona. 2

MENYANTHES.

1. MENYANTHES foliis cordatis integerrimis. Corol. Nymphoides. antice alpestria. 271.

lis ciliatis. folia à nymphæa lutea diffine. 10. foliis basiliæ rilla apic.

Menyanthes foliis orbiculatis, corollis margine laceris.

Hort. cliff. 53. Roy. lugdb. 430. Dalib. paris. 62.

Nymphæa lutea minor, flore fimbriato. Baub. pin. 194.

Habitat in Belgii, Dantiaci fossis majoribus. 2

Umbella simplex, sessilis e latere petioli, ut in sequenti.

2. MENYANTHES foliis cordatis subcrenatis, corol. indica. Nedel. ad.

lis interne pilosis. Fl. zeyl. 72. flor umbella. excep. petiol. pedunculus. 271.

Nedel- ambel. Rheed. mal. II. p. 55. t. 28. Zaratti. Righ. 6. 7. 72. f. 3.

Habitat in Malabariæ, Zeylonæ fossis. Comendu Brum. 2nd fibr. caule foliatis. calyx fib. pro. consp. Et. 10. alt. brev. tota plana costa crenatis comuta. antice

3. MENYANTHES foliis ternatis. Fl. lapp 80. Fl. suec. trifoliata. menyanthus ad.

163. Hort. cliff. 52. Mat. med. 66. Roy. lugdb. 430. Stopyrum gal. gen. do.

Hall. helv. 487. Dalib. paris. 62.

Trifolium palustre. Baub. pin. 327.

Habitat in Europæ paludibus. 2

HOTTONIA.

1. HOTTONIA Boerb. lugdb. 1. 207. Hort. cliff. 51. Fl. suec. palustris.

164. Roy. lugdb. 41. Hall. helv. 487. Dalib. paris. 63.

Millefolium aquaticum s. Viola aquatica, caule nudo.

Baub. pin. 141.

K

Eijero ea cit. ambel. hæm. 11. 2. 29. Cunad. Brum. Mille- } Nedel. ad. 271.
flax de Nedel. ouque nymphæa. } 1562
lae ea cit. ambel. l. minor, lato laeum. tantum perfracto non foliato. tanjo alt. brev. pedunc. antice haem. hædæb.

Cyclamen ad 231.

europæum.

xoxapiv. Dio.

cyclaminus. gal. Reg. 22

cyclamen. Ed. Syl. gen. 18

? Latticum. Nia. ang.

Sphaerity. aest. Italy.

anthanta. lob.

Land prænius

Menyanthus ad

271.

Ez aplo. ad Lysimachia trifolia lutea spicata. B. S. 245.

146 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Millefolium aquaticum equisetifolium, caule nudo. *Banh.*
pin. 141.

Habitat in fossis & paludibus Europæ borealioris. 2

Hydrophyllum ad. 179. HYDROPHYLLUM.

virginianum 1. HYDROPHYLLUM *Hort. cliff. 44. Roy. lugdb.*
413. Gron. virg. 21.

Dentariæ facie planta monopetalos, fructu rotundo monopyreno. *Moris. hist. 3. p. 599. f. 15. t. 1. f. 1.*

Habitat in Virginia. 2

Ex le hydrophylli D. - Hydrophyllum verum canadense in aquis natum diversissima planta foliis binis petiolatis palmatis, basi excavatis: lobis auctis lobulo a trinque lateral, serratis, viridibus, facie aceris; Fructificatio hujus mibi ignota est.

LYSIMACHIA.

Lysimachia ad. 230

* *Pedunculis multifloris,*

vulgaris. 1. LYSIMACHIA paniculata, racemis terminalibus.
Lysimachia foliis lanceolatis, racemo composito terminali. *Virid. cliff. 415. Fl. suec. 166. Roy. lugdb. 416.*
Cutharicum mag. virid. Valdeca. gen. 81. Hort. cliff. 50.

Lysimachia lutea major. *Banh. pin. 245.*
Habitat in Europa ad ripas & paludes. 2

Ephemerum 2. LYSIMACHIA racemis simplicibus terminalibus, petalis obtusis, staminibus brevioribus.

Lysimachia racemo simplici terminali, foliis lanceolato-linearibus. *Vir. cliff. 13. Hort. cliff. 3. Roy. lugdb. 415.*

Lysimachia spicata purpurea minor. *Buxb. cent. 1. p. 22. t. 33.*

Lysimachia orientalis minor, foliis glaucis. *Till. pis. 106. t. 40. f. 2.*

Habitat in Media. ○

Conf. Ephemerum matthioli. Banh. pin. 244. Banh. hist. 2. p. 905. Dod. pempt. 203.

Convenit cum L. atropurpurea habitu, structura, glauco colore. Differt Petalis obtusis, patulis, staminibus corolla brevioribus, floribus pedicillo insidentibus; cum illa Petala gerit acuminata, calyce paulo longiora, conniventia, saturate rubra; stamina corolla longiora, antheris fuscis; Flores in spicam sessiles; interime maxime affines sunt.

3. LY-

Lysimachia trifolia lutea spicata. B. S. 245.

PENTANDRIA

LYSIMACHIA

tis, staminibus co-

Lysimachia foliis la-

spica ovata termi-

Lysimachia foliis la-

bus. Roy. lugdb.

Lysimachia oriental-

Habitat in Oriente

LYSIMACHIA

Lysimachia racemis

13. Fl. suec. 16

Lysimachia ex alis

Hort. cliff. 52

Lysimachia bifolia,

Lysimachia lutea.

Habitat in Europa,

* P

LYSIMACHIA

lis quaternis unif

Lysimachia foliis o

Anagallis marina lu-

f. 2. f. 5.

Anagallis lutea foli

tuor ex æqualib

positis. Pluk. ma

Habitat in Virginia

LYSIMACHIA

ciliatis unifloris.

Lysimachia foliis

cliff. 52. Roy. I.

Lysimachia lutea mi-

pin. 245.

Lysimachia lutea i

Blattariæ affinis pla-

punctis notatis. N

Habitat in Holland

LYSIMACHIA

Lysimachia foliis o

margine utrinque

390.

Lysimachia canad

Walth. bort. 32.

ONOGYNIA.
ifolium, caule nudo. A
Europæ borealioris.
LLUM.
f. cliff. 44. Roy. b
alos, fructu rotundo
• 599. f. 15. t. I.
uum in aquis natum
etiolatis palmatis, basi
nque laterali, serrati
atio hujus mibi igni

HIA.
multifloris
cems ter
cemo co
ee. 166. I
ympbo te
pin. 24
alndes. H
licibus te
breviori
inali, fol
rt. cliff.
or. Bux
tus glau

b. pin. 244. Bauh.

Chale (Leuille R. g. 1 p. Red. fibra rauca alt. fol. grata. floribundis alt
Lysimachia Cal. tenui brv. 5 fd. Cor. lato brv. 5 fd. ocy. calyx 1 lyra
 ad. 230 masticata dentatae dolentes meditatae.
 f. anagallid. cuius fidei ex

148 PENTANDRIA MONOGYNYA.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis erectus. Folia opposita, oblongo-ovata, integerima, acuta, glabra: nervis lateralibus; petioli canaliculati, ciliati. Pedunculi solitarii, uniflori, nudi.

- *Linum stellatum*. 8. LYSIMACHIA calycibus corollam superantibus,

Lysimachia ad 230 caule erecto ramosissimo. Roy. lugdb. 416. Hort. upf. 37. Sauv. monsp. 130. Lysimachia annua minima Linum minimum stellatum. Baub. pin. 214. prodr. 107. Magn. monsp. 163. t. 162.

Habitat in Gallia. ○ 1 p. red. foliis fl. solitariis. Pl. 1.

Cal. sp. 5. corolla longior cor. lutea 5 fd. stam. 5. anthers 5. fil. 5. lvs. 5. calyx fl. grata.

- *nemorum*. 9. LYSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Hort. cliff. 52. Roy. lugdb. 416. Anagallis lutea nemorum. Baub. pin. 252. Moris. hist. 2. p. 569. f. 5. t. 26. f. 5.

Anagallis. Clas. hist. 2. p. 182.

Habitat in Germaniae, Galliae, Angliae nemoribus glareos. fl. solit. acill. alterni. lutei.

Lysimachia ad

- *Nummularia*. 10. LYSIMACHIA foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Vir. cliff. 13. Hort. cliff. 52. Fl. suec. 168. Mat. med. 67. Roy. lugdb. 416. Hall. helv. 481.

Nummularia major lutea. Baub. pin. 309. Anagallis mas. Cam. epit. 394.

Habitat in Europa juxta agros & scrobes. 2

Lysimachia senella
Leticaria

- *virens*. 11. LYSIMACHIA foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule repente.

Lysimachia foliis subrotundis, floribus solitariis longe bellis, caule repente. Sauv. monsp. 135.

Nummularia minor, purpurascente flore. Baub. pin. 310. prodr. 139. Moris. hist. 2. p. 567. f. 5. t. 26. f. 2.

Habitat in Galliae, Angliae humidis.

anagallis ad 250.

ANAGALLIS.

- *arvensis*. 1. ANAGALLIS foliis indivisis, caule procumbente.

Anagallis foliis indivisis. Roy. lugdb. 416. Fl. suec. 169.

Anagallis foliis ovatis. Hort. cliff. 52.

Anagallis phoeniceo flore. Baub. pin. 252.

Habitat in Europae arvis. ○

- *monelli*. 2. ANAGALLIS foliis indivisis, caule erecto.

Anagallis foliis lanceolatis. Hort. cliff. 52. Hort. upf.

anagallis ad

38. *part. mucosa agerata*

Nyctagrum Sten. Nyctagrum inter ruris eruditus in dampnis, est omni-flores, rura, rura tenui calathis, percepit in gastera ruris. Eni post aquarum verum radices, ruris, ruris, ad hanc 30 dicas, ita leuam noctis, rugos Sarothrym rugos, ut hinc herba ad rora sanguine da latum vocari chenopodion quodcumq; ad. conquestris ejus ruris ab aliis nyctagrum quendam longum noctis foliis.

olive triplo

PENTAND

Anagallis cærulea, f. scensibus. Baub. P.

Anagallis tenuifolia Habitat - - -

ANAGALLIS foli- bus compressis.

Anagallis hispanica inf. 143.

Cruciata montana m. Habitat in Hispania.

Caulis erecto-patens, ris: angulis oppositi

in margine acuto maxime sessilia &

tia, obtusiflora, nata. Pedunculi a-

retes, corolla cærulea

purpurea; Antheri magnis & latis, ca-

valde affinis.

ANAGALLIS foli- Agagallis purpurea, l.

Agagallis purpurea, l. inf. 245.

Habitat ad Caput b.

THE

THEOPHRAST

Erebia foliis aquifolii Habitat in America

Caudex nudus, simpli- mis. Folia lanceola-

latis, omnia ex apic- ficationes ramosæ,

PAT

PATAGONULA

Patagonica foliis par- elb. 306. t. 226.

Habitat in Patagoni-

SPIGELIA.

Arapabaca quadrifolii Barr. equin. 15.

MONOGYNIA.

alline triphyllor coerulea. B.D. 250

{ *Dactylobotrys*. *Hedw.*
herbaceum frag-

PENTANDRIA MONOGYNIA.

149

Anagallis cærulea, foliis binis ternisve ex adverso na-

scentibus. *Bauh. pin.* 252.

Anagallis tenuifolia monelli. *Clus. app. alt.*

Habitat - - - - ○

3. **ANAGALLIS** foliis cordatis amplexicaulibus, cauli- *latifolia*.

bus compressis.

Anagallis hispanica latifolia, maximo flore. *Tournef.*

inst. 143.

Cruciata montana minor, flore cæruleo. *Barr. ic.* 584.

Habitat in Hispania. *Lœfl.* ○

Caulis erecto-patens, brachiatus, ramosus, quadrangula-

ris: angulis oppositis triplo latioribus, *angustioribus ve-*

ro margine acuto utrinque septis. *Folia subcordata*,

maxime sessilia & amplexicaulia, *basi deorsum spectan-*

tia, *obtusiuscula*, *nervosa*, *glabra*, *subtus pallide pun-*

ctata. *Pedunculi axillares*, *solitarii, uniflori, nudi, ter-*

retes, corolla cærulea, fundo purpurascente. *Filamenta*

purpurea; *Antheris oblongis flavis*. *Notabilis foliis*

magnis & latis, caule compresso, *A. arvensi* attamen

valde affinis.

4. **ANAGALLIS** foliis sinuatis. *Roy. lugdb.* 416. + *capensis*.

Anagallis purpurea, *bursæ pastoris* foliis minoribus. *Pet.* *afinissæ. afi-*

mus. 245

Habitat ad Caput b. spei.

THEOPHRASTA.

1. **THEOPHRASTA**. *Roy. lugdb.* 528.

Eresia foliis aquifolii longissimis. *Pluk. gen.* 8.

Habitat in America æquinoctiali. 5

Caudex nudus, simplicissimus, apice frondosus ut in Pal-

mis. Folia lanceolata, longissima, dentata nervis undu-

latis; omnia ex apice caudicis undique diffusa. *Fructi-*

fications ramosæ, diffusæ, inter folia ad apicem caulis.

americana. 300

gambier. peruv.

Zubengar. v. Den.

cognit. v. Den.

Colonia Willm.

PATAGONULA.

PATAGONULA +

Patagonica foliis partim serratis partim integris. *Dill.*

elth. 306. *t.* 226. *f.* 293.

Habitat in Patagonia Americes australis. 5

americana.

SPIGELIA.

arapabaca ad 225

Anthelmia.

1. **SPIGELIA**.

Arapabaca quadrifolia, *fructu testiculato*. *Plum. gen.* II.

Barr. equin. 15.

Ara-

Zangaraea. p. 92. *Sentia spud. rami et fol. opp. Eugeniae typae virens. informe adstantia veluta.*
 ad 147 *A. panicul. corona terminalis. ppma brachii plena que 4. fol. extenua longiora.*
 ?ophidionylon *8. hi mirrae interiora. centrum flor. foliis constat ppma more scabidae holostichum.*
 ad 148. *Bacea myrtilli magnitud. cornuta. flwa flor. fructus unicus arponico vir-*
aduent. antedictum ericin radic.

150 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Arapabaca brasiliensibus dicta planta. Marcgr. bras. 46.
Habitat in Cajenna, Brasilia. *Ram. foliis 4. fol. extenua longiora.*
Caulis simplex, herbaceus. Folia terminalia, quatuor, lan-
guata cœlata. Folia caulina alia duo opposita. Ramus ex ala
singula folii caulinis solitarius. Cauli simillimus, termi-
natus foliis quatuor cruciatim positis, ut in caule. Ra-
mena terminalia solitarii in caule & ramis.
flor. albo purpureo luteo. capite glab. didyma 2. loculi polyporum
Rudi

OPHIORHIZA.

- Mungos. ad 225. 1. OPHIORRHIZA foliis lanceolato-ovatis.
Ophiorrhiza. Fl. zeyl. 402. Mat. med. 79. t. 1. Amœn.
acad. 2. p. 118.
Habitat in India orientali. 2
Conf. Limonium mauritanicum, flore minimo, caule fo-
lioso. Pet. gaz. 66. t. 41, f. 12.
- Mitreola. 2. OPHIORRHIZA foliis ovatis.
Mitreola. Hort. cliff. 492. Gron. virg. 28.
Mitra. Houst. mss. t. bona.
Habitat in America meridionali.

Tsutsusi. ad 165

AZALEA.

- indica. 1. AZALEA floribus subsolitariis, calycibus pilosis.
Chamærhododendron exoticum, amplissimis floribus li-
laceis. Breyn. prodr. 1. p. 23. Cistus indicus, ledi alpini foliis, floribus amplis. Herm.
cal. pilos. p. 100
13. varietates a colore flor. coloribus liaceis. Breyn. prodr. 1. p. 23. Cistus indicus, ledi alpini foliis, floribus amplis. Herm.
in Japonia. Vide Kœmpf.
lugdb. 152. t. 153. Raj. hist. 1895. glab.
Tsutsusi. Kœmpf. amœn. 845. t. 846. f. 1. fol. alt.
Habitat in India. 2. AZALEA arborea. †
Chamærhododendros pontica maxima, mespili folio,
flore luteo. Tournef. cor. 42. Buxb. cent. 5. p. 36. t.
69.
Habitat in Ponto, Trapezunte. †
- pontica. 3. AZALEA foliis ovatis, corollis pilosis, staminibus
longissimis.
Azalea ramis infra flores nudis. Gron. virg. 21.
Azalea scapo nudo, floribus confertis terminalibus, sta-
minibus declinatis. Hort. cliff. 69.
Azalea erecta, foliis ovatis integris alternis, flore luteo
piloso præcoci. Cold. ebor. 25.
Cistus virginiana, periclymeni flore ampliori minus o-
dorato. Plak. mant. 49.
Habitat in Virginia. †

4. A.

PENTANDRIA
 AZALEA foliis m-
 tinosis.
 Azalea ramis infra f-
 ebor. 24.
Cistus virginiana, flo-
106. t. 161. f. 4.
Habitat in Virginia.
 AZALEA foliis a-
 Azalea ramis comp-
 Azalea maculis fer-
 t. 6. f. 1.
Habitat in Alpibus
 AZALEA ramis c-
 t. 6. f. 2. Fl. suec-
 Chamærhododendro-
 alpina. Bocc. muj-
 Chamæcistus serpy-
 466.
Habitat in Alpibus

P
 PLUMBAGO fo-
 Mat. med. 75. R-
 Lepidium Dentillar-
 Tripolium dioscorid-
Habitat in Europa
 PLUMBAGO fo-
 up. 43. Fl. zeyl-
 Dentillaria lychnoi-
 Sloan. hist. 1. p.
*Lynnis indica spic-
 ceis oblongis, ra-*
t. 5. acar binaria
Habitat in India
Hydrocotyle rotundifolia
and pinnata anti-dotea
 PHLOX foliis la-
 compositis,
 Lysimachia virginini-
 luteæ floribus ai-
Habitat in America
 Planta magna, alte-
 lanceolata: marg-
 inib. cedividi. ho-
 Montago alt. flor-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 15

I

4. AZALEA foliis margine scabris, corollis piloso-glu-*viscosa*
tinosis.
Azalea ramis infra flores foliosis. *Gron. virg. 21. Cold.*
ebor. 24.
Cistus virginiana, flore & odore periclymeni. *Pluk. alm.*
106. t. 161. f. 4. *Catesb. car.* 1. p. 57. t. 57.
Habitat in Virginia. 5

5. AZALEA foliis adspersis punctis excavatis. *lapponiae*
Azalea ramis compositis suberectis. *Fl. suec. 171.*
Azalea maculis ferruginea subtus adspersa. *Fl. lapp. 89.*
t. 6. f. 1.
Habitat in Alpibus Lapponiae. 5

6. AZALEA ramis diffuso procumbentibus. *Fl. lapp. 90. procumbi*
t. 6. f. 2. *Fl. suec. 170. Hall. helv. 416.*
Chamærhododendros supina ferruginea, thymi folio,
alpina. *Bocc. mus. 2. p. 64. t. 53.*
ChamæCistus serpyllifolia, floribus carneis. *Bauh. pin.*
466.
Habitat in Alpibus Europæ. 5 *Haller. No 666.*

PLUMBA GO. *Chrysanthemum*

Puerbago ad. 265.

1. PLUMBAGO foliis amplexicaulibus. Hort. cliff. 53. europæ. •
Mat. med. 75. Roy. lugdb. 417. Sauv. monsp. 63.
Lepidum Dentillaria dictum. Bauh. pin. 97.
Tripolium dioscoridis, Col. ecphr. I. p. 160. t. 161.
Habitat in Europa australi. 2

2. PLUMBAGO foliis petiolatis. Hort. cliff. 53. Hort. zeylanica. *Plumbago*
ups. 43. Fl. zeyl. 73. Roy. lugdb. 417.
Dentillaria lychnoides sylvatica scandens, flore albo.
Sloan. hist. I. p. 211. t. 133. f. 1.
Lychnis indica spicata, *ocymastri* foliis, fructibus lappa-
 ceis oblongis, radice urente. Comm. hort. 2. p. 169.
t. 5. acer binata. Augus 7. 168. Academ. veratoria uti. Noxanthus caudat. corolla
Habitat in India utraque. 2 Tumba adiut. h. m. 102. 8. Davo citroco. Nam.
 fl. alba adut. red. in. rad. repens. liga cato. flava. subdite. aromatica
 in 2. gnd. calida. Epota in PHLOX. vix et vnit. elicitum est. *Scoura* ad
 und. praeceps anti. dotum. *PHLOX*. *Scoura* ad. 1. 126. 127.
 1. PHLOX foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculata. 126. 127.
 compositis,
Lysimachia virginiana umbellata maxima, *lysimachiae*
 luteæ floribus amplioribus, Pluk. mant. 121.?
Habitat in America septentrionali. Collinson. 2
 Planta magna, alta. Caulis levis, obtusus. Folia lato-
 lanceolata: margine Aculeis minutissimis sparsis ex-
 schetti adiut. h. m. 102. 9. K 4 spec-
 Montago alt. fl. 10 majoribus. floribus etiam sparsis. vix ad majoribus. pparescere

sperata. Corymbi conferti in umbellam Floribus numerosissimis.

- *maculata.* 2. *PHLOX* foliis cordato-lanceolatis lœvibus.
Lychnoides marilandica, foliis binis oppositis basi & auriculis caulem utrinque amplexantibus. *Raj. suppl.*
 489.?

• *Habitat in Virginia. Kalm. 2.*

Plantæ caulis teretiusculus, subscaber, rubro viridiisque undique tenuissime maculatus, erectus. Folia levia, e basi amplexicauli cordata, elongata in lanceolatum sensim acutius. Flores in Racemum compositum digesti.

• *pilosa.* 3. *PHLOX* foliis lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali. *Cal-tato brachian S phlox longistylinae.*
sonna ad 214. *Lychnoides marilandica*, calycibus lanuginosis, foliis angustis acutis. *Raj. suppl.* 490.

Lychnidea umbellifera, blattariæ accedens virginiana, major repens pseudomelanthii foliis pilosis, flore pentapetaloidè fistuloso. *Pluk. alm.* 133. t. 98. f. 1.

• *glaberrima.* 4. *PHLOX* foliis lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 63. *Roy. lugdb.* 433. *Gron. virg.* 21.

Lychnidea folio melampyri. Dill. elth. 203. t. 166. f. 202.

Habitat in Virginia. 2.

• *divaricata.* 5. *PHLOX* foliis lato-lanceolatis: inferioribus alternis, caule ramoso.
Lychnidea virginiana, alsines aquaticæ foliis, floribus in ramulis divaricatis. *Pluk. mant.* 121?

Habitat in Virginia.

Plantæ Caules erectiusculi. Folia lanceolata s. ovato-lanceolata, oleracea & molliuscula, glabra aut parum pilosa: superiora opposita, inferiora alterna. Rami alterni, basi divaricati. Corollæ cæruleæ.

• *ovata.* 6. *PHLOX* foliis ovatis, floribus solitariis.
Lychnidea fistulosa marilandica, clinopodii vulgaris folio, flore amplio singulari. *Pluk. mant.* 122. t. 348. f. 4.

Habitat in Virginia. 2.

• *subulata.* 7. *PHLOX* foliis subulatis hirsutis, floribus oppositis.

haja Benyon & haja India occid. similis Batatas arii qd minor et suavis. Benyon. B. Pin. 91.
aer. chy Cochuchu radis pana dulcis, quam aliqui qd magis indistincte sit
cochuchu aer. conditum. aer. B. Pin. 91.

154 PENTANDRIA MONOGYNIA.

carolinus.

5. CONVOLVULUS foliis cordatis integris trilobis que villosis, calycibus laevibus, capsulis hirsutis, pedunculis subbifloris.

Convolvulus, folio hederaceo, arvensis, flore dilute purpureo. Dill. elth. 100. t. 84. f. 98.

Habitat in Carolina. 2

Pedunculi uniflori aut biflori.

hederaceus. 6. CONVOLVULUS calycibus tuberculatis pilosis. *Convolvulus ad.* 212. Virid. cliff. 18. Hort. ups. 38. Gron. virg. 141. Roy. lugdb. 428.

Convolvulus annuus, foliis cordatis rarius trilobis, calyx tuberculato piloso. Hort. cliff. 67.

Convolvulus purpureus, folio subrotundo. Bauh. pin. 295.

? Nil. avicin. ab. Lin. n. 156. B. Convolvulus cæruleus minor, folio subrotundo. Dill. elth. 97. t. 82. f. 94.

• 2. Convolvulus flore purpureo, calyce punctato. Dill. elth. 99. t. 83. f. 96.

? Nil. avicin. ab. Lin. n. 156. C. Convolvulus flore minore lacteo fundo atrorubente. Dill. elth. 98. t. 83. f. 95.

D. Convolvulus folio cordato glabro, flore violaceo. Dill. elth. 100. t. 84. f. 97.

E. Convolvulus cæruleus, hederaceo angulo folio. Bauh. pin. 295. Dill. elth. 96. t. 80. f. 91.

F. Convolvulus cæruleus, hederaceo folio magis anguloso. Dill. elth. 96. t. 80. f. 92.

G. Convolvulus cæruleus major, folio hederaceo. Dill. elth. 97. t. 81. f. 93.

Habitat in Asia, Africa, America. ☺

Pedunculi in aliis uniflori, in aliis triflori s. multiflori, limites autem inter singulas & --- vix occurunt.

Convolvulus ad.

B. Batatas. A. Batatas. B. Patates. C. Batatas. D. Batatas. E. Batatas. F. Batatas. G. Batatas. H. Batatas. I. Batatas. J. Batatas. K. Batatas. L. Batatas. M. Batatas. N. Batatas. O. Batatas. P. Batatas. Q. Batatas. R. Batatas. S. Batatas. T. Batatas. U. Batatas. V. Batatas. W. Batatas. X. Batatas. Y. Batatas. Z. Batatas.

7. CONVOLVULUS foliis cordatis angulato-nervosis, caule repente tuberifero.

Convolvulus foliis cordatis angulatis, radice tuberosa. Hort. cliff. 67. Roy. lugdb. 427.

Convolvulus radice tuberosa esculenta &c. Catesb. car. p. 60. t. 60.

Convolvulus indicus orientalis Inhame s. Batatas. Mo. ris. hist. 2. p. 11. f. 1. t. 3. f. 4.

Convolvulus indicus vulgo Patates dictus. Raj. hist. 728. Batatas. Bauh. pin. 91.

Kappa kelengu. Rheed. mal. 7. p. 95. t. 50.

Habitat in India utraque. 2

Conf. Convolvulus indicus vulgo Patates dictum. Few. per. 3. p. 16. t. 11. foliis palmatis.

ubi castila. Rheed. s. 2. 130. Variety rad. alba angustata. CON-

elth. 131. B. variet. rad. alb. leucoceras. Linnae-

Rheed. alba florib. int. alba foliis alba exalt. raro.

oblit. foliis alint. subra coacta tingit manu exalt.

coquuntur tanguntur exalt. vel in fructu oblit. foliis

languit se insuperante int. raro.

Rheed. raro castita exalt. exalt. exalt. exalt. exalt.

Exalt. exalt. exalt. exalt. exalt. exalt. exalt. exalt.

Liquor. Radix grisea
Radix grisea indi

PENTANDR

Raj. Radix in Naupe

CONVOLVULU

bellatis.

Convolvulus american

quetris numerosis.

Convolvulus luteus p

Convolvulus polyant

Sloan. jam. 55.

Habitat in Martinica

CONVOLVULU

renni villosa. fl. in

Convolvulus foliis

scandente. Roy. lug

Kattu-kelengu. Rhee

376.

Habitat in Malabari

CONVOLVUL

caule perenni villa

Convolvulus foliis

Vir. cliff. 18. Ho

Convolvulus canarie

& incanis. Comm.

Convolvulus canarie

canis. Pluk. alm.

Habitat in Canarien

CONVOLVUL

Hort. cliff. 496.

Convolvulus american

nos. Pluk. alm.

Convolvulus maxim

Sloan. jam. 55. hist

371?

Smilax aspera indiae

Habitat in America

CONVOLVUL

membranaceo qua

Fl. zeyl. 74. Mat.

Convolvulus zeylan

nonnihil similibus

179.

Turpethum repens,

pin. 149.

Habitat in Zeylon

Angloam. Rheed. s. 2. 13

zeyl. 149.

Indoam. Rheed. s. 2. 13

zeyl. 149.

Angloam. Rheed. s. 2. 13

zeyl. 149.

- MONOGYNIA.
- Liquinas. Radix quæ cestata uterina curvit. ad refrigerandum ratione pedunculus* *B. Singi.* *Liquinas. aeris.*
- Cordes. Radix quæ indi ad levanda in ratione uterina. Ind. occid. B. Singi.* *Cordes. americæ.*
- PENTANDRIA MONOGYNIA.** 155 { *Zagari. Radix in Naupe m. orient. praetavando corpore. B. Singi.* *Zagari. Indon.*
8. **CONVOLVULUS** foliis cordatis, pedunculis um- umbellatis. *Convolvulus. ad* 212
- bellatis.
- Convulvulus americanus, vulgaris folio, capsulis triquetris numerosis. *Pluk. alm. 114. t. 167. f. 1.*
- Convolvulus luteus polyanthos. *Plum. amer. 88. t. 102.*
- Convolvulus polyanthos, folio subrotundo, flore luteo. *Sloan. jam. 55.*
- Habitat in Martinica, Domingo, Jamaica. 2*
9. **CONVOLVULUS** foliis cordatis glabris, caule perenni villoso. *fl. in umbellæ longe pedunculat. 3* *malabaricus.* *Kattu-kelengu. Rheed. mal. 11. p. 105. t. 5. Raj. suppl.* 376.
- Convolvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo scandente. *Roy. lugdb. 429.*
- Habitat in Malabariæ arenosis. 3*
10. **CONVOLVULUS** foliis cordatis pubescentibus, canariensis. X *Convolvulus. ad*
- caule perenni villoso, pedunculis multifloris.
- Convolvulus foliis cordatis, caule fruticoso villoso. *Vir. cliff. 18. Hort. cliff. 67. Roy. lugdb. 428.*
- Convolvulus canariensis sempervirens, foliis mollibus & incanis. *Comm. bart. 2. p. 101. t. 51.*
- Convolvulus canariensis, foliis longioribus mollibus incanis. *Pluk. alm. 114. t. 325. f. 1.*
- Habitat in Canariensis insulis. 5*
11. **CONVOLVULUS** foliis cordatis, caule aculeato. *aculeatus.* *Hort. cliff. 496.* *Dunes noctis, chy.* *Convolvulus. ad*
- Convolvulus americanus, subrotundis foliis, viticulis spinosus. *Pluk. alm. 115. t. 276. f. 3.* *Ipomoea bonariensis* *Linn. 158*
- Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis obsito. *Sloan. jam. 55. hist. 1. p. 151. t. 96. f. 1? Raj. suppl.* 371?
- Smilax aspera indiæ occidentalis. *Baub. pin. 296.*
- Habitat in America calidiore. 5*
12. **CONVOLVULUS** foliis cordatis angulatis, caule Turpethum. *Turpethum.* *membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris.* *Burkitt. Rauw. Ruer* *magd. aer.*
- Fl. zeyl. 74. Mat. med. 84.*
- Convolvulus zeylanicus alatus maximus, follis ibisci nonnihil similibus angulosis. *Herm. lugdb. 177. t. 178.* 179.
- Turpethum repens, foliis althææ vel indicum. *Baub. pin. 149.*
- Habitat in Zeylona. 2*
- Bangalor. Rung 5. 7. 21. fæc. Antata 1st. flamm. limbis rufis expansis, tubi longitudo* *zandry. rot. brunn. fl. radiata per 4. foliat 3. CON-* *inglomeratum.*

PETNANDI

Mechoacan. Mon. *Grewia* *curvistylis* *mechoacan* Dccty. Raj. hst 723.
Zetinaea. *melegu* *Poggia* *mechaeana* *alta* Bof. 297, fol. Peamorensis, et Batavia
Convoluta, fol. 92, fl. sub alto fide pprw. Radix Batavie ex iusta pprw ex iusti.
Lia 1. n. 156 156 PENTANDRIA MONOGYNIA.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

tomentosus. 13. CONVOLVULUS foliis trilobis tomentosis, caule lanuginoso.

*Convolvulus folio lanato in tres lacinias diviso, flore
oblongo purpureo. Sloan. jam. 55. hist. I. p. 154. t. 98.
f. 2. Raj. suppl. 381.*

Convolvulus jamaicensis trilobus, foliis tomentosa la-
nugine densiori ac veluti instar utrinque obductis.
Pluk. alm. 115. *t.* 167. *f.* 4.

Habitat in Jamaica.

Convolvulus ad. 212 • althæoides. 14. CONVOLVULUS foliis palmatis cordatis seri-
ceis : lobis repandis, pedunculis bifloris.

Convolvulus foliis cordato-digitatis sericeis: foliolis linearibus: intermediis duplo longioribus. *Vir. cliff.*
18. *Roy. lugdb.* 429. *Sauv. monsp.* 202.

Convolvulus foliis ovatis divisis basi truncatis : lacinis
intermediis duplo longioribus. *Hort. cliff.* 67.

Convolvulus argenteus, folio althææ. *Baub.* pin. 295.
Convolvulus, betonicæ althææque foliis, repens argenteus. *Barr. rar.* t. 312.

B. *Convolvulus argenteus elegantissimus*, foliis tenuiter incisis. *Tournef. inst.* 85.

Habitat in Europa meridionali.

paniculatus. 15. CONVOLVULUS foliis palmatis: lobis septem-
lobis modicach. vatis acutis integerrimis, pedunculis paniculatis.
Paniculatus

Rheed. mal. II. p. 101. t. 49. *Raj. suppl.*

374. *Cavaleria brauni* (L.) *var. pallidior*
?/pec. M. maydell. Habitat in Malabaricae arenosis. Wing lvs. semi 2-toned.
Fore fl. white. 3rd gen. wings argenteous above.

16. CONVOLVULUS foliis hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunculis subunifloris, calycibus sagittatis. *facies convoluti* *mentis* *arvensis*.

Tala-neli. *Rheed. mal.* II. p. 113. t. 55. *Cali valli*. *Bom*
Habitat in India. gano-guru *Angul* 51. 159 f. 2. *Reinmann*

Habitat in India. Jano. geno. syng. 51. 159 p 2.
Folia lanceolata, apice integra, glabra, acuta, basi dilata-
ta ip 2. auriculas recurvas extrorsum subdentatas. Pe-
nunculi uniflori, rarius biflori; Stipulis lanceolatis,
oppositis, duabus, acuminatis. Calycis foliola sagittata,
hinc Campanulae Medii instar postice appendiculata re-
trospectantia. Flores corollinae - albo-flav.
Mio rubato ex. qd. 4. loc. Scen. 4. gradua.

Cause prostrato.

Convolvulus. ad 17. CONVOLVULUS foliis cordato-ovatis, pedunculis unifloris: bracteis lanceolatis, flore sessili.

Convolvulus foliis ovatis acutis, floribus duplice bractea succinetis. Roy. lugdb. 428.

Hayatae. *Ranunc.* f. 157. 24. volv. und. fl. alt. cordata - das
runifloratus fl. umbellata plur. alb. caps. glab. valv.
Lor. Cotic. capillis crassis fasciis. ? *Zagadka*. *C.W.* p. 155.

PETNANDRIA MONOGYNIA. 157

Convolvulus foliis ovatis acutis. *Hort. cliff.* 67.

Convolvulus sicutus minor, flore parvo auriculato. *Bocc.*
sic. 89. *t.* 48. *Moris. hist.* 2. *s.* 1. *t.* 7. *f.* 5.

Habitat in Sicilia. ○

Caulis vix vel admodum parum, saepius minime volubilis.

18. CONVOLVULUS foliis subrotundis, caule repente. *nummularia* *Vistnu-ad*

Convolvulus minor repens, nummulariae folio, flore cæ-
ruleo. *Sloan. jam.* 58. *hist.* 1. *p.* 157. *t.* 99. *f.* 2.

Raj. suppl. 382.

Habitat in Jamaicæ & Barbados pratis.

19. CONVOLVULUS foliis subovatis obtusis petiola-
tis pilosis, caule diffuso, pedunculis trifloris. *Fl. zeyl.* 76. *alpinoides.*

Convolvulus foliis ovatis obtusis, caule filiformi. *Hort.*
cliff. 68. ♀

Convolvuli minimi species bisnagarica hirsuta, alines
folio. *Pluk. alm.* 116. *t.* 9. *f.* 1.

Anagallis hirsuta minor, foliis alternis, floribus solitariis.
Burm. zeyl. 11. *t.* 6. *f.* 1. ♂

Vistnu-clandi. Rheed. mal. 11. *p.* 131. *t.* 64. *hirsuta procumbens* *1* *spud.* *Vistnu-zyl*
Habitat in Malabar, Zeylona, Bisnagaria, Bahama. *fl. Vistnu pilosa subeffil.*

Varietas habitu lini: caulis, panicula, foliis lanceola- *ad 2* *spurc.*
tis sericeis, hujus forte sola varietas. *ppos. alto et caeruleo varietate. Nobis dic. vello*
rtto. style. 4. stam. 5. calyxphyll. cap. 2. rad. 3. cul. 2. 3. per. trop.

20. CONVOLVULUS foliis linearis-cuneiformibus tri-
cuspidatis: basi dilatata dentatis, pedunculis unifloris. *tridentatus.* *Vistnu*
Sendera-clandi-hirs.

Convolvulus minor procumbens, acetosellæ foliis tri-
cuspidatis ad imum quaternis: summo apice tricuspi-
datis. *Pluk. mant.* 117. *t.* 167. *f.* 5.

Sendera-Clandi. Kheed. mal. 11. *p.* 133. *t.* 65. ? *fol. carnos. endr.*

β. Convolvulus indicus barbatus minor: foliorum apicibus *2* *dent. subeffil.* *apic. tenuato* *3* *dent.*
lunulatis. Pluk. alm. 117. *t.* 276. *f.* 6. *fl. 3* *dent. alto flav. canti pum*

Habitat in India. *fl. 2* *dent. cap. 2. fl. 4 sp. 1. lig. ruga.*

21. CONVOLVULUS foliis lanceolatis obtusis sericeis, *Cneorum* *alt. Dalech*
pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 68. *Roy. lugdb.* *Doryandrum* *Impres. clav.*
429. Sauv. monsp. 56.

Convolvulus major rectus creticus argenteus. *Moris.* *Convolvulus* *alp. 54.*
hist. 2. *p.* 11. *s.* 1. *t.* 3. *f.* 1.

Cneorum album, folio oleæ argenteo molli. *Bauh. pin.*
463.

β. Convolvulus serpens maritimus spicæfolius. *Triumf.*
obs. 91. t. 91. f. 2.

Convolvulus saxatilis erectus villosus perennis. *Barr. rar.*
4. t. 470. Bocc. mus. 2. *p.* 79. *t.* 70

*Somnium 7. 100m h. m. 112. 61. magnus in arenarij. caule veltri.
foli. cord. angustif. veltri. long. petiol. flor. cor. imb. foli. ann. 15 ad 20. stigmine
pyram. dentes Cap. glab. emargin. 9. lind. 3. 6. 3/1. Ann. 3. gynaecid. flava.*

158 PENTANDRIA MONOGYNIA.

2. *Dorycnium. Alp. exot. 74. t. 73.*

*Habitat in Hispaniae, Italiæ, Siciliæ, Cretæ maritimis
campestribus. 2.*

uent. • Cantabrica 22. CONVOLVULUS foliis linear-lanceolatis acutis
? cantabrica. Min. Haas. cl. 68. Sauv. monsp. 56. caule ramofo recto, pedunculis bifloris. *Hort. cliff.*

Convolvulus minimus spicæfolius. Moris. hist. 2. p.

17. f. 1. t. 4. f. 3.

Convolvulus linariæ folio. Bauh. pin. 295.

Cantabrica quorundam. Clus. hist. 2. p. 49.

Habitat in Italia, Sicilia, Narbona, Verona.

spithameus. 23. CONVOLVULUS foliis cordatis pubescentibus,
caule recto, pedunculis unifloris.

Convolvulus spithameus, caule recto, foliis subrotun-

dis. Gron. virg. 141.

Habitat in Virginia.

persicus. 24 CONVOLVULUS foliis ovalibus tomentosis, pe-

dunculis unifloris. *Aman. acad. 2. p. 341. **

Habitat in Persia, ad maris Caspici littus. 2.

tricolor. Convolvulus. ad. 212 caule declinato, floribus solitariis. *Vir. cliff. 19. Roy.*

lagdb. 428. Convolvulus. hist. 2. p. 49. Convolvulus foliis lanceolato-ovatis nudis, caule recto,

floribus solitariis. *Hort. cliff. 68. Hort. ups. 38.*

Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo. Bauh.

pin. 295. flore triplici colore insignito. Moris. hist.

2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 4.

Habitat in Africa, Mauritania, Hispania, Sicilia. ②

repens. 26. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice obtusis,
caule repente, pedunculis unifloris.

Convolvulus lactescens, foliis sagittatis, radice longa alba

perenni. Gron. virg. 141.

Convolvulus marinus catharticus, foliis acetosæ, flore

niveo. Plum. amer. 89. t. 105.

Habitat in Americæ maritimis. 2.

reptans. Ballel. h. an. 27. *CONVOLVULUS* foliis hastato-lanceolatis: auri-

culis rotundatis, caule repente, pedunculis unifloris.

Ballel. Rheed. mal. II. p. 107. t. 52. Zakkari valli-Bon.

Habitat in Indiæ aquori.

Planta ex minoribus. Caulis filiformis, nec volubilis.

enervis radiculis erubet.

Folia

vardes du convolvus

marit. syl.

*Convolvulus foliis. ut agmina obtusa evagin. balaustre
motu kol. rur. raw. undulata. Rawolf. ? Vgl. mandragora oldhamia*

Pentandria

luteata crassa

Folia lanceolata, basi

tusa, glabra, angu-

sis insidentia. Pedu-

tundatus. ap. glb. 36.

CONVOLVUL-

vilosus, caule peti-

foris.

Convolvulus foliis c

angustis rotundatis

cliff. 496. ? Roy. li-

Habitat in India. Osba-

Planta non magna, m-

is pilis flavescentib-

ris: primaria, cor-

ndata; floribus proxi-

bilis longiores, florib-

ad singulum pedicell-

o. CONVOLVUL-

unifloris. Hort. cliff.

48.

Solidanella maritima

Bellaria marina. Cord.

Habitat in Anglia, F

CONVOLVUL-

boris. cap. glb. ana.

Convolvulus foliis bil-

oblongis. foliis su-

integris. Roy. lugdb.

Convolvulus maritimi-

diformi. Herm. lugd.

Schovanna-adamboe.

Habitat in India. 2. da-

CONVOLVUL-

tifloris.

Convolvulus marinus

purpureo. Plum. am-

Convolvulus marinus f

bras. 51. Pis. bras.

Habitat in Brasiliæ, D

IP

** Flor*

POMOEA foliis pi-

{ Bel ad ambo valli. h. m. u. 2. 58. Bandaga valli. Bram. Cawas. alt. 500. Denat. fl. cordata.
epid. acent. caulis ex rad. rad. fl. corymb. pedunc. 3 ad 5 flor. fl. candida. Capit. oval. minu-
scula 4. minima laevata. ? cawas in flore alto qui patens rotundata dicitur et quia rubra.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

159

lactata crassa.
Folia lanceolata, basi auricula utrinque recurvata, ob-
tusa, glabra, angusta, acuminata, petiolis brevissimi longi-
mis insidentia. Pedunculi breves uniflori. Calyx ro-
tundatus. cap. glob. 3 ad 4 emend. al. uti Denat. pp. 159.

28. CONVOLVULUS foliis cordatis subhaftatisque *birtus*.
villoso, caule petiolisque pilosus, pedunculis multi-
floris.

Convolvulus foliis cordato-hastatis glabris acuminatis
angustis rotundatis, caule petiolisque villoso. *Hort.*
cliff. 496. ? *Roy.* *lugdb.* 429.

Habitat in India. Osbeck.

Planta non magna, minus volubilis. Pedunculi & Cau-
lis pilis flavescentibus exstantibus *birti*. Folia parum
villosa: primaria, cordato-subrotunda; secundaria proprie
cordata; floribus proxima sèpe hastata. Pedunculi nudi,
foliis longiores, floribus alternis pedicellatis, involucris
ad singulum pedicellum minimis, lanceolatis.

29. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis *Soldanella* gen. 212
unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Mat. med.* 81. *Roy. lugdb.* *Brassica marina* gal. 212.
428.

Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295.

Brassica marina. *Cord. hist.* 205.

Habitat in Anglia, Frisiae littoribus maris.

30. CONVOLVULUS foliis bilobis, pedunculis uni- *Convolutus. ad*
floris. cap. glob. crassa. s. m. peti. bruni, obtusa. *Pes capra. • Denat. gal.*

Convolvulus foliis bilobis. *Fl. zeyl.* 75.

Convolvulus foliis subrotundis apice emarginatis basi
integris. *Roy. lugdb.* 428.

Convolvulus maritimus zeylanicus, folio crasso cor-
diformi. *Herm. lugdb.* 174. t. 175.

Schovanna-adambœ. *Rheed. mal.* II. p. 117. t. 57. *Bandaga valli. Bram.*
Habitat in India. *Dawn. Cather. Roy.* 57. 159. fl. cull. Denat. *Sgl. vulg. pl. tuberculata*
apiculata *caerulea* *herba* *inarenosa* *rotundata* *sapida*.

31. CONVOLVULUS foliis emarginatis, pedunculis *brasiliensis.*

Convolvulus marinus catharticus, folio rotundo, flore
purpureo. *Plum. amer.* 89. t. 104.

Convolvulus marinus f. *Soldanella brasiliensis.* *Marcgr.*
bras. 51. *Pis. bras.* 258. *Pararo. Bras.*

Habitat in Brasiliæ, Domingo maritimis.

IPOMOE A.

* *Floribus sparsis*

1. IPOMOE A foliis pinnatifidis linearibus, floribus fo- *Convolutus. ad*
lita- *Quamoclit.*

PENTANDR

160 PENTANDRIA MONOGYNIA.

*flor. corymb. and. 100. pedunc. annul. ad 2 flori flippini. tubby.**litariis. Hort. cliff. 60. Hort. upf. 39. Fl. zeyl. 77.**Roy. lugdb. 430. cap. 46. t. 41. San 32. n. nigr.**Quamoclit s. Jasminum americanum. Clus. posth. 9.**Convolvulus pennatus exoticus rarer. Col. aquat. 73. t.**Etoile 3 Narrene.
gazon.**Quamoclit p. temerit. in iug. exponit.**72.**Jasminum millefolii folio. Bauh. pin. 398.**Habitat in India. ○ Banga Zali. Pl. 5. t. 155. f. 1.**Zjuria crantz. h. m. 117. 60.**2. IPOMOEAE foliis pinnatifidis sinuatis acutis.**Duranta ad. 200.**carolina.**Habitat in Virginia. D. Gronovius.**3. IPOMOEAE foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris.**Convolvulus minor pentaphyllos, flore purpureo minore. Gatesb. car. 2. p. 9. t. 91.**Habitat in Carolina.**4. IPOMOEAE foliis cordatis acuminatis: basi angulatis, pedunculis multifloris. Hort. upf. 39.**212 Ipomoea foliis cordatis acuminatis vix dentatis. Hort. cliff. 66. Roy. lugdb. 429.**Ipomoea foliis cordatis integerrimis, limbo floris quinquefido. Sauv. meth. 114.**Quamoclit americana, folio hederæ, flore coccineo.**Comm. rar. 21. t. 21.**Convolvulus coccineus, folio anguloso. Plum. amer. 89. t. 103. Raj. suppl. 380.**Habitat in Domingo. ○**5. IPOMOEAE foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis integerrimis. Hort. upf. 39.**Convolvulus major heptaphyllus, flore sulphureo odorato. Sloan. jam. 55. hist. 1. p. 152. t. 96. f. 2.**Convolvulus americanus, manduccæ multifido folio, heptaphyllos, flore albo fundo purpureo, radice tuberosa, cortice albo. Pluk. alm. 116. t. 276. f. 5.**Habitat in Jamaica. 5**Convolvulus. ad**tuberosa.**6. IPOMOEAE foliis cordatis, pedunculis multifloris, perianthio exteriore orbiculari, corollis campanulatis lobatis.**Adamboe Rheed. mal. 11. p. 115. t. 56. Argia vallis in H. Habitat in India. v. 111. cap. 1. sub 16.**Corolla crassior; quam in reliquis; sub Perianthio quinquepartito, aliud perianthium minus orbiculatum in**tegerrimum. folio ex petiolis aplo. valde incrassata.**tubulosa. utrinque glabra. odore purpureo.**flor. cymbarill. pedunc. lata. 4 flor.**caroll. cayenn. eti. Batatas gen. ipomoea**magni pinni, petiol. rotundato valde incrassato**cap. 46. mandib. 1. p. 110. 3 ad 4 flor. 3 ad 44**flor. 4 erigera. Ogni p. 100 argenteis ultra**7. IPO-*** Flo-**IPOMOEAE foliis**zeyl. 79.**Convolvulus indicus**flore cæruleo. Hern**prod. 327.**Habitat in Zeylona.*