



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

## PENTANDRIA MONOGYNIA. 181

*Habitat in Peru. ○*

Differt a secunda Caule teneriore, altiore, paniculato.

Corollis angustioribus: limbo brevissimo, obtusissimo,  
tubo longo clavato; calycibus capsulisque acutis.

4. NICOTIANA foliis cordatis, corollis racemosis *glutinosa*.  
subringentibus, calycibus inæqualibus.

*Habitat in Peru. D. B. Jussieu. ○*Folia magis cordata; *glutinosa*. Flores in racemos paucos, longos. Corollæ ferme speciei primæ, sed magis inæquales & fere ringentes fauce hiantes. Stamina ad latus superius inflexa. Calycis una lacinia reliquis duplo major.

*Strobiles l. b. c. 2. caerulei nigrum nodulos intem fantes  
mandragora. Utriculus nigrae vacuatus sanguineus. Cibis atropo. 1. lin.*

## MANDRAGORA.

*Nicotiana ad*  
*214*

1. MANDRAGORA Hort. cliff. 51. Roy. lugdb. 423. officinarum. +  
Mat. med. 88.

Mandragora fructu rotundo. Baub. pin. 169.

Mandragoras. Dod. pempt. 457.

*Habitat in Hispaniæ, Italiæ, Cretæ, Cycladum apricis.**Solanum ad. 218*

1. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris.  
Atropa. Hort. cliff. 57. Hort. upf. 45. Roy. lugdb. 423.  
Solanum melanocerasus. Baub. pin. 166, evan. dipes ined. pauc. 169. Solanum lethale. Clas. hist. 2. p. 86.

*Habitat in Austriæ, Angliæ montibus sylvosis. 2 spes. Ad altiora virg. itaq. sed pubes.**Radix tuberosa, lateribus subplana. foliis alterna. petiolis obtuse sinuata. Cal. tubul. lob. 5. foliis. subirregulari. Etiam inq. bell. tub. pericard.*

2. ATROPA foliis sinuato-angulatis, calycibus clausis a- physalodes.  
cutangulis.

Alkekengi amplio flore violaceo. Few. peruv. 724. t. 16.

*Habitat in Peru. D. B. Jussieu. ○*

Radix fibrosa, annua. Caulis bipedalis, patulus, erectus, ramis angulatis. Folia alterna, glabra, oblonga, per petiolum decurrentia, obtuse sinuata (Daturæ). Pedunculi ad latus petiolorum solitarii, nudi, uniflori. Calyx ovatus, basi excisus, angulis quinque compressis, profunde 5 partitus: foliolis sagittato-ovatis. Corolla campanulata, parum quinqueloba, obtusa, Limbo erecto, subfusca, cæruleo-purpurea. Stigma 5, subulata, basi dilata- ta, subvillosa, corolla longe breviora, superne divergentia. Antheræ erectæ. Germen intra basin staminum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma

*Belladonna ad. 219.**Mandragora. Utriculus gal.**Bella donna. evan. 169.**pedunculus rotundus. 169.**Nicandra ad.**consp. c. 219.*

*Neladone manifolia* fl. violaceo-purpurea h. 1.20. Q. hirsutula 2 ad 2 p. subtilis.  
foliata - rosula albita altero latere bractea petiol. ap. subalata hisp. Cauda 7-8  
fl. glob. velutina. Petala 4-5. bracteol. petiol. & 3 bracts. Calyx 1. Corolla linearis 2.  
staminea long. over 1.5 gram. Flores 5-6. callo. in constricta capitea subtilis  
*Neudorfia ad.* 219. *Neudorffia carica*. 182 PENTANDRIA MONOGYNIA.  
*Nolana hirsuta* in 5. sericea officinalis hirsute long. ovarium. glob. 2 bract. 2 p. hirsute et  
staminea long. ad Brachiat. acut. vel verbena.

# PENTANDRIA MONOGYNIA.

*inseq. ad Bongardia acut. vel Verbena.*  
capitatum. Fructus cernuus, tectus calyce majore,  
quinquangulari angulis compressis arcte clausis, basi  
mucronatis. Bacca exsucca, 3. 4. s. 5-locularis; se-  
mina subrotunda, compressa. Media inter Atropam &  
Phygalidem; a Physalide differt figura corollæ, stami-  
nibus distantibus, calyce quinquepartito, capsula locu-  
lamentis pluribus.

*frutescens*. 3. ATROPA caule fruticoso.  
*alkekengi*. ad. 218 Bella-donna frutescens rotundifolia hispanica. Tournef.  
inst. 77. Barr. ic. 1173.  
*Habitat in Hispania.*  $\S$   
*Habitus & omnia Physalidis somnifera, ut limites generum in solo calyce consistant.*

Strychnos. Theophr. L. c. 12. duo genera sunt.  
 1<sup>a</sup> sp. Radice recente estrofia alta PHYSALIS. rizoma vero subracem  
 hirtis rubens quam corus. folium tetragonum tan malo villa minus  
 nascitur in rizibus et ad levigatum. Radix 3 cortex multum secta in  
 alkekengi. ad. 218 fructu clivis vix pene in fructu excepta corona indebet.  
 somnifera. X i. PHYSALIS caule fruticolo, ramis rectis, floribus  
 confertis. alkekengi fructu parvo verticillato. T. 151.  
 1. διπλιον. 1. διπλαιον.  
 1. δερπυδιον grise 1. δερπυδιον grise  
 καττιας) Solanum somniferum verticillatum. Baub. pin. 166.  
 απόλινον μικρον Solanum somniferum. Clus. hist. 2. p. 85.  
 Cacabu. apix. Habitat in Mexico, Creta, Hispania, &c.  
 Fructus Physalidis; Flos Atropæ; Herba præcedentis, cui  
 ita similis, ut vix genere separari queat.

~~falso. Semis. alondjum art.~~ 2. PHYSALIS caule fruticoso, ramis flexuosis, floribus confertis.

confertis.

Pevetti. ad. 44<sup>b</sup> Baccifera indica, floribus ad foliorum exortus, fructu sulcato decapyreno. Raj. hist. 1632.

cuh. un. arboreal. ind.  
fol. opp. cordine parallel  
nervis angustis. flor plurimis  
cal. ceras. Epit. cal perrot  
minim. sub fructu non  
valvularius nec includens  
fructu. Rara logia magis  
20 lvs. 20 pum. ~~Solanifida~~ ~~Physalis~~  
9 tot. coel. 10 porta Curaçavica.

Pevetti. Rheed. mal. 4. p. 113. t. 55.

Habitat in India. 5

Habitus & statura P. somniferæ; Flores itidem sparsi  
ad axillas foliorum; Calyces etjam enascuntur & in-  
volvunt baccam; Manifeste vero difert floribus mino-  
ribus, ramis bifariam valde flexuosis, hinc folia quasi  
distiche disposita, flexuræ angulis exterioribus inserta.

3. PHYSALIS caule fruticoso, foliis ovatis tomentosis.

*curassavica.* 3. *PHYSALIS* caule fruticoso, foliis ovatis tomentosis.  
*ulticona.* *Vir. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 426.  
*alketungia.* *Physalis* caule perenni, foliis ovatis solitariis, ramis an-  
 notinis simplicissimis. *Hort. cliff.* 62. \*  
*Solanum vesicarium curassavicum*, solano antiquorum  
 simile, foliis origani subincanis, *Moris. hist.* 3. p. 527.  
*Pluk. alm.* 352. t. III. f. 5.  
*Habitat in Curaffao.* 5

PENTANDRIA MONOGYNIA.

183

4. PHYSALIS foliis cordatis integerrimis obtusis scabris, viscosa. • 218  
corollis glabris.

Physalis radice perenni, foliis cordatis obtusis. Hort. cliff. 496. Roy. lugdb. 426 Gron. virg. 24.

Alkekengi bonariense repens, bacca turbinata viscosa.

Dill. elth. 11. t. 10. f. 10.

Habitat in Virginia, Bonaria. 2

alkekengi ad.

218

Opsago. Romanus

5. PHYSALIS foliis geminis.

Physalis caule simplici annuo, foliis integerrimis geminatis, floribus solitariis. Hort. cliff. 62. Hort. ups. 49. Mat. med. 93. Dalib. paris. 73.

Physalis radice perenni, foliis lanceolato-cordatis. Vir. cliff. 16. Roy. lugdb. 426.

Solanum vesicarium. Baub. pin. 166. Dod. pempt. 454. ~~do~~ drucki. <sup>do</sup> 785.

Habitat in Italia. 2

alkekengi ad

Alkekengi. Lonic

halicacabum

axiatafov. thym

physalis. do

putatus. do

Vaccaria. Coni

Saujo. do

drucki. do

6. PHYSALIS ramosissima, ramis angulatis glabris. ~~fl. angulata~~ alkekengi

Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, foliis dentato-ferratis. Hort. cliff. 62. Hort. ups. 50. Fl. zeyl. 97. Roy. lugdb. 427.

Halicacabum s. Solanum indicum. Comm. ~~hort~~ i. p. 70. t. 17.

Solanum vesicarium indicum. Baub. pin. 166.

Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. Dill. elth. 13. t. 12. f. 12. nota modicu. h. m. 10<sup>2</sup>. 70. Zera puti. Drun.

- β. Alkekengi indicum glabrum, capsicii folio. Dill. elth. 12. t. 11. f. 11.

Habitat in India utraque. ◎

7. PHYSALIS ramosissima, foliis villoso-viscosis, pedunculis nutantibns.

Physalis annua ramosissima, ramis teretibus pubescentibus: geniculis nodosis. Hort. cliff. 62.

Alkekengi virginianum, fructu luteo. Fewill. peruv. 3. p. 5. t. 1.

Solanum vesicarium virginianum procumbens annum, folio lanuginoso. Moris. hist. 3. p. 527. f. 13. t. 3. f. 24.

Habitat in India utraque. ◎ Boca dulcis regia alkekengi ind.

Fructus villoso-viscosus, nec glaber; maculae corollæ fuscae, nec pallidæ. Pedunculi nutantes, nec cernui.

8. PHYSALIS ramosissima, pedunculis fructiferis folio minima. • <sup>longioribus</sup> 291 min.

longioribus. Hort. cliff. 62. Roy. lugdb. 427.

See nota inodore.

So-alkekengi ad



*Pycnosoma* Dill. L. 4 C. 169. *Sida* Eruca *zeylana*, opera chassodactylus  
aniorum caulis agerum. *Sida* *ociani*. Semen membranaceum.  
*Pratense*. *Sida* nigra rotunda pallida maliparis magnitudo  
terram oleum in petros valuit.

**PENTANDRIA MONOGYNIA.**

*J. drosera* *lemonia* *pta* *somniferum* *multistylis* *fructu* *radix* 185  
*alvum* *solst* *2* *dream* *pare*. *folia* *artemisia* *cylindrum* *tectorum* *druidae*  
Etu medio quasi fissi. *Pluk. alm.* 349. t. III. f. 4.  
mala.

Habitat in America? 5

5. **SOLANUM** caule inermi frutescente flexuoso, foliis *Dulcamara*. May. 200  
superioribus hastatis, racemis cymosis. *Hort. cliff.* 60. *Fl. suec.* 189: *Mat. med.* 95. *Roy. lugdb.* 424. *Dalib.*  
*paris.* 73. *Solanum scandens* f. *Dulcamara*. *Bauh. pin.* 167. *Salicottum* *Stingil*  
*B. Solanum dulcamarum* africanum, foliis crassis hirsutis. *Yuxentrop.* *Zhal*  
*Dill. elth.* 365. t. 273. f. 352. *Flor. caerulea* *corolla* *longa* *tearier* *staminum* *distincta*.  
*Habitat* *in* *Europæ* *sepibus* *humantibus*. *h* 15. *stet* *flor.*  
*accutum* *armatum* *deciduum* *caeruleum* *caeruleum* *caeruleum* *caeruleum* *caeruleum* *caeruleum*  
6. **SOLANUM** caule inermi frutescente flexuoso, foliis *quercifolium*.  
oblongis lateribus sinuatis, racemis cymosis.  
*Solanum* foliis quernis. *Few. peruv.* 722. t. 15.  
Habitat in Peru. *D. Jussieu.* 5  
*Habitus S. Dulcamarae*; Rami angulati. Folia ovato-  
oblonga, in petiolum decurrentia, venosa, glabra, late-  
ribus pinnato-sinuata. Pedunculi ramosi. Corollæ vio-  
laceæ, obtusiores quam *Dulcamarae*; maculis duabus pal-  
lidis ad basin singuli lobi. Antheræ flavæ, stylo breviores.
7. **SOLANUM** caule frutescente *subinermi*, foliis cu- *bonariense*.  
neiformibus sinuato-repandis. *Solanum* 218  
*Solanum bonariense* arboreseens, papas floribus. *Dill.*  
*elth.* 364. t. 272. f. 351.  
*Habitat* *in* *agro* *Bonariensi*. *h* *flous* *albi* *pav* 35. *latit. 5. Sud.*  
*Folia* & *Flores* *maximi*, *Aculei* aliquot in tenella planta,  
non vero in adulta. *na* *geli* *que* *julquam* *vaires* *qui* *out* *reponelle*  
*en mai* *comme* *celli*; *de* *figier*, *pav* 0 16. *de* *des* *deut* *hiver* *de* *1786* *a* *1789*.
8. **SOLANUM** caule inermi herbaceo, foliis pinnatis in- *tuberosum*. *Tartufolo. Ital.*  
tegerrimis. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 60. *Hort. ups.* *Papas. aust. Scov.*  
48. *Roy. lugdb.* 423. *Dalib. paris.* 73. *opinawak* *Odinawit.*  
*Solanum tuberosum* esculentum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* *Piescony. dicta* *Cortex*  
89. t. 89. *mala*. *stachidina* *Thesiph. chy.*  
*Habitat* *in* *Peru*. ○ -- 2  
*chunno* *panca* *acari*  
i.e. *abruptum* *gracile* *bauer* *panca*  
9. **SOLANUM** caule inermi herbaceo, foliis pinnatis in- *Lycopersicum* *gelen*.  
cisis, racemis simplicibus. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* *Poma amoris. gal. 20*  
60. *Roy. lugdb.* 423. *Solanum pomiferum*, fructu rotundo striato molli.  
*Bauh. pin.* 167. *Zanatta*. *Pannus amoris* *Rytms* 2. 154.  
*Poma amoris*. *Cam. epit.* 821.  
*B. Solanum racemosum* cerasorum forma. *Bauh. pin.* 167. *Tomatilla* *americana* *rot.*  
*prodr.* 90. *Zanatta*. *h. pin* 103.  
*Habitat* *in* *America calidiore*. ○. B 4 *cruda* *fruta* *eten* *Lycopersicon* 218  
*solent*, *aleni* *plumbea* *coquuntur* *perates*. M 3  
10. SO- *Lycopersicon* 218  
*lycantha* *lutea*

*Melantria* *Solanum pomiferum fructu inerme* A.A. 157.  
*Melongena* *and* *fruct. cerasus, flava vel purpurea.*  
*Bedangiam* *Rauw.*

186 PENTANDRIA MONOGYNIA.

*peruvianum*. 10. *SOLANUM* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis bipartitis reflexis, baccis subpilosis.

*Lycopersicon ad 218* *Lycopersicon pimpinellæ folio. Few. peruv. 3. p. 37.*

*t. 25.*

*Habitat in Peru. D. Jussieu. 2*

*montanum*. 11. *SOLANUM* caule inermi herbaceo, foliis subcordatis repandis.

*Solanum tuberosum minus, atriplicis folio, vulgo Pa-*

*yava morsa. hisp. matth. Habitat in Peru. 2*

*ad aliis egypt.*

*X Solanum nigrum. 12. SOLANUM* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus.

*Strumaria Roman. Solanum vulgare. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis.*

*cucullus offic. ang. Vir. cliff. 15. Hort. cliff. 60. Hort. ups. 48. Fl. suec.*

*campanula Roman. 188. Mat. med. 94. Gron. virg. 24. Roy. lugdb. 433.*

*Cordifolium Roman. Konka et Turkja jajina. Dalib. paris. 72.*

*Kona subsp. vulg. Solanum officinarum. Bauh. pin. 166.*

*patulum. B — ramis teretibus glabris, foliis integerrimis glabris.*

*Solanum procerius patulum vulgaris fructu. Dill. elth.*

*367. t. 275. f. 355.*

*villosum. Y — ramis teretibus villoso, foliis angulatis subvilloso.*

*Scubulum? Roman. Solanum annum hirsutius, baccis luteis. Dill. elth.*

*caeruleum? Roman. 366. t. 274. f. 353, Nelen Guadalupe 102.72.*

*guineense. J — ramis angulatis dentatis, foliis integerrimis glabris.*

*Solanum guineense, fructu magno instar cerasi. Dill.*

*elth. 366. t. 274. f. 354.*

*virginicum E — ramis angulatis dentatis, foliis repandis glabris.*

*asturum. apis Solanum nigrum vulgari simile, caulibus exasperatis. Dill.*

*elth. 368, t. 275. f. 256.*

*judaicum. Z — ramis aculeis incurvis, foliis repandis nudis.*

*Habitat in Orbis totius cultis. ○*

*Tot varietates B. Y. J. E. Z. videntur esse hybrida pro-*

*les.*

*+ Solanum ad 218. S. Spinosa. caule quadrigynum.*

*macumba Cognihi. fl. Galba.*

*Tongu angolana. Melongena. Solanum caule aculeato fructu inerme*

*nila Barudana. Ann. 102.74. Vacuna Brani. Solanum calycibus aculeatis, foliis ovatis integerrimis to-*

*mentosis integris, calycibus spinosis.*

*Solanum calycibus aculeatis, foliis ovatis integerrimis to-*

*mentosis. Hort. cliff. 61. Hort. ups. 49. Fl. zeyl.*

*93. Roy. lugdb. 426. melongena fructu inerme*

*Solanum pomiferum, fructu oblongo. Bauh. pin. 167.*

*Mala insana. Dod. pempt. 458. rong — Rupes.*

*Habitat in Asia, Africa, America. ○*

*Arachnura tom. 2. 2. 35. Chuada. h.m. 2. 2. 37.*

*fructus 4 ped. long. caule fl. spinosus subt. 3 ped. long. exod. fl. melong. mala. firmata*

*fol. dentato angul. melongena submarg. flor. melong. albi. cym. cataph. subt. 3 ped. fl. melong. mala. firmata*

*fructus 4 ped. 1. ped. 2. 2. 35. Non Mala. calcar.*

*flavus glab. 1. ped. 2. 2. 35. fl. melong. mala. firmata*

*1. ped. 2. 2. 35. fl. melong. mala. firmata*

NOGYNIA.  
erbaceo, foliis  
xis, baccis si  
Few. peruv.  
  
baceo, foliis su  
olicis folio, vu  
t. 46.  
  
erbáceo, foliis  
tantibus.  
foliis ovatis an  
dort. upf. 48. l  
24. Roy. lug  
166.  
stegerrimis gla  
ris fructu. Dill  
angulatis subv  
teis. Dill. elth  
75.  
integerrimis gla  
instar cerasi.  
repandis glabri  
bus exasperatis.  
pandis nudis.  
ur esse hybridae

quadriguttata  
eo, foliis ovatis  
s.  
atis integerrimis  
upf. 49. Fl. 2  
~~in aequalibus~~  
Bauh. pin. 10  
Rugosa  
2-4 ft  
ovalis by appon  
on volutio  
2.37.  
pink  
finete 14. 50

Santy. Rumph. 6. 7. 26. f. 2. cù le Solane rigorously climite.  
caule aculeato. foliis

Solanum & quinque

Linn. 172. Linn. 1884. Solanum frutescens aculeo folio. Daem.

lurepeba. Mery. 1884. Solanum frutescens aculeo folio. Daem.

caule aculeato. Daem.

### PENTANDRIA MONOGYNIA.

sabutus tomentosis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. Fl. zeyl. 95. \* Hort. upf. 49.

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis oblongis pinna-ti-laci-nati-s, spinis supini sere-tis, pronis recurvis. Hort. cliff. 61. Vir. cliff. 15. Roy. lugdb. 424.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans, borraginis flore, foliis profunde laciniati. Herm. lugdb. 573. t. 575. Moris. hist. 3. p. 521. f. 13. t. 1. f. 15. Pluk. alm. 251. t. 226. f. 5.

Habitat in Africa. 5

1000 *infanum.* 20. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis repandis, calycibus aculeatis. Roy. lugdb. 425.

*in infanum 30.* Solanum spinosum incanum, foliis sinuatis, flore boraginis, fructu luteo ovuli gallinacei magnitudine & forma. Boerb. 2. p. 68.

Habitat - - -

tomentosum. 21. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis cordatis villofis margine repandis, calycibus inermibus. Hort. cliff. 61. Roy. lugdb. 425.

Solanum pomiferum frutescens, flore boraginis, folio tomentoso incano, solo caule spinoso. Boerb. lugdb. 2. p. 69.

Habitat in America septentrionali.

*bahamense.* 22. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis lan-

*Solanum ad. 218* ceolatis angulo-so-dentatis. Hort. cliff. 61. Roy. lugdb.

424.

Solanum bahamense spinosum, petalis angustis reflexis. Dill. elth. 263. t. 271. f. 250.

Solanum spiniferum frutescens, spinis igneis, americanum. Pluk. alm. 350. t. 225. f. 5.

Habitat in America insula Providentia. 5

*lobatum.* 23. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis subtri-

lobis glabris obtusis inermibus.

Habitat in India.

Caulis subfrutescens. Folia parva, glabra, obtusa, subtri-loba, raro etiam ad basin lobata. Aculei reflexi in caule, petiolis, pedunculis. Pedunculi uniflori; Calyces minimi, inermes. Stylus ascendens. Figura proxime accedit ad. Pluk. tab. 316. f. 5.

### CAPSICUM.

#### *Capsicum ad 218.*

annuum. 1. CAPSICUM caule herbaceo. Roy. lugdb. 426.

*Quina aquatica* 3g. ex gaudrone fructu cyl. 1. p. 22. hys 36m. drun eructi rubri. Cap. 2. Quina curvata. 3. Quina major paulo ex totundis rubra. Quina curvata. 4. Quina major 2 p. 22. hys 1 p. 22. lati. foliis angustioribus. Quina curvata. fructus coroll. mag. 1. rot. rubri.

Gomme alia sp. in Camelle. c. 1000  
Gomme alia sp. in Camelle. c. 1000  
Pentandria. caps. fructus c.  
Pentandria. caps. fructus c.  
Pentandria. caps. fructus c.  
PENTANDRIA

Capsicum annum. Ho

22. Mat. med.

Piper indicum vulgatiss.

Vallia-capo-molago. RH

Habitat in America me-

ritate laut. 10. galactu-

CAPSICUM caule fi-

spicium frutescens. H

Capo-molago. Rheed.

Habitat in India. 5

Altri Paesi cit. spic.

STR

STRYCHNOS foliis

11. Mat. med. 77. f.

Strychnos foliis quinque

Nix Vomica officinaru-

114. Colubrina ligni tertium g

Chiram. Rheed. mal. 1.

Habitat in India. 5

115. Senna velutina

116. Senna mettii

STRYCHNOS foliis o

Mat. med. 78. Amox

tonos foliis trinerviis

Nematis indica spinosa,

Fructus orbicularis major

Modica-caniram. Rheed.

116. Habitat in India. 5

CH

CHRONIA herbacea

co-carinatis. Fl. zeyl.

Chronia foliis lanceolati

Lymachia folio sinuato

culo amplo, calyce ca

117. Habitat in Zeylona. 5

CHRONIA herbacea,

14. Roy. lugdb. 433.

Capitio affinis, lini faci

175. t. 90.

Habitat in Capitis b. Spe

# MONOGYNIA

*Yomica* <sup>alia nom.</sup> *sin Camellie*, fol. opp. *Varianus*  
stip. 2 caud. capite. fructus citre magnificus.  
Semina subglob. angul. ? / perh. Randia.  
*Yomica* ad. 147. *Caribbe. et mordax.*  
*Yomica* <sup>ad. 147.</sup> *Caribbe. et mordax.*  
*Yomica* <sup>ad. 147.</sup> *Caribbe. et mordax.*  
*Yomica* <sup>ad. 147.</sup> *Caribbe. et mordax.*

PENTANDRIÆ MONOGYNIA.

- Capsicum annum. Hort. cliff. 59. Hort. upf. 47. Fl. capsicum fruct. Aug. 16  
 capsicum vulgaris. Repandens. L. 152.  
 zeyl. 92. Mat. med. 90. capsicum aduncum  
 Piper indicum vulgatissimum. Bauh. pin. 132.  
 Vallia-capo-molago. Rheed. mal. 2. p. t. 35. Chile. Rumph. 5 T. 446.  
 Habitat in America meridionali. ♂ fructus vel radix tita ex morte canis rabi  
 impedita levat. fol. & alant. longipetiol. fl. solit. fruct. ovat. obt. magni penduli.  
 CAPSICUM caule fruticoso. Roy. lugdb. 426.  
 Capsicum frutescens? Hort. cliff. 59. frutescens.  
 Capo-molago. Rheed. mal. 2. p. 109. t. 56.  
 Habitat in India. ♂ superter 3 ped. fruct. ovat. aeneo.  
 fl. solit. folia cil. 1. petiolata. rubra. erecta.

~~STRYCHNOS.~~ et nomen grec. Solani. Dose. Hippocr.

1. STRYCHNOS foliis ovatis, caule inermi. Fl. zeyl. Genipa ad. 147.  
 91. Mat. med. 77. *Hande corymbri.* Nux vomica. Codi. Dakeh.  
 Strychnos foliis quinquenerviis. Wach. ultr. 32. ? cattchula. Tur. Rass.  
 Nux Vomica officinarum. Baub. pin. 511. Raj. hist. caniram.  
 1814. metella. matth. hae. Linn.  
 Colubrini ligni tertium genus in malabar. Baub. pin. 301. Lycium colubrinum  
 Caniram. Rheed. mal. I. p. 67. t. 37. Raj. hist. 1661. Duguetia sp. Hippomanes. v. t. c. B.  
 Habitat in India.  $\S$  fol. opp. ex doride facie du Sauvage et Cambodj. actio magna cal. ovatis iaud.  
 amarantina. Semina velutina perspicuum sanguineum. Seminifera et in fructuosa. Genipa spicata.  
 2. STRYCHNOS foliis ovatis acutis, cirrhis simplicibus. colubrina.  
 Mat. med. 78, Amoen. acad. 2. p. 119. modira canina Linn.

Strichnos foliis trinerviis ovatis binatis. Wach. ultr. 32.  
 Clematis indica spinosa, foliis luteis. Baub. pin. 301.  
 Fructus orbicularis major fuscus striatus. Baub. pin. 405.  
 Modira-caniram. Rheed. mal. 8 p. 47. ~~24~~ Raj. hist.

~~CHIRONIA~~. *et nonne alia plantarum Cisti partibus.*

1. CHIRONIA herbacea, calycinis foliolis membrana-<sup>trinervia</sup>,  
ceo-carinatis. Fl. zeyl. 90. \*

Chironia foliis lanceolatis trinerviis. Hort. cliff. 54.

Lysimachia folio sinuato acuminato trinervio, flore cæ-  
ruleo amplo, calyce carinato alato. Burm. zeyl. 145.  
t. 67.

*Habitat in Zeylona.* ○

2. CHIRONIA herbacea, foliis linearibus. Hort. cliff. linoides. •  
54. Roy. lugdb. 433.

Rapuntio affinis, lini facie, capitis b. spei. Breyn. cent.  
175. t. 90.

*Habitat in Capitis b. Spei berbidis.* ♀

*Cauda* *pt.* *g. 2.* *margen* *110.* *ab* *flav.* *longior* *facta* *straminea*  
*vasta* *lata*  
*Dura* *punctigera* *l. ornata* *2. lata* *cusp. mucosa* *2. valvata*  
*prosternat* *extre* *angustata* *infest* *area* *maculata*, *ex* *Brachysoma*  
*utitur* *ad* *capiculas* *piper*, *quae* *sunt*  
*Lappidum* *fructu* *ambato* *minori* *vorax*. *Bracon*. *Mexican* *2. 55*  
*apic. fructu* *ab* *debet*. *Sturm*  
*rot.* *indumento*. *Zorn*  
*Sawato* *obligo*. *Zorn*  
*terre* *commoda* *ordine* *discrepant* *litteris*. *orthographia* *varia*  
*et* *cligem* *que* *est* *conspicua* *Haralambus*. *Rhein* *Natur*  
*et* *optimam* *Brachysoma* *elatocerum* *Bracon*  
Arida Brasil  
Ootam. ad 17<sup>E</sup>

*chara* *maijs* *auct.* *caerulea* *erecta* *racemoso*. *Hort. 101.* *? puer* *caerulea* *? chrysanthemum* *petiolaris*  
*Amomophila* *ad. 528.* *lutea* *folia* *alterna* *malvaceae* *minores* *frutescens* *stellatae* *acuta*  
*Dit. Bras. Mayr. 120* *arb.* *lutea* *fructuosa* *punctata* *lutea* *foli. lpp. int. vasa g. 5. sp. luya. fl. pectinata*

*mulpugia* *ad. 388.* *Lin. 1. n. 314.* *? famili. malpighie. cap. et curvus. cerasus rubra calid. amara purpurea vivida*

*campanulata* *3.* *CHIRONIA* *herbacea*, *foliis sublinearibus*, *calycibus* *longitudine corollæ*.

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Caulis pedalis*, *teres*: *Ramis longis. Folia lanceolato-linearia*, *lævia*. *Flores terminales*, *solitarii rotati*, *purpurei*, *pedunculo longo insidentes*; *calycis foliola* *longitudine corollæ*, *subulata*. *Antheræ spirales*.

*angularis.* *4.* *CHIRONIA* *herbacea*, *caule acutangulo*, *foliis ovatis* *amplexicaulibus*.

*Habitat in Virginia. Kalm.*

*Facies Centaurii minoris.* *Caulis pedalis*, *tetragonus*: *al* *lis membranaceis*. *Folia ovata*, *hyperici*, *opposita*, *ses* *filia* & *semiamplexicaulia*. *Flores congesti*, *ut in Hyperico*; *Antheræ spirales*, *Stylus bifidus*.

*Sabatia* *ad. 503* *dodecandra.* *5.* *CHIRONIA* *floribus duodecemfidis*.

*Gentiana* *floribus duodecim-petalis*, *foliis distinctis. Gron.* *virg. 27.*

*Habitat in Virginia*

*baccifera.* *6.* *CHIRONIA* *frutescens baccifera*.

*Centaurium minus arborescens pulpiferum. Comm. rar.*

*9. t. 9.*

*Centaurium minus africanum arborescens angustifolium.* *Old. afr. 26.*

*Habitat in Æthiopia. 5*

*• frutescens.* *7.* *CHIRONIA* *frutescens capsulifera*.

*Centaurium minus africanum arborescens latifolium*, *flore ruberrimo. Comm. rar. 8. t. 8. Old. afr. 26.*

*Habitat in Æthiopia. 5*

*Sebesten. ad. 177*

*Myxa. Galba*

*Myxaria. Tab.*

*malvata. arab*

*Sebesten. Cypar. Cal*

*Sebesten tray*

*? prunaria. ethiop. 13.*

*Sebesten. Con*

*Vidi. manu. h.m*

*Vidi. manu. h.m*

*Vidi. manu. h.m*

*Sebestena. Lin.*

*Sebesten. ad. 177*

*CORDIA. Lin.*

*1. CORDIA* *foliis subovatis ferrato-dentatis. Hort. cliff.* *83. Mat. med. 171.* *flor. ramea* *lata* *petiolaris* *22.*

*Sebestena sylvestris* & *domestica. Bauh. pin. 446. Alp.*

*Egypt. 30. Vidi. manu. h.m*

*Sebestena domestica f. Myxa. Comm. hort. I. p. 139.*

*t. 79. Vidi. manu. h.m*

*Vidi-maram. Rheed. mal. 4. p. 77. t. 37.*

*Habitat in Egypto, Malabar. 5. sp. ramea alt. cyl*

*petiolaris. virgate petiolaris* *petiolaris* *lata* *lata*

*2. CORDIA* *foliis oblongo ovatis repandis scabris.*

*Sebestena scabra, flore miniato crispo. Dill. elth. 341.*

*& 255. f. 331.*

*Ca-*

*PENTANDRIA*

*Caryophyllus spurius in*  
*dore racemoso hexap*

*136. hift. 2. p. 20.*

*car. 2. p. 91. t. 91.*

*Habitat in America cali*

*CORDIA* *foliis ovatis*

*Ludia nucis juglandis*

*Habitat in America mer*

*Folia exacte ovata, lavi*

*olla tubus longitudin*

*lata apicis flor*

*BRUNS*

*BRUNSFELDIA*

*Brunsfeldia flore albo, fru*

*Habitat in America mer*

*Folia oblonga, obtusa, in*

*spicamorum plures.*

*CES*

*CESTRUM* *floribus se*

*lupuloides foliis pisham*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

19

*Caryophyllus spurius inodorus*, folio subrotundo scabro,  
flore racemoso hexapetaloidē coccineo. *Sloan.* *jam*  
*136. hist. 2. p. 20. t. 164. Raj. suppl. 86. Catesby*  
*car. 2. p. 91. t. 91.*

*Habitat in America calidiore.*

**CORDIA** foliis ovatis integerrimis

Cordia nucis iuglandis folio. Plum. gen. 13?

Habitat in America meridionali.

Folia exacte ovata, levia, in neutra pagina scabra. Co

rollæ tubis longitudine tantum calycis.

*Sebirena*  
glabra. ad 177  
? *Doumenia*.

## BRUNSFELΣΙΑ

# BRUNSFELΣΙΑ.

*Brunsfelsia* flore albo, fructu croceo molli. *Plum. gen.* 12

### *Habitat in America meridionali.*

Folia oblonga, obtusa, integerrima, petiolata; Flores in  
apice ramorum plures.

Brauifolia. ad.  
americana. 209

## ~~CESTRUM~~. Linn. n.

*Syringa laurifolia jamaicensis*, floribus ex flavo pallenscentibus. Pink. alm. 35. t. 64. f. 3.

Parqui. Fewill. peruv. 2. p. 32. t. 32. f. I

Habitat in Jamaica, Chilli.

CESTRUM floribus sessilibus Hort. cliff. 491.  
Leptilon fl. corymb. annl. alb. nocte odorante onuschata hirsuta  
Jasminoides laureolæ folio, flore candido interdù odora  
de præf. specie foli. bellidifol. f. umbell. annl. et ter-  
rito Dill. 186. t. 154. f. 186. pl. corymb. sad. Hort. cliff.  
Laureola sempervirens americana, latioribus foliis, flori-  
bus albis odoratis. Pluk. alm. 209. t. 95. f. 1. Raj.

dendr. 53 cal. ex. prae 5. int. ex. regular. tubo longo brach. 5 fm. flor. 5. bract.  
 25. c. recta tub. subteret. tub. long. Dens lob. exsert. ovula. 2 loculi ligata tenuissim.  
 Hediunda jasmini flore. Fewill. peruv. long. April 25. t. 20. <sup>Mare grat. auct. solvens.</sup>  
 f. 3. <sup>id ad puncta frons et tangere.</sup> Scir. 7 ad 10. <sup>ad</sup> cent. cap. 2 fm. ligat. contorta uta capitulo ad  
 10. <sup>ad</sup> annis molla. cuta teneri subtilis quam regular. carnae crassae <sup>bacis annos molla.</sup> <sup>ad</sup> circa  
 Habitat in Chilli, Havana. <sup>h</sup> includes binominum S. O. s. rectum annos molla. <sup>decepti.</sup>  
<sup>ma decepti est en</sup> <sup>confusione aperte.</sup> Males fl. fascicul. odore. <sup>confusione</sup> <sup>confusione</sup>  
<sup>confusione</sup> <sup>confusione</sup>

## LVCITIUM

Zamia sp. Myrsinaceae orange-yellow

Leptilon  
Leptilon

*Zarea*. ch. Rad. *Lycium* foliis ovalibus. pars.  
hadot. *Indic.* foliis buni. c. B. Pl. 78

192 PENTANDRIA MONOGYNIA.  
*Lycium* foliis buni. folio. B. Pl. 78.  
*Lycia cantha*. Dod. *Lycium* foliis rufis dundimis furi ex parte pentandri com  
*Rosa* sibi Bras. mag. 1715 autem propinqua ligno rubro dendrosum furi ex parte pentandri com  
*Rosa* furo hyst.

*Niss.* act. 1711. p. 420. t. 12.

*Rhamnus* alter, foliis falsis, flore purpureo. *Baub.* pin.

477.

B. *Jasminoides aculeatum humile*, halimi minoris folio, flore minore, per maturitatem flavescente. *Mich. gen.* 224. t. 105. f. 2.

*Habitat in Africa & in Regno Valentino.* 5

2. *LYCIUM* foliis lanceolatis crassiusculis, calycibus bifidis? *Jasminoides* siamke halimi folio longior & angustior.

*Rhamnus peregrinus*, rosmarini folio, candidior. *Pluk.* alm. 317. mant. 160. t. 322. f. 2. *mala*.

*Jasminoides aculeatum*, polygoni folio, floribus parvis albidis. *Schaw. afric.* 349. f. 349?

*Habitat in Asia, Africa?* 5

*Calycis ore bilobo, aut interdum trilobo, a reliquis speciebus diversum.*

3. *LYCIUM* foliis cuneiformibus. *Vir. cliff.* 14. *Roy.* lugdb. 436.

*Jasminoides aculeatum*, salicis folio, flore parvo ex albo purpurascente. *Mich. gen.* 224. t. 105. f. 1

*Rhamnus spinis oblongis*, flore candicante. *Baub.* pin.

477. *Habitat in Narbona, Hispania, Lusitania, Italia.* 5

*Cainito*. ad. 166.

• Cainito.

### CHRYSORHYLLUM.

I. CHRYSTOPHYLLUM

*Chrysophyllum* foliis ovatis superne glabris, parallele striatis, subtus tomentoso-nitidis. *Hort. cliff.* 491. *Anona* foliis iubus ferrugineis, fructu rotundo majore lœvi purpureo, femine nigro partim rugoso partim glabro. *Sloane. Jam.* 206. *hist.* 2. p. 170. t. 229. *Raj. dehar.* 78.

Cainito. *Laet. amer.* 390.

Cainito folio subtus aureo, fructu maliformi. *Plum.* gen. 10.

B. Cainito folio subtus aureo, fructu oliviformi. *Plum.* gen. 10.

*Habitat in America calidiore.* 5 *fusca* *gigantea*

Folia alterna, petiolata, ovata, integerrima. Pedunculi laterales, uniflori, numerosi, brevissimi.

Si *sidaroneum*. ad. 171.

### SIDEROXYLON.

*Abea putorum. Bras. mag. 120.*

*Bo fons. lat. inerme.*

*Kunz gaudi. Ingr. mag. 796. Bocconia mag. 17. Rosmar. 17. Corolla pubesc.*

*Kunz R. alt. bracteata.*

*Caro. Ind. or. liso.*

*? dae filo. p. 708.*

i. SIDEROXYLON inerme. *Hort. cliff.* 69.

*Kunz gaudi. Ingr. mag. 796. Bocconia mag. 17. Rosmar. 17. Corolla pubesc.*

*Kunz R. alt. bracteata.*

*Caro. Ind. or. liso.*

*Lignum teixi dictum, adeo durum ut ferum aequat, in*

*ligno insula, quod valde pretiosum est, utile, interius coriaceum*

*undulatum, ex quo instrumenta fructu. linsit. It. Pl. 449.*

*Caro. frag. Lycium hispanicum foliis buni. B. Pl. 478.*

*Nobis. Rio. Lycium gallicum B. Pl. 478. grossa luteo colorata tangunt*

*Lycium. Gallicum*

*Campestris. Lycium. exiquis foliis luteo confertus. B. Pl. 479.*

*Pseudosantolina ericoides* Benth. B93. folia - alaterni, ligulen rubrae.  
fructus piperis. Ligula petiolarum santoninum involucrata. ? fagaraceae species.

PENTANDRIA MONOGYNIA

*PENTANDRIA MONOGYNIA.* 193  
Pseudo benthamum rubrum sive arbor brasiliæ. H. Dill. 393. fructem non perfringit. *Braillia* Voss 373.  
arbor quæcumque magnitudinis. quæ per vix 16 hemicentrum ultime angustiora sunt. fructus bene *Basiliacum* Koenic.  
*Sideroxylon primum* f. dein *Coriæ indorum* nomine *Basiliacum*. C. W. *araborum brasiliæ*  
data arbor. Dill. elth. 357. t. 265. f. 344.

*Padus* foliis oblongis, fructu solitario. *Burm. afric.* 238  
t. 84. f. 2.

t. 84. f. 2

2. SIDEROXYLON spinosum. Hort. cliff. 69.  
Ebenaceae.

Ebenus jamaicensis arbūscula, buxi foliis, spinosa. Pluk. pinosum. • 171  
alm. 132. t. 89. f. 1. ? aliud genet. Bract. lvs. 10 mm. long. 2 mm. wide. Carou-mœlli. hian.  
Carou-mœlli. Rheed. mat. 5. p. 77. t. 30. Rai. agnoso creste. ? Crotalaria s. quadrifolia. The de Boenheave.

*Habitat in Malabaria.* In præriæ expter. rame pùtale foliæ caduea multa erat acutæ  
latevæ pubescens, hyp. coriaceo suffrancient. subtili pubile, non medice.

Rhamnus cathartica Linn. B. Pl. 478. 24 spes rami sub. subpetiolatae. spiculæ  
in pinn. oblongo-ellipt. atque lyrate. RHAMNUS. fol. bipinnata.  
grain d'Avignon gall.  
fructuosa. flor. plena. anili. 2 ad 3. bracts petiolatae. vixid. cal. 17th. 3 ad 2 fid. outgo 4 pr.  
papillæ. Dose. Thym. Rhamnus. verus. Adans.  
moniliformis. lacin. calyx alt. \* stipe 2-10 cm. à lat inter. pubesc.  
Dose. gât. rubra 2 liv. Diarr. 100 gr. 10 fl. corposa fata. (Loring Andrus et al.)

dioicis. Hort. class. 70. Fl. suec. 193. Mat. med. 72.  
Roy. lugdb. 224. ~~varia cyl. alt. fl. opp. l. alt. petiole~~ ~~varia cyl. alt.~~

*Rox. Ind. 224.* *racem. cym. alt. fol. opp. l. alt. petiole supra 1-rib. tip. 2-ang. -caulinic.*  
*hammus catharticus.* *Baeh. t. 178* <sup>flor. late and protracted</sup> *Cal. 1 plus tuberc 4 pr.* <sup>ang.</sup> *Cor. 4 pet. calici in*

*Rhamnus catharticus*. *Bauh. pin.* 478. *Cal.* 1 p. foliis 4 fol. *Cord.* 4 p. calici  
*Cervispina*. *Cord. hist.* 175. *mea* *hunc alt.*  
*Habitat* in Europa. *Flor.* *ut 4. calici vel cor. calice ligulalem alt.*  
Grecia. Sicilia. *neopurpurea*

Habitat in Europæ australioris sepibus.

\* \* *inermes.* <sup>permin</sup> RHAMNUS *inermis* floribus dorsiis

# RHAMNUS inermis, floribus dioicis, foliis duplicato-crenatis.

*Frangula ora folii ferrata.* Hall. helv. 164.  
*Frangula rugosiore & ampliore folio.* Tournaf. inst. 65.

*Frangula rugonore & ampliore folio. Tournef. inst. 612.*  
*Frangula altera polycarpos. Baub. prodr. 160.*

*Alnus nigra baccifera, rugosiore folio. f. major. Baub.*  
*bist. I. p. 562.*

*Alnus nigra polycarpos. Bauh. pin. 428.*

Habitat in alpibus Helveticis. 5  
RHAMNUS. ad. 305.  
~~Ramula~~

RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. Hort. cliff. 70. El. suec. 224. Frangula. • mult. id.

*Rhamnus inermis*. foliis exstipulis. Fl. 224.

*Rhamnus inermis*, foliis annuis. *Fl. lapp.* 60.  
*Alnus nigra baccifera*. *Baub. pin.* 428.

*Frangula*. Dod. pempt. 784.  
*Alnus inermis*, foliis ovatis integerrimis vel i-

*Ainus inermis*, foliis ovatis integerrimis glabris. *Roy.* *lavifolius.*  
*lugdb.* 224.

Habitat in Europæ borealis nemorosis humidiusculis. ♂ *alaternus* ad  
interv. multi pro rhabarbarum utantur.

RHAMNUS inermis, floribus dioicis, stigmate tripli- <sup>aterrimus</sup> <sup>alaterrimus</sup> <sup>30</sup>  
si Vir. cliff. et H. s. f. s. f.

Cl. Vir. cliff. 19. Hort. upf. 47. Sauv. monsp. 95. *Philyca* - Beller

Rham-*Philyca*-Bellar  
Calcicarpus. tricuspidat. cono-<sup>1</sup> / wavy 1. plate in margin. Rhynch  
the 5 sides inserted in wall.

*aphanica*. Detach  
*Elaeocarpus*. *curvifl.* B. & B.

Lycium Indicum altissimum B. Pla 47, 9 } usq.

Liane rouge de Virginie arbor chilensis Baccifer L. Mill. Tab. 368 f. 3. Liane rouge d'Amérique  
Lippia <sup>ad.</sup> 304 Lippia vero spec. fl. et fructu. qudr. 2 lvs. lvs. cibic att. fl. att. ovat.  
Lippea atroviridis auct. fl. racemosa foliis elliptic. foliis pidi in connexum  
Lin s.n. 179. pl. 194 monogr. PENTANDRIA MONOGYNIA.

# PENTANDRIA MONOGYNIA.

Rhamnus inermis, floribus polygamis, stigmate triplici,  
foliis ferratis. Hort. cliff. 70. Roy. lugdb. 225.  
Phylica elatior. Bauh. pin. 477.  
Phylica humilior. Bauh. pin. 477.  
Alaternus. 1. 2. Clus. hist. 1. p. 50.  
*Habitat in Europa australi.* 5

Paliung ad. 304.

*Lottis.* Linn. 6.  
*Zizyphus* ad. 304

## Zigyrhus

~~Fujuba~~ 8  
Bara Todor  
Nidau - orat

OENOPOLIA. 9

*Ophidion* OENOPOLIA. 9  
*Zerynthus*

## Linguistics

~~Zizyphus~~ <sup>10</sup> ~~Zizyphus~~ <sup>10</sup> Zizypha colum  
~~Zizyphus~~ <sup>10</sup> ~~Zizyphus~~ <sup>10</sup> Zizyphus. d. 10

Eunab. Ver.  
haab. ant

Euanab. Ver.  
haneb. arb  
afafita afafita  
Katapa h.

~~unpublished~~ 13  
1920-9 ad. un

Egypt - 3 Europe  
Egypt - gal. Italy Casp. - 3  
Serica - Guizhou

卷之三

100

卷之三



196 PENTANDRIA MONOGYNIA.

*Evonymus*, jujubinis foliis, carolinensis, fructu parvo  
fere umbellato. *Pluk. alm.* 139. t. 28. f. 6.  
*Habitat in Virginia, Carolina.* 2. 5

*asiaticus.*

2. *CEANOOTHUS* foliis ovatis enerviis.

*Ceanothus racemis folio brevioribus*, *Fl. zeyl.* 98. \*  
*Habitat in Zeylona.* 5

*Appalachianus* 3. 30.

*africanus* 3. 30.

*alaternoides. comm.*

*Zeylona capri.*

3. *CANOTHUS* foliis lanceolatis enerviis, stipulis sub-  
rotundis.

*Celastrus inermis*, foliis lanceolatis obtuse serratis pe-  
tiolatis appendiculatis. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugd.* 435.  
*Alaternoides africana*, lauri ferratae folio. *Comm. prael.*  
61. t. II.

*Ricinoides africana* arborescens, folio phillyreæ longi-  
foliæ serratae. *Seb. thes.* I. p. 35. t. 22. f. 6.

*Habitat in Æthiopia:* 5 *Spec. ornat. Ramificat. sub*  
*fol. olear. obt. dentata. 1 nerva. petiol. 2. lenticellul. folia. aperta. anfractuosa. petiolata.*  
*et nomen grossum myrt. MYRSINE.*

*X africana.*

*ageria. adans.* 166.

1. *MYRSINE*. *Hort. cliff.* 72. \*

*Vitis idæa æthiopica*, myrti tarentinæ folio, flore atro-  
purpleo. *Comm. hort.* I. p. 123. t. 64.

*Buxus africana* rotundifolia ferrata. *Pluk. alm.* 74. t. 80.

f. 5. *flor. 2 gland. sicc. comm.* *Genus eorum quae in* *inducta*

*Frutex æthiopicus* baccifera, foliis myrtilli. *Breyne. cent.*  
9. t. 5.

*Habitat in Æthiopia.* 5 *Spec. sublavi. ramis nervosat.*  
*fol. alt. subcord. acut. dentata. rigida. petiolata. lata. plana. cauli coton.*  
*Hip. velut puncta minima. vix embry. a latere petiolata in dentata.*

CELASTRUS.

1. *CELASTRUS* inermis, foliis ovatis integerrimis.

*Evonymoides virginiana*, foliis non serratis, fructu coc-  
cineo eleganter bullato. *Isnard. act.* 1716. p. 369.

*Evonymus virginianus* rotundifolius, capsulis coccineis  
eleganter bullatis. *Pluk. alm.* 139. t. 28. f. 5.

*Habitat in Virginia.* 5

*frut. scandens.*

*Celaterry. ad*

2. *CELASTRUS* inermis, caule volubili.

*Evonymoides canadensis* scandens, foliis serratis. *Isn.*  
*act. 1716. p. 369.*

*Frutex viminibus lantis infirmis*, foliis profunde serratis,  
*Gron. virg. 55. Thun. flor.*

*Habitat in Canada.* 5 *Spec. scandens volubilis. foliis*

*remigatis. foliis dentatis. petiolatis. floribus. flor. 2. lata. 2. foliis*

*myrtifolius.* 3. *CELASTRUS* inermis, foliis ovatis ferrulatis flori-  
bus racemosis, caule erecto. *Hort. cliff.* 72.

Myr.

PENTANDRIA  
Myrtifolia arbor, foliis  
cemoso. Sloan. jam.  
Raj. dendr. 36.  
Habitat in Virginia, Ja.

CELASTRUS spinis  
obtusis. Hort. cliff. 72.  
Lignum portoricense, bu-

134. t. 202. f. 3.  
Habitat in Æthiopia. 5  
Rami & ramuli angula-  
ferrata. Cymæ pedunc.

CELASTRUS spinis  
obtusis. Hort. cliff. 72.  
Lignum æthiopicum, py-

163. t. 84. Raj. d.  
Eonymo affinis æthiop-  
du evonymi. Pluk. 5  
Habitat in Æthiopia. 5  
Rami & ramuli teretiu-  
trinque acuta, in peti-  
ris acuminatis ut fere  
dunculata, laterales.

EVO

EVONYMUS florib  
Eonymus foliis oblong

Spec. 133. Roy. lugd.

Eonymus vulgaris, gra-

Eonymus 2. Clus. bif

Eonymus latifolius. E

Eonymus 1. f. latifolia

Habitat in Europæ sep

Ex flore primario conve

178. foliis major angust

EVONYMUS florib

Eonymus foliis lato-la

Eonymus foliis lanceo

Eonymus virginianus,

carum instar exaspera

Celastrus foliis oppositis

solitariis. Hort. cliff

Rhus virginianum, folio

t. 81. Raj. dendr. 5

Habitat in Virginia. 5

178. foliis 2. lata non

178. foliis 2. lata non

MONOGYNIA.  
*carolinensis*, fructuosa.  
alm. 139. t. 28. f. 6.  
lina. 2. 5  
vatis enervii.  
erioribus, Fl. zeyl.

*Celastrus serratus* incurvus foliis crassifolis subcordat. oblongo-oblato-deltat. 21. 3 pnd. rami cespitosi. flor. petiolis cyl. tenuis exsertis. lipp. 2-membr. 1. dentat. calcarum - flor plurimis vixte flor. amilli. pedunculo 2 longiori inclus. cal. petioles 3 dent. cor. spic. calice 1 longiorib. plaus pet. branc. aegritate calice alt. Stein 5. corollis prae-

# PENTANDRIA MONOGYNYA.

# PENTANDRIA MONOGYNYIA.

*Myrtifolia arbor*, foliis latis subrotundis, flore albo racemoso. *Sloan.* *jam.* 162. *bif.* 2. *p.* 79. *t.* 193. *f.* 1. *Rai. dendr.* 36.

Habitat in Virginia, Jamaica. 5

4. CELASTRUS spinis foliosis, ramis angulatis, foliis buxifolius. • *Celastrus ad 303.*  
obtusis. *Hort. cliff.* 72. *Rey. lugdb.* 434.  
*Lycium portoricense*, buxi foliis angustioribus. *Pluk. alm.* *Celastrus ad. 303.*  
234. t. 202. f. 3.

Habitat in Æthiopia. b

Rami & ramuli angulati. Folia obovata, obtusa, acute serrata. Cymæ pedunculatae, ex alis.

5. CELASTRUS spinis nudis, ramis teretibus, foliis a-  
cutis. *Hort. cliff.* 72. *Rhamnus* <sup>*after*</sup> *siliquastrum* <sup>*folio*</sup> *poteroy* <sup>*cladis*</sup> *afficant* <sup>*spine longior*</sup> *Bosch.* *pyracanthus* .  
*Lycium æthiopicum*, *pyracantha* folio. *Cann. hart.* *xynaspes* <sup>*Thespea*</sup> *selecta* .

*Lycium æthiopicum*, pyracanthæ folio. *Comm. hort.* 1.  
p. 163. t. 84. *Raj. dendr.* 72.

*Evonymo affinis æthiopica*, lycii foliis & aculeis, fructu evonymi. Pluk. alm. 139. t. 280. f. 5.

Habitat in Æthiopia. h <sup>in theop. celestis folia raro. demissis cunctis</sup>  
Rami & rami <sup>nullum patens, tande fructifer, ad bambus idoneus</sup> rami

Rami & ramuli teretiusculi. Folia ovali-lanceolata, un-  
trinque acuta, in petiolos desinentia, superne serratu-

ris acuminatis ut fere spinosis, persistentia; Cymæ pendunculatæ, laterales. cal. sp. pat. con sp. pet. valvæ mag. pet. pet.

Institute for Botanical Documentation

EVONYMUS floribus plerisque quadrifidis.

*Evonymus foliis oblongo-ovatis. Hort. cliff. 38. Fl.  
suec. 133. Ray. lugh. 136. Hall. helv. 533.*

*Evonymus vulgaris*, granis rubentibus. Baub. pin. 428.

Evonymus 2. Clus. hist. I. p. 57. Calecon etiam vigo 4.  
Evonymus latifolius. Bauh. pin. 428. Calecon etiam

*Evonymus* I. f. *latifolia*. *Clus. hist.* 2. p. 56. velgo *S. reticulata*.  
*Habitat in Europa* *septibus* *B.* *in Pannonia* *ut* *brunnea*.

*Ex flore primario convenit cum congeneribus.* Phil. Bot.  
<sup>178</sup> ~~floribus major annuat. floribus minoribus - 15 maii floribus~~

EVONYMUS floribus omnibus quinquefidiis

EVONYMUS foliis omnibus quinquefidiis.  
Evonymus foliis lato-lanceolatis ferratis. *Hort. upf.* 30

*Evonymus foliis lanceolatis. Gron virg. 17.*  
*Evonymus virginianus, pyracanthæ foliis, capsula verru*

carum instar exasperata. Pluk. alm. 139. t. 115. f. 5  
Celastrus foliis oppositis ovatis integerimis. floribus sub-

*Celastrus torquatus* oppositis ovatis integrifinis, nonibus raro  
solitariis. *Hort. cliff.* 32.  
*Rhus* *virginiana* *Salicifolia* *Gouan* *hort. L. B.* 157

Rhus virginianum, folio myrti. Comm. hort. I. p. 157  
t. 81. Raj. dendr. 57.

Habitat in Virginia. ~~5~~ spade semi-geophilic. flor. in aut. DL

8 ani de la data emisiunii primelor legi si atributelor  
fiscale, fără multă flacă este mult.

## DIOSMA.

*oppositifolia.*  
*Diosma ad*  
344

*hirsuta.*  
*Diosma ad*

*rubra.*

*ericoides.*  
*anisodactylina.*  
*Diosma ad*

*hirsuta ad 344*  
*ciliata.*  
*Linn. f. N. 625.*

*lanceolata.*  
*Hartya ad 344.*

*uniflora.*  
*Diosma ad.*

1. DIOSMA foliis subulatis acutis oppositis. *Hort. cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434. *Spiræa africana*, foliis cruciatim positis. *Comm. rar.* 1. t. 1. *Hypericum africanum vulgare.* *Seb. thes.* 2. p. 41. t. 40. f. 5. *Habitat ad Caput b. Spei.* 5
2. DIOSMA foliis linearibus hirsutis. *Hort. cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434. *Spiræa africana odorata*, foliis pilosis. *Comm. rar.* 3. t. 3. *Habitat ad Caput b. Spei.* 5
3. DIOSMA foliis linearibus acutis glabris subtus bifariam punctatis. *Diosma* foliis setaceis acutis. *Hort. cliff.* 72. *Spiræa africana odorata*, floribus sanguineis. *Comm. rar.* 2. t. 2. *Erica æthiopica*, rosmarini sylvestris folio eleganter punctato, flore tetrapetalo purpureo. *Pluk. mant.* 68. t. 347. f. 4. *Habitat in Æthiopia.* 5
4. DIOSMA foliis linear-lanceolatis subtus convexis bifariam imbricatis. *Spiræa africana*, ericæ bacciferæ foliis. *Raj. dendr.* 91. *Ericæformis*, coridis folio, æthiopica, floribus pentapetalis in apicibus. *Pluk. amalh.* 236. t. 279. f. 5. *Habitat in Æthiopia.* 5
5. DIOSMA foliis lanceolatis ciliatis. *Spirææ* forte genus africanum, serpilli hirsutis foliis, fructicosum, floribus albis umbellatis. *Pluk. amalh.* 197. t. 411. f. 3. *Habitat in Æthiopia.* 5
6. DIOSMA foliis lanceolatis glabris. *Spiræa africana*, saturejæ foliis brevioribus. *Raj. dendr.* 91. *Habitat in Æthiopia.* 5
7. DIOSMA foliis ovato-oblongis, floribus solitariis terminalibus. *Cistus humilis æthiopicus*, inferioribus foliis rosmarini sylvestris punctatis, cæteris autem serpilli subrotundis, flore carneo. *Pluk. mant.* 49. t. 342. f. 5. *Habi-*

PENTANDRIA

*Habitat in Æthiopia,* 5  
*Folia rigidiora,* & longius.  
*flos et jam sextu-*  
*punctatus.*

*Ianicum* B.E.

*BRUNIA* foliis quadri-

*p.*  
*Carex-Pinulus* capitatis

*Eca* capitata f. nodiflor-

*mant.* 69. t. 346. f. 4.

*Arbuscu-*  
*losæ* affinis *Arbuscu-*

*los*. *Raj. hist.* 144.

*Habitat in Æthiopia.* 5

*BRUNIA* foliis linearis

*Imariscus monomapat-*

*ultera*, ramulis lanu-

*Pluk. alm.* 361. t. 31.

*Habitat in Æthiopia.* 5

*BRUNIA* foliis lineari-

*ana* foliis ericæferrimis

*Burm. afric.* 266.

*Ericanus africanus*, ericæ-

*under.* 130.

*Habitat in Æthiopia.* 5

*BRUNIA* foliis obova-

*Brunia* foliis oblongis in-

*ham terminante.* *Burm.*

*Ericanus capensis*, serpy-

*lica* capitata f. nodiflor-

*Pluk. mant.* 69.

*Habitat in Æthiopia.* 5

*IT*

*TEA. Gron. virg.* 14.

*Conangia. Mitch. gen.*

*Habitat in Virginia.* 5

PENTANDRIA MONOGYNIA.

199

Habitat in Æthiopia. ♂

Folia rigidiora, & longe majora, quam in precedentibus. Flos etiam sextuplo major: margine ut & subitus punctatus.

BRUNIA

~~I. semiconic foli. ventricosa imbricata glabra adus.~~

1. BRUNIA foliis quadrifariam imbricatis. Hort. cliff. nodiflora. <sup>turpifl.</sup> ~~Brunia ad 284~~

Cupresso-Pinulus capitis b. spei. Breyn. cent. 22. t. 10.

Erica capitata s. nodiflora cupressiformis africana. Pluk. mant. 69. t. 346. f. 4.

Scabiosæ affinis Arbuscula africana ericoides sphærocephalos. Raj. bist. 1444.

Habitat in Æthiopia. ♂

2. BRUNIA foliis linearibus patulis. Hort. cliff. 71. <sup>lanuginosa. X adus</sup> ~~Brunia~~

Tamariscus monomapatensis, ericæ tenuissimo folio, pilulifera, ramulis lanugine aranearum instar implexis.

Pluk. alm. 361. t. 318. f. 4.

Habitat in Æthiopia. ♂

3. BRUNIA foliis ovatis acuminatis ciliatis. <sup>ciliata. X</sup> ~~Brunia~~

Habitat in Æthiopia.

4. BRUNIA foliis linear-lanceolatis confertis. <sup>abrotanoides X</sup> ~~Brunia~~

Brunia foliis creberrimis lanceolatis, floribus conglobatis. Burm. afric. 266. t. 100. f. 1.

Levisanus africanus, ericæ folio, capitulo majore. Raj. dendr. 130.

Habitat in Æthiopia. ♂

5. BRUNIA foliis obovatis tomentosis. <sup>obliqua. ad 284</sup> ~~Levisanus. X~~ ~~Concarpuy. ad.~~

Brunia foliis oblongis incanis, florum capitulo ramulum terminante. Burm. afric. 267. t. 100. f. 2.

Levisanus capensis, serpylli folio. Pet. gaz. 9. t. 5. f. 7.

Erica capitata s. nodiflora, corios foliolis rectis, æthiopica. Pluk. mant. 69. t. 346. f. 7.

Habitat in Æthiopia. ♂

6. BRUNIA floribus solitariis. Hort. cliff. 71. <sup>uniflora. turpifl.</sup> ~~Brunia ad 284~~

Ericæformis æthiopica, cupressi foliis compressiusculis. <sup>Pluk. alm. 136. t. 279. f. 2.</sup> ~~Brunia ad 284~~

Habitat in Æthiopia. ♂

1. ITEA. Gron. virg. 143. <sup>guiana</sup> ~~ITEA. monomerum gracile Salis.~~

Diconangia. Mitch. gen. 5.

Habitat in Virginia. ♂ 2nd. à choisi. fol. apicis cleftis.

lanceolatis minore. tip. 2. minore. lyrate-rib. ad cicutam floro.

N 4

GA-

Diconangia mitch. 165.

