



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

*mangaita* fl. 76. arb. pilehia magna & ped. fol. opp. cameraria  
 vult deuisi parali 102 flor. 1 ad 3 terminu albi tubul. odoris paucissimi  
 parva angust. flor. utra q. in unib; fructum fol. Racia glob. abico colore  
 cute tenui iute. q ad q. orbulis ruga lactea annuum mauricima  
 meli PENN. ANIERIA MONOGYNIA 201  
 d. l. u. u. n. m. n. p. o. t. o. d. e. i. d. e. u. r. u. b. a. n. o. e. d. u. l. i. ?

*mangaita*. Prop.  
 Kabbett. ad.  
 383.

3. *Ribes montana*, oxyacanthæ sapore. *Baub. prodr.* 160.  
*Amœn. acad.* 1. p. 170. *grossularia fructu dulci tenui.*  
*Habitat in Sueciæ, Helvetiæ, Angliæ sepibus siccis.* } *grossularia ad. 243*

3. *RIBES inerme*, racemis pilosis, floribus oblongis. *nigrum.*  
*Ribes inerme*, floribus oblongis. *Hort. cliff.* 269. *Hort. ups.* 51. *Fl. suec.* 196. *Mat. med.* 100. *Roy. lugdb.* 269. *Dalib. paris.* 74. *Pignivella. Dalech*  
*Ribes vulgaris*, fructu nigro. *Rudb. vall.* 32. *Fl. lapp.* 99. *Grossularia non spinosa*, fructu nigro. *Baub. pin.* 455. *Grossularia non spinosa*, fructu nigro. *Baub. pin.* 455. *Ribesium amum*  
*Casi. gallen*

3. *Ribesium nigrum pensylvanicum*, floribus oblongis. *Dill. elth.* 324. t. 246. f. 315. *Habitat in Suecia, Helvetia, Pennsylvania.* } *Pensylvanica*

\* *Grossulariæ aculeatæ.*

4. *RIBES ramis subaculeatis reclinatis*, pedunculi bractea reclinatum, triphylla.  
*Ribes ramis subaculeatis reclinatis.* *Hort. cliff.* 82. *Hort. ups.* 51. *Roy. lugdb.* 270.  
*Grossularia spinosa fativa altera*, foliis latioribus. *Baub. pin.* 455. *Habitat in Germania, Helvetia.* }

5. *RIBES ramis aculeatis*, petiolorum ciliis pilosis, baccis *Grossulariæ* hirsutis.  
*Ribes ramis aculeatis*, racemis erectis, baccis hirsutis. *Hort. cliff.* 82.  
*Ribes ramis aculeatis erectis*, fructu hispido. *Vir. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 269.  
*Grossularia fructu maximo hispido margaritarum fere colore.* *Raj. hist.* 1484. *Habitat in Europa.* }

6. *RIBES ramis undique aculeatis.* *Hort. ups.* 51. *Grossularia oxyacanthæ* foliis amplioribus, e sinu hudsonis. *Pluk. amalth.* 212. *Dill. elth.* 166. t. 139. f. 116. *Habitat in Canada.* }

7. *RIBES ramis aculeatis*, baccis glabris, petioli bractea monophylla.  
*Ribes ramis aculeatis erectis*, fructu glabro. *Hort. cliff.* 82. *Fl. suec.* 195. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. belg.* 346. *Dalib. paris.* 74.  
*Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris.* *Baub. pin.* 455. *Habitat in Europa boreali.* }

8. *RI*

*grossularia ad. 243.*  
*oxyacanthoides.*  
*oxyacanthoides.*  
*grossularia ad. 243.*  
*Caspiana. Hal.*  
*Uva crispa.*  
*Grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*  
*grossularia vel. clus.*

*grossularia virginiana fructu oblongo rubente pau maturatione*  
*nigri cantu. H. R. An. 2. p. 98. 15 aprils fl.*  
*fl. molliora quam R. in elongis pediculis. lenticulis anarq; undiq; compressis*  
*fl. spica 8 ad 12 ramis junctis. lenticulis anarq; undiq; compressis*  
*calice tubo longo ovario tubuloso. an. calice tubuloso. Stylis 8 apice brevissimis 2 p. 116*  
*ovariis 12 ad 15 p. 116. 2 ovaria ad partem baccæ ulam metallæ etc*  
*lychnioides quibus 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.*

*Pensylvanica*



*Schemba valli. h. m. 7. L. 6. Rana Diazq. Aram. Uvas dos Bugios. long. aperturam. Arty*  
*folia obtusa. caulis rot. ruscini eluini glob. uva vult. nigri. 4. ovul. 39ma. Con 1 prot*  
*5 f. 5. alia / pec. ut.*

**PENTANDRIA MONOGYNIA.** 203  
*Vitis lanuginosa, ruginosa, minibus, aini, nigri, juniperinis, similib., dulcibus,*  
*ruis pures. R. Recept. annu. 746.*

3. VITIS foliis cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. *Labrusca. Lat. adau*

*Vity. ad Hog*

Vitis sylvestris virginiana. *Baub. pin. 299.*

Vitis vinifera sylvestris americana, foliis a versa parte densa lanugine tectis. *Pluk. phyt. 249. f. 1.*

Vitis fructu minore rubro acerbo, folio subrotundo minus laciniato, subtus alba lanugine tecto. *Sloan. hist. 5.*

2. p. 104. t. 210. f. 4. *flor. Diab. utan. Ruyth. 2. 157. fl. spic. aini ovat. minid.*

Habitat in America septentrionali. *5 nigr. alut. ovata 2. Ell gamb. unil. puc. vici obtuli fl. Plum. 18. 2. 259. } viti. ad*

4. VITIS foliis cordatis dentato-ferratis utrinque nudis. *vulpina.*

Vitis vulpina dicta virginiana nigra. *Pluk. alm. 392. Vity. ad*

Vitis aceris folio. *Raj. dendr. 68.*

Habitat in Virginia. *5*

5. VITIS foliis ternatis: foliolis subrotundis ferratis. *trifolia.*

Vitis pearme doorica, foliis ternis subrotundis ferratis. *Vity. ad*

*Raj. dendr. 68. ? Coni crepitans triflorus. Dreyh. Tali Baboniji. 5. 2. 165. Con 5 pt. 25.*

Habitat in India. *5 caule tect. cinhu. stip. al. fl. Plum. 2. 269. Dura 2. 2. 200. 9. 18.*

6. VITIS foliis quinatis: foliolis multifidis. *Hort. cliff. laciniosa.*

74. *Roy. lugdb. 223. La cinat. Vity. ad*

Vitis laciniatis foliis. *Corn. canad. 182. t. 183.*

Vitis apii folio. *Baub. hist. 2. p. 73.*

Habitat - - - *5*

7. VITIS foliis supradecompositis: foliolis lateralibus pinatis. *arborea. scandens*

Vitis caroliniana, foliis apii, uva corymbosa purpurascen- *Vity. ad*

te. *Act. bonon. 2. part. 2. p. 365. t. 24. pinnatas ad 1754*

Frutex scandens, petroselinii foliis, virginianus claviculis

donatus. *Pluk. mant. 85. t. 412*

Habitat in Carolina, Virginia. *5*

*viti 15 fol. minor. uva corymbosa auro. mag. Plum. 2. 269. viti 15 fol. minor. uva corymbosa auro. mag. Plum. 2. 269.*

*5. 2. 165. Con 5 pt. 25. viti 15 fol. minor. uva corymbosa auro. mag. Plum. 2. 269.*

**LAGOECIA.**

1. LAGOECIA. *Hort cliff. 73. Hort. ups. 52. Cuminoides.*

Cuminum sylvestre, capitulis globosis. *Baub. pin. 186. +*

Cuminum sylvestre. *Cam. epit. 518. mod. auro. el. p. fol. pinnatis. Plum. 2. 269. Lagaecia ad 102.*

Habitat in Creta, Lemno, Lyfia, Galatia. *5 1 p. 2. Plum. 2. 269. Lagaecia ad 102.*

*fol. radice 1 p. 2. Plum. 2. 269. Lagaecia ad 102.*

*unib. fl. opp. et antri.*

**SAUVAGESIA.**

1. SAUVAGESIA. *erecta.*

Habitat in Domingo. *Sauvagea ad*

Habitus Hyperici aut Corchori. Caulis erectus. Folia

alterna, ovato-lanceolata, obtuse serrata. Stipulae acute,

ciliatae.

*viti valli. h. m. 7. 2. 9. Cerbau valli. Aram. Uvas d'alic. p. Luyit. Plant. Ruythling. Arty*  
*caulis rot. fl. Diab. 3. Coni crepitans triflorus. Dreyh. Tali Baboniji. 5. 2. 165. Con 5 pt. 25.*  
*2. 9. Cerbau valli. Aram. Uvas d'alic. p. Luyit. Plant. Ruythling. Arty*  
*caulis rot. fl. Diab. 3. Coni crepitans triflorus. Dreyh. Tali Baboniji. 5. 2. 165. Con 5 pt. 25.*  
*2. 9. Cerbau valli. Aram. Uvas d'alic. p. Luyit. Plant. Ruythling. Arty*  
*caulis rot. fl. Diab. 3. Coni crepitans triflorus. Dreyh. Tali Baboniji. 5. 2. 165. Con 5 pt. 25.*  
*2. 9. Cerbau valli. Aram. Uvas d'alic. p. Luyit. Plant. Ruythling. Arty*  
*caulis rot. fl. Diab. 3. Coni crepitans triflorus. Dreyh. Tali Baboniji. 5. 2. 165. Con 5 pt. 25.*

CLAYTONIA. *ad 242*

*f. virginica.*  
*lanifragoides, ad*  
*filibifolia.*  
*radice lanifraga*  
*tuberoso granulata*  
*spica rotunda*

1. CLAYTONIA foliis linearibus.  
Claytonia. Gron. virg. 25.  
Ornithogalo affinis virginiana, flore purpureo pentapeta-  
loide. Pluk. alm. 272. t. 102. f. 3. Rudb. elys. 2.  
p. 139. f. 6. *radice tuberosa granulata*  
Habitat in Virginia. *lanifrago*

*fibirica.* 2. CLAYTONIA foliis ovatis. Hort. ups. 52. \*  
*Limnia. act. stockb.* 1746. p. 130. t. 5. \*  
Habitat in Sibiria. 4

*Kadelari ad 268*  
*Y. Cadelari-*

ACHYRANTHES. *lin.*

*aspera.*  
*Schem Cadelari. m. 102. 79.*  
*folia minima acutius*  
*quam Cadelari.*  
*spica cyl. mediocri*  
*ficula.*  
*infundib. nudae.*  
*gossitz. Japon*  
*Indica.*  
*Prostratit. valgo.*

1. ACHYRANTHES caule erecto, calycibus reflexis spi-  
ca adpressis. Fl. zeyl. 105.  
Achyranthes caule erecto. Hort. cliff. 42. Roy. lugdb.  
418.

*a.* Amaranthus ficulus spicatus. Bocc. sic. 16. t. 9. Pluk.  
phyt. 260. f. 2.

*β.* Amaranthus spicatus zeylanicus, foliis obtusis amaran-  
tho ficulo boccioni similis. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 3.  
Amaranthus spicatus, dictamni cretici folio, maderan-  
sipatensis. Pluk. alm. 26. t. 60. f. 4.

Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica. 5  
Planta indica β foliis obtusioribus differt a sicula.

*Cadelari. h. m. 102. 78.*  
*caute me gars. Aram. in p. 102.*  
*spica tenuis. 102. 2.*  
*spice crassius. 1. clavatae. abasi. usq. apic. fl. v. n. n.*

2. ACHYRANTHES caule erecto, spica interrupta, flo-  
ribus externe lanatis.

*Pupal lappaceo*  
*Wellia Codiveli. H.M.*

Achyranthes floribus externe lanatis interrupte spicatis.  
Fl. zeyl. 103.

*Pu pal valli. H.M. 7243*

Blitum scandens, fructu lappaceo. Burm. zeyl. 47. t.  
18. f. 1.

*Pallay Aram*  
*Sala. Sa. m. 102. 79.*  
*Roxy Wortel. P. 102.*

Centaurium ciliare minus, circææ foliis firmioribus, spi-  
catis floribus. Pluk. alm. 93. t. 82. f. 2.

*radia cuncta antihumida*  
*pulox. intellim. edic. m. 102. 79.*

Wellia-Codiveli. Rheed. mal. 10. p. t. 59.  
Habitat in India. 4. rami. cyl. fl. p. 102. 79.

*Stachyopogon valli*

3. ACHYRANTHES caule erecto, spicis ovatis latera-  
libus, calycibus lanatis.

*lanata.*  
*ovet. ad 268*  
*fruct.*  
*Chenopodium heinariano.*  
*ad stipulae. 0.*

Chenopodium incanum racemosum, folio majore mi-  
nori opposito. Burm. zeyl. 60. t. 26. f. 1.

*Scherubala. Rheed. mal. 10. p. 57. t. 29. Zandalo. Brum*

Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis lanugine in-  
canus. Pluk. alm. 27. t. 75. f. 8.

*Scherubala. Rheed. mal. 10. p. 57. t. 29. Zandalo. Brum*

Habitat in India. 0. 1. ad 2 pl. arvensis. 102. 79.

*Radix. Plu. amara. cum. alt. cyl. fl. alt. oval. ant. infund. 102. 79.*  
*lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.*  
*lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.*  
*lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.*

Scherubala. Rheed. mal. 10. p. 57. t. 29. Zandalo. Brum  
Habitat in India. 0. 1. ad 2 pl. arvensis. 102. 79.

*Radix. Plu. amara. cum. alt. cyl. fl. alt. oval. ant. infund. 102. 79.*  
*lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.*  
*lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.*

Radix. Plu. amara. cum. alt. cyl. fl. alt. oval. ant. infund. 102. 79.  
lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.  
lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.

*lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.*

Radix. Plu. amara. cum. alt. cyl. fl. alt. oval. ant. infund. 102. 79.  
lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.  
lapp. 102. 79. 2. 3. p. 102. 79. fl. p. 102. 79. alt. 102. 79. 2. 3.

PENTANDRIA  
ACHYRANTHES  
f. 7. Achyrantha repens, f.  
Habitat in Turcoman  
ACHYRANTHES fo  
dichotoma. Fl. zeyl.  
achyranthia foliis ad ge  
umbellatis. Burm. zeyl.  
amaranthus folio tenuif  
te. Bocc. mus. 44. t.  
achyranthia affinis herba i  
caulium nodos an  
6.  
Habitat in Zeylona.  
CE  
CELOSIA foliis lan  
fica ovato-oblonga.  
celosia foliis lineari-lan  
lugdb. 419.  
amaranthus spica abes  
Habitat in America. 0  
CELOSIA foliis oblo  
fimbriatis, spica oblon  
celosia foliis lanceolato  
102. 79. Roy. lugdb.  
amaranthus panicula in  
amaranthus cristatus. C  
Habitat in India? 0 an  
CELOSIA foliis lance  
confertis, staminibus  
Habitat in Zeylona. 102  
CELOSIA foliis cunei  
foliis lateralibus. Fl. zeyl.  
amaranthoides indicum  
rescentibus. Burm. zeyl.  
amaranthoides indicum  
toridum, foliis solitari  
102. 79. t. 133. f. 2  
Habitat in Zeylona. 102

*Ujra belutta adca manjin hrm 107. 39. wae ad fol. tenuiora. spec. ad. } amarantho ad.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

4. ACHYRANTHES caule repente, capitulis lateralibus sessilibus repens.

Achyrantha repens, foliis bliti pallidi. *Dill. elth. 8. t. 7. f. 7.*

Habitat in Turcomannia. ☉

*Uleebuun & achyrantha Lm*

*n. 188*

*1767.*

5. ACHYRANTHES foliis oppositis linearibus, panicula dichotoma. *Fl. zeyl. 100.*

Paronychia foliis ad genicula confertis acutis, floribus umbellatis. *Burm. zeyl. 184. t. 65. f. 2.*

Amaranthus folio tenuissimo incano mollugini æmulate. *Bocc. mus. 44. t. 39.*

Elichryso affinis herba indica polygonoides ramosior, foliis caulium nodos ambientibus. *Pluk. alm. 134. t. 86. f. 6.*

Habitat in Zeylona.

*Paronychia ad corymbosa.*

*7. Lin. n. 1767.*

*n. 188.*

CELOSIA.

*Bliti. Diak.*

1. CELOSIA foliis lanceolatis, pedunculis angulatis, spica ovato-oblonga.

Celosia foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff. 43. \* Roy. lugdb. 419.*

Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. cent. 7. t. 7. Habitat in America. ☉*

2. CELOSIA foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spica oblonga.

Celosia foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff. 43. Hort. ups. 52. Roy. lugdb. 419.*

Amaranthus panicula incurva. *Bauh. pin. 121.*

3. AMARANTHUS cristatus. *Cam. epit. 792. Habitat in India? ☉*

3. CELOSIA foliis lanceolatis tomentosis obtusis, spicis confertis, staminibus lanatis. *Fl. zeyl. 102. \* Habitat in Zeylona. Syl. 2.*

4. CELOSIA foliis cuneiformibus acutiusculis, spicis globosis lateralibus. *Fl. zeyl. 101. \* Amaranthoides indicum nodiflorum, capitulis ex albo virescentibus. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 2.*

Amaranthoides indicum globosum, ad caulium nodos floridum, foliis solitariis summo apice barbatis. *Pluk. alm. 27. t. 133. f. 2. Differt genere faciundo. ad. Habitat in Zeylona. 1754.*

*amaranthus panicula conglomerata Pluk. 121. amaranthus panicula a. cristata. Reiquian Zap + Keitoge. amaranthus simpliciter panicula. C. B. 121. Circaea. Tragi. lanata. aurebrad. aurebrad. Pluk. 2. 357. f. 3. collar poe. malab. Pluk. nodiflorum. amaranthoides. Pluk. Koluppa ad. 268. Ros. genm. ab. Platanokofaloides. 1754.*

*Katu mailpina. h. m. 10. 2. 8. mailpina Brum. Syl. 162. Solvia dyf. umbellata h. m. 1. p. d. in arund. fl. v. v. h. m. 4. 2. 8. fl. umbell. tenuia Syst. angute don. Lys. 3. v. ab. 1. h. m. c. m. v. v. v. v.*

*n. 989*

*amaranthus ad argentea. 269*

*Belutta adca manjin*

*amaranthus a. cristata.*

*Reiquian Zap + Keitoge.*

*amaranthus simpliciter panicula. C. B. 121. Circaea. Tragi. lanata.*

*aurebrad. aurebrad. Pluk. 2. 357. f. 3. collar poe. malab. Pluk. nodiflorum. amaranthoides. Pluk. Koluppa ad. 268.*

*Ros. genm. ab. Platanokofaloides. 1754.*

*amaranthus a. cristata. Reiquian Zap + Keitoge.*

*amaranthus simpliciter panicula. C. B. 121. Circaea. Tragi. lanata.*

*aurebrad. aurebrad. Pluk. 2. 357. f. 3. collar poe. malab. Pluk. nodiflorum. amaranthoides. Pluk. Koluppa ad. 268.*

*Ros. genm. ab. Platanokofaloides. 1754.*

*amaranthus a. cristata. Reiquian Zap + Keitoge.*

*amaranthus simpliciter panicula. C. B. 121. Circaea. Tragi. lanata.*

*aurebrad. aurebrad. Pluk. 2. 357. f. 3. collar poe. malab. Pluk. nodiflorum. amaranthoides. Pluk. Koluppa ad. 268.*

*Ros. genm. ab. Platanokofaloides. 1754.*

*amaranthus a. cristata. Reiquian Zap + Keitoge.*

*amaranthus simpliciter panicula. C. B. 121. Circaea. Tragi. lanata.*

*aurebrad. aurebrad. Pluk. 2. 357. f. 3. collar poe. malab. Pluk. nodiflorum. amaranthoides. Pluk. Koluppa ad. 268.*

*Ros. genm. ab. Platanokofaloides. 1754.*

*amaranthus a. cristata. Reiquian Zap + Keitoge.*

*Kokera ad 269.* } *amaranthus foliolosus oratus pro modo lama altissima. Sloan 2. 91. f. 1.*  
*206* PENTANDRIA MONOGYNIA.

*in fine ad 268* 5. CELOSIA foliis lanceolato-ovatis, panicula diffusa filiformi. *Gron. virg. 144.*

*f* *Amaranthus panicula flavicante gracili holosericea. Sloan. jam. 49. hist. 1. p. 142. t. 90.*

*f* *Amaranthus nodosus, pallescentibus foliis bliti parvis, americanus, multiplici speciosa spica laxa, f. panicula sparsa candicante. Pluk. alm. 26. t. 261. f. 1.*  
*Habitat in America septentrionali*

*Paronychia ad 272* ~~MILLECEBRUM.~~

*• verticillatum.* 1. ILLECEBRUM floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *cat. calby cucullat. ovata sumentary.*

*• sessilata. hist.* Illecebrum caulibus procumbentibus. *Roy. lugdb. 214. Dalib. paris. 76. 126.*

*• suffruticosum.* Illecebrum. *Hort. cliff. 492.*  
*Paronychia serpillifolia palustris. Vaill. paris. 157. t. 15. f. 1.*

*• suffruticosum.* Polygala repens nivea. *Bauh. pin. 215.*  
*Habitat in Europæ pascuis udis.*

*• suffruticosum.* 2. ILLECEBRUM floribus lateralibus solitariis, caulibus suffruticosis. *Hort. cliff. 492.*

*• suffruticosum.* Illecebrum caule erecto. *Roy. lugdb. 214.*  
*Polygonum herniarie foliis. Lob. adv. 404. Dalech. hist. 1124.*

*• cymosum.* 3. ILLECEBRUM spicis cymosis secundis, caule diffuso. *Polygoni hispanici genus Clusii. Dalech. hist. 1125?*  
*Habitat Monspelii. D. Sauvages. ☉*

*• cymosum.* *Planta facie Sedi aut Polygoni; caulis filiformis, brachiatas. Folia opposita, linearia, crassiuscula. Flores digesti in spicas secundas, Spicae in cymas tam laterales quam terminales. Calyces margine membranaceo ut in Statice, terminati setis quinque.*

*• cymosum.* *Paronychia ad 272.* 4. ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus.

*• cymosum.* *Herniaria squamis nitidis flores superantibus. Hort cliff. 41. Hort. upf. 54. Roy. lugdb. 215. Sauv. monsp. 129.*

*• cymosum.* *Paronychia hispanica. Clus. hist. 2. p. 183.*  
*Polygonum minus candicans. Bauh. pin. 281.*  
*Habitat in Hispania & Narbona. ☉*  
*ut 2. sed strobila flis i hancis foliis calis bta sua longat. tenuit.*

ILLE.

PENTANDRIA MONOGYNIA

207

*Paronychia ad 272*

- 5. ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis occultatis, capitatum. *fol. d. se 2 alflory d. inid.*
- Herniaria erecta, squamis nitidis flores occultantibus *id. (bipula) fl. in univ. 1/2 h. univ.*
- Sauv. monsp. 129.*
- Paronychia narbonensis erecta. *Tournef. inst. 508.*
- Polygonum minus candicans, capitulis surrectis. *Magn. monsp. 209.*
- Polygonum montanum niveum minimum. *Lob. ic. 420.*
- Habitat in G. Narbonensis, Hispania.*

GLAUX.

*glauca ad .231*

- 1. GLAUX. *Hort. cliff. 43. Fl. suec. 199. Roy. lugdb. maritima. 417.*
- γλαυξ διορι*
- Glauca foliis elliptico-oblongis. *Fl. lapp. 72.*
- Glauca maritima. *Bauh. pin. 215.*
- Alfina bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Laesel. pruss. 13. t. 3.*
- Habitat in Europæ maritimis, salsis. &*

THESIUM.

*Thesium ad .80*

- 1. THESIUM panicula foliata, foliis linearibus. *Linophyllum.*
- Thesium. *Hort. cliff. 41. Hall. helv. 183. Dalib. par. ris. 75.*
- αθησιον*
- Thesium floribus sparsis. *Sauv. monsp. 48.*
- Linaria montana, flosculis albicantibus. *Bauh. pin. 213.*
- Sesamoides procumbens montanum, linariæ folio, floribus albicantibus. *Moris. hist. 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 3.*
- Anonymos lini folio. *Clus. hist. 1. p. 324.*
- 3. Onobrychis IV lutea. *Bauh. pin. 215. Dalech. hist. 491.*
- Habitat in Europæ siccis montosis. ©. 21. pruss. in Calvario calce*
- 2. THESIUM floribus sessilibus lateralibus, foliis lineari-alpinum.
- Alchimilla alpina, linariæ foliis, calyce florum albo in foliorum alis. *Till. pis. 6.*
- Alchimilla linariæ folio, floribus & vasculis in foliorum alis sessilibus. *Shaw. spec. 14.*
- Habitat in Italiæ alpinis.*
- 3. THESIUM floribus capitatis, foliis triquetris. *capitatum.*
- Thesium floribus capitatis. *Roy. lugdb. 214.*
- Thymelæa foliis linearibus alternis, floribus ex uno petiolo copiosis. *Burm. afric. 133. t. 48. f. 3.*
- Thymelæa africana, lini angusto folio, floribus albis villosis. *Raj. dendr. 55.*
- Habitat in Æthiopia. &*
- 4. THE-



Palaeonitum Rumph. 3. 2. 20. Sicut volubilis. cortex albo odore laticibus. Lactea  
fl. ovata. & volubilis. *Coryph. tenium tubul. 5. p. 11. 8. Acaia glob. minimum. 1. 6. 1.*

Pulappan  
ad 171.

208 PENTANDRIA MONOGYNIA.

umbellatum. 4. **THESIUM** floribus umbellatis, foliis oblongis.  
Centaurium luteum ascyroides virginianum. Pluk. man.  
43. t. 342. f. 1.

Habitat in Virginiae, Pensylvanicae pascuis siccis. Kalm. 2.  
Radix perennis. Folia alterna, ovali-lanceolata, integerrima. Rami alterni, in summitate caulis: Umbellulae terminales: involucro tetraphyllo, parvo: Flosculi 5.

Rauwolfia. ad. 171.

RAUVOLFIA.

1. **RAUVOLFIA**. Hort. cliff. 75. t. 9. Rauwolfia tetraphylla angustifolia. Plum. gen. 19.

2. **RAUVOLFIA** tetraphylla latifolia. Plum. gen. 19. Habitat in America calidior.

~~Thevetia ad.~~  
~~ad 171.~~

CERBERA.

**CERBERA** foliis ovatis.

Thevetia. Hort. cliff. 75. Roy. lugdb. 413. Ahouaj. Thev. antarct. 66. Tournef. inst. 658. Raj. hist. 1676.

Ahouaj major. Pis. bras. 49.

Arbor americana, foliis pomi, fructu triangulo. Baub. pin. 434.

Habitat in Brasilia. h. liquor tetraonidi odoris, cuius unguis venenatus.

Odollam. ad. 171.

2. **CERBERA** foliis lanceolatis: nervis transversalibus. Fl. zeyl. 106. \*

Manghas lactescens, foliis nerii crassis venosis, jasmini flore, fructu persici simili venenato. Burm. zeyl. 150. t. 70. f. 1.

Manghas fructu venenato. Baub. pin. 440. Raj. hist. 1552.

Odollam. Rheed. mal. 1. p. 71. t. 39.

Habitat in Indiis ad aquas. h.

Arbor lactescens. Folia alterna, sparsa ad apices ramorum, lato-lanceolata, petiolata, glabra, integerrima, pedalia. Racemi terminales, ramosi, inaequales. Perianthium pentaphyllum foliolis lanceolatis, patentibus, coloratis, deciduis. Corolla alba, infundibuliformis. Tubo calyce longiore, interne angulato. Limbo quinquepartito, lobis ovatis, tubo brevioribus. Stam. Filamenta 5, brevissima, tubi superiori parti inserta. Antherae ovatae, tetragonae, tectae laevigine tubi. Pist. Germen bifidum. Stylus filiformis, tubo fere brevior. Germen ovatum, fissum. Pericarpium Drupa ovata, magnitudine ovi anseris, viride punctis albis minutissimis, uno latere compressum suturaque obsoleta; Semina

Nandi ad. 171.

Nandi Ervatae major. H.M. 2. 1. 54. Sicut Nandi fere in speciebus  
foliis laticibus ovatis. fl. ovatis. in cal. tubo  
galeo. 10 p. l. v. alt. inter mirabilia. Lact. ca.  
ad. 171.

Nandi Ervatae minor. H.M. 2. 2. 55. videtur Brasiliae spec. fol. ovatis  
Dacolo nandite. fl. ovatis. caudatae loto 5 p. l. v. truncati. h. p. v. v.  
betulae Peruvia. ad. 171.



Kaye Baka. clu. { Suetus neri siliqua puzua. B. Sin. 464.

?nerium ad 171

210 PENTANDRIA MONOGYNIA.

fol alt. ampla 1 ped long ovatae, inter 16 utiq. neri.  
petalis med. al. 5-6. auti angulat. 5-6. utiq. neri.  
Plumeria flore roseo odoratissimo. Tournesf. inst. 659.

Catesb. car. 2. p. 92. t. 92.

Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, flore incarnato. Sloan. jam. 154, hist. 2. p. 61. t. 185. f. 1. & t. 186. f. 1.

Jasminum indicum. Mer. surin. 8. t. 8.

Clematis arborea americana, laurinis amplissimis foliis, flore laccæ colore odoratissimo. Pluk. mant. 50 alm. 109. t. 207. f. 2.

Habitat in Jamaica, Surinamo. 5 ped. longi

alba. Plumeria ad 172

2. PLUMERIA foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosis.

Plumeria flore niveo, foliis longis angustis & acuminatis. Tournesf. inst. 659.

Apocynum americanum frutescens, longissimo folio, flore albo odoratissimo. Comm. hort. 2. p. 47. t. 24.

Nerium arboreum altissimum, folio angusto, flore albo. Sloan. jam. 154. hist. 2. p. 62. Raj. dendr. 114. Herm. parad. 49.

Habitat in Jamaica. 2 utiq. neri. cetera cinnam. putida emanant. capra

obtusa. Plumieria ad 172

3. PLUMERIA foliis lanceolatis petiolatis obtusis. Plumieria flore niveo, foliis brevioribus obtusis. T. Catesb. car. 2. p. 93. t. 93.

Habitat in America calidiore. 5 ped. longi

CAMERARIA.

latifolia. Cameraria ad 172

1. CAMERARIA foliis subrotundis utrinque acutis. Hort. cliff. 76. Roy. lugdb. 412.

Cameraria lato myrri folio. Plum. gen. 18.

Habitat in America calidiore. 5 ped. longi

angustifolia.

2. CAMERARIA foliis linearibus. †

Cameraria angusto linearæ folio. Plum. gen. 18.

Habitat in America calidiore.

Tabernæmontana ad 172 TABERNÆMONTANA.

citrifolia.

1. TABERNÆMONTANA foliis oppositis lanceolatis. Tabernæmontana foliis lanceolatis. Hort. cliff. 76. Roy. lugdb. 413. Cor. 1/2 fide alba.

Tabernæmontana citri foliis undulatis. Plum. gen. 18. Pala. Rheed. mal. 1. p. 81. t. 46.

Habitat in utraque India. 5 15. ang. fl. rub. alba.

laurifolia.

2. TABERNÆMONTANA foliis oppositis ovatis. †

Tabernæmontana laurifolia, flore albo, fructu rotundiore. Amm. herb. 212.

Komettivalli. her. g. 2. 14. Ube valli. Pram. spec. Cassiniana. fol. opp. neri. fl. corumb. term. jasminii. inter alii inter p. 171. fildy. Eyl. ? 2 val. singular. B. Sem. alata plana Myrtinae cartier. 20. 1/2 ped. centuli cyl. aptrata.

ad 172

PENTANDRIA

Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, flore incarnato. Sloan. jam. 154.

Habitat in Jamaica a. TABERNÆMONTANA

Tabernæmontana pala. Rheed. mal. 1. p. 81. t. 46. Habitat in Malabar.

CER

TEROPEGIA umbellata. R. n. jodem-valli. R. n. Malabar.

Habitat in Malabar.

TEROPEGIA pedunculata. Habitat in Zeylona. 2

DIC

PER

PERIPLACA floribus. Periplaca foliis lanceolatis. Hort. cliff. 410. Roy. lugdb. 411.

Periplaca folio oblongo. Apocynum 2 angustifolium. Habitat in Syria. 4

PERIPLACA spicis. Periplaca foliis ovatis. Hort. zeyl. 113. \*

Apocynum caule volubili. Roy. lugdb. 411.

Periplaca foliis angustis. Hort. cliff. 83. f. 1.

Apocyni genus scandens. Hort. cliff. 17. t. 359. f. 2.

Habitat in Zeylona. 5

PERIPLACA caule hirsuto. Apocynum caule volubili. Hort. cliff. 17. t. 359. f. 2.

Apocynum scandens africanum. Comm. hort. 2. p. 47. t. 24.

Apocynum scandens africanum. Comm. hort. 2. p. 47. t. 24.

Apocynum scandens africanum. Comm. hort. 2. p. 47. t. 24.

Apocynum indicum minimum. Hort. 3. p. 611. f. 15.

*Fructus Indiarum tinctibus expellitur, in cortice autem conficitur: P. Sin 434 } Brindona gary  
 articulo mali / iuvilis, lactum suum fundat, cyrus 3 vel 4 guttas potentissimi purgant, } Brindona. Liban.  
 B. Sin 434 } Pipinichi. monad.*

PENTANDRIA DIGYNIA.

211

Nerium arboreum, folio latiore obtuso, flore luteo minore. Sloan: jam. 154. hist. 2. p. 62. t. 186. f. 2.  
 Habitat in Jamaica ad ripas fluviorum. 5

3. TABERNÆMONTANA foliis alternis.  
 Curutu-pala. Rheed. mal. 4. p. t. 43.  
 Habitat in Malabaria. 5

alternifolia

CEROPEGIA.

1. CEROPEGIA umbellis pendulis, floribus erectis.  
 Njota-njodem-valli. Rheed. mal. 9. p. 27. t. 16.  
 Habitat in Malabaria. 2 Lira piti valli. Bram. scand. volub. fl. opp. longis petalis erectis.

Niota ad 172

Candelas  
 brevis.

2. CEROPEGIA pedunculis bifloris. Fl. zeyl. 46. \*  
 Habitat in Zeylona. 2

biflora.

DIGYNIA.

PERIPLOCA,

1. PERIPLOCA floribus interne hirsutis.  
 Periploca foliis lanceolato-ovatis. Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 410. Periploca fl. 9 obtusa 2.

Periploca ad 172  
 græca.

Periploca folio oblongo. Bauh. pin. 303.  
 Apocynum 2 angustifolium. Clus. hist. 1. p. 125.  
 Habitat in Syria. 2

Periploca. Ind. cas  
 περιπλοκα. Diosc.

2. PERIPLOCA spicis imbricatis.  
 Periploca foliis ovatis acutis glabris, spicis imbricatis. Fl. zeyl. 113. \*  
 Apocynum caule volubili perenni, foliis ovato-lanceolatis. Roy. lugdb. 412.

indica. X

Periploca foliis angustis acutis glabris. Burm. zeyl. 187. t. 83. f. 1.  
 Apocyni genus scandens ex india orientali. Pluk. mant. 17. t. 359. f. 2.

Habitat in Zeylona. 5

3. PERIPLOCA caule hirsuto.  
 Cynanchum caule volubili ramoso, foliis subovatis cum acumine. Hort. cliff. 79.

afreana. X  
 Periploca ad.

Apocynum scandens africanum, vincæ pervincæ foliis, subincanum. Comm. rar. 18. t. 18.

Apocynum scandens africanum, convolvuli minoris folio, & caule hirsuto. Pluk. alm. 37. t. 137. f. 4.

Apocynum indicum minus, nummulariæ foliis. Moris. hist. 3. p. 611. f. 15. t. 3. f. 62.

O 2

β. Cy=

Papi a papa. Rumph. 5. 2. 19. cu. apam. pind. flora. sigt. calygnina. bodov.

β. Cynanchum foliis planis sinuatis, flore pallide viridi, fructu crasso glabro viridi. *Burm. afric. 34. t. 14. f. 2.*  
*Habitat in Africa. 4*

*rennifolia.*

4. PERIPLOCA foliis lineari-lanceolatis.  
Cynanchum radice granulosa, foliis angustis sinuatis, floribus urceolatis miniatis. *Burm. afric. 36. t. 15.*  
β. Cynanchum linearibus foliis acutis, floribus urceolatis rubris. *Burm. afric. 37. t. 16. f. 1.*  
*Habitat in Cap. b. Spei dunis.*

*ascleris ad. acutum.*

*Mundhaud. Rhazij  
Conziola. Rauv.*

CYNANCHUM.

1. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis cordato-oblongis glabris. *Hort. cliff. 79. Hort. wps. 54. Roy. lugdb. 409.*  
Scammonia monspeliaca affinis, foliis acutioribus. *Bauh. pin. 294.*  
Apocynum 3 latifolium. *Clus. hist. 1. p. 125.*  
*Habitat in Sicilia, Hispania, Astracan. 4*

*inbetosum.*

2. CYNANCHUM caule volubili inferne suberoso fissio, foliis cordatis acuminatis. *Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 409. Gron. virg. 27.*  
Periploca carolinensis, flore minore stellato. *Dill. elth. 300. t. 229. f. 296.*  
*Habitat in America calidiore.*

*hirtum.*

3. CYNANCHUM caule volubili fruticoso inferne suberoso fissio, foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 410.*  
Periploca scandens, folio citrei, fructu maximo. *Plum. spec. 2.*  
Apocynum scandens virginianum rugosum, pullis amplis floribus, capsulis alatis. *Moris. hist. 3. p. 611. f. 15. t. 3. f. 61.*  
Apocynum scandens fruticosum, fungoso cortice, surinamense. *Herin. par. 53.*  
*Habitat in America, 5*

*ascleris ad 172.*

*monspeliaca  
cuna.  
? Sawht. Sgl*

4. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. *Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 409. Sauv. monsp. 133.*  
Scammonea monspeliaca, foliis rotundioribus. *Bauh. pin. 294.*  
Apocynum IV latifolium: Scammonea valentina. *Clus. hist. 1. p. 126.*  
*Habitat in Hispania & Narbonæ maritimis. 4*

5. CY-

*Pargulatus. Rumph. 5. 2. 29 f. 1. Simplicis spec. lacte flavo. d. r. 100.  
Fater fave. Syringa v. dub. fl. opp. uniuata fl. alb. umbellata*

PENTANDRIA  
CYNANCHUM caule  
glabris. *Hort.*  
monsp. 133. f. 133.  
Apocynum folio subro  
Apocynum I. latifolium  
Habitat in Syria. 4  
APO  
POCYNUM caule  
glabris  
caule erecto  
411.  
Apocynum foliis ovati  
Apocynum canadense,  
35. t. 16. f. 3. A  
16.  
Habitat in Virginia, C  
POCYNUM caule  
longis, cymis latera  
Apocynum foliis ovatis  
virg. 28.  
Apocynum canadense  
tenuissima. M  
14.  
Apocynum virginianum  
tenuissima. *Moris. prael. 2*  
Apocynum canadense m  
Pluk. alm. 35. t. 12  
Apocynum erectum vir  
bente, esulae raræ foli  
35. t. 260. f. 2.  
Habitat in Canada, Vi  
nulla virides, nec pic  
POCYNUM caule  
to-lanceolatis. *Roy.*  
Apocynum foliis ovato-  
malus maritimus,  
pin. 291.  
rula rara e lio venetor  
Habitat in Adriatici m  
POCYNUM caule  
lato-ovalibus, corolli  
114.  
Rumph. 5. 2. 8. f. 8. Kie  
fl. opp. uniuata fl. alb.  
Sawht. med. canbot

*Uchili octan. Rumph. 4 2-67. Est apocyni spec. fructu lacteo. fol. opp. digynia.*  
*f. alk pari plit enali opp. pedali lay Minu p. unulo. Capitula 2 vult. inflat. horum*  
*ostant, patenti.*

PENTANDRIA DIGYNIA,

*apocyni ad 172.*

5. CYNANCHUM caule erecto divaricato, foliis cordatis glabris. *Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 409. Sauv. monsp. 133.*

*erectum.*

*Andros Kool. Bauw*

*Andros. Dirc*

*apocynum. matth.*

*Andros. Dirc*

*Cynanchum*

*Andros.*

*Apocynum folio subrotundo. Bauh. pin. 302.*

*Apocynum i. latifolium. Clas. hist. 1. p. 124.*

*Habitat in Syria. 4*

APOCYNUM.

1. APOCYNUM caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus.

*fol. androsæmi.*

*Apocynum caule erecto annuo, foliis ovatis. Roy. lugdb. 411.*

*apocynum*

*ad 172.*

*Apocynum foliis ovatis. Hort. cliff. 80.*

*Apocynum canadense, foliis androsæmi majoris. Bocc. sic. 35. t. 16. f. 3. Moris. hist. 3. p. 609. f. 15. t. 3. f. 16.*

*Habitat in Virginia, Canada. 4*

2. APOCYNUM caule rectiusculo herbaceo, foliis oblongis, cymis lateralibus.

*cannabinum.*

*Apocynum foliis ovatis acutis subtus tomentosis. Gron. virg. 28.*

*apocynum.*

*Apocynum canadense ramosum, flore e viridi albicante, filiqua tenuissima. Moris. hist. 3. p. 609. f. 15. t. 3. f. 14.*

*Apocynum virginianum, flore herbaceo, filiqua longissima. Moris. præl. 232.*

*Apocynum canadense maximum, flore minimo herbaceo. Pluk. alm. 35. t. 13. f. 1.*

*Apocynum erectum virginianum ramosum, caule subrubente, esulæ raræ foliis, filiquis tenuissimis. Pluk. alm. 35. t. 260. f. 2.*

*Habitat in Canada, Virginia. 4*

*Corollæ virides, nec pictæ sunt.*

3. APOCYNUM caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato-lanceolatis. *Roy. lugdb. 411. Sauv. monsp. 133.*

*venetum.*

*apocynum.*

*Apocynum foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 80.*

*Tithymalus maritimus, purpurascens floribus. Bauh. pin. 291.*

*Esula rara e lio venetorum insula. Lob. hist. 201.*

*Habitat in Adriatici maris insulis. 4*

4. APOCYNUM caule erecto frutescente, foliis lanceolato-ovalibus, corollis acutis: fauce villosis. *Fl. zeyl.*

*frutescens.*

114.

*Koka kodi. h. m. 92. 8. Kiti. O 3. Præm. 2. h. m. in cæno. n. m. l.*  
*fl. opp. Sæch. in cordat. obl. mid. pett. fl. coyp. anthe. alt. par. flav. apocyni ubiq. med.*  
*Med. med. Arab. Sum. papp.*

Sajon maceore Rumph. 5. 2. 175. f. 1. ...  
fol. opp. petiol. ...  
Blad. 1 ad 2. ...  
ac Sajon. ...  
214

PENTANDRIA DIGYNIA

Apocynum caule erecto arboreo, foliis ovatis acutis. Roy. lugdb. 412.

Apocynum floribus fasciculatis. Fl. zeyl. 23. t. 12. f. 1. Habitat in Zeylona. 5

reticulatum. 5. APOCYNUM caule volubili perenni, foliis ovatis venosis. Roy. lugdb. 412. Habitat in India.

ASCLEPIAS.

\* foliis oppositis planis.

1. ASCLEPIAS foliis sessilibus oblongis lanceolatis undulatis, petalis ciliatis.

Apocynum africanum, lapathi folio. Comm. rar. 16. t. 16.

Habitat in Africa. 4

gigantea. 2. ASCLEPIAS foliis amplexicaulibus oblongo-ovalibus. Fl. zeyl. 112.

Apocynum erectum majus latifolium indicum. Pluk. alm. 35. t. 175. f. 3.

Beid el ossar. Alp. egypt. 85. t. 86.

Ericu. Rheed. mal. 2. p. 53. t. 31. Seb. thes. 1. p. 41. t. 26. f. 1.

Habitat in India, Aegypto. 4

Nectaria promunt non cornicula subulata, sed laminas solidas conniventes.

canaliculata. 3. ASCLEPIAS foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus.

Asclepias caule erecto simplici herbaceo, foliis ovalibus subtus tomentosis, umbellis nutantibus. Vir. cliff. 20.

Hort. ups. 53, Gron. virg. 27. Roy. lugdb. 410.

Asclepias caule erecto simplici annuo, foliis ovato-oblongis subtus incanis, umbella nutante. Hort. cliff. 78.

Apocynum majus syriacum rectum. Corn. canad. 90.

Apocynum syriacum. Clas. hist. 2. p. 87.

Habitat in Virginia. 4

amœna. 4. ASCLEPIAS foliis ovatis subtus pilosiusculis, caule simplici, umbellis nectariisque erectis,

Apocynum floribus amœne purpureis, corniculis furrectis. Dill. elth. 31- t. 27. f. 30.

Habitat in America septentrionali. 4

purpurascens 5. ASCLEPIAS foliis ovatis subtus villosis, caule simplici, umbellis erectis, nectariis resupinatis.

assueta Rumph. 5. 2. 172. ...  
Stocymb. alt. anell. ...

Damn cyro. Rumph. 5. 2. 174 p. 2. ...  
Roy. 17 p. 110. long. com. 2. ...

*Naujara patyja h. m. g. 2. 13. fl. ovata. fr. flor. med. Olu. cypria. Pung. 52. 174 f. 1. 2*  
*fl. ovata. antivenenatorum. alt. a. l. p. i. a. d. 177. fl. ovata. fl. comitibus.*  
*Watte Kalla Kadi h. m. g. 2. 15. 21. cand. amarillima. fl. cordata. pp. longi petiol. fl. umbell.*  
*redunculata. fl. ovata. fl. pedicellat. utresque. cand. fl. ovata. fl. longi petiol. fl. umbell.*  
 PENTANDRIA DIGYNIA. 215

*Asclepias floribus obsolete purpureis, corniculis resupinatis. Dill. elth. 32. t. 28. f. 31.*  
*Apocynum erectum noveboracense, foliis minus incanis, flore ex obsolete dilute purpurascense. Herm. par. 33.*  
*Habitat in Carolina. 4*

6. ASCLEPIAS foliis ovatis rugosis nudis, caule simplici, umbellis subsessilibus: pedicellis tomentosis. *variegata.*  
*Apocynum americanum erectum, tuberosa radice, non incanum, foliis rigidioribus latis subrotundis, floribus albis intus purpureis, summo caule corymbum magnum efformantibus. Pluk. alm. 34. t. 77. f. 1.*  
*Apocynum vetus americanum, wifank. Dill. elth. 32.*  
*Habitat in America boreali. 4*

7. ASCLEPIAS foliis lanceolatis glabris, caule simplici, umbellis erectis lateralibus solitariis. *nivea.*  
*Asclepias caule erecto simplici annuo, foliis lanceolato-ovatis glabris, pedunculis alternis, umbellis erectis. Gron. virg. 27.*  
*Apocynum persicariae mitis folio, corniculis lacteis. Dill. elth. 33. t. 29. f. 32.*  
*Apocynum americanum, foliis amygdali longioribus. Plum. spec. 2*  
*Habitat in Virginia & America calidioribus.*

8. ASCLEPIAS foliis lanceolatis, caule superne diviso, umbellis terminalibus congestis. *incarnata.*  
*Asclepias caule erecto ramoso annuo, foliis lanceolatis, umbellis terminalibus erectis pluribus. Vir. cliff. 20.*  
*Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 411. Gron. virg. 27.*  
*Apocynum minus rectum canadense. Corn. canad. 9. t. 93. Barr. rar. 8. t. 72. Raj. hist. 1089.*  
*Habitat in Canada, Virginia. 4*  
*Caulis ubi dividitur folia e regione tria producit.*

9. ASCLEPIAS foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule simplici, umbellis erectis solitariis. *curassavica.*  
*Apocynum caule erecto simplici annuo, foliis lanceolatis, umbellis alternis erectis. Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 411.*  
*Apocynum radice fibrosa, petalis coccineis, corniculis croceis. Dill. elth. 34. t. 30. f. 33.*  
*Apocynum curassavicum f. americanum, fibrosa radice, floribus aurantiis, chamænerii foliis latioribus. Herm. par. 36. t. 36.*  
*Habitat in Curassao. 4. 5*

10. A-  
*Ada Kodiam h. m. g. 2. 7. 21. cand. fol. ovata longi petiol. simpliciter*  
*fl. umbell. mult. alt. fl. alb. tubo breviss. fimbriat. lobis. nutantibus.*  
*fl. ovata magna tubi inflatae fimbriat. lobis. nutantibus.*  
*Ada Kodiam spica oculorum morborum sanat.*  
*Naujara patyja h. m. g. 2. 13. Dada Yulli. Pung. fl. ovata. longi petiol. cand. 24. cand.*  
*fl. umbell. mult. fimbriat. lobis. nutantibus.*



*Wilauk. virgin* } *Asclepias in Virginia. Plin 303. Wilauk s. vinulatum*  
} *2. d. sum. quadr.*

216 PENTANDRIA DIGYNIA.

*decumbens.* 10. ASCLEPIAS foliis villosis, caule decumbente. *Asclepias caule decumbente hirsuto, foliis ovatis obtusis villosis subsessilibus. Gron. virg. 27. Apocynum carolinianum aurantiacum pilosum. Pet. sicc. 90. Habitat in Virginia. 2*

*lactifera.* 11. ASCLEPIAS foliis ovatis, caule erecto, umbellis proliferis brevissimis. *Asclepias caule erecto simplici herbaceo, foliis ovatis acuminate, corymbis compositis longitudine petiolorum. Fl. zeyl. 111. \* Habitat in Zeylona. 2*

*asclepias ad. 172*  
*Vincetoxi- cum. matth. 82* 12. ASCLEPIAS foliis ovatis basi <sup>card</sup>barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Asclepias caule erecto simplicissimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. Fl. suec. 200. Mat. med. 103. Dalib. paris. 76. Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. Hort. cliff. 78. Asclepias albo flore. Baub. pin. 303. Vincetoxicum. Dod. pempt. 407. Habitat in Europæ glareosis. 2*

*asclepias ad* 13. ASCLEPIAS foliis ovatis basi barbatis, caule superne subvolubili. *Asclepias caule subvolubili herbaceo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis patentissimis. Roy. lugdb. 410. Hort. upf. 53. Sauv. monsp. 133. Asclepias nigro flore. Baub. pin. 303. Vincetoxicum flore nigro. Cam. epit. 560. Habitat Monspelii in collibus. 2*

*X. fruticosa, asclepias ad* 14. ASCLEPIAS foliis revolutis lanceolatis, caule fruticoso. *Asclepias caule erecto fruticoso, foliis lanceolatis, umbellis nutantibus, conceptaculis inflatis pilosis. Hort. cliff. 78. Hort. upf. 54. Vir. cliff. 20. Roy. lugdb. 410. Apocynum erectum africanum, villoso fructu, falcis folio. Herm. parad. 23. t. 24. Apocynum erectum elatius, falcis angusto folio, folliculis pilosis. Pluk. alm. 36. t. 138. f. 2. Habitat in Æthiopia. 3*

15. A-

*Asclepias foliis ternatisque, caule erecto. Asclepias montana humilis. Asclepias foliis verticillatis. Vincetoxicum marianum corymbis, umbellatum. P. Vincetoxicum marianum, foliis. 609. Habitat in Virginia. \* \* \* foliis albis. Asclepias foliis alternis, pedunculo communi. Vincetoxicum caule erecto, foliis alternis, pluribus. Virg. 27. Habitat in Virginia. Asclepias foliis alternis, pilosis. Asclepias caule erecto di-umbellis simplicibus. Roy. lugdb. 411. Vincetoxicum novæ angliaë herbaceum aurantiis. Herm. t. 30. f. 34. Habitat in America bore. STAPELIA denticulis ramorum. Roy. lugdb. 409. Stapelia denticulis ramorum. Hort. upf. 54. Vincetoxicum humile aizoides. Herm. lugdb. 52. t. 5. Habitat ad Cap. b. X. Spei. STAPELIA denticulis. Roy. lugdb. 409.*

*Habit. Musc. magis. 20. 21. (pauc. volubris). Ho tuberosa fol. opp. cordata  
 flor. plerumq. annd. obtusius uti Saroth. palus de luteis inodori. Capula  
 fideliter asi anetini mugnt. in redd. flava tuberosa Sam. obl. an dym piper albi  
 Lae equorum utridum uti y hucini.*

*Habit. Brasil  
 Asclepias ad 172*

**PENTANDRIA DIGYNIA. 217**

5. ASCLEPIAS foliis revolutis lineari-lanceolatis oppositis ternatisque, caule decumbente. *sibirica.*  
 Asclepias montana humilis, radice longius proserpente, lini foliis. *Amm. ruth. 10.*  
*Habitat in Sibiria. 4*
6. ASCLEPIAS foliis revolutis linearibus verticillatis, caule erecto. *verticillata.*  
 Asclepias foliis verticillatis lineari-setaceis. *Gron. virg. 26.*  
 Apocynum marianum erectum, linearis angustissimis foliis, umbellatum. *Pluk. mant. 17.*  
 Apocynum marianum, foliis angustissimis stellatis. *Pet. mus. 609.*  
*Habitat in Virginia.*

*\* \* \* foliis alternis.*

7. ASCLEPIAS foliis alternis ovatis, umbellis ex eodem pedunculo communi pluribus. *rubra.*  
 Apocynum caule erecto simplici annuo, foliis ovatis acuminatis alternis, pluribus in pedunculo umbellis. *Gron. virg. 27.*  
*Habitat in Virginia.*

8. ASCLEPIAS foliis alternis lanceolatis, caule divaricato piloso. *tuberosa. Asclepias ad.*  
 Asclepias caule erecto divaricato villosa, foliis lanceolatis, umbellis simplicibus subterminalibus. *Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 411.*  
 Apocynum novae angliae hirsutum, tuberosa radice, floribus aurantiis. *Herm. lugdb. 646. t. 647. Dill. elth. 35. t. 30. f. 34.*  
*Habitat in America boreali. 4*

**STAPELIA.**

1. STAPELIA denticulis ramorum patentibus. *Vir. cliff. variegata. Asclepias ad. 172*  
*Stipelia. hist.*  
 20. *Roy. lugdb. 409.*  
 Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominulis. *Hort. cliff. 77. Hort. upf. 53.*  
 Apocynum humile aizoides, siliquis erectis, africanum. *Herm. lugdb. 52. t. 53. Stiff. bot. 32.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei. b. Pala montagnu des Arules pnd de Seyde in Syria.*
2. STAPELIA denticulis ramorum erectis. *Hort. cliff. hirsuta. Asclepias ad.*  
 77. *Roy. lugdb. 409.*

Asclepias africana aizoides, flore pulchre fimbriato.  
Comm. rar. 19. t. 19.

Habitat ad Cap. b. Spei. 5

HERNIARIA.

*Lithothalon. Thal. Dalib.*  
*herniaria 1771*  
*milligrava. cad.*  
*Empetrum. Cray. Linn.*  
*Epipactis ang.*  
*glabra. 272.*  
*Paronychia ad.*  
*undulata. a. Paronychia.*  
*tantum. calic. non cucullatis.*  
*utem id. s. muschura in.*  
*um s. dult. alt. epud. b.*  
*stil. o. 179. 2.*

1. HERNIARIA glabra. Bauh. hist. 3. p. 378.  
Herniaria calycibus bractea nudis. Hort. cliff. 41. Fl.  
suec. 207. Mat. med. 104. Roy. lugdb. 215. Hall.  
helv. 182. Dalib. paris. 76.

Polygonum minus f. Millagrana major. Bauh. pin. 281.  
Habitat in Europæ apricis, glareosis, siccis. ☉ 27

*ruic. alt. cap.*  
*hirfuta.*

2. HERNIARIA hirsuta. Bauh. hist. 3. p. 379.  
Habitat in Angliæ, Hispaniæ, Italiæ agris. 27, 28.

*lenticulata.*

3. HERNIARIA? quæ Polygonum lenticulatum.  
Polygonum minus tenuifolium. Bauh. pin. 281.  
Polygonum minus lentifolium. Bauh. prodr. 131.  
Habitat in Hispaniæ montibus Escurial, Monspeli.  
Flores non vidi; ut excitem Botanicos ad hujus generis  
forte distinctissimi examen, hic plantam adjeci; Habitu  
tus proximus herniariæ, sed molliissimus.

CHENOPODIUM.

*Chenopodium ad. 261.*

\* foliis angulosis.

*Bonus Henricus.*  
*Chrysochlorum Thal.*  
*annum atipia*

1. CHENOPODIUM foliis triangulari-sagittatis integerimis.  
Hort. cliff. 84. Fl. suec. 208. Mat. med. 106.  
Roy. lugdb. 278. Hall. helv. 174. Dalib. paris. 79.  
Lapathum unctuosum. Bauh. pin. 115  
Bonus Henricus. Bauh. hist. 2. p. 965.  
Habitat in Europæ ruderatis. 4

*urbicum.*

2. CHENOPODIUM foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. Fl. suec. 209.  
Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolis longissimis ex foliorum alis confertim nascentibus. Buxb. hall. 69. t. 1.  
Habitat in Europæ borealis plateis. ☉

*Chenopodium ad.*  
*rubrum.*

*Chenopodium 1. Rab.*  
*transversum. Buch.*  
*Lobelia*  
*Lobelia*

3. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnatis caule brevioribus. Fl. suec. 210. Mat. med. 107.  
Dalib. paris. 78.  
Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus antice sinuato-dentatis, racemis erectis foliosis lateralibus.  
Hort. cliff. 85. Roy. lugdb. 219.

PENTANDRIA  
sylvestris latifolia  
Dalech. bil  
in Europæ cultis  
CHENOPODIUM fol  
ramosis nudis. Fl. J  
podium erectum ram  
dentatis, racemis ram  
85. Lech. scan.  
in Europæ muris  
CHENOPODIUM fo  
erosi postice integ  
Fl. suec. 212.  
podium foliis inferi  
tatis: summis lance  
85. Gron. virg.  
175. Champ. fl.  
in agris Europæ.  
CHENOPODIUM fo  
racemis ramosis fu  
78.  
podium sylvestre,  
L. I.  
podium folio oblo  
in Europæ cultis  
CHENOPODIUM fo  
racemis ramosis nu  
79.  
podium foliis trian  
sinuato-dentatis, racem  
Roy. lugdb. 219.  
podium stramonii  
sylvestris latifo  
119.  
in Europæ culti  
CHENOPODIUM f  
natis multifidis. Hort  
med. 109. Roy. lugdb  
rys ambrosioides vul  
rys. Dod. pempt. 34  
in Europæ aust  
CHENOPODIUM

*Atriplex sylvestris latifolia. Baub. pin. 119.*  
*Pes anserinus. Dalech. hist. 542. t. 542.*  
*Habitat in Europæ cultis, ruderatis. ☉*

CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, racemis ramosis nudis. *Fl. suec. 211. Dalib. paris. 211.* *album. • chenopodium*

*Chenopodium erectum ramosissimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramosis caulem superantibus. Hort. cliff. 85. Lech. scan. 16.*

*Habitat in Europæ muris aggeribusque. ☉*

CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangularibus erosis postice integris; summis oblongis, racemis erectis. *Fl. suec. 212. Dalib. paris. 80.* *album. • chenopodium*

*Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis; summis lanceolatis. Vir. cliff. 22. Hort. cliff. 85. Gron. virg. 145. Roy. lugdb. 219. Hall. helv. 175. chenopodium foliis ovato cordicatis non.*

*Habitat in agris Europæ. ☉*

6. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subnudis. *Fl. suec. 213. Dalib. paris. 78.* *viride. chenopodium ad 261.*

*Chenopodium sylvestre, opuli folio. Vaill. paris. 36. t. 7. f. 1.*

*Chenopodium folio oblongo integro. Dill. app. 62.*  
*Habitat in Europæ cultis oleraceis.*

7. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Fl. suec. 214. Dalib. paris. 79.* *hybridum. • chenopodium*

*Chenopodium foliis triangulari-sagittatis; infra medium sinuato-dentatis, racemis longissimis. Hort. cliff. 84. Roy. lugdb. 219.*

*Chenopodium stramonii folio. Vaill. paris. 36. t. 7. f. 2.*

*Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. Baub. pin. 119.*

*Habitat in Europæ cultis. ☉*

8. CHENOPODIUM foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff. 84. Hort. ups. 55. Mat. med. 109. Roy. lugdb. 219. Sauv. monsp. 273.* *Botrys. ? nov. gener. Botrys. Regi. mult. ad 261. chenopodium*

*Botrys ambrosioides vulgaris. Baub. pin. 138.*

*Botrys. Dod. pempt. 34.*

*Habitat in Europæ australis arenosis. ☉*

9. CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, racemis *ambrosioides. • Botrys ad 261.*

mis foliatis simplicibus. Hort. cliff. 84. Hort. lugdb. 219.

*Savate. mnicob* Botrys ambrosioides mexicana. Bauh. pin. 138. 516.  
*Epagott. Reuch.* Botrys odorata suaveolens americana mexicana. *M. L.S.C. 32* ris. hist. 2. p. 605. f. 5. t. 35. f. 8.  
Habitat in Mexico, Lusitania. ☉

*multifidum* 10. CHENOPODIUM foliis multifidis: segmentis linearibus, floribus axillaribus sessilibus.  
*Chenopodium ad 261.* Botrys ad.  
Chenopodium sempervirens, foliis tenuiter laciniatis.  
Dill. elth. 78. t. 66. f. 77.  
Habitat in Bonaria. ☽

*anthelminti-cum.* 11. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis dentatis racemis aphyllis.  
*Chenopodium ad* Botrys ad.  
Chenopodium, lycopi folio, perenne. Dill. elth. 77. t. 66. f. 76.  
Habitat in Pensylvania, Bonaria. ♀

*glaucum.* 12. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis racemis nudis simplicibus glomeratis Fl. suec. 215.  
*Chenopodium ad* Botrys ad.  
Chenopodium foliis ovato oblongis repande sinuatis, florum racemis glomeratis ex ala solitariis. Vir. cliff. 22. Hort. cliff. 85. Roy. lugdb. 219.  
Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Tournef. inst. 506.*  
Habitat ad Europæ simeta. ☉

*Chenopodium ad* 13. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis. Fl. suec. 216. Mart. med. 108. Dalib. paris. 77.  
*Vulvaria. J. L. C. 13*  
*Gav. m. m. G. d. d. d.*  
*Contra vulgo. Casalp.*  
*S. conivea*  
*Stincking-orrache ad*  
Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Hort. cliff. 84. Roy. lugdb. 218.  
Atriplex foetida. Bauh. pin. 119.  
Vulvaria. Dalech. hist. 543.  
Habitat in Europæ cultis oleraceis, ☉

*polyspermum* 14. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis.  
*Chenopodium* beta folio.  
Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. Vir. cliff. 21. Fl. suec. 217. Roy. lugdb. 218. Dalib. paris. 77.  
Blitum foliis ovatis. Hort. cliff. 28.  
Blitum polyspermum. Bauh. pin. 118.  
Polysporon cassiani, bassii, anguillare. Lob. hist. 128.  
Habitat in Europæ cultis. ☉

15. GHE-

CHENOPODIUM  
integerrimis. Hort.  
lugdb. 220.  
scoparia. Bauh.  
Dod. pempt. 1  
Gracia, Jap  
CHENOPODIUM  
foliis su  
convexis. Hort. cliff.  
minus album, semi  
ris. hist. 2. p. 610.  
in Europæ mari  
CHENOPODIUM  
caule fruticoso. Ha  
st. stamp. 2. p. 4  
podium, sedi folio  
lugdb. 2. p. 9  
minus arborescen  
in Gallia, Hispa  
CHENOPODIUM f  
erecto. Hort. up  
podium altissimum.  
21. t. 31. f. 2.  
ramineo folio. Bau  
20.  
podium foliis filifor  
ramosissimo. Hor  
ad Astracatum, ad  
CHENOPODIUM fo  
rex, caule ramoso:  
podium maritimum.  
1. p. 21. t. 31. y  
ad Astracatum. C  
CHENOPODIUM fol  
ternis, caule herbace  
minus villosum. Bauh.  
parvum hirsutum. Ba  
Monspeli in mari  
CHENOPODIUM fol  
dichotomis spinos  
in Sibiria. ☉