



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Thapsia idve *Lubith* ganganicum, semine latissimis. etc.
 H. fr. 24. 4 ped. p. l. t. f. uti 1. h. d. latiora et breviora 2. p. i. a. l. o. v. a. t. r. o. v. i. c. l. u. i. d. a. p. r. i. t. i. s. h. u. n. s. u. l. a. t. u. s.
 261 } *Thapsia* ad 100
 Lib. 1. p. 218
 S. ganganica

PENTANDRIA DIGYNIA.

Carvifolia Bauh. pin. 158. Bauh. hist. 3. p. 171. Vaill. ^{f. l. o. a. n. y. a. d. u. c. u. l. 2. y. p. a. l. o. r. u. m. p. 244.}
 paris. t. 5. f. 2.

Angelica tenuifolia. Riv. pent. 18.

Habitat in Helvetia, Germania, Anglia. 4

9. SESELI foliis duplicato-pinnatis; foliolis incisus acutis, involucris setaceis umbellula longioribus. pyreneum.

Carvi alpinum. Bauh. pin. 158. prodr. 84. Burs. VIII: 36.

Habitat in Pyrenæis.

Caulis pedalis, teres, striatus. Folia radicalia duplicato-pinnata, laxa, parum divaricata: Foliolis pinnatis, longitudinaliter incisus, acuminatis, cuneiformibus; Folium in caule saepe unicum, ex cuius ala exit ramus; petioli radicales simplices; caulibus lato-membraceus. Umbella universalis nuda, oblonga, pedunculis circiter octo; partialis conferta, brevissima, uniformis: involucre polyphylo, setaceo, longiore umbellulis.

10. SESELI caule filiformi divaricato, foliis duplicato-ternatis linearibus, umbellis subsexfidis. saxifragum.

Pimpinella saxifraga tenuifolia. Bauh. pin. 160. prodr. 84. Burs. VIII: 5.

Habitat ad Lacum Genevensem.

Planta pedalis. Caulis filiformis, ramosus & subramosus, divaricatus, teres, tenuis. Folia parva, duplicato-ternata, linearia, raro lobata. Umbellæ nuda, pedunculis sex saepius; umbellulæ involucre flosculis sex ad octo.

Seseli *Lubith*. Lin.

THAPSIA.

1. THAPSIA foliolis dentatis basi coadunatis. Hort. cliff. villosa. 105. Roy. lugdb. 113.

Thapsia latifolia villosa. Bauh. pin. 148. ^{maxima latissimo folio etc. Thapsia Ma. Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Thapsia. 1. Clus. hist. 2. p. 192. ^{Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Habitat in Hispania, Lusitania. 4 ^{6 ped. p. l. t. f. uti 1. h. d. latiora et breviora 2. p. i. a. l. o. v. a. t. r. o. v. i. c. l. u. i. d. a. p. r. i. t. i. s. h. u. n. s. u. l. a. t. u. s.}

2. THAPSIA foliolis multifidis basi angustatis. Hort. fetida. 1400. fl. p. cliff. 105. Roy. lugdb. 113. ^{Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Thapsia carotæ effigie. Bauh. hist. 3. p. 187. Moris. ^{Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

hist. 3. p. 319. f. 9. t. 18. f. 7. ^{Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Habitat in Hispania. 4 ^{6 ped. p. l. t. f. uti 1. h. d. latiora et breviora 2. p. i. a. l. o. v. a. t. r. o. v. i. c. l. u. i. d. a. p. r. i. t. i. s. h. u. n. s. u. l. a. t. u. s.}

3. THAPSIA foliolis multifidis setaceis. Hort. cliff. 106. ^{Beide. ap. Asclepium. Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Roy. lugdb. 113. ^{Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Ligusticum fœniculi folio. Carv. ^{Thapsia latifolia non parva vicem alypias seu Lubith. Topp. Bauh. 1584}

Seseli. ad. 96.

Podifarina seu floribus quo flatibus ventris emigunt Ind. or. B. 1558. } Podifarina Indon

PENTANDRIA DIGYNIA. 263

Ægopodium foliis caulinis summis novenis. Hort. cliff. 107. Roy. lugdb. 115.

Angelica acadensis, flore luteo. Dod. act. 55. Raj. hist. 1368.

Angelica humilior & minor, flore luteo. Moris. hist. 3. p. 281.

β. Smyrnum foliis caulinis decompositis acuminatis. Gron. virg. 148.

Smyrnum aureum, lobis ternis quinisque, marianum. Pluk. mant. 173.

Habitat in America boreali.

4. SMYRNIUM foliis caulinis duplicato ternatis integerrimis, integerrimum.

Smyrnum foliis caulinis ternatis petiolatis: foliolis oblongo-ovatis integerrimis. Gron. virg. 148.

Habitat in Virginia.

ægypticum.

ANETHUM.

anethum ad. 100

1. ANETHUM fructibus compressis. Hort. cliff. 106. graveolens. Hort. ups. 66. Mat. med. 146. Roy. lugdb. 116.

Anethum hortense. Baub. pin. 147. Habitat inter Lusitaniæ & Hispaniæ segetes.

2. ANETHUM fructibus ovatis. Hort. cliff. 106. Hort. Fœniculum. ups. 66. Mat. med. 147. Roy. lugdb. 116.

Fœniculum dulce. Baub. pin. 147. Fœniculum vulgare germanicum. Baub. pin. 147.

Fœniculum sylvestre. Baub. pin. 147. Habitat in Narbonæ, Aremoriæ, Maderæ rupibus cre-

taceis.

CARUM.

Carvi ad 95.

1. CARUM. Dod. pempt. 299. Fl. lapp. 105. Fl. suec. Carvi. 245. Mat. med. 138. Hort. cliff. 106. Roy. lugdb. 116. Hall. helv. 428.

Carum pratense, Carvi officinarum. Baub. pin. 158. Habitat in Europæ borealis pratis.

PIMPINELLA.

1. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus.

Pimpinella foliolis subrotundis. Fl. suec. 246. Mat. med. 125.

Pimpinella. Hort. cliff. 106. Roy. lugdb. 115.

1753

R 4

Pim-

I Gen. Tragacelinum Saxifraga. Pimpinella... Pimpinella... Pimpinella... Pimpinella...

Dollin. Dier. L. 1. p. 71.
Botchm. ad 343.
Madelcom

268 **PENTANDRIA TRIGYNIA.**
Calepuz. *Salvia diluta* (syn. *Guthriei*) humis coluit, undecum sit
contra hunc erupta utilis.

- Thinnus. Cart.* β. *Laurus sylvestris*, foliis venosis. *Bauh. pin.* 461.
 - Lentago. Bellon.* γ. *Laurus sylvestris*, folio minore. *Bauh. pin.* 461.
- Habitat in Lusitania, Hispania, Italia. h*

- 1. *Gen.* • nudum. *Viburnum ad 154*
- 2. **VIBURNUM** foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Tinus* foliis ovatis in petiolos terminatis integerrimis. *Gron. virg.* 33. *Habitat in Virginia. h*
Cymæ in hac nudæ, in precedenti involucre.

- 1. *Gen.* • prunifolium. *Viburnum ad*
- 3. **VIBURNUM** foliis subrotundis crenato ferratis glabris. *Gron. virg.* 33. *Viburnum canadense glabrum. Vaill. act.* 1722. p. 200. *Mespilus prunifolia virginiana non spinosa, fructu nigricante. Pluk. alm.* 249. t. 46. f. 2. *Habitat in Virginia, Canada. h*

- dentatum. *Viburnum ad*
- 4. **VIBURNUM** foliis ovatis dentato-ferratis ovatis. *Habitat in Virginia. h*

- 1. *Gen.* • *Lantana*. *Viburnum ad*
- 5. **VIBURNUM** foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis. *Vir. cliff.* 25. *Hort. ups.* 68. *Roy. lugdb.* 242. *Sauv. monsp.* 136. *Viburnum. Hort. cliff.* 107. *Lantana. Dod. pempt.* 701. *Habitat in Europæ australioris sepibus argillofis. h*

- acerifolium. *Viburnum ad*
- 6. **VIBURNUM** foliis lobatis, petiolis lævibus. *Opulus. Gron. virg.* 149. *Habitat in Virginia. h*

- *Opulus. Rud.* *Viburnum ad*
- 7. **VIBURNUM** foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Opulus. Hort. cliff.* 109. *Fl. suec.* 249. *Roy. lugdb.* 243. *Sambucus aquatica, flore simplici. Bauh. pin.* 456. *Sambucus palustris. Dod. pempt.* 846. β. *Sambucus aquatica, flore globofo pleno. Bauh. pin.* 456. *Habitat in Europæ pratis humidiusculis. h*

- 1. *Gen.* • *Lentago. Linn.* *Viburnum ad*
- 8. **VIBURNUM** foliis ferrulatis ovatis acuminatis glabris, petiolis glandulosis. *Habitat in Canada. Kalm. h*
Folia crassa Tini, glabra, denticulis minimis serrulata; petiolis longitudinaliter glandulosis.

- Mauritan. ad. 303* • *Peragna.* **CASSINE.**
- 1. **CASSINE** foliis oblongis ferratis.

one. Sangua en
fol. opp. cruciatim
fol. laniat. rari
fol. conyubi. mali
PENTANDRIA
long. flor.
Cassine. Hort. cliff.
242. fol. conyubi
Phillyrea capensis, Pluk. alm. 94.
f. 305. t. 4 ad 5. p. 1
Cerasus Sebestena
Frutex æthiopicus, t. 29. f. 5. p. 1
Habitat in Æthiopia
CASSINE foliis
Maurocentia. Hort
Frangula sempervi
clb. 146. t. 12.
Cerasus capensis, gaz. t. 57. f. 4
Cerasus africana, fructu rubro. Pl
Habitat in Æthiopia
SAMBUCUS c
Sambucus caule n
free. 251. Mat
lugdb. 245.
Sambucus humilis
Ebulus. Fuchs. hi
Sambucus humilis t
456.
Habitat. in Europa
SAMBUCUS c
natis.
Habitat in Canada
Media inter S. E
at folia pinnata;
bus magis ovatis;
terrambyeme. C
filiformes, trunc
pansa, ut in Ebu
SAMBUCUS c
Sambucus caule a
Roy. lugdb. 243
Sambucus caule p
Sambucus fructu i
cas
Sambucus

Tamarix aegyptia - arbor. Bauh. pin. 485.

? hinc. D. Rosta quos, calices 4 ped. corollae 4 lob. et capsula 4 gona 4 valv. unguis

charmesel arab. Melin.
carmelit. arab.
atlas alpini Tamarix.
athel. Tamarix Bauh. ad.

PENTANDRIA TRIGYNIA.

271

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris. Hort. ups. 69. Mat. med. 154.

Tamarix altera, folio tenuiore, f. gallica. Bauh. pin. 485.

Tamariscus narbonensis. Lob. ic. 218. ~~atlas alpini~~

Habitat in Gallia, Hispania, Italia. h. ~~atlas alpini~~ f. gallica.

2. TAMARIX floribus decandris. Hort. cliff. III. Roy. lugdb. 436.

Tamarix fruticosa, folio crassiore, f. germanica. Bauh. pin. 485.

Tamariscus germanica. Lob. ic. 218.

Habitat in Germaniae locis inundatis. h. ~~atlas alpini~~ ~~atlas alpini~~

TURNERA

1. TURNERA foliis serratis, petiolis floriferis. Vir. cliff. 20 Hort. cliff. 112. t. 10. Roy. lugdb. 434.

Turnera frutescens ulmifolia. Plum. gen. 15. Mart. cent. 49. t. 49.

Cistus urticae folio, flore luteo, vasculis trigonis; Sloan. jam. 86. hist. 1. p. 202. t. 127. f. 4. 5. Raj. dendr. 492.

Helianthemoides. Bauh. lugdb. 2. p. 260.

β. Turnera frutescens, folio longiore & mucronato. Mart. cent. 49. t. 49.

Habitat in Jamaica, & in America calidiora.

TELEPHIUM.

1. TELEPHIUM. Hort. ups. 70.

Telephium foliis oblongo-ovatis, racemis secundis terminalibus. Vir. cliff. 20. Hort. cliff. 73. Roy. lugdb. 434.

Telephium repens, folio non deciduo. Bauh. pin. 287.

Telephium legitimum. Clus. hist. 2. p. 67.

Cistus folio majoranae. Bauh. pin. 465.

Habitat in Gallo-provincia. 4

CORRIGIOLA.

1. CORRIGIOLA. Hort. ups. 70.

Corrigiola caule fasciculis florum terminato. Hort. cliff. 112. Roy. lugdb. 420. Hall. helv. 391.

Polygonum litoreum minus, flosculis spadiceo albican- tibus. Bauh. pin. 281. prodr. 131. Moris. hist. 2. p. 593. f. 5. t. 29. f. 1.

Habitat in Galliae, Germaniae litoribus arenosis. ☉

1. PHAR-

Tamarix ad 269

germanica.
Tamarix Bauh. pin. 485.
Tamarix f. gallica. Lob. ic. 218.
Tamarix f. germanica. Bauh. pin. 485.

Turnera ad 244.

ulmifolia.
Turnera ad 244.

Telephium ad

imperati.
Telephium ad

Polygonum ad 272.

Polygonum ad 272.

litoralis.

Polygonum ad 272.

hedera ad.
102.
Linn. sp. 202.

aralia capitata 2) caule arborea foliis simplicibus floribus
capitata congestis. Baug. Monum. 169. heder. Mon. sp. 18
274 PENTANDRIA PENTAGYNIA
hedera arbor. Plin. ic. 144. et aralia sic propter folia 5. et ovales
Ab alt. simplicibus Baugors. p. pandub. et aralia
Panaces carpimon f. racemosa canadensis. Corn. canad.
74. t. 75. Barr. ic. 705.
Christophoriana canadensis racemosa & ramosa. Moris.
hist. 1. p. 9. f. 1. t. 2. f. 9.
Habitat in Canada. 2

• nudicaulis.
aralia ad. 102.
3. f
u 4. G

4. ARALIA caule nudo. Hort. cliff. 113. Gron. virg.
34. Roy. lugdb. 94.
Aralia caule nudo, radice repente. Cold. noveb. 66.
Christophoriana virginiana, zarzæ radicibus furculosis &
fungosis. Pluk. alm. 98. t. 238. f. 5.
Habitat in Virginia, simillima (forte eadem) in Iava. 2

BARRERIA. ad. 448

capensis.

1. BARRERIA ^{sup. imi pamp. f. n. 2. confusa}
^{anale diosma oul. Kustoga.}
Erica capitata f. nodiflora, corios foliis rectis, æthio-
pica. Pluk. mant. 69. t. 346. f. 7.
Habitat in Æthiopia. 5
Frutex; Rami per spatia determinata conferti, erecti,
rufescentes, adpersi pilis albis. Folia alterna, appro-
ximata, ovato-lanceolata, integerrima, pilis albis velut
ciliata; Capitula florum terminalia; Simillima est ha-
bitu Diosmæ ciliatæ.

Statice ad 283.

STATICE.

• Armeria.

1. STATICE caule nudo simplici capitato. Hort. cliff.
115. Fl. suec. 253. Gron. virg. 150. Roy. lugab. 194.
Limonium aphyllocaulon gramineum globosum. Moris.
hist. 2. p. 15. t. 1. f. 20.
Caryophyllus montanus major, flore globoso. Bauh.
pin. 211.

Staudenby. gal. 2. B. Caryophyllus montanus minor. Bauh. pin. 211.
Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis cam-
pis. 2. 4. rad. fl. radie. capota dula.

Limonium ad 243.

• Limonium.

2. STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis lævi-
bus.

Statice caule nudo ramoso. Hort. cliff. 115. Fl.
suec. 254. Gron. virg. 150. Roy. lugdb. 192.

Limonium maritimum majus. Bauh. pin. 192.

β. Limonium maritimum minus, oleæ folio. Bauh. pin.
192.

γ. Statice foliis obverse-ovatis glabris, caule nudo ramo-
so. Sauv. monsp. 15.

Limonium parvum, bellidis minoris folio. Bauh. pin.
192. J. Lino-

PENTAND
Limonium marin
prodr. 99. Bocc.
Habitat in Europa
STATICE caule
tusis. Sauv. monsp
Limonium maritim
192. prodr. 99.
Limonium minimu
ic. 805.
Habitat ad maris
STATICE caule
culatis. Linn. in L
Statice foliis obver
nudo. Sauv. mon
Limonium minus a
157. t. 156.
Habitat Monspeli.
STATICE caule
terilibus retrofle
statice foliis ob
intricatis Sauv.
Limonium minus,
picatis. Pluk. al
Limonium reticul
t. 44.
Habitat in Melita
STATICE caule
lanceolatis mucro
Limonium foliis
caule ancipiti di
192. 71. Gmel. f
Limonium floribus
Limonium elatius,
cauleum termina
gestis. Amm. ru
Habitat in Tataria.
STATICE caule
latis mucronatis
Gmel. 2. p. 223.
Limonium orient
latis. Tournef. c
Limonium elatius,

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 275

2. Limonium maritimum minimum. *Baub. pin. 192. prodr. 99. Bocc. sic. 25. t. 19.*
Habitat in Europæ & Virginie maritimis. ♀

3. STATICE caule nudo paniculato foliis spathulatis re- ^{cordata:}
 tufis. *Sauv. monsp. 15. †*
 Limonium maritimum minus, foliis cordatis. *Baub. pin. 192. prodr. 99.* *Limonium ad 283.*
 Limonium minimum cordatum f. folio retuso. *Barr. ic. 805.*
Habitat ad maris Mediterranei litora. ♀

4. STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis tuber- ^{echioides:}
 culatis. *Limonium Luyt. auricula uniflora?* *Limonium ad*
 Statice foliis obverse-ovatis verrucosis, caule ramofo
 nudo. *Sauv. monsp. 15,*
 Limonium minus annuum bullatis foliis. *Magn. monsp. 157. t. 156.*
Habitat Monspelii. ☉

5. STATICE caule subnudo paniculato prostrato, ramis ^{reticulata:}
 sterilibus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus.
 Statice foliis obverse-ovatis, ramis nudis humifusis,
 intricatis *Sauv. monsp. 15.*
 Limonium minus, virgulis retiformiter se invicem im-
 plicatis. *Pluk. alm. 221. t. 42. f. 4.*
 Limonium reticulatum. *Raj. hist. 396. Bocc. sic. 82. t. 44.*
Habitat in Melita.

6. STATICE caule subnudo dichotomo ancipiti, foliis ^{speciosa:}
 lanceolatis mucronatis, floribus aggregatis.
 Limonium foliis lanceolatis mucronatis radicalibus,
 caule ancipiti dichotomo, stipulis simplicibus. *Hort. ups. 71. Gmel. sibir. 2. p. 221. t. 91. f. 1.*
 Limonium floribus elegantissimis. *Raj. hist. 397.*
 Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in
 aculeum terminatis, floribus albis in capitula conge-
 gestis. *Amm. ruth. 129.*
Habitat in Tataria. ♂

7. STATICE caule subnudo dichotomo, foliis lanceo- ^{tatarica:}
 latis mucronatis, floribus alternis distantibus. *Gmel. sibir. 2. p. 223. t. 92.*
 Limonium orientale, plantaginis folio, floribus umbel-
 latis. *Tournef. cor. 25. Boerb. lugdb. 1. p. 76. t. 76.*
 Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in
 aculeum terminatis. *Hort. cliff. 115. Roy. lugdb. 192. Baub. pin. 192. Boerh. lugdb. 1. p. 76. t. 76.*

aculeum terminatis, floribus albis spicatis. *Amm. ruth.* 130.

Habitat in Tataria. ♂

Echinus.
Limonium ad 283

8. STATICE caule nudo paniculato, foliis subulatis mucronatis.

Limonium foliis caulinis subulatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 192.

Limonium orientale frutescens, caryophylli folio in aculeum rigidissimum abeunte. *Tournef. cor.* 25.

Limonium cespitosum, foliis aculeatis. *Buxb. cent.* 2. p. 18. t. 10.

β. *Limonium græcum*, juniperi folio. *Tournef. cor.* 25.

Echinus f. *Tragacantha altera*. *Alp. exot.* 57. t. 56.

Habitat in Græciæ & Mediæ desertis.

flexuosa.

9. STATICE caule nudo ramoso flexuoso, corymbis terminalibus, foliis nervosis. *Gmel.*

Statice foliis ovalibus muticis nervosis, caule nudo alternatim ramoso flexuoso, corymbis terminantibus.

Gmel. sibir. 2. p. 217. t. 89. f. 1.

Habitat in Sibiria.

suffruticosa.

10. STATICE caule fruticoso: superne nudo ramoso, capitulis sessilibus, foliis lanceolatis vaginantibus.

Statice foliis e lanceolato-linearibus caulinis basi vaginantibus, capitulis alternis sessilibus. *Gmel. sibir.* 2. p. 216. t. 88. f. 2. 3.

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* b

• *monopetala.*
Limonium ad
Limoniastrum hist.

11. STATICE caule fruticoso folioso, floribus solitariis, foliis lanceolatis vaginantibus.

Statice foliis caulinis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 192. *Limonium halimifolia hist.*

Limonium lignosum. *Bocc. sic.* 34. 35. t. 16. 17.

Habitat in Sicilia.

aurea.

12. STATICE caule fruticoso folioso ramoso, foliis subulatis.

Statice caulibus fruticosis teretiusculis, foliis subulatis caulinis, floribus ex corymboso fasciculatis. *Gmel. sibir.* 2. p. 218.

Limonium maritimum humile, ephedræ facie, calycibus florum aureis. *Amm. ruth.* 132. t. 18. f. 2.

Habitat in Dauriæ campis montosis.

• *sinuata.*
Limonium ad

13. STATICE foliis radicalibus alternatim pinnato-sinuatis:

PENTANDRIA
atis: caulinis terni
Hort. upf. 71.
Statice foliis caulinis
Limonium peregrin
Limonii species. R
Limonium rauvolfi
Limonium african
tis, petalo pallide
cent. 48. t. 48.
Habitat in Sicilia,
*
LINUM calycib
natis, foliis lance
Linum ramis foliis
annua. Hort. cl
Linum foliis altern
acuminatis angu
71. Mat. med.
Linum arvense. B
Linum sativum.
Linum sativum h
p. 284.
Linum sativum l
Tournef. inst. 3
Habitat hodie inte
LINUM calycib
lanceolatis integ
Linum foliis alter
apice obtusis, ca
Linum perenne, r
tis. Hort. cliff.
Linum perenne m
rif. hist. 2. p.
Linum sylvestre
pitulo majore.
Habitat in Sibiria
LINUM calycib
caule corymbo
Linum sylvestre
pin. 339. Mo
Raj. hist. 107

aguaroponda. Brus. mangn. 6. hnta p ad 1 ped. auct. caule gmi abterete
fl. verticill. 4 vel pluribus interduo inoag. angusta bnta. c. pica 1. ped. caule
tenuis terz flouibz caule vobae. facit 8 petalis. ?/pu. Solemnii

PENTANDRIA PENTAGYNIA.

277

aguaroponda Brus
Rotten steat. Belg
aguaroponda ad
244

atis: caulinis ternis triquetris subulatis decurrentibus

Hort. upf. 71.

Statice foliis caulinis decurrentibus. Hort. cliff. 116.

Limonium peregrinum, foliis asplenii. Bauh. pin. 192.

Limonii species. Rauw. itin. 313. t. 314.

Limonium rauwolfianum. Clus. cur. 33. t. 33.

β. Limonium africanum, caule elato, foliis integris hirsutis, petalo pallide flavo, calyce amœne purpureo. Mart. cent. 48. t. 48.

Habitat in Sicilia, Palæstina, Africa. ♂

LINUM.

* Foliis alternis.

1. LINUM calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario.

Linum ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. Hort. cliff. 114. Roy. lugdb. 433.

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucronatis. Hort. upf. 71. Mat. med. 156.

Linum arvense. Bauh. pin. 214. Raj. hist. 1073.

β. Linum sativum. Bauh. pin. 214.

γ. Linum sativum humilius, flore majore. Boerb. lugdb.

I. p. 284.

δ. Linum sativum latifolium africanum, fructu majore.

Tournef. inst. 339. c. y. hnt. hnt. hall. n. 1836.

Habitat hodie inter segetes Europæ australis. ☉

2. LINUM calycibus capsulisque obtusis, foliis alternis lanceolatis integerrimis.

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus apice obtusis, capsulis muticis. Hort. upf. 72.

Linum perenne, ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis. Hort. cliff. 114. Roy. lugdb. 434. Sauv. monsp. 53.

Linum perenne majus cæruleum, capitulo majore. Moris. hist. 2. p. 573.

Linum sylvestre cæruleum perenne erectius, flore & capitulo majore. Raj. angl. 3. p. 362.

Habitat in Sibiria et Cantabrigiæ ♀

3. LINUM calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis, caule corymbofo.

Linum sylvestre latifolium hirsutum cæruleum. Bauh. pin. 339. Moris. hist. 2. p. 573. f. 5. t. 26. f. 5.

Raj. hist. 1073.

Linum ad 260

ustatissimum

Linum. Bauh. Pin. 214

Linum ad.

Linum. idant.

ad. Linum. Botand.

Linum sylvestre latifolium. *Clus. hist. 1. p. 317.*
Habitat in Austria, Tataria editis graminosis.

- *narbonense.* 4. LINUM calycibus acuminatis, foliis lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso. *Linum sylvestre cæruleum, folio acuto. Baub. pin. 214. prodr. 107. Raj. hist. 1073.*
Linum sylvestre angustifolium, cæruleo amplo flore. Magn. monsp. 161. Sauv. monsp. 54.
Habitat in Galloprovincia, Monspeli, unde Burserus attulit C. Bauhino. & Helvet. herb. n. 837.
- *tenuifolium.* 5. LINUM calycibus acuminatis, foliis sparsis lineari-fetaceis retrorsum scabris. *Linum perenne, foliis angustioribus, calyce aristato. Hall. helv. 371.*
Linum sylvestre angustifolium, flore magno. Baub. pin. 214.
Linum sylvestre V. angustifolium. Clus. hist. 1. p. 318.
 β. *Linum sylvestre angustifolium, flore magno intense cæruleo. Tournef. inst. 340.*
 γ. *Linum sylvestre angustifolium, flore magno violaceo. Tournef. inst. 340.*
 δ. *Linum sylvestre angustifolium, flore magno lineis purpureis distincto. Tournef. inst. 340.*
 ε. *Linum sylvestre angustifolium, flore magno cæruleo & velut cinereo. Tournef. inst. 340.*
Lini sylvestris V. angustifolii aliud genus. Clus. hist. 1. p. 318.
 ζ. *Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurescentibus vel carneis. Baub. pin. 214.*
Linum sylvestre VI. angustifolium. Clus. hist. 1. p. 318.
Linum oxyphyllum multicaule. Bocc. mus. 2. p. 169. t. 125.
 η. *Linaria, capillaceo folio, altera. Baub. pin. 213.*
 θ. *Linum angustifolium album, ramusculis per terram sparsis. Tournef. inst. 340. Haller n. 838.*
Habitat in Gallia, Helvetia aridis herbosis. &
- *austriacum.* 6. LINUM calycibus rotundatis obtusis, foliis linearibus acutis. *Linum sylvestre angustifolium, foliis rarioribus. Baub. pin. 214.*
Linum sylvestre II. Tabern. ic. 822.
Habitat in Austria inferiore.

Linum ad. 257

7. LINUM calycibus acutis alternis, capsulis muticis, pa-^{virginianum}
nicula filiformi, foliis alternis lanceolatis: radicalibus
ovatis.

Linum ramis foliisque alternis lanceolatis sessilibus ner-
vo longitudinali instructis. *Gron. virg. 35.*

Habitat in Virginia, Pennsylvania.

Caulis filiformis, pedalis, paniculatus. Folia radicalia o-
valia, integerrima, levia; caulina alterna, lanceolata.
Flores alterni: pedunculis brevissimis. Calyces acuti.
Capsulæ globosæ, muticæ; Corollæ luteæ.

8. LINUM calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatis al-^{trigynum.}
ternis, paniculæ pedunculis bifloris. *Chamaelimum Lob. gen.*

Linum foliis lineari-lanceolatis, pedunculis bifidis, flo-
ribus luteis. *Sauv. monsp. 53.*

Linum sylvestre minus, flore luteo. *Bauh. pin. 214.*

Habitat in Monspelii. *D. Sauvages.*

Planta spithamea. Caules ad basin saepe ramos duos op-
positos exserunt. Corolla flava, rotata, tubo supra ba-
sin coherente longitudine calycis. Pistilla in hoc sapi-
us 3 observavit *Ill. Sauvages.*

9. LINUM calycibus subserrato-scabris lanceolatis sub-^{flavum.}
sessilibus, panicula ramis dichotomis. *2. Signoli.*

Linum sylvestre latifolium luteum. *Bauh. pin. 214.*

Linum latifolium luteum. *Bauh. hist. 3. p. 454.*

Linum sylvestre III. latifolium. *Clus. hist. 1. p. 317.*

Habitat in Austria.

10. LINUM calycibus foliisque lanceolatis strictis mu-^{strictum.}
cronatis: margine scabris. *Palladium Lob. Dalech.*

Linum foliis asperis umbellatum luteum. *Magn. monsp.*

164. Raj. hist. 1076. Sauv. monsp. 53.

Lithospermum, linariæ folio, monspeliensium. *Bauh.*
pin. 259.

Passerina lobelii. *Bauh. hist. 3. p. 454.*

Habitat in Monspelii, Hispaniæ, Siciliæ squalidis. ☉

11. LINUM foliis linearibus acutis scabris, caulibus suf-^{suffrutico-}
fruticosis. *sum.*

Linum angustifolium fruticosum valentimum, foliis ri-
gidis & aculeatis. *Tournef. inst. 340.*

Habitat in Regno Valentino.

12. LINUM foliis cuneiformibus, caulibus arborefcenti-^{arboreum.}
bus.

Linum arboreum. *Alp. exot.* 19. t. 13.
Habitat in Creta. h

+

campanula-
tum.

13. LINUM foliorum basi utrinque puncto glanduloso.
 Linum foliis imis spathulatis, floribus luteis. *Sauv. monsp.*
 76.

Linum sylvestre luteum, foliis subrotundis. *Baub. pin.*
 212. *Tournef. inst.* 340. *Magn. char.* 261.

Campanula lutea linifolia montis lupi, flore volubilis.
Lob. ic. 414.

Campanula linifolia lutea. *Baub. hist.* 2. p. 817.

Habitat in Galloprovinciæ montibus, Monspelii in mon-
te lupi. 2

Facies a Lino diversa, stamina unita basi reddunt plan-
 tam dubiam, quam accuratius examinent, qui vivam
 adire queant.

Linum ad. 269

• maritimum.

14. LINUM calycibus ovatis acutis muticis, foliis lance-
 olatis: inferioribus oppositis.

Linum caule simplici, ramis foliisque inferioribus oppo-
 sitis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 114. * *Roy. lugdb.*
 434. *Sauv. monsp.* 147.

Linum foliis ovatis, floribus racemosis. *Guett. stamp.* 2.
 p. 499.

Linum maritimum luteum. *Baub. pin.* 214.

Linum luteum narbonense. *Baub. hist.* 3. p. 454. *Raj.*
hist. 1074.

Linum sylvestre. *Dod. pempt.* 534.

Habitat in Austria ad Thermas badenses, Monspelii.

* * Foliis oppositis.

H

• africanum.

Linum ad

15. LINUM foliis oppositis lineari-lanceolatis, floribus
 terminalibus pedunculatis. *Roy. lugdb.* 434.

Linum africanum luteum, foliis conjugatis. *Boerb. lugdb.*
 1. p. 284.

Habitat in Africa.

nodiflorum.

16. LINUM foliis oppositis lanceolatis, floribus alternis
 sessilibus, caule simplici. *Hort. cliff.* 114.

Linum luteum ad singula genicula floridum. *Baub. pin.*
 214. *Moris. hist.* 3. p. 574. f. 5. t. 26. f. 11. *Raj.*
hist. 1026.

Linum luteum sylvestre latifolium. *Column. ecpbr.* 2.
 p. 79. t. 80.

Habitat in Italiæ pratis argillasis.

17. LI-