



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Habitat α in Zeylona, β . in Guinea. γ
Plantæ β flores non vidi, dubiam emendent vel confis-
ment autoptæ.

spiralis.
aloe ad 54
669. C

5. ALOE floribus sessilibus ovatis crenatis: segmentis in-
terioribus conniventibus.

Aloë foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam
imbricatis. Hort. cliff. 132. Hort. ups. 87. Roy. lugdb. 23.

Aloë africana erecta rotunda, folio parvo & in acumen
acutissimum exeunte. Dill. elth. 16. t. 13. f. 14. Comm.
præl. 83. t. 32.

Habitat in Africa campestribus. *5 caulis 2 ped.*

retusa.

aloe ad 54

6. ALOE floribus sessilibus triquetris bilabiatis: labio in-
feriore revoluto. *fol. 2 pedibus longa pinnatis triquetris angulis acutis apice truncato superius tergem.*

Aloë foliis rhomboidalibus ventricosis quinquefariam
positis radicatis triquetris plano exstantibus. Hort.
cliff. 132. Hort. ups. 87. Roy. lugdb. 24.

Aloë africana, brevissimo crassissimoque folio, flore viridi.
Comm. hort. 2. p. 2. p. 11. t. 6. Till. pis. 6. t. 5.
Habitat in Africa argillosis. *4 caulis.*

viscosa.

aloe ad 54

7. Aloë floribus sessilibus infundibuliformibus bilabiatis:
laciniis quinque revolutis: lamina erecta.

Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis: caulinis ap-
pice reflexo-patulis. Hort. cliff. 132. Hort. ups. 87.
Roy. lugdb. 23.

Aloë africana erecta triangularis & triangulari folio vi-
scoso. Comm. præl. 82. t. 31. Till. pis. 6. t. 5.
Dill. elth. 15. t. 13. f. 13.

Habitat in Æthiopiæ campestribus. *4 caulis 2 ped.*

pumila.
aloe ad 54

8. ALOE floribus sessilibus bilabiatis: labio superiore ere-
cto; inferiore patente.

*a. Aloë foliis ovato-lubulatis acuminatis tuberculis crati-
tilagineis undique adspersis. Hort. cliff. 131. Roy. lugdb.
24.*

*margariti-
fera.*

Aloë africana, folio in summitate triangulari, margari-
tifera, flore subviridi. Comm. hort. 2. p. 19. t. 10.

666 C

*b. Aloë africana margaritifera minor. Comm. hort. 2. p.
21. t. 11. Dill. elth. 19. t. 16. f. 17.*

*γ. Aloë africana margaritifera minima. Comm. præl. 43.
Dill. elth. 20. t. 16. f. 18.*

*Arachnoi-
dea.*

*δ. Aloë africana humilis arachnoidea. Comm. præl. 72.
t. 27. caulis nullus.*

alba pumila.

*fol. radice densa 3 virgibus longa 2 ad 3 longis lat. limbo acut. 12 dent. utiq;
stria. alba nullis. et 4 similib. inclina. densa. pumila. pumila.*

Aloë foliis ova-
angulis inermi-
86. Roy. lug-
Aloë africana n-
merolis ornat-
Habitat in Æth-
Flores in hoc ge-
gunt Margar-

ALOE floribus
Aloë foliis line-
cliff. 133. R-
Aloë africana t-
mo, floribus
15. Seb. thes-
Habitat ad Cap-

AGAVE foli-
nov. 1102.
Agave foliis spi-
81.

Aloë foliis lan-
bus. Hort. c-
Aloë folio in ob-
286

Habitat in Am-
AGAVE foli-
bus: sub melle-
Aloë american-
Habitat in An-

Confer. Aloe a-

AGAVE fol-
Gen. nov.
Aloe foliis lan-
bus alternis
Habitat in Vi-

AGAVE fol-
Aloe foliis int-
radice caule
Aloe america-
dicta indige

3. A-

Guava. Spet-

Lilio asphodelus hirtus, minor. Hort. 344. Mon. Syst. 2. 21. f. 1.
alia spec. ac humerocallis. 1. 2. 2 ped. p. lator. fl. radical. tantum 3 gona carin
1. ped. deorsum recurva in eisa (veo manantia. Scapus flor. cylind. teris, foliis
ya longior apice breviter spicatis, seu 1 ad 2 florib. terminat. floris 2 pedibus longi
324. calde ovario vix 1/4 insid. ita ut ovarium fore totum extra florem videtur.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Aloe americana, radice tuberosa, minor. Pluk. alm. t. 258. f. 2.

Habitat in Curacao. *h. caulis 2 ped. cili. d. h. h. fol. sp. latior. plana termin. cili. 30 long. 9 lato.*

HEMEROCALLIS.

hemerocallis ad 57

Lilio Asphodelus.

1. HEMEROCALLIS scapo ramoso, corollis monopetalis. Hort. ups. 88.

Hemerocallis radice tuberosa, corollis monopetalis. Hort. cliff. 128. Roy. lugdb. 26.

a. Hemerocallis radice tuberosa, corollis monopetalis luteis. Gmel. sib. 1. p. 37.

Lilio Asphodelus luteo flore. Clus. hist. 1. p. 137.

Lilium luteum, asphodeli radice. Bauh. pin. 80.

β. Lilium rubrum, asphodeli radice. Bauh. pin. 80.

Lilio-asphodelus puniceus. Clus. hist. 1. p. 137.

Habitat a in Hungariae, Sibiriae campis uliginosis, at

Hybrida & constans, ex India Orientali.

HEMEROCALLIS scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis. Hort. cliff. 128. Roy. lugdb. 27.

Hall. belv. 290.

Phalangium magno flore. Bauh. pin. 29.

Phalangium allobrogicum majus. Clus. app. alt.

Phalangium. Dalech. hist. 852.

Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis.

Habitu conveniunt Haec, Antherica 1. 2. 3, Asphodeli 2.

3, sed quis character connecteret? 15 mai. flor. p. lator.

fol. radical. tantum. 3 gona carinata incurva versus caulum non ulcra

dum incedunt. Scapus floribus teris apice pice breviter

floribus liliis breviter spicatis. ACORUS liliaceus 1. p. 137.

1. ACORUS. Roy. lugdb. 6. Fl. suec. 277. Mat. med. 16.

a. Acorus verus f. Calamus aromaticus officinarum. Bauh.

pin. 34. Hort. cliff. 137.

Typha aromatica, clava rugosa. Moris. hist. 3. p. 246.

f. 8. t. 13. f. 4.

β. Acorus asiaticus, radice tenuiore. Herm. lugdb. 9. Fl. zeyl. 132. Bemb. Aram.

Waambu. Rheed. mal. 11. p. 99. t. 60.

Habitat in Europae, β. in Indiae fossis paludosis.

rad. ann. suavit. edim.

ORONTIUM.

1. ORONTIUM. Gen. nov. 1086. f. 3. *

Arum folio enervi ovato. Gron. virg. 113.

Arum fluitans, pene nudo. Banist. virg. 1926.

Habitat in Virginiae, Canadae paludibus, scaturiginibus.

Phalangium ad 49

Liljastrum.

HEMEROCALLIS scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis. Hort. cliff. 128. Roy. lugdb. 27.

Hall. belv. 290.

Phalangium magno flore. Bauh. pin. 29.

Phalangium allobrogicum majus. Clus. app. alt.

Phalangium. Dalech. hist. 852.

Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis.

Habitu conveniunt Haec, Antherica 1. 2. 3, Asphodeli 2.

3, sed quis character connecteret? 15 mai. flor. p. lator.

fol. radical. tantum. 3 gona carinata incurva versus caulum non ulcra

dum incedunt. Scapus floribus teris apice pice breviter

floribus liliis breviter spicatis. ACORUS liliaceus 1. p. 137.

1. ACORUS. Roy. lugdb. 6. Fl. suec. 277. Mat. med. 16.

a. Acorus verus f. Calamus aromaticus officinarum. Bauh.

pin. 34. Hort. cliff. 137.

Typha aromatica, clava rugosa. Moris. hist. 3. p. 246.

f. 8. t. 13. f. 4.

β. Acorus asiaticus, radice tenuiore. Herm. lugdb. 9. Fl. zeyl. 132. Bemb. Aram.

Waambu. Rheed. mal. 11. p. 99. t. 60.

Habitat in Europae, β. in Indiae fossis paludosis.

rad. ann. suavit. edim.

acory. ad 47.

Calamus.

1. ACORUS. Roy. lugdb. 6. Fl. suec. 277. Mat. med. 16.

a. Acorus verus f. Calamus aromaticus officinarum. Bauh.

pin. 34. Hort. cliff. 137.

Typha aromatica, clava rugosa. Moris. hist. 3. p. 246.

f. 8. t. 13. f. 4.

β. Acorus asiaticus, radice tenuiore. Herm. lugdb. 9. Fl. zeyl. 132. Bemb. Aram.

Waambu. Rheed. mal. 11. p. 99. t. 60.

Habitat in Europae, β. in Indiae fossis paludosis.

rad. ann. suavit. edim.

verus.

Piperacium gall.

nautica radix.

Yaemba. H. M.

Bembi. Aram.

Deringo. Ruyter. 5. 72. f. 1.

aquaticum.

amidna ad 470

HEXANDRIA MONOGYNIA.
HEMANTHUS foliis
HEMANTHUS afric
Habitat ad Cap.
HEMANTHUS
cliff. 127. Hor
HEMANTHUS colch
cliff. 167. p. 1.
Hyacintho affinis
gantissime mac
Orchis f. Satyriu
Habitat in Afric
cliff. 1. ad 36
CALAMUS.
Arundo zeylanic
scabris acidis.
Arundo nucifera
stris purpureis
Arundo Rotang
Fructus cannæ
Habitat in India
JUNCUS cu
terminali, inv
Juncus culmo p
la. Sauv. mo
Juncus panicul
etata, secund
ovatis nitenti
Juncus acutus,
Moris. hist.
Juncus panicu
laxis longe
stamp. 2. p.
Juncus acutus
rif. ibid. f.
Habitat in A
lis. 2
HE-
atitua Prop
fol. 1 pin
44. 2. 2. 2.
fol. ante
sp. 1. 2.
pancula

325
HEXANDRIA MONOGYNIA.
HÆMANTHUS. *Rotang grandis* L.

HÆMANTHUS foliis lingviformibus planis. Roy. coccineus. *hamanthus ad 57.*
lugdb. 42. *folia vulgo 2 radic opp. plana ovat obt. patenti. 1. 4 bis flor.*

Hæmanthus foliis obtusis basi truncatis. Hort. cliff. 127.
Hæmanthus africanus. Comm. hort. 2. p. 127. t. 64.

Habitat ad Cap. b. Spei. *1. ped. pulch. tenuis umbasi folio vagin. 1. phyll.*
HÆMANTHUS foliis lanceolatis undulatis. Hort. cliff. 127. Hort. ups. 127. Roy. lugdb. 42. 15. 4. *fruct. hamanthus ad*

Hæmanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. Dill. elth. 167. p. 140. t. 2.

Hyacintho affinis africana, bulbosa radice, caule elegantissime maculato. Seb. thes. 1. p. 20. t. 12. f. 1. 2. 3.

Orchis f. Satyrium e Guinea. Swert. flor. 1. p. 62. f. 3.
Habitat in Africa. *1. ped. pulch. uti 1. ped. fol. 4 usq. med. vagin. ovata*

CALAMUS. *Chyphocel venen acory. yuba Bras. major 4.*
Arundo zeylanica spinosissima major, fructibus rotundis scabris acidis. Burm. zeyl. 36. Fl. zeyl. 468.

Arundo nucifera Rotang dicta, fructu spadicei coloris striis purpureis venuste tessulato. Pluk. alm. 53. *Arundo forte maning atonibz*

Arundo Rotang dicta. Pis. mant. 188. *qua principis pro (re)ponitur aton*

Fructus cannæ de Benghala. Baub. pin. 405. *tu. C. D. 17. Vagos. Dida. To (i) no. Rhegla*

Habitat in Indiæ sylvis juxta fluentia. *ad long rotang.*

JUNCUS. *longitas impitavit*
Culmis nudis. *calathi ad alia multa pulcherrima compressant*

JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicula acutus. *Juncus ad 47.*
terminali, involucreo diphylo spinoso. *B. o (i) u. xavos. D. i. o. c.*

Juncus culmo pungente, panicula ex folii solitarii axilla. Sauv. monsp. 9. *onychaeniz 3e Rhegla*

Juncus panicula universali culmo brevior infime coarctata, secundariis paululum laxis, capsulis triquetro-subovatis nitentibus. Guett. stamp. 2. p. 412. *Drypterium Dora*

Juncus acutus, capitulis forghi. Baub. hist. 2. p. 520. *aut esp. o. juncus.*
Moris. hist. 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 15. *juncus acutus*

Juncus panicula universali culmo longiore, secundariis laxis longe pedunculatis: media præcipue. Guett. stamp. 2. p. 412. *o. acutus.*

Juncus acutus maritimus anglicus. Raj. hist. 1303. Moris. ris. ibid. f. 14. *juncus 26*

Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ maritimis paludosis. *glomeratus. adau*

2. JUN- *Rotang ad 24*
atitara. Bras
1. Patitara. ad.
2. Dactyl. 25

Na Il faut voir les juncus dans Mich. p. 36. 2. 31. la diction
timell bonue.

326 . HEXANDRIA MONOGYNIA.

Q • conglomeratus
Juncey. ad. 47

2. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. Roy. lugdb. 44. Fl. suec. 278.

Juncus lævis, panicula non sparsa. Bauh. pin. 12. theatr. 183.

Juncus lævis, panicula conglomerata. Scheuch. gram. 343.

Juncus. Cam. epit. 780.
Habitat in Europæ borealis uliginosis, &

Q • effusus
Juncey. ad

3. JUNCUS culmo nudo stricto: panicula laterali. Roy. lugdb. 44. Fl. suec. 279.

a. Juncus culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus sessilibus. Fl. lapp. 116. Hall. belv. 254.

Juncoides alpinum, foliis juncei glomeratis atrofuscis. Scheuch. hist. 323. adveny utitur. ad lactata puritate

β. Juncus culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus pedunculatis. Fl. lapp. 117. Gron. virg. 38.

Juncus lævis, panicula sparsa, major. Bauh. pin. 12. theatr. 182. Scheuch. gram. 341.

Juncus lævis. Dod. pempt. 606.
Habitat in Europæ uliginosis, & in alpihus. &

Juncey lævis alter C.B. 12.
in hœc pedicella nigra ad
Luzernanum lacum introhitu

Q • inflexus
Juncey. ad

4. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali.

Juncus culmo nudo, paniculam arcuatim tegente.

Juncus, acumine reflexo, major. Bauh. pin. 12. prodr. 184. Moris. hist. 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 25. Barr. ic. 204. Hall. belv. 252.

Juncus, acumine reflexo, alter. Bauh. pin. 12. prodr. 22. Scheuch. gram. 345.

γ. Juncus panicula univèrsali laterali culmo longiore, secundariis sparsis. Guett. stamp. 412.

Juncus acutus, panicula sparsa. Bauh. pin. 412.
Habitat in Europa australi. & vagare videtur.

Juncey monsp.
Zeyheri A
Melanoceras. Luff.

Q • filiformis.

5. JUNCUS culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. Roy. lugdb. 44. Gron. virg. 152. Fl. suec. 280.

Juncus parvus, calamo supra paniculam longius producto. Raj. angl. 3. p. 432. Fl. lapp. 118.

Juncus lævis, panicula sparsa, minor. Bauh. pin. 12. theatr. 183. Scheuch. gram. 347. t. 7. f. 1.

Habitat in Europæ uliginoso-paludosis turfosis. &

omnifuit helidum et
baleis de juncis à Paris.

Juncey. ad.
• viscidus.

6. JUNCUS culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. Fl. lapp. 119. Fl. suec. 281. Roy. lugdb. 43. Hall. belv. 253.

HEXA

Juncus, acumi
12. prodr. 22.

Juncoides alpi
Habitat in Alpi

JUNCUS cu
meratis aphy

Juncus foliis
tis terminali

Juncus monta
121.

Gramen junc
Gramen junc
t. 29.

Habitat in Eu

JUNCUS f
Juncus foliis
filibus, cap

Juncus foliis
inst. 247.

Gramen jun
pin. 5. pro

Gramen Ju
Bauh. pro

Juncus alpi
Gramen jun
pin. 5. th

Junci foliof
n. 1. --- 1

Habitat in

JUNCUS
tusis. Fl.

Juncus foli
triangula

Juncus foli
tinali pro

Gramen
Raj. his
227. f. 8

Juncus bu
gen. 39

Juncoides
Scheuch

Jun-

Juncus, acumine reflexo, minor & trifidus. *Baub. pin. 12. prodr. 22. t. 22. theatr. 186.*

Juncoides alpinum trifidum. *Scheuch. gram. 325.*

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Pyrenæis. 4

7. JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Fl. suec. 282.* squamrosus. •
Juncus ad. 47

Juncus foliis setaceis, culmo nudo, capitulis glomeratis terminalibus. *Roy. lugdb. 44.*

Juncus montanus palustris. *Raj. hist. 1303. Fl. lapp. 121.*

Gramen junceum, foliis & spica junci. *Baub. pin. 5.*

Gramen junceum, semine acuminato. *Læf. pruss. 15. t. 29.*

Habitat in Europæ borealis fespitosis. 4

* Culmis foliosis.

8. JUNCUS foliis nodoso-articulatis. *Fl. suec. 285.* articulatus. • G

Juncus foliis articulosis, panicula inæquali, capitulis sessilibus, capsulis subulatis triquetris. *Roy. lugdb. 43.* Juncus ad
3 septi.

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tournef. inst. 247. Fl. lapp. 120.*

Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Baub. pin. 5. prodr. 12. theatr. 76. Scheuch. gram. 331.*

β. Gramen Junceum, folio articulofo, cum utriculis. *Baub. pin. 12. Scheuch. gram. 333.* • C

γ. Juncus alpinus, folio articulofo. *Scheuch. gram. 333.* • C

γ. Gramen junceum, folio articulofo, sylvaticum. *Baub. pin. 5. theatr. 75. Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 1. Scheuch. gram. 334.* • C

δ. Junci foliosi, foliis per siccitatem nodosis. *Mich. gen. 38. n. 1. --- 13.* • C

Habitat in Europæ aquosis, 4 Vagina pulta etc 2.

9. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Fl. suec. 284.* bulbosus. • C
Juncus ad.
Juncus ad.
Juncus ad.

Juncus foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis triangularibus. *Guett. stamp. 134.*

Juncus foliis angulatis, culmo subnudo, panicula terminali prolifera, capsulis ovatis. *Roy. lugdb. 43.*

Gramen junceum minimum, capsulis triangularibus. *Raj. hist. 1307. angl. 3. p. 434. Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 3.*

Juncus bulbifer, foliis teretibus non articulosis. *Mich. gen. 39. n. 1. 2. 3.* • C

β. Juncoides calycibus paleaceis glomeratis, folio varians. *Scheuch. gram. 39.* Gra. p. 101. f. 101. C

Gramen junceum aquaticum, paniculis cum foliis capillaribus simul ortis proliferum. *Pluk. alm. 179. t. 32. f. 3. Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 4.*

*Ulyssidam
ab ipso*

9. Juncus foliosus minimus campestris & nemorensis. *Gron. virg. 15.*

Gramen junceum elatius, pericarpis ovatis, americanum. *Pluk. alm. 179. t. 92. f. 9.*

Gramen junceum virginianum, calyculis paleaceis, bicornis. *Moris. hist. 3. p. 228. f. 8. t. 9. f. 15.*

Habitat in Europæ pascuis sterilibus subhumidis, atque in Sibiria, Virginia.

Juncus. ad. 47

• *Bufonium.*

10. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Roy. lugdb. 43. Fl. suec. 283. Hall. helv. 254.*

Epigonatocaulon. Valis mibi. Epicaulon. s. epigonon holostedum. Lob. matth.

Juncus palustris humilior, panicula laxissima. *Rupp. jen. 130. Fl. lapp. 122.*

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum. *Scheuch. gram. 327.*

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis. *Baub. pin. 7. theatr. 100.*

Holosteum. *Lob. ic. 18. matth.*

Juncus. 7. ad.

• β . Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuch. gram. 329.*

Juncus. 6. ad.

• γ . Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, species altera procerior. *Scheuch. gram. 328.*

J. ad.

• δ . Gramen bufonium erectum angustifolium majus. *Barr. ic. 264.*

Juncus. 5. ad.

• ϵ . Gramen holosteum alpinum minimum. *Baub. pin. 7. prodr. 64. theatr. 101.*

Gramen juncoides minimum anglo-britannicum. *Raj. angl. 3. p. 434.*

Habitat in Europæ inundatis. \odot

t. falso en 2 flm. biglumis.

11. JUNCUS folio subulato, gluma biflora terminali. *Amen. acad. 2. p. 266. t. 3. f. 3. **

Habitat in Alpibus Lapponicis. *D. Montin. 4*

Planta faciem gerit Schoeni ferruginei.

t. falso en 2 flm.

• *triglumis.*

12. JUNCUS foliis planis, gluma triflora terminali. *Fl. suec. 286.*

• Juncus gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp. 115. t. 10. f. 5.*

• Juncus exiguus montanus mucrone carens. *Baub. pin. 12. prodr. 22. theatr. 183. Rudb. elys. 1. p. 103. f. 8.*

Habitat frequens in Alpibus Lapponicis, Tauro Rattadiensi. *4 Helv.*

13. JUN-

JUNCUS fol...

Juncus foliis plan...

Gramen nemoro...

Gramen hirsutu...

Juncus foliis pla...

Gramen hirsutu...

Gramen nemoro...

Gramen hirsutu...

Gramen hirsutu...

Juncoides mon...

Gramen hirsutu...

Habitat in Eu...

14. JUNCUS...

culatisque. Juncus foliis...

culatisque. Juncus villos...

Juncus villos...

Juncoides vi...

Gramen hirsu...

Juncus foliis...

Juncoides hi...

Gramen hirsu...

Juncus mon...

13. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso, Fl. pilosus. •
suec. 287.

Juncus foliis planis, panicula diffusa, pedunculis prolifera: flosculis intermediis sessilibus. Roy. lugdb. 43.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. Bauh. pin. 7. Moris. hist. 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 1. *

β. Gramen hirsutum angustifolium perenne, lini utriculis. Barr. ic. 740.

γ. Juncus foliis planis, culmo paniculato, floribus sparsis. Fl. lapp. 124.

Gramen hirsutum nemorosum angustifolium alpinum, paniculis obscure rufescentibus. Scheuch. gram. 312. t. 6.

δ. Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. Scheuch. gram. 317.

Gramen hirsutum latifolium maximum, juncea panicula. Moris. hist. 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 2.

ε. Gramen hirsutum angustifolium majus. Bauh. pin. 7. prodr. 16. theatr. 105. Moris. hist. 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 3. Scheuch. gram. 318.

ζ. Gramen hirsutum latifolium minus. Bauh. theatr. 102.

η. Juncoides montanum nemorosum, flore niveo. Scheuch. gram. 320.

Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. Bauh. pin. 7. theatr. 106.

Habitat in Europæ sylvis, at varietates β. δ. ε. ζ. η. in Europæ australioribus, γ. in Alpibus. 4 vagans orissanti 2.

14. JUNCUS foliis planis subpilosis, spicis sessili pedunculatisque. Fl. suec. 288.

Juncus foliis planis, panicula rara, spicis sessilibus pedunculatisque. Hort. cliff. 137. Roy. lugdb 42. Gron. virg. 38.

Juncus villosus, capitulis psyllii. Tournef. inst. 246. Fl. lapp. 126.

Juncoides villosam, capitulis psyllii. Scheuch. gram. 310.

Gramen hirsutum, capitulis psyllii. Bauh. pin. 7. theatr. 103.

β. Juncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. Fl. lapp. 127. t. 10. f. 2.

γ. Juncoides hirsutum, capitulo glomerato. Scheuch. gram. 312.

Gramen hirsutum, capitulo globoso. Bauh. pin. 7. theatr. 104.

δ. Juncus montanum nemorosum villosum latifolium et latius.

Luzula. P. B.
Luziola. Val
mich

Juncoides Michx

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 1. ord. 2. m. m.

Juncoides Michx

Juncoides 1. ord. 2. m. m.

Juncoides 2. ord. 2. m. m.

Juncoides 3. ord. 2. m. m.

Leucanthemum. Dalech. 137.

Juncoides 47.

Juncoides 3. ord. 2. m. m.

Juncoides 3. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

Juncoides 4. ord. 2. m. m.

latius, capitulis florum candidis & splendidibus. Mich. gen. 42.

Juncoides latifolium alpinum glabrum, panicula subul- tea splendente. Scheuch. gramen. 314.

Juncoides hirsutum elatius, panicula juncea compacta. Raj. angl. 3. p. 416.

Juncoides bohemicum, panicula minore nigricante, sca- po super eandem erecto & longius producto. Mich. gen. 42.

Habitat in Europæ pascuis siccioribus. 4

• spicatus.

15. JUNCUS foliis planis, spica racemosa nutante. Fl. lapp. 125. t. 10. f. 4. Fl. suec. 289.

Juncus alpinus latifolius, panicula racemosa nigricante pendula. Till. pis. 91.

Habitat in Lapponiæ Alpihus. 4

RICHARDIA. 158

scabra.

1. RICHARDIA. Houst. mss.

Habitat in Vera Cruce. 4

Planta ex stellatis XLIV. Caulis altus, brachiatus, sub- articulatus, obsolete tetragonus, hispida: Pilis ri- gidiusculis, sparsis, reflexis. Folia e lanceolato ova- ta, alternatim nervosa, integerrima, subpetiolata. Scabra. Flores in capitula terminali a, passim etiam in verticillos congesti; capitula terminalia, radiata Foliis 4. vel pluribus, scilicet alternis minoribus. Co- rollulæ ut in Asperulis, tennes, longæ, sed sexfida & fructus ex 3 seminibus; sic differt a Spermacoe nu- mero & cæteris.

agenia. ad. 166

Id genus ac myricine qui agoria. adam. PRINOS. Nomen in Niv.

• verticillatus 1. PRINOS foliis longitudinaliter ferratis.

*Prinos. Gron. virg. 39. **

Habitat in Virginia. h. f. laury d. ali. fl. p. 100

• glaber.

2. PRINOS foliis apice ferratis.

agenia. ad. 166

Habitat in Canada. Kalm. h

Arbor. Foliis alternis, petiolatis, oblongis, consistenti- bus, glabris, versus apicem serraturis utrinque sapius binis acutis, facie ferme Myricæ. Pedunculi axilla- res, parvi, sæpius triflori. Flores non vidi.

BERBERIS. ad

BERBERIS.

• sparsis.

1. BERBERIS pedunculis racemosis. Mat. med. 290.

Ber-

amirbaris. avic.

Berberis. gal. 20

oxyacantha. gal. hermbi.

Corymbus. mull. 47. Ribes. p. 201.

? Calytra. Theophr.

Epine. vincta. Theophr. p. 201.

Vincta. Epine. vincta. Theophr.

HEXANDRIA
Berberis spinis trip
Roy. lugdb. 43
Berberis dumeto
Berberis vulgaris
Habitat in Europ
BERBERIS pec
Berberis cretica,
Berberis alpina cr
Lycium creticum
Lycium e Cand
Habitat in Cret
LORANTHU
Loranthus race
Vall. act. 17
Lonicera flore
Habitat in Am
FRANKENI
Frankenia foliis
Frankenia foliis
Franca floribus
angularibus.
Franca maritim
pervirens, flo
Lychnis supina
p. 38.
Anthyllis reper
lygoni facie.
Cali f. Vermic
hist. 3. p. 7
Polygonum f
thymi folio,
1. p. 7. t.
Polygonum m
281.
Habitat in Eu
FRANKEN
terminalibu
Franca mariti
futus, foliis
f. 2.

Boldu. Seville. 2. 6. arbor. 25 ped. foliis ovatis viti pubes. fls. pediculis albi parvis
cal. 6 phyllis con 6 pet. stan 6. oval 1. Bacca ovali v. d. d. lutea olivæ
magnitud. edulis præterea 1. loculi. ovali. 1. f. umbra citi ad adama
HEXANDRIA MONOGYNIA. 331 ram Boldu Seville ad 446.

Berberis spinis triplicibus. *Hort. cliff. 122. Fl. suec. 290.*
Roy. lugdb. 438. Hall. helv. 424.

Berberis dumetorum. *Baub. pin. 454.*

Berberis vulgaris f. *Cresspinus. Cam. epit. 86.*

Habitat in Europæ sylvis. h. spina pubes. 1 ad 2 ped.

2. **BERBERIS pedunculis unifloris.**

Berberis cretica, buxi folio. *Tournef. cor. 42.*

Berberis alpina cretica. *Baub. pin. 454.*

Lycium creticum. *Alp. exot. 21. t. 20.*

Lycium e Candia. *Pon. ital. 137.*

Habitat in Creta. h. rami rub. spina 3 ad 6 ped. viti 5 ped.
flor. v. 12 dent. viti. ovum petiolatis.

cretica. •

Lycium belli. Linn. clus.

LORANTHUS.

1. **LORANTHUS.**

Loranthus racemosus, flore coccineo, baccis nigris.
Vaill. act. 1722. p. 274.

Lonicera flore coccineo, baccis nigris. *Plum. gen. 17.*
Habitat in America calidiore. h.

Lonicera Mum
ad.
americana 157.

FRANKENIA.

1. **FRANKENIA foliis linearibus basi ciliatis.**

Frankenia foliis confertis. *Roy. lugdb. 452.*

Frankenia foliis aciformibus congestis. *Sauv. monsp. 46.*

Franca floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis triangularibus. *Guett. stamp. 2. p. 459.*

Franca maritima supina saxatilis glauca ericoides sempervirens, flore purpureo. *Mich. gen. 23. t. 22. f. 1.*

Lychnis supina maritima, ericæ facie. *Raj. angl. 3. p. 38.*

Anthyllis repens italica, thymi foliis, rubente flore, polygoni facie. *Till. pis. 46.*

Cali f. Vermiculari marinæ non dissimilis planta. *Baub. hist. 3. p. 703.*

Polygonum fruticosum supinum ericoides cinereum, thymi folio, hispanicum. *Barr. ic. 714. Bocc. mus. 1. p. 7. t. II.*

Polygonum maritimum minus, foliis serpylli. *Baub. pin. 281.*

Habitat in Europæ australis maritimis. 4

Franca ad. 255.
levis. • †

2. **FRANKENIA caulibus hirsutis, floribus fasciculatis hirsuta terminalibus.** †

Franca maritima supina multiflora candida, caulibus hirsutis, foliis quasi vermiculatis. *Mich. gen. 23. t. 22. f. 2.*
 Poly-

vi de pny. 223 cauder Polygonum creticum, thymi folio. *Bauh. pin. 281.*
alati mifer prodr. 131.

Alfina cretica maritima supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis. *Tournef. cor. 45.*

Habitat in Apulia, Creta.

franca ad 255.

pulverulenta 3.

FRANKENIA foliis obovatis retusis subtus pulveratis. Frankenia foliis ovalibus. *Sauv. monsp. 168.*

franca ad 255.

franca ad 255.

Franka maritima quadrifolia supina, chamæsyces folio & facie. *Mich. gen. 23.*

Anthyllis valentina. *Clus. hist 2. p. 186.*

Anthyllis marina, chamæsyces similis. *Bauh. pin. 282.*

Habitat in Suffexia, Narbonæ, Italiae, Apuliae littoribus. *⊙ Sgluiv. ut Stam 5.*

In ordine Naturali ad XL referatur.

chabrea ad 234.

PENLIS.

Portula 2u.

1. PEPLIS. *Fl. lapp. 128. Fl. juec. 291. Hall. helv. 406.*

Glaucoides palustre, portulacæ folio, flore purpureo. *Mich. gen. 21. t. 18.*

Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. *T. 88 Petit. gen. 43. t. 43.*

Glaux aquatica, folio subrotundo. *Loef. pruss. 106. t. 20.*

Glaux altera, subrotundo folio. *Vaill. paris. 80. t. 15. f. 5.*

Alfina palustris minor serpillifolia. *Bauh. pin. 251.*

Habitat in Europæ inundatis. *⊙*

Tetrandra. 2 Jacq. florib. 4 and. monsp. 145. Ⓞ Jacquin.
Beckl. ad 147. ammannia. Brunn. juv. 1. p. 145.

DIGYNIA.

Lin s. n. 148 VELEZIA. *ad 255.*

rigida.

1. VELEZIA. *Loefl. ? minutia facia spliri. D. Holz.*

Silene foliis subulatis cauli appressis calycibus rigidis intermedio longioribus. *Sauv. monsp. 145.*

Lychnis sylvestris minima, exiguo flore. *Bauh. pin. 206. prodr. 103.*

Lychnis minima rigida cherleri. *Bauh. hist. 3. p. 352. Raj. hist. 997.*

Lychnis corniculata minor. *Barr. rar. 665. t. 1018. 1017. Bocc. mus. 2. p. 50. t. 43.*

Habitat in Europa australi. *⊙*

Stamina tenuissima difficillime numerantur; in siccis specimini-

HEXA
cimibus 5
hujus ordo no
rit staminu
Statia
ORYZA. Ba
Dod. pempt.
cliff. 137. M
Habitat forte in
Habitat in Me
fluvios. h
ATRAPHAX
Atraphaxis iner
Roy. lugdb.
Arbuscula afri
lygona relat
Habitat in A
Habitat in Me
Panambu - val
suppl. 573.
Habitat in Ja
Frutex human
* Hermaphr
RUMEX fl
mis: unica
Lapathum ho
Lapathum sat

Lapathum ad 277
Sanguineus.
ΚΟΠΕΥΤΟΡ
Cyperion

Habitat in Italia. 2
Confer. *Lapathum hortense latifolium*. *Bauh. pin.* 115.
2. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 138. *Hort. ups.* 89. *Mat. med.* 528. *Roy. lugdb.* 229.

+
Lapathum
Lapathum ad 277
Lapathum
alpinus.

Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
Habitat in Virginia. 3
Valvula exterior floris grano magno globoso rubro notata, rarius & altera grano minimo.

f. *Pseudorha*. *Dahl. Dalech.*
Rumen. Mia.

3. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipticis. *Sauv. monsp.* 69.
Rumex folio pedali cordato, radice repente. *Lemonier. Sauv. monsp.* 111.
Lapathum androgynum obtusifolium, spica confertissima. *Hall. helv.* 170.
Lapathum hortense rotundifolium f. montanum. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum rotundifolium. *Clus. hist.* 2. p. 69.
Habitat in Helvetia, Monspeli. 2

Lapathum ad
verticillatus.
Lopezia. ad.
a D. Lopez. de goman.

4. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis cylindricis.
Lapathum aquaticum, foliis longis angustis acutis, floribus ad genicula verticillatim congestis. *Gron. virg.* 39.
Habitat in Virginia. 2

Lapathum ad.
Britannica.

5. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis obsoletis. *Mat. med.* 17.
Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus æqualibus, radice exterius nigra vel flava. *Cold. noveb.* 83.
Lapathum foliis longis latis vix acuminatis costis caulisque rubentibus, radice intus crocea. *Gron. virg.* 39.
Habitat in Virginia. 2

In precedenti stipula cylindrica membranacea fere ad dimidium vaginans internodium, in hac vero non item, sed ut in Europæis. Pedicelli in priori crassiores in hac capillares; prior magis spicata; hæc magis paniculata. Plantam Gron. in Fl. virginica habui a Cl. Authore, quæ non rubra erat caule aut costis.

6. RU-

Lapathum minim
o. 11. ad 2. p. 115.
Lapathum foli
Lapathum
Dill. elib. 19
Lapathum ægy
sula feminis
Habitat in Æg
RUMEX flor
omnibus gran
Habitat in Virg
Planta spitham
lata, levia,
bus utrinque
dis magnis.
RUMEX flo
graniferis, fo
248.
Lapathum aqua
Lapathum aqua
mus. 2. p. 1
Habitat in Eur
RUMEX flo
niferis, foliis
Rumex floribu
nis, foliis cor
138. Roy. la
Rumex foliis
lapp. 129.
Lapathum foli
Lapathum acu
Habitat in Eur
RUMEX
graniferis, f
Mat. med,
Lapathum ac
983. Lob.
Lapathum (act
Habitat in Eu
RUMEX
foliis corda

Lapathum involucro seminis dentato, foliis obtusis crispula. Hall. helv. 172.

Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis. Moris. hist. 2. p. 580.

Lapathum folio minus acuto. Baub. pin. III.

Lapathum vulgare, folio obtuso. I. B. Raj. hist. 178.

Lapathum. Cam. epit. 228.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Anglia. 2

cili-reuilapathum
Lapathum ad pulcher. 277

* Hermaphroditi: valvulis granula destitutis s. nudis.
12. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis lyratis. Guett. stamp 1. p. 7.

Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucro dentato, foliis inferioribus instar fidiū. Moris. hist. 2. p. 580.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. Baub. hist. 2. p. 988. Raj. hist. 1. p. 174.

Habitat in Gallia, Italia, Veronæ.

cili-lapathum acutum
Lapathum bucephalophorus. Col.

13. RUMEX floribus hermaphroditis; valvulis dentatis nudis planis reflexis. Hort. ups. 90.

Rumex fructibus dentatis calyce reflexis, caput bovinum referentibus. Hort. cliff. 139. 277. cany.

Acetosa, ocymi folio, neapolitana. Baub. pin. 114.

Acetosa, ocymi folio, bucephalophoros. Col. ecphr. 1. p. 151. t. 150.

Habitat in Italia. *o typ. 1. mai flon fl. colit. sprate*

Lapathum acutum
Britannica ad 277
aquaticus.

14. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. Baub. pin. 116.

Lapathum palustre. Tabern. ic. 437.

Hippolapathum. Dalech. hist. 604. Cam. epit. 232.

Herba britannica. Munt. brit. t. 1.

Habitat in Europa ad ripas fluviorum & paludum. 2

Lapathum

Lapathum ad 277
Britannica
Lunaria.

15. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis lævibus, caule arboreo, foliis subcordatis. Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 139. Roy. lugdb. 320.

Acetosa arborefcens, subrotundo folio. Pluk. alm. 8. t. 252. f. 3.

Lunaria magorum arabum. Baub. hist. 2. p. 994?

Habitat in Canariis. *h sp. 15. mai flon*

Lapathum ad 277
Britannica
Lunaria.

Lapathum

Lapathum ad 277
Britannica
vesicarius.

16. RUMEX floribus hermaphroditis geminatis: valvularum alis maximis membranaceis reflexis, foliis indivisis. Hort. cliff. 130. Hort. ups. 90. Roy. lugdb. 230.

Lapathum ad 277
Britannica
vesicarius.

Lapathum

Acetosa americana Baub. pin. 1

5. t. 28. f. 7

Habitat in Africa

RUMEX floribus alis maximis

lugdb. 230.

Acetosa aegyptia

5. f. 5.

Habitat in Aegyptia

RUMEX floribus

statis. Vir. cliff.

Roy. lugdb. 230.

Acetosa rotundifolia

list. 2. p. 583

Lapathum andromedae

foliis divergentibus

Oxalis rotundifolia

Acetosa scutata

Habitat in Helvetia

pidum. 227.

RUMEX floribus

138. Fl. suec.

Rumex foliis orbatis

Acetosa rotundifolia

Acetosa repens

hil sinuatis.

Acetosa britannica

obs. 67. t. 6.

Habitat in Alpibus

*

RUMEX floribus

monophyllis

Hort. ups.

Rumex floribus

Hort. cliff.

Beta cretica, serotina

Beta cretica, serotina

Habitat in Creta

RUMEX floribus

Vir. cliff. 32

295. Fl. lapidum

Acetosa

Rumex digynus male hic reportum

HEXANDRIA TRIGYNIA. 337.

Acetosa americana, foliis longissimis pediculis donatis.
Bauh. pin. 114. prodr. 54. Moris. hist. 2. p. 583. f.
5. t. 28. f. 7.
Habitat in Africa. ☉

17. RUMEX floribus hermaphroditis distinctis: valvula-
rum alis maximis membranaceis, foliis erosis. Roy. lugdb. 230.

*Lapathum ad
Britannica ad*

Acetosa ægyptia, roseo seminis involuero. Saub. afr.
5. f. 5.
Habitat in Ægypto. ☉

*Lapathum ad
Britannica*

18. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-ha-
statis. Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 138. Hort. ups. 89.
Roy. lugdb. 230.

*Lapathum ad
277.*

Acetosa rotundifolia hortensis. Bauh. pin. 114. Moris.
list. 2. p. 583. f. 5. t. 28. f. 9.

Renodota. c. d. 114.

Lapathum androgynum acetosum, foliis sagittatis, ra-
mis divergentibus. Hall. belw. 170.

+

Oxalis rotundifolia. Dod. pempt. 649.

β. Acetosa scutata repens. Bauh. pin. 114. prodr. 55.
Habitat in Helvetia, Galloprovincia, inter acervos la-
pidum. *2 2 p. 1. un. fl. flon 2 ad 3 p. nati an p. nati.*

*Rumex ad
Lapathum ad*

19. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. Hort. cliff.
138. Fl. suec. 294. Roy. lugdb. 230.

*Rumex ad
Lapathum ad
+ 276 falli in
3 p. ynd
digynis.*

Rumex foliis orbiculatis emarginatis. Fl. lapp. 132.

Acetosa rotundifolia alpina. Bauh. pin. 55. prodr. 114.

Acetosa repens vestmorlandica, cochleariæ foliis nonni-
hil sinuatis. Pluk. alm. 8. t. 252. f. 2.

Acetosa britannica rotundifolia, fructu compresso. Blair.
obs. 67. t. 67.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Wallicis.

*Lapathum ad
Di Rumex ad*

* * * Floribus dictinis.

20. RUMEX floribus androgynis: calycibus femineis
monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis.
Hort. ups. 89.

*Rumex ad
spinosus.*

Rumex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis.

Hort. cliff. 139 Roy. lugdb. 230. *Lapathum creticum*

Beta cretica, semine aculeato. Bauh. pin. 118. prodr. 57.

Beta cretica, semine spinoso. Bauh. hist. 2. p. 962.

Habitat in Creta. ☉

Lapathum

calyx, aculeato. A. R. ad.

21. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis.
Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 139. Hort. ups. 89. Fl. suec.
295. Fl. lapp. 130. Mat. med. 529. Roy. lugdb. 231.

*Acetosa
Lapathum*

Aceto-

+

Erythrum. Dica.
oxyphyllum. gal.
orale. 2 humil.
repens.
Brokensbergia. Thal.

acetosa ad.
Lepanthum
acetosella.
Sarpegina. Lob.

+

- Acetosa pratensis. *Baub. pin. 14.*
- β. Acetosa pratensis, flore albo. *Tournef. inst. 502.*
- γ. Oxalis crispa. *Baub. hist. 2. p. 990. Tabern. ic. 440.*
- δ. Acetosa montana maxima. *Baub. pin. 114. Scheuch. alp. 129.*
- ε. Acetosa montana, lato ari folio rotundo. *Bocc. mus. 165. t. 125.*

Habitat in Europæ pascuis. δ in Alpibus. 2

- 22. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Vir. cliff. 32. Hort. cliff. 139. Fl. lapp. 131. Fl. suec. 296. Roy. lugdb. 231. Gron. virg. 153.*
- Acetosa arvensis lanceolata. *Baub. pin. 114.*
- Oxalis ovina. *Tabern. ic. 440.*

- β. Acetosa lanceolata angustifolia repens. *Baub. pin. 114. prodr. 55.*
- γ. Acetosa arvensis minima non lanceolata. *Baub. pin. 114.*
- δ. Acetosa minor erecta, lobis multifidis. *Bocc. mus. 164. t. 126.*

Habitat in Europæ pascuis & arvis arenosis. 2

- I. SCHEUCHZERIA. *Fl. lapp. 133. t. 110. f. 1. Fl. suec. 297. Roy. lugdb. 45. Hall. helv. 258. Gmel. sib. 1. p. 73. Berg. viadr. 67.*

Juncus floridus minor. Baub. pin. 12. prodr. 43. theatr. 190. Rudb. elys. 1. p. 110. f. 2.

Juncoidi affinis palustris. Scheuch. gram. 336.
Gramen juncum aquaticum, semine racemoso. Lof. pruss. 114. t. 28.
Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ. Borussia, Sueciæ paludosis. 2

TRIGLOCHIN.

- 1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus. *Fl. suec. 298. Act. stockh. 1742. p. 147. t. 6. f. 1. 2. 3.*

Triglochin fructu tenui. Fl. lapp. 134. Roy. lugdb. 44. Hall. helv. 258.

Gramen juncum spicatum f. Triglochin. Baub. pin. 6. theatr. 80.

- β. Juncago maritima perennis, bulbosa radice. *Mich. gen. 44.*

palustre.
juncago ad 471

HEX.
Juncago maritima
Habitat in Eur
TRIGLOCHIN
Suec. 299. Act
Triglochin fructu
45. Gort. gel
Juncago palustris
quinquecapsul
Gramen spicatum
Habitat in Euro
MELANTHIUM
Melanthium foli
ribus panicula
Habitat in Virg
MELANTHIUM
p. 349. t. 11
Ornithogalum
fib. 1. p. 45
Habitat in Sibi
MEDEOLA
Fruticulus foli
f. 149
Habitat in Am
MEDEOLA
Medeola foli
Gron. virg.
Lilium f. Mar
baceis. Plu
Habitat in Vir
MEDEOLA
Asparagus foli
122. Roy.
Asparagus afr
16. t. 12.
Habitat in A
TRILLIUM

Juncago maritima. Barr. rar. 55. t. 271.
Habitat in Europæ inundatis uliginosis. 3

2. TRIGLOCHIN capsulis sexocularibus ovatis. Fl. ^{maritimum}
suec. 299. Act. stockh. 1742. p. 147. t. 6. f. 4. 5. ^{Juncago ad 471}
Triglochin fructu subrotundo. Fl. lapp. 135. Roy. lugdb.
45. Gort. gelr. 76.

Juncago palustris & maritima perennis, fructu brevior
quinquecapsulari. Mich. gen. 44.

Gramen spicatum alternum. Bauh. pin. 6. theatr. 82.
Habitat in Europæ maritimis. 2

MELANTHIUM. *Est annuus nigella. Dicu.*

1. MELANTHIUM petalis ungviculatis. ^{fl. spicati} ^{virginicum}
Melanthium foliis linearibus integerrimis longissimis, flo- ^{Veratrum ad 47.}
ribus paniculatis. Gron. virg. 59.
Habitat in Virginia. 2 *Est veratrum spicatum. Roy. pag. 1044.*

2. MELANTHIUM petalis sessilibus: *Amoen. acad. 2. sibiricum.*
p. 349. t. II. * ^{Veratrum ad 47}
Ornithogalum spicis florum longissimis ramosis. Gmel.
fib. 1. p. 45. t. 8.
Habitat in Sibiria. 2

Ex herbario D. Hudson aut idem genus ac Veratrum. 3. sicut veratrum folia mundis fertilibus.

1. MEDEOLA foliis verticillatis, ramis aculeatis. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Fruticulus foliis rufi stellatis. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
f. 149 ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Habitat in America calidior. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}

2. MEDEOLA foliis verticillatis, ramis inermibus. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Medeola foliis stellatis lanceolatis, fructu baccato. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Gron. virg. 39. * ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Lilium s. Martagon pusillum, floribus minutissime her- ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
baceis. Pluk. alm. 401. t. 328. f. 4. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Habitat in Virginia. 3 ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}

3. MEDEOLA foliis alternis. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Asparagus foliis ovato-lanceolatis solitariis. Hort. cliff. asparagoides. 52.
122. Roy. lugdb. 29.

Asparagus africanus scandens, myrti folio. Till. pis.
16. t. 12. f. 1. 2. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}
Habitat in Æthiopia. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}

TRILLIUM. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}

1. TRILLIUM flore pedunculato cernuo. ^{cap. 178. lapp. 133. t. 10. f. 1}

