



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

*See amudu. h. m. 7. 2. 19. Vallis amudu valli, et genus Aram. Trapede circa de coo luyt
caul rot. pilis. fl. candida alt. fl. pur. anthe. ut. 6. Hæced. & Ang. rub. in Lora 1020. Gind Wortel. Belg.
vite melde. h. m. 7. 2. 20. et amudu valli. v. ae. See amudu ad fl. menijmi in Belg. m. to. cis de 238 syl
fructus minimi. ut datur a quod v. arbitry. itory. topomy utuna Lanab. 341 quæ diatra
cubata*

HEXANDRIA TRIGYNIA 341

Arbor, aristolochiæ foliis, maderaspatana, fructu parvo medicæ ad instar convoluto. *Pluk. alm. 43. t. 13. f. 2. cuculus. last. Deam James. Curis. Condroucho.*

Cocculus officinarum. *Bauh. pin. 511. Pluk. mant.*

Natifiatam. *Rheed. mal. 7. p. 1. t. 1. an? s. Hatter valli. garundo pala Brach.*

Habitat in India. *h. m. 7. 2. 20. et amudu valli. v. ae. See amudu ad fl. menijmi in Belg. m. to. cis de 238 syl
fructus minimi. ut datur a quod v. arbitry. itory. topomy utuna Lanab. 341 quæ diatra
cubata*

5. MENISPERMUM foliis orbiculatis subtus villosis. *orbiculatum. ovate.*

Cocculi orientalis frutex convolvulaceus, orbiculatis foliis prona parte villosis. *Pluk. amalth. 61. t. 384. f. 6.*

Habitat in insula Crocodilorum Asiæ.

6. MENISPERMUM foliis lanceolato-ovatis villosis. *hirsutum.*

Cocculi indici altera species minor scandens, vineæ pervincæ foliis villosis. *Pluk. amalth. 61. t. 384. f. 7.*

Habitat in India.

7. MENISPERMUM foliis lineari-lanceolatis hirsutis. *[myofotoides.]*

Cocculi indici species minima, myofotidis hirsutis foliis & facie. *Pluk. phyt. 384. f. 3.*

Habitat in India.

SAURURUS

Saururus ad 264

1. SAURURUS foliis cordatis petiolatis, spicis solitariis recurvis. *Hort. upf. 91. ^{var. cyl. perisori.} fl. petiole basi ciliatis. am. lami. cauli
non vagi. In basi qua
tas. Min. v. ap. v. m. to.*

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, spicis solitariis propendentibus folio brevioribus. *Roy. Lugdb. 8. ^{ovato ovate cucullata ut in ovo.} fl. v. h. t. c. v. l. d. u. t. r. y. l. a. t. e. involuta. ex intra vagin petioli fl. v. t. m. v. e. n. t. u. r. i. r. e. p. t. e.*

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, spicis solitariis folio longioribus. *Hort. cliff. 139. Gron. v. g. 40.*

Serpentaria repens, floribus stamineis spicatis, bryoniæ nigrae folio ampliore pingvi, virginienfis. *Pluk. alm. 343. t. 117. f. 4.*

Habitat in Marilandia, Virginia. &

COLCHICUM.

colchicum ad 514

1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. autumnale. ^{folium} cliff. 140. Hort. upf. 90. Roy. lugdb. 41. Sauv.*

monsp. 18. Bæhm. lips. 29.

Colchicum commune. *Bauh. pin. 67. autumnale*

Colchicum. *Fuch. hist. 356. 357.*

2. Colchicum flore pleno. *Bauh. pin. 67.*

Habitat in Europæ australioris succulentis. & *1. pl. 15 aug. fl. in invig. 2. COL-*

*fl. radi. tantum - 5 ad 6. 2. h. m. 7. 2. 20. et amudu valli. v. ae. See amudu ad fl. menijmi in Belg. m. to. cis de 238 syl
fructus minimi. ut datur a quod v. arbitry. itory. topomy utuna Lanab. 341 quæ diatra
cubata*

Kusam? Bm. Reu? Colchicum Myricum c. A. nervositate.
Sungca
Bugidam? Salmas. 342.
Sarungiam

HEXANDRIA TETRAGYNIA.

montanum.
gallocium. 277.

2. COLCHICUM foliis linearibus patentissimis. Læf.
Colchicum montanum angustifolium. Bauh. pin. 68.
Colchicum montanum. Clus. hisp. 266. t. 267. hist.
1. p. 200. *mont. 2. 3 f. 8.*
Habitat in Hispania, Helvetia. *Karmuhm.*
Folia una cum floribus autumno erumpunt.

variegatum.
agrippium
guinty. Indu
caloy. de corfne

3. COLCHICUM foliis undulatis patentibus. Hort. cliff.
140. Roy. lugdb. 42. *flor. pinnata acut. 3 long. glab.*
Colchicum chionense, floribus fritillariae instar tessula-
tis, foliis undulatis. Moris. hist. 2. p. 341. s. 4. t.
3. f. 7.
Habitat in Chio insula. *K. utriusq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.*

abalum. ad. 261.
bullata. 47.
ell. novum hyacinthi
non p. 261.

HELONIAS,

1. HELONIAS. Gen. nov. 1077. f. 1. *
Ephemerum phalangoides virginianum, flosculis arbuteis
bullatis in spicam dispositis. Pluk. alm. 135. t. 174.
f. 5. Moris. hist. 3. p. 606. s. 15. t. 2. f. 1.
Habitat in Pensylvaniæ paludosis. *K.*

TETRAGYNIA.

Petiveria ad. 261.
allinea.

PETIVERIA.

1. PETIVERIA. Hort. cliff. 141. Hort. ups. 91. Act.
stockh. 1744. p. 287. t. 7.
Petiveria folani foliis, oculis spinosis. Plum. gen. 50.
Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido,
calyce aspero, alii odore. Sloan. jam. 64. hist. 1. p.
172. Raj. suppl. 287.
Habitat in Jamaicæ nemorosis. *B.*

POLYGYNIA.

alisma ad 459

ALISMA

1. gunt. Plantago. Δ I.
alisma. cad.
Linnæum. aug.
Lisopar.
Sapa 660 rior

ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis.
Alisma fructu obtuso trigono. Fl. lapp. 138. Fl. succ.
300. Hort. cliff. 141. Roy. lugdb. 46.
Plantago aquatica latifolia. Bauh. pin. 190.
Plantago aquatica. Cam. epit. 264.
Habitat in Europæ aquosis & ad ripas fluviorum, lacu-
rum.

Dutomeil 76.
Troc. ad. 261.

Damastrum maritimum Plantago in folio, flore flavo, fructu glabro.
flum. m. f. 2. 4. f. 120.
flum. Drom. ic. 15.
radix capillar. simplic.
fol. 10 ad 12 radice simplic. petiole longo 3 gono, elliptico obtusa 12. nervis
caulis 1. centralis 3 gono, simplic. aplyllis apice involuero 2. an 3 phyllis ter.
flor 10 ad 12 umbell. termin. pedicelatis internod. 3. vident. flora radialis 4. pinn.
cal. 5 phyll. 3 fol. ant. vident. perisperm. 3. vident. dentatis luteis calu?
stam plus 49. b. vident.
ovari 1. glob. 1. fol. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
capsula 1. 10 b. vident. abutit. inter circumanum d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5. in num. vident. ductica. 1. mucosa. de. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

HEXAN

ALISMA foliis
Damastrum ma
scente, fructu
Habitat in Amer
ALISMA foliis
Alisma fructu se
46. Sauv. mon
Plantago aquatica
Plantago aquatica
Damastrum stel
Habitat in Angli
ALISMA foliis
Damastrum ra
1719. p. 28.
Sagittaria virgini
ribus albis. M
Habitat in Virgi
ALISMA foli
Damastrum re
Vail. act. 17
Damastrum ra
rif. 46.
Ranunculus pa
Petit. gen. 4
Habitat in Gal
ALISMA foli
squarrosis.
Alisma fructu g
141. It. gotl.
gelr. 77. San
Damastrum a
1719. p. 35.
Plantago aquat
738. Lob. ic
Ranunculus ac
Pet. gaz. 4
Habitat in G
ALISMA fe
Habitat in Vi
Ranunculus
Communia A
Radix
caulis
fol. de
flor. o
cal. o
stam
ovari
saur

2. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus globosis. flava. 2 generi en Tour.
 Damasonium maximum, plantaginis folio, flore flavo- Pratomy. ad. 76.
 scente, fructu globoso. Plum. spec. 7.
 Habitat in America meridionali. 2

3. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis. Damasonia. 2. generi.
 Alisma fructu sexcorni. Hort. cliff. 141. Roy. lugdb. um. Dose adans
 46. Sauv. monsp. 14. Damasonium. ad
 Plantago aquatica stellata. Baub. pin. 190. 458
 Plantago aquatica minor altera. Lob. ic. 301.
 Damasonium stellatum. Dalech. hist. 1058.
 Habitat in Angliæ, Galliæ aquosis.

4. ALISMA foliis cordatis obtusis. †
 Damasonium ramosum, folio cordiformi. Vaill. act. cordifolia. Damasonium
 1719. p. 28. Ranuncul. aquat. aloni folio ad nodos umbellifera. ad
 Sagittaria virginiana, obtusiore lato folio, floribus mino- ad. 2346
 ribus albis. Moris. hist. 3. p. 618. f. 15. t. 4. f. 6. ad. 2346
 Habitat in Virginia. 2

5. ALISMA foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. natans.
 Damasonium repens, potamogetonis rotundifolii folio.
 Vaill. act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.
 Damasonium radículas emittens ex geniculis. Vaill. pa-
 ris. 46.

Ranunculus palustris foliis gramineis & subrotundis.
 Petit. gen. 47.
 Habitat in Galliæ, Sueciæ fossis.

6. ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoso- Ranunculoi-
 squarrosis. des
 Alisma fructu globoso undique echinato. Hort. cliff. Alisma. ad
 141. It. gotl. 298. Fl. suec. 301. Roy. lugdb. 46. Gort.
 gelr. 77. Sauv. monsp. 14.
 Damasonium angustissimo plantaginis folio. Vaill. act.

1719. p. 35.
 Plantago aquatica humilis angustifolia. Baub. hist. 3. p.
 738. Lob. ic. 300.
 Ranunculus aquaticus, plantaginis folio angustissimo. F.
 Pet. gaz. 41. t. 26. f. 12.
 Habitat in Gotlandiæ, Belgii, Angliæ, Galliæ fossis.

7. ALISMA foliis subulatis. Gron. virg. 153. subulata
 Habitat in Virginia.

Ranunculus aut Damasonium repens, Ranuncula fol. villosa.
Plum. m. Vol. 5. 295.
Comuliana Alismarum. Plum. m. 116. f. 2.
Radix graminea prostrata
caulis repens 1 ped. ad nodos 4 ad nodos
ob. alt. cordata v. ovata ampliciter velut vagin. 5 nervis v. 4
flor. corymb. anillo et term. (quasumula) stipitata
cal. et cor. 4. calia Damasonii 6 plus. 2. internis color dentati
o tam numero.
ovariis tant. Plum
Dam

Clas = } Damasonium
sig. palm

Leucoma { *Diarrhoeam* foliis orbis. ? *Lucuma* jauned oup. *puilli*
 ad 367 344 HEPTANDRIA MONOGYNIA.

Classis VII.

HEPTANDRIA OCT

MONOGYNIA

Orientalis ad 30 pamp. 231 TRIENTALIS.

- *europaea* 1. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis.
Orientalis. Cord *Alfine alpina. Swenckf. files. 117.*
Alinanthus m. Thal Pyrola alfine flore europæa. *Bauh. pin. 191. prodr. 101.*
 Pyrola, alfine flore, minor brasiliana. *Bauh. prodr. 101.*
 t. (sub *Hermodactyli* nomine) 99. *Burs. X. 107.*
Sapientia hbr *habitat in Europæ borealis sylvis & juniperetis. 2*
capensis. 2. TRIENTALIS foliis subrotundis crenatis. *Roy. lugdb.*
 538. †
 Habitat ad Cap. b. Spei.
 Plantam hanc non vidi, ex auctoritate Clariss. D. Ro-
 yeni adposui.

- *Hippo. Casta- num.* 1. ÆSCULUS floribus heptandris, *Hort. upf. 92.*
cap. p. 100. 2 ad 4 locis vult. 2 ad 3 locis.
 Castanea folio multifido. *Clas. hist. 1. p. 7. B. Pin. 416*
 Habitat in Asia septentrionaliore, unde in Europam
 1550. h. *in oriente 1. constituti in p. d. in Vietnam ut primum*
delator, argue a. Equi arabici, p. d. Equina dicitur.
 1500 • Pavia 2. ÆSCULUS floribus octandris.
Zamouna Simia Pavia. *Boerb. lugdb. 2. p. 260. t. 260. Hort. angl. 54.*
al. Ciba pinota t. 19. *Hort. cliff. 143. Roy. lugdb. 463.*
 Saamouna pisonis f. filiquifera brasiliensis arbor, digi-
 tatis foliis ferratis, floribus teucris purpureis. *Pluk.*
 alm. 326. t. 56. f. 4. *h. e. l. m.*
 Habitat in Carolina, Brasilia. h. 10. p. d.

fol. quoda digitata. 1. mai flor.
cal. tubo. cyl. longo. 5 dent. h. v. d. inaeq.
con 4 p. ut. inaeq. p. p. p. d. n. n. h. e. l. t. h. c. a. b. r. l. o. n. e. a. b. o. v. e. n. t. e. i. n. n.
hu. h. i. n. t. a. m. h. i. s. c. o. n. t. r. a. y. a.
o. t. h. e. 18. l. o. z. i. n. e. a. q. a. u. d. o. c. o. n. t. r. a. y. a.
o. v. i. n. 1. u. m. i. n. e. n. t. i. o. c. a. b. r. i. s. l. i. d. a. b. u. e. n. s. l. a. t. e. r. a. i. t. e. u. t. e. n. e. o. l. u. t. e.
o. v. i. n. e. m. o. l. l. e. c. o. n. t. r. a. y. a. a. b. a. l. t. e. r. o. v. e. n. t. e. l. a. t. e. r. e. a. b. i. p. s. i. v. a. l. d. e. i. n. n.
a. t. i. a. M. e. l. i. a. n. t. e. e. t. C. r. a. s. i. a. e. l. l. a. r. q. u. i. n. f. o. t. e. f. u. b. r. e. e. t.
u. l. d. d. l. o. z. i. n. e. a. u. d. o. i. t.
 Clas-
 cap. Sed 4 g. m. v. a. l. e. 3. a. d. 4. l. o. c. a. v. u. l. g. 4. l. o. c.

Classis VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

TROPÆOLUM. ^{fm} *quoc ad. 388*

~~cardaminum minus~~
388
Nasturtium indicum

- 1. TROPÆOLUM foliis integris, petalis acuminato: se-
taceis. *Hort. ups. 93.*
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff. 145.*
Cardaminum minus & vulgare T. *Fewill. peruv. 3.*
p. 14. t. 8.
Nasturtium indicum majus. *Baub. pin. 306.*
Nasturtium indicum. *Lob. ic. 166. f. 2. 1.*
Habitat in Peru, Lima. ☉ ✕

- 2. TROPÆOLUM foliis subquinelobis, petalis obtusis. *minus.*
Hort. ups. 93.
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff. 143.*
Cardaminum ampliori folio & majori flore. T. *Few.*
peruv. 3. p. 14. t. 8.
Acriviola maxima odorata. *Boerb. lugdb. 1. p. 244.*
Viola inodora scandens, nasturii sapore, maxima odora-
ta. *Herm. lugdb. 628. t. 629.*
Habitat in Peru, unde in Europam venit 1684 cura Be-
werningii. ☉ ✕

- 3. TROPÆOLUM foliis palmatis, petalis multifidis. *peregrinum.*
Cardaminum quinefolii folio, vulgo Malla. *Few.*
peruv. 2. p. 756. t. 42.
Habitat in Peru, nondum mihi visa in Europa. ☉

OSBECKIA.

- 1. OSBECKIA. *chinensis.*
Echinophora maderaspatana, fideritis non ferratis nervo-
sis foliis, fructu capsulari caucalidis æmulo. *Pluk. Kadali. Raj' ad. 234*
akm. 132. t. 173. f. 4.
Kadali maderaspatanum minus, capsulis pilosis. *Raj. Osbeckia Lin.*
suppl. app. 236.
Habitat in India; in honorem Petr. Osbeck, Sveci, qui
1751. plantas Chinæ & Javæ periculoso itinere adiit, le-
git, examinavit, descripsit, communicavit.
Habitus Melastomæ. Caulis erectus, brachiatus, acute tetra-
gonus.

onagra. *dicarb. 4c. 113.*
onduis
onethwa.
Chamenerim
ad. 44.

*fructu grandi. Folia amygdalo, dulcira
folia lili corone rimilia. Flores rosei, imity magni
Radix candida parva, qualis vivi odorum upur
montani, malditum lili*

OCTANDRIA MONOGYNIA.

*Radix infusa p. ta ab animalibus feruntur ea inanusid
et Lepida lenti ulcem dolosa. alvina onagra. dnu.*
gonas. Folia angusto-lanceolata, trinervia, opposita,
scabra, subsessilia. Flores terminales aliquot, sessiles,
cincti foliis 4 flore longioribus patentibus.

RHEXIA.

virginica.
alifany Pluk.
ad. 234.

1. RHEXIA calycibus glabris. Gron. virg. 41.
Alifanus vegetabilis carolinianus. Pluk. amalt. 8.
Lysimachia non papposa virginiana, tuberariae foliis hir-
futis, flore tetrapetalo rubello. Pluk. alm. 235. t. 202.
f. 8.

Habitat in Virginia.

Caulis tetragonus angulis membranaceis. Folia opposita,
sublanceolata, internodiis longiora, sessilia, trinervia,
pilis vagis hispidiuscula, subserrata ferraturis setaceis.
Pedunculus terminalis, dichotomus. Flores solitarii
ex dichotomia, subsessiles, petalis rubris; Antheris fal-
catis, luteis.

mariana.

2. RHEXIA foliis ciliatis.
Lysimachia non papposa, terrae marianae, leptoneuros,
flore tetrapetalo rubello, folio & caule hirsutiae ferru-
ginea hispida. Pluk. mant. 123. t. 428. f. 1.

Habitat in Marilandia.

*oculorum
dulce chamenerim
onagra ad. 88
+ I. biennis. C.
ex Rom. onagra. dnu
num. onothera. Plin*

OENOTHERA.

1. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. Vir.
cliff. 33. Hort. ups. 94. Gron. virg. 254. Roy. lugdb.
251. Gort. gelr. 78 onagra. latifolia. Gron. 202.

Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus
lateralibus in summo caulis. Hort. cliff. 144.

Lysimachia lutea corniculata. Bauh. pin. 245. 516. *
Moris. hist. 2. p. 271. f. 3. t. 11. f. 7.

Habitat in Virginia unde 1614, nunc vulgaris Europa. 8

G. mollissima.
onagra ad

2. OENOTHERA foliis lanceolatis undulatis. Vir. cliff.
33. Gron. virg. 42. Roy. lugdb. 251.

Oenothera foliis lineari-lanceolatis dentatis, floribus e
medio caule. Hort. ups. 144.

Onagra bonariensis villosa, flore mutabili. Dill. elth.
297. t. 219. f. 286.

Habitat in agro Bonariensi. ☉

fruticosa.
onagra ad 49

3. OENOTHERA foliis lanceolatis, capsulis acutan-
gulis.

Oenothera florum calyce monophyllo, hinc tantum a-
perto. Gron. virg. 42.

Ona-

*onothera octo
glabris. 20*
OCTAN
Onagra angustif
inst. 302.
Habitat in Vi
Calyx purpur
sepibus & un
mus. Capsula
us denticulat
calophyllo tubulosa
GAURA. G
Lysimachia lut
Pluk. alm. 235
Habitat in Vi
cap. 4 paron
Hort. cliff.
*
EPILOBIU
Epilobium fl
suc. 304.
Epilobium fo
Hort. cliff.
Lysimachia C
245.
Lysimachia
245.
Lysimachia C
prodr. 116
Habitat in E
EPILOBIU
Habitat in
Differt a pr
ceolato-ov
tomento
a sequent
les petali
terna;
liquis.
* Stamin
EPILOBI
Hort. cl
Roy. lug
Lysimachi
Lysimach

Oenothera octovalvis, foliis lanceolatis oblongis, acuminatis, planis, glabris. Paq. Mem. ic. 175. f. 1. } *7/17/17/17/17*

OCTANDRIA MONOGYNIA. 347

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minore. Tournef. inst. 302.

Habitat in Virginia. 2 &

Calyx purpurascens, tetraphyllus, sed rumpitur altero saepius & unico latere. Tubus filiformis, angustissimus. Capsula angulis 4 acutis compressis. Folia rarius denticulata.

aetia ad

ovario ad 89

~~GAURA.~~

1. *GAURA* Gen. nov. III. *Lyfimachia lutea angustifolia virginiana, flore minore.*

Pluk. alm. 225. t. 207. f. 7. mala. non ex hoc planta nam fl. in gaura fuit

Habitat in Virginia, Pennsylvania. & haec ut vira spec. onagra fl. mhi.

Caps. 4 gaura ov. ang. aut. 1 lob. Sem. 8 ad 10 vato pro. mag. cap. p. 17. d. ab

cap. column. Epilobium.

~~GAURA.~~ *Epilobium.*

* *Staminibus declinatis.*

1. *EPILOBIUM* foliis sparsis lineari-lanceolatis.

Epilobium floribus difformibus, pistillo declinato. Fl. suec. 304.

Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. Fl. lapp. 146.

Hort. cliff. 154. Roy. lugdb. 250.

Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia. Baub. pin. 245.

Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia. Baub. pin. 245.

Lyfimachia Chamænerion dicta alpina. Baub. pin. 245.

prodr. 116.

Habitat in Europa boreali. 2

2. *EPILOBIUM* foliis alternis lanceolato-ovatis.

Habitat in Sibiria. 2

Differt a precedenti floribus duplo majoribus, foliis lanceolato-ovatis, alternis nec sparsis, utrinque levissimo tomento mollissimis. Haec & antecedens differunt a sequentibus in non paucis, his enim Flores inaequales petalis integris; Pistillum declinatum; Folia alterna; Folia erumpentia revoluta contra ac in reliquis.

* *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

3. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis ferratis.

Hort. cliff. 145. Fl. suec. 305. Gron. virg. 154.

Roy. lugdb. 251. Chamænerion. videri minus magno fl. 2.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore. Baub. pin. 245.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Lyfimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

Chamænerion

angustifolia. ad 85

Epilobium

Chamænerion

Belyphium

Pseudopimpinella

Conyza

Antoniana

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

Chamænerion

β. Lysif.

Subtilis in chilo. B. Pin. 471. Planta fructu colui, mri nondum maturo,

lignum involuente foliis molle, fructu a valle amara, cortice molle

OCTANDRIA MONOGYNIA.

349 *Laurus ad. 345. Jaffray*

MIMUSOPS.

- 1. MIMUSOPS foliis alternis remotis. Fl. zeyl. 138. Elengi. ad. 166. Kauki indorum. Pluk. alm. 203. Breyn. cent. 20. t. 8. Elengi. Rheed. mal. 1. p. 34. t. 20.
- 2. MIMUSOPS foliis confertis. Fl. zeyl. 137. Kauki. Habitat in Zeylona. b

JAMBOLIFERA. *foliis oppositis.*

Jambolana. ad 508 et pedunculata. 305

- 1. JAMBOLIFERA. Fl. zeyl. 139. * Jambolones. Baub. pin. 466. Habitat in India. b

Jambolones gurgise Jambolyn. Galus Jamboloni. aut. Baluh

SANTALUM. ad 159.

- 1. SANTALUM. Mat. med. 183. Santalum verum. Breyn. ic. 94. t. 5. f. 1. Santalum album. Baub. pin. 392. Habitat in India. b

album- Sambavana. mab. gurgise. Sambavana. mab. gurgise. Sambavana. mab. gurgise. Sambavana. mab. gurgise.

MEMECYLON. *cul nomen gossium fructu arboreo. Theoph*

- 1. MEMECYLON foliis ovatis. Fl. zeyl. 136. Cornus sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus, flosculis ad foliorum alas globosis. Burm. zeyl. 76. t. 30. Habitat in Zeylona. b

capitellatum Walipaha. herm. ad 84.

LAWSONIA.

- 1. LAWSONIA ramis inermibus. Fl. zeyl. Ligustrum ægyptiacum latifolium. Baub. pin. 476. Alhenna f. Henna arabum. Walth. hort. 3. t. 4. Postaletsje. Rheed. mal. 4. p. 117. t. 57. Habitat in India, Ægypto. b

al. Kanne. ad 444. inermis. Pustalys. Mal. Pustalys. Mal. Pustalys. Mal.

- 2. LAWSONIA ramis spinosis. Fl. zeyl. 134. Rhamnus maiabarcus. Mail-anschi. Pluk. alm. 38. t. 220. f. 1. Mail-anschi. Rheed. mal. 1. p. 73. t. 40. Habitat in India. b

spinosa. 2. f. Cypher. Mal. Cypher. Mal. Cypher. Mal.

VACCINIUM.

* Foliis annotinis deciduis.

- 1. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. Fl. lapp. 143. Fl. suec. 313. Mat. med. 184. Hort. cliff. 148. Roy. lugdb. 239. Hall. kelv. 419. Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. Baub. pin. 470. *Junia flor 20. Jelsi. fructu maturo.*

Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus. Myrtilus.

2. 1. ped. angulato in unguis 2. infra fol. pedunculis fol. alt. sub orbis denticulis fol. termin. sub p. multo pedulo huius 1. unguis. fol. alt. sub orbis denticulis fol. termin. sub p. multo pedulo huius 1. unguis. fol. alt. sub orbis denticulis fol. termin. sub p. multo pedulo huius 1. unguis.

Frutilla in chilo. B. Burm. 477. Planta fructu coleri mari undum maturo,
 com. in mont. topone.
 Lignum involucens foliis malose, fructu avellanam mirum, cortice mollitie
 a sapiente, savana. Burm. 477. p. 293

Frutilla in chilo
 1. Roganda ad.
 Savana. in chilo. Baluh.
 349 Laurus. ad. 345.
 Jaffray

OCTANDRIA MONOGYNIA.

MIMUSOPS.

1. MIMUSOPS foliis alternis remotis. Fl. zeyl. 138. Elengi. ad. 166.
 Kauki indorum. Pluk. alm. 203. Breyn. cent. 20. t. 8.
 Elengi. Rheed. mal. 1. p. 34. t. 20.
2. MIMUSOPS foliis confertis. Fl. zeyl. 137. Kauki.
 Habitat in Zeylona. b

JAMBOLIFERA. fol. ovata. jambolana. ad 508 et
 pedunculata. 305

1. JAMBOLIFERA. Fl. zeyl. 139. *
 Jambolones. Bauh. pin. 466.
 Habitat in India. b

SANTALUM, ad 159.

1. SANTALUM. Mat. med. 183.
 Santalum verum. Breyn. ic. 94. t. 5. f. 1.
 Santalum album. Bauh. pin. 392. Sambauua. Sembaue. ^{mat. bur. gaj. j. b.}
 Habitat in India. b

MEMECYLON. ^{ell. uonam gaseum fructu arbuti. Theoph}

1. MEMECYLON foliis ovatis. Fl. zeyl. 136. capitellatum
 um colorem tingentibus, ^{Walikaha. herum,}
 olis. ^{ad 84.}
 Burm. zeyl. 76. t. 30.

cal. mar. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 con. u. l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LAWSONIA.

1. LAWSONIA ramis spinosis. Fl. zeyl. 134.
 Rhamnus maiabaricus. Mail-anschi. Pluk. alm. 38. t.
 220. f. 1.
 Mail-anschi. Rheed. mal. 1. p. 73. t. 40.
 Habitat in India. b

VACCINIUM.

* Foliis annotinis deciduis.

1. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. Fl. lapp. 143. Fl. suec. 313. Mat. med. 184. Hort. cliff. 148. Roy. lugdb. 239. Hall. kelv. 419. Bauh. pin. 470.
 Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. Bauh. pin. 470.
 Myr...

spinoso. 1. f. p.
 Capher. Cal.
 Gynat. Plin. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 hunc...
 1. al. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 Schenna
 maty. Boerh.
 Mat. Lap. ad 164.
 Myrtilus. m. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l.
 Bleuet. gall.
 Viti idæa. Theoph. g. m. cl.
 Bagola 1. cap.
 Vaccinia nigra. Dod. l. l.
 Bauhaunitza. Cuvier.
 Mauriti. m. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l.
 Paurio. B. m. g. ad.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Myrtillus germanica & Vitis idæa. Dalech. hist. 191.

192. *sp. p. caule, et ubi nimis ventis inflatur, et
termina caulat, quæ sunt abscondita, edulcorata, cum
Habitat in Europæ borealis sylvis umbrosis. Dalech. hist.
videt. ram. angul. junct. v. d. l. d.*

Gamineum.

2. VACCINIUM pedunculis solitariis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongis integerrimis. Vaccinium staminibus corolla longioribus. Gron. virg. 43. Vitis idæa americana, longiori mucronato folio & crenato, floribus urceolatis racemosis. Pluk. alm. 331. t. 339. f. 3.

Habitat in America septentrionali. ♀

Frutex. Folia oblonga, integerrima. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, filiformes, corolla longiores. Corollæ quinquefidæ, campanulato patentes. Antheræ 10. Stylus flore longior.

Vaccinium ad. 164

uliginosum.

3. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus basi ciliatis.

Vaccinium foliis ovalibus integerrimis deciduis. Fl. suec. 312.

Vaccinium foliis annuis integerrimis. Fl. lapp. 142. Hall. belv. 414.

Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis. Baub. pin. 470.

Vitis idæa II. Clus. hist. I. p. 61. t. 62.

Habitat in Sueciæ borealibus & alpinis, uliginosis. ♀

album.

4. VACCINIUM pedunculis simplicibus, foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis.

Habitat in Pennsylvania. Kalm. ♀

Frutex. Folia ovata, subtus tomentosa. Flores duo vel tres ad apices ramorum: pedunculis aggregatis, brevissimis, nudis.

mucronatum

5. VACCINIUM pedunculis simplicissimis unifloris, foliis ovatis mucronatis glabris integerrimis.

Habitat in America septentrionali. Kalm. ♀

Frutex Ramis teretibus, glaucis. Folia elliptica, utrinque glabra, integerrima, mucronata, petiolis canaliculatis insidentia. Pedunculi uniflori, foliis paulo breviores.

corymbosum

6. VACCINIUM floribus corymbosis ovatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis.

Habitat in America septentrionali. Kalm. ♀

Frutex. Folia oblonga, acuta, nervis subtus villosis. Corymbi ex gemmaceo involucre, sessiles. Corollæ cylindraceo-ovata, longiores, quam in reliquis, Stamina decem.

7. VAC-

VACCINIUM longis integerrimis. Gron. v.

Habitat in America septentrionali. Frutex. Folia oblonga, integerrima, mucronata, petiolis canaliculatis insidentia. Pedunculi uniflori, foliis paulo breviores.

VACCINIUM crenulatis ovatis. Habitats in Pennsylvania. Flores in Racemis, 8. foliolis

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

VACCINIUM vatis acutis. Vitis idæa ovata. Tournefort. Vitis idæa crenulata. Tournefort. Habitats in Carolina. Racemi foliolis instructi.

7. VACCINIUM racemis filiformibus foliosis, foliis obfrondosum longis integerrimis.

Vaccinium foliis ovatis integris deciduis, racemis foliosis. Gron. virg. 155. *

Habitat in America septentrionali. †

Frutex. Folia oblonga, integerrima. Racemi infra folia, bracteis oblongis, parvis. Pedunculi partiales bracteis longiores, instructi bracteolis duabus filiformibus. Corolla ovato-campanulata. Stamina 10.

Vaccinium ad.

8. VACCINIUM racemis nudis, caule fruticoso, foliis ligustrinum. † crenulatis oblongis.

Habitat in Pennsylvania. Kalm. †

Flores in Racemis alternis, numerosis, destitutis bracteis, 8. foliolis, qua nota facile distinguitur.

9. VACCINIUM floribus racemosis, foliis crenulatis ovatis acutis, caule arboreo.

Arctostaphylos. Lin.

Vitis idæa orientalis maxima, cerasi folio, flore variegato. Tournef. cor. 42. it. 2. p. 223. t. 223.

β. Vitis idæa cappadocica maxima, mespili folio, flore variegato. Tournef. cor. 42.

Habitat in Cappadocia. †

Racemi foliis longiores, infra folia siti, foliolis ovatis instructi.

* Foliis semper virentibus.

10. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis.

Vaccinium ad. 164

Vaccinium foliis obverse ovatis perennantibus. Fl. lapp. 145. Fl. suec. 314. Mat. med. 185. Hort. cliff. 148.

Vitis idæa. Dod. pempt. 770. Lob. ic. 109.

Roy. lugdb. 239. Hall. helv. 414. Gort. gelr. 81.

Vaccinia palustris. Baub. pin. 470.

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. Baub. pin. 470.

Habitat in Europæ frigidioris sylvis macris. †

Oxycoccus ad 164

11. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis.

Oxycoccus. um. cordi

Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. Fl. lapp. 145.

Vaccinia palustris. Baub. pin. 471.

Vaccinium ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus, pedunculis simplicibus stipula duplici. Fl. suec. 318. Mat. med. 186.

Vitis idæa palustris. Baub. pin. 471.

Vaccinia palustris. Dod. pempt. 770. Lob. ic. 109.

Habitat in Europæ paludibus sphagnoque repletis. †

Ray. v. d. pempt. 1. mai. fl. suec. fl. suec. 318. Mat. med. 186.

Ray. v. d. pempt. 1. mai. fl. suec. fl. suec. 318. Mat. med. 186.

Ca. palustris

Ca. palustris

Ca. palustris

Ca. palustris

Ca. palustris

Racemus brevissimus, pedunculis longissimis: bracteis
2 alternis; Corolla revoluta.

oxycoen. ad.
hispidulum.
atoca. Canad.

12. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis,
caulibus repentibus filiformibus hispida.

Vitis idæa palustris americana, oblongis splendidibus
foliis, fructu grandiore rubro plurimis intus acinis re-
ferto. *Pluk. alm. 392. t. 320. f. 6.*

Vitis idæa palustris virginiana, fructu majore. *Raj. hist. 685.*

Habitat in Virginia paludosis.

*Structura antecedentis, sed majora omnia, & Caulis
squamis setaceis imbricatus.*

ERICA.

* *Antheris bicornibus.*

Erica. ad. 164

vulgaris.

1. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inæquali-
bus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis.

*Erica vulgaris. Cal.
Erica vulgaris. Cal.
Erica vulgaris. Cal.
Erica vulgaris. Cal.
Erica vulgaris. Cal.*

Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris e-
rectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus. *Hort.*

Erica vulgaris glabra. *Bauh. pin. 485. F. 141.*

*Habitat in Europæ campestribus sterilibus frequens. &
Comparativa mediocriis, longior, brevior corollæ respici-*

Erica longis
umbellata.

2. ERICA antheris bicornibus exsertis, corollis globosis
umbellatis, foliis ternis acerolis glabris. *Læst. epist.*

2. n. 8.
Habitat in Lusitania. b.

Fruticulus habitu *Ericæ vulgaris*. Folia ternâ, acerosâ,
brevia, glabra, subtus lineâ alba notata. Umbellulæ
nude absque involucre. Calyx compositus. Corolla
pallide cærulea, angulata.

Erica rubra
ad.

3. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campa-
nularis mediocribus secundis, foliis ternis triquetris pa-
tulis.

*Erica procumbens herbacea. Bauh. pin. 486.
Erica coris folio 8. Clus. hist. i. p. 44.
Habitat in Europâ australiori.*

Erica cinerea
ad.

4. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis ra-
cemosis, foliis ternis glabris linearibus.

*Erica foliis linearibus ternis, floribus globoso-oblongis
laxe spicatis. Guett. stamp. 2. p. 110.*

Erica myrta
Erica juny
OCTA
Erica humilis, c
Erica coris fol
Habitat in Eu
ERICA anthe
latis longior
tosis.
Erica erecta, f
ticillatis. Sa
Erica major f
Erica scoparia
Savv. monst
Habitat Mon
ERICA anth
tis mediocri
Erica foliis lin
lycibus acu
Habitat in A
ERICA anth
longioribus
Erica foliis la
versu racem
Erica major,
485.
Erica corios
Habitat in I
ERICA anth
bosis aggr
latis pater
Erica foliis li
ovatis tern
310. Roy
Erica ex rub
Habitat in E
ERICA an
latis long
subarbore
Erica erecta
fis. Savv
Erica foliis
vatis, stan
Erica maxi
Eri

Hunt Institute for Historical Documentation

Erica myrica folio hirsuta B. Pin 485

Erica genus qd tota graecia vulgo Rhana dicit. Belon. c. 1. Pin 485 } *Scytago. Min. quibus.*
} *Phana. graec. Belon.*
} *Erica ad. 164*

OCTANDRIA MONOGYNIA. 353

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. Bauh. pin. 486.

Erica coris folio 6. Clus. hist. 1. p. 47.

Habitat in Europa media.

Tribu. ad

- 5. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis tomentosis.

Scoparia. Erica ad

Scytago. Min. quibus.

Picosa. Theoph. quibus.

Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas sessilibus verticillatis. Sauv. monsp. 170.

Meyer d'ortous.

Erica major scoparia, foliis deciduis. Bauh. pin. 485.

Erica scoparia, flosculis herbaceis. Lob. ic. 2. p. 215.

Sauv. monsp. 46.

Habitat Monspeli, in Hispania, & Europa australi. h

biflorat. c. 1.

- 6. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis subovatis mediocribus solitariis, foliis ternis, caule arboreo.

castra. Tribu. ad

Erica foliis lineari subulatis ternis, corollis ovatis, calycibus acutis patulis. Hort. cliff. 148.

Habitat in Aethiopia. h

- 7. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis longioribus, racemis corymbosis secundis, foliis ternis.

viridi-purpurea. Tribu. ad

Erica foliis lanceolatis oppositis imbricatis, floribus uno versu racemosis. Hort. cliff. 148. Sauv. monsp. 170.

Meyer de Bovenne

Erica major, floribus ex herbaceo-purpureis. Bauh. pin.

485.

Erica coris folio 3. Clus. hist. 1. p. 42.

Habitat in Lusitania. h

R-gamm.

Erica ad

- 8. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis subglobosis aggregatis calyce longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus.

Tetralix. athenicum

Erica ad

Erica foliis subulatis ciliatis quaternis, corollis globoso-ovatis terminalibus confertis. Hort. cliff. 148. Fl. suec.

310. Roy. lugdb. 442.

Mabuta ca. Hist. 602. Cal. 17. 4. 4. 4. 4.

ca. lacerata & dens

Erica ex rubro nigricans scoparia. Bauh. pin. 486.

Habitat in Europæ borealis paludibus cespitosis. h

Tetralix ad

- 9. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis quaternis patentissimis, caule subarboreo tomentoso.

arborea.

Erica erecta, foliis quaternis, floribus spicato-racemosis. Sauv. monsp. 170. 46.

Erica foliis acerosis linearibus patentissimis, corollis ovatis, staminibus brevibus. Hort. cliff. 47. Roy. lugdb. 442.

Erica maxima alba. Bauh. pin. 485.

Prancioni. Lob. Erica frutescens purpurea. B. R. 485.

354 OCTANDRIA MONOGYNIA.

Pentalix ^{aspid.} pallido-purpurea.

10. ERICA foliis in summitate quinis, caule procumbente. *Segu. ver. 280.*
Erica procumbens dilute purpurea. *Bauh. pin. 486. Raj. hist. 1715.*
Erica foliis corios, flore purpureo dilutionis coloris. *Bauh. hist. 1. p. 358.*
Erica coris folio VII. *Clus. hist. 1. p. 43.*
Habitat in Europa australi. h



Numerosum gregem Ericarum Aethiopicarum aliorumque infinita diligentia dudum conquirit, descripsit, delineavit & absolvit Botanicus vere magnus Ill. Adrian Royenus, quas ut edat publicique juris faciat, omnes Botanici mecum serio efflagitant.

* *Anteris simplicibus obtusis emarginatis.*

Viburni ciliaris.

11. ERICA antheris simplicibus inclusis, corollis ovatis irregularibus, floribus terno racemosis, foliis ternis ciliatis. *Loest. epist. 2. n. 9.*
Erica hirsuta anglica. *Bauh. pin. 602 486.*
Erica XII. *Clus. hist. 1. p. 46.*
Habitat in Lusitania. h

Scopae caespit.

Planta suffruticosa, bipedalis. Folia terna, patentia, sessilia, ovato-oblonga, acuta, margine reflexa, ciliata. Racemus terminalis, terno-verticillatus. Corolla magna, ovata, ore contracto inaequali.

Viburni triflora.

12. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis subglobosis subvillosis ternis, pedunculis triphyllis, foliis ternis. *Habitat in Aethiopia. h*

Viburni ~~triflora~~ ^{retroflora} ~~surviflora~~.

13. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis clavato-cylindricis curvis solitariis longis, foliis ternis. *Habitat in Aethiopia. h*
Erica foliis linearibus quaternis oppositis villosis, corollis longissimis solitariis. *Hort. cliff. 148.*
Erica africana frutescens. *Seb. thes. 2. p. 20. t. 19. f. 5.*
Erica spicata, floribus oblongis ex carneo purpureis. *Pluk. mant. 67. t. 346. f. 9.*
Habitat in Aethiopia. h

Viburni ~~triflora~~ ^{bruniades}.

14. ERICA antheris bifidis exsertis stylo brevioribus, corollis globosis tectis calyce lanato, foliis ternis. *Habitat in Aethiopia. h*
Eriocephalus bruniades ericaeformis monomopatenfis, capitulis globulorum instar interioris cavis & densa lanugine tectis. Pluk. mant. 69. t. 347. f. 9.
Frutex africanus aromaticus. Seb. thes. 2. p. 64. t. 63. f. 7.

15. E-

Erica apud 15 mai flor in Aethiopia

21. 4 ped. ramis rub. fragilib. 4goni. fl. linear. lutea. corolla 3 lobis
flor. 2 ad. 3 long. ala. 3 lobis. subrotunditate. in medio pediculi 2/3 quant. operit. ligati.
cal. 4 phyllis. calicibus. agralis. parvis. cor. minima. in 2 ped. tubo. tubo. tubo.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

15. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis globosis, calycibus hispidis

Erica africana calyce lanuginoso ex viridi luteo capitulum referente, floribus concoloribus exiguis lanugine obsitis. Seb. thes. 1. p. 30. t. 20. f. 1.

Habitat in Aethiopia. b

capitata.
Tetralonga ad

16. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis ovatis sublongioribus, foliis quaternis triangularibus patentibus:

Erica procumbens, ternis foliolis, carnea. Baub. pin. 486.

Erica coris folio IX. Clus. hist. 1. p. 44. b. nitid.

Habitat in Pannonia, Helvetia. b. nitid.

floribus compositis, capitulum ab hinc modo adhaerentibus. c. b.

Tetralonga
Sung ad. 164

carnea.
crashiza. Carnid.
D. Sigphi
artezha. Carnid.

17. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis campanulatis longioribus, foliis quinque linearibus patentibus.

Erica, foliis corios, multiflora. Baub. hist. 1. p. 356.

Erica juniperifolia dense fruticans narbonensis. Lob. hist. 620. Sauv. monsp. 46.

Habitat Monspelii. b gallica. 1 ad 2 ped.

Pentelongo ad
multiflora.

18. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis globosis glabris quaternis, foliis quaternis setaceis patulis.

Habitat in Aethiopia. b

Tetralonga ad
pilulifera.

19. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis clavatis, calycibus duplicibus.

Erica africana angustifolia glabra, floribus oblongis tubulosis dependentibus coccineis, cum longissimis filamentis concoloribus. Seb. thes. 1. p. 32. t. 21. f. 4.

Habitat in Aethiopia. b

Tetralonga ad
coccinea.

20. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis globosis mediocribus, pedunculis triphyllis, foliis quaternis.

Erica africana glabra fruticosa, coris folio, arbuti flore dilute purpureo. Seb. thes. 1. p. 32. t. 21. f. 3.

Habitat in Aethiopia. b

Tetralonga ad
corifolia.

21. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis cylindricis longioribus aggregatis, foliis verticillatis dentato-auriculatis.

Erica foliis subulatis glabris quinque pluribusve verticillatis, floribus longissimis terminalibus confertis. Hort. cliff. 148.

Erica africana, abietis folio longiore & tenuiore, floribus

Tetralonga ad
abietina.

bus oblongis saturate rubris. *Raj. dendr.* 96. *Seb. thes.* 1. p. 31. t. 21. f. 1.

Habitat in Æthiopia. ♀

Viburni ad.

gnaphaloides

22. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis globosis ternis, calycibus duplicibus obtusis.

Habitat in Æthiopia. ♀

Facies plantæ Gnaphalii.

Trilonga ad.

plukenkii.

23. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis subcylindricis indivisis longioribus, calycibus simplicibus, foliis linearibus verticillatis.

Chamæpithys æthiopica, foliis læte virentibus, flore oblongo phœniceo plus quam eleganti s. plusquenectii.

Pluk. mant. 45. t. 344. f. 3.

Habitat in Æthiopia.

Et nomen græcum Laure DAPHNE.

* Floribus lateralibus.

Thymelæa ad. 285.

Mezerium.

1. DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.

Chamaecra.

Daphne floribus sessilibus infra folia elliptico-lanceolata.

Aellen Zwart.

Fl. lapp. 140. *Fl. suec.* 311. *Mat. med.* 179. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 201.

Chamaecra.

Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. *Bauh. pin.* 462.

Chamaecra.

Daphnoides. *Cam. epit.* 937.

Chamaecra.

Habitat in Europæ borealis sylvis. ♀ 2 p. rami albi

Thymelæa ad.

Thymelæa.

DAPHNE floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis.

Thymelæa.

Daphne floribus tetrandris secundum caules simplicissimos. *Sauv. monsp.* 56.

Thymelæa.

Thymelæa foliis polygalæ glabris. *Bauh. pin.* 463.

Thymelæa.

Sanamunda viridis vel glabra. *Bauh. prodr.* 160.

Thymelæa.

Sanamunda glabra. *Bauh. hist.* 1. p. 592.

Thymelæa.

Habitat in Hispania & Montpelii in Horto Dei. ♀

Thymelæa.

3. DAPHNE floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis utrinque pubescentibus nervosis.

Thymelæa.

Thymelæa foliis candicantibus & serici instar mollibus

Thymelæa.

Bauh. pin. 463.

Thymelæa.

Tarton-Raire galloprovinciæ monspeliensium. *Lob. ic.* 371.

Thymelæa.

Habitat in Galloprovincia. ♀ 2 p. rami albi

Thymelæa.

4. DAPHNE floribus sessilibus aggregatis lateralibus, foliis lanceolatis obtusiusculis subtus tomentosis.

Thymelæa.

Thymelæa.

Thymelæa flor. Hall. belv. 1

Chamelæa alpin. 462.

Chamelæa alpin. Chamelæa saba. Raj. hist. 15

Thymelæa, inc. dum fragilibus. Habitat in Alp.

DAPHNE racem. Hort. cliff.

Sauv. monsp. Laureola semp. mas. Bauh.

Laureola. Do. Habitat in Ar.

6. DAPHNE foliato ovatis. Thymelæa po.

180. t. 180. Habitat in P.

7. DAPHNE positis obl.

Habitat in C. Frutex parv.

rima, glab. pice geren.

8. DAPHNE foliis lanc.

Daphne hui. les subcir.

Thymelæa Cneorum.

Habitat in Munchb.

9. DAPHN acuminata.

Daphne fo. do tern.

Thymelæa. Rami p.

Alta c. Flory. monsp.

ne p. angu.

Thymelæa florib. Kali Laryngivora / abis. Pin 463

*Phacoides. oribasi Balis
Capanidæ minus. Daled
Euphorbia ang.
Sanamunda. ad 285.
Pappina 2 hirsuta
L. p. 559.*

OCTANDRIA MONOGYNIA.

357

Thymelæa floribus inter folia, folio utrinque hirsuto.
Hall. helv. 187. Sauv. monsp. 57.

Chamelæa alpina, folio inferne incano. *Bauh. pin. 462.*

Chamelæa alpina incana. *Lob. ic. 370.*
β. Chamelæa fabaudica, folio utrinque incano, flore albo.
Raj. hist. 1588.

Thymelæa, incana, mezerei folio & facie, furculis admodum fragilibus. *Pluk. alm. 366. t. 229. f. 3.*
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Genevæ, Italiæ.

*Thymelæa ad 285.
Lauræola. - Muff. germ.
Thymelæa. Prop. mesum.
Daphnoides. Diels. cas.
mezerei. sub. cas.
Chama Daphne. matth.
Xaprai Dapry. Diels.
Daprocides. Plin.*

5. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris.
Daphne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris.
Hort. cliff. 147. Hort. ups. 94. Mat. med. 180.
Sauv. monsp. 57.

Laureola sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureolamas. *Bauh. pin. 462.*

Laureola. *Dod. pempt. 365.*
Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Baldo. h 2 p. uti.

6. DAPHNE pedunculis lateralibus bifloris, foliis lanceolato ovatis.

Thymelæa pontica, citrei foliis. *Tournef. itin. 3. p. 180. t. 180.*

Habitat in Ponto. h

Hunt Institute for Botanical Documentation

* Floribus terminalibus.
7. DAPHNE capitulo terminali pedunculato, foliis oppositis oblongo-ovatis glabris.

Habitat in China. h

Frutex parvus. Folia opposita, oblongo-ovata, integerrima, glabra. Pedunculus terminalis, brevissimus, apice gerens flores 6 ad 8 sessiles.

8. DAPHNE floribus congestis terminalibus sessilibus, foliis lanceolatis nudis.

Daphne humifusa, foliis oblongis flores sessiles terminales subcingentibus. *Sauv. monsp. 57.*

Thymelæa affinis facie externa. *Bauh. pin. 463.*

Cneorum. *Matth. hist. 46. Pluk. hist. 89.*

Habitat in Helvetia, Hungaria, Pyrenæis, Baldo, L. B. Munchhausen. h

*? Thymelæa
Cneorum. matth.
oleander. Tour. Balis
Cada. matth.*

9. DAPHNE panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis.

Daphne foliis lanceolatis basi angustioribus, racemo nudo terminali. *Sauv. monsp. 56.*

Thymelæa. *Diels. h. 4. c. 167.*

*Rami plures 2 cubitaly pulchri glaberrimi
Alba chameleæ ad angustiora et laeviora, glutinosa supra
flos candidi. Dutur glaberrimus parvis myrtifloris 10 v. 10
monumbra. ovidulo nigro, melle albo.
Mulle 20. long. pona val auro uva, aut melle corte chabate
ne pueri usant. Scler. p. ugento. quibus dardare. agra eo rante
angustior eo hite addit. recte claretu*

*Thymelæa ad
Gnidium. h
Carogni dion. matth. clus.
Cuscut. androg. fustis. p. 10
Xocapog. Rhynch. 802
Casia. gaza vertit.
Lupidaria. dion
Thymelæa. mesum. matth.
Brittanella. longum.
Cneorum. q. y. foliam. dion.*

Embria Mrs. Pi.
Pindaba
amese. Kairum
Mou de negre Stam.
4. ger. Sept 265.

Thymelæa arborea, foliis subtus argenteo, fructu nigro, sammi.
fructu amaro, p. 2. p. 427. la. nigro, p. 2. p. 427. la. nigro, p. 2. p. 427.
paucis amari, corve que au papa a la. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

- Daphne floribus racemosis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integris.* Guett. stamp. 2. p. 427.
- Thymelæa foliis lini.* Baub. pin. 463.
- Thymelæa.* Clas. hist. 1. p. 87. Cam. epit. 974.
- Habitat in Hispania, Italia, G. Narbonensi.* †
- 1. p. 2. uti Martiana 13. tota laud. Flaj.*
- squarrosa.* 10. DAPHNE floribus terminalibus pedunculatis, foliis sparsis linearibus patentibus mucronatis.
- Thymelæa capitata lanuginosa, foliis creberrimis minimis aculeatis.* Burm. afr. 134. t. 49. f. 1.
- Habitat in Æthiopia.* †

Suprior grec. nomen althæa p. 142. DIRCA. *grec. cur*

- palustris.* 1. DIRCA. Gen. nov. 1078. *
- Dofia. adanf. p. 245.* *Hil. de plau. gall.* *Lithor. wood. angl.* *moor wood. J.*
- Thymelæa floribus albis primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus & cortice valde tanacibus.* Gron. virg. 155. *Lignum levissimum ab opp. p. 2.*
- Habitat in Virginia paludosis.* †

Eu unia urticae p. 943. GNIDIA. *hyrcan.*

- pinifolia.* 1. GNIDIA foliis sparsis lineari-subulatis.
- Deffania. adanf. 285.* *a. D. Deffania. Acton.*
- Rapunculus foliis nervosis linearibus, floribus argenteis non galeatis.* Burm. afr. 112. t. 41. f. 3.
- Habitat in Æthiopia.* †

- tomentosa.* 2. GNIDIA foliis alternis ovato-lanceolatis.
- Habitat in Æthiopia.* †
- Fores tomentosi, capitati, terminales.*

- oppositifolia.* 3. GNIDIA foliis oppositis lanceolatis.
- Deffenia. ad*
- Habitat in Æthiopia.* † *1. p. 2. uti Martiana 13. tota laud. Flaj.*
- Frutex ramis rectis. Folia opposita, lanceolata, glabra, integerrima. Flores terminales, conferti, infundibuliformes, tubo villoso, petalis emarginatis.*

- Zingina. chin.* *frutescens.* *ad. 254*
- 1. BÆCKEA.* *hab. 2. p. 142. laud.*
- Habitat in China. D. D. Abrak. BÆCK. S. R. M. tis.*
- Suecicæ medicus ordinarius, Amicus noster vere sincerus, e cujus horto sicco plurimas rariores stirpes obtinimus, etiam hanc primus nobiscum communicavit.*
- Frutex habitu abrotani, ramis virgatis: Ramulis oppositis, brevibus, simplicibus. Folia opposita, linearia, acuta, glabra, integerrima. Flores axillares, solitarii, pedunculo nudo longitudine floris, foliis longe brevioribus. Perianthium infundibuliforme, quinquedentatum. Petala*

tala 5, subrotunda, patula, calyci inserta. Filamenta 8, quorum 6 paria, & 2 solitaria, brevissima, inflexa. Antheræ subovatæ, parvæ. Germen subrotundum. Stylus filiformis, corolla brevior. Stigma capitatum. Chinesibus Tjongina. Osbeck.

DIGYNIA.

GALENIA.

- 1. GALENIA. Hort. cliff. 150. Roy. lugdb. 209. Sherardia. Pont. epist. 14. Kali lignosum, flore muscoso, rosmarini folio. Bocc. mus. 150. t. 110. Atriplex africana lignosa frutescens, rosmarini foliis. Till. pis. 20. t. 25. Habitat in Africa. *h. 27 ped. flos totus. de ulis uti Salicornia. Reginum h. ymi vrid flav. subpubes.*

galenia ad. 262.

africana. galenia. lin. ad. 262. Chersodia. Pont. Epist.

MOEHRINGIA. *Lin.*

moehringia. ad.

257 muscosa.

- 1. MOEHRINGIA Alfine montana, capillaceo folio. Bauh. pin. 251. Scheuchz. alp. 503. t. 6. Pluk. alm. 23. t. 75. f. 1. Alfine saxifraga angustifolia minima montana. Cold. ephr. 1. p. 292. t. 290. 2. Alfine tenuifolia muscosa. Bauh. pin. 251. Moris. bles. 10. hist. 2. p. 551. f. 5. t. 23. f. 12. Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ, Austriæ. *21.*

TRIGYNIA.

POLYGONUM

* *Atraphaxoides caule frutescente.*

- 1. POLYGONUM caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflexis. Hort. ups. 95. Atraphaxis inermis, foliis planis. Hort. cliff. 138. Roy. lugdb. 209. Lapathum orientale, frutex humilis, flore pulchro. Tournefort. nef. cor. 38. Lapathum dauricum montanum fruticans, ramis late sparsis. Amm. ruth. 227. Habitat in Sibiria, Dauria. *h. 1 ped. 15 junci flos. fol. alt. nat. auct. cap. v. supra 1 ped. v. supra flos v. supra 2 ped. fl. 2. auct. altero loco punctato. admodum. Cal. 5 ped. du. p. 5. fl. 2. admodum. Infund. cur. a. * Bi.*

I. Genu.

frutescens. πη δαλιον. gnu. gnu.

Petalium. ad.

277.

1337

Bistorta ad 277.

1. Gen. ? Bistorta.

X *Colebina ? Murex Am*
Dracunculus Inj. m.
Sagittaria L. Schy
Polypodium Jacq.

* Bistorta spica unica.
2. POLYGONUM caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat. med.* 188.
Bistorta foliis ovato-oblongis acuminatis. Hort. cliff. 150. Hort. ups. 150. Roy. lugdb. 217.
Bistorta major, radice magis intorta. Bauh. pin. 192.
Bistorta. Cam. epit. 683.
Habitat in montibus Helvetiæ, Austriæ, Galliæ. 2

Bistorta

3. POLYGONUM caule simplicissimo monostachyo, foliis lanceolatis.
Bistorta foliis lanceolatis. Fl. lapp. 152. Fl. suec. 321. Hort. cliff. 150.
Bistorta montana minor, radice intorta inodora, flosculis in spicæ cacumine albis sterilibus, inferna spicæ parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis fecunda. Amm. rath. 169.
Bistorta alpina media. Bauh. pin. 192.
Bistorta alpina minor. Bauh. pin. 192.
Habitat in Europæ subalpinis pascuis duris. 2

Chuly. asy

4. POLYGONUM foliis crenatis.
Polygonum folio oblongo crenato. Shaw. afr. 489.
Habitat in Mauritania.

3. Gen. virginianum
Tovara adu
ad. Tovara. Bot. 276.

* *Perficaria pistillo bifido.*
5. POLYGONUM floribus pentandris digynis, corollis quadrifidis, foliis ovatis.
Perficaria floribus pentandris digynis, corolla quadrifida inæquali. Wach. ultr. 258.
Perficaria florum staminibus quinis, stylo duplici, corolla quadrifida inæquali. Hort. cliff. 42. Gron. virg. 43. Roy. lugdb. 216.
Perficaria frutescens maculosa virginiana, flore albo. Moris. hist. 2. p. 589. Raj. hist. 183.
Habitat in Virginia. 2

Perficaria ad. 276.

6. POLYGONUM floribus pentandris semidigynis, staminibus corollæ regulari æqualibus.
Perficaria floribus pentandris digynis, corolla regulari staminibus æquali. Wach. ultr. 257.
Perficaria florum staminibus quinis semidigynis, stylo bifido corollæ regulari æquantibus. Hort. cliff. 42.
Perficaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. Tournef. inst. 510. Raj. suppl. 119.
Perficaria Hydropiper. Lob. ic. 315.
Habitat in Gallia.

4. Gen.

7. PO.