



Hunt Institute for Botanical Documentation  
5th Floor, Hunt Library  
Carnegie Mellon University  
4909 Frew Street  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
Telephone: 412-268-2434  
Email: [huntinst@andrew.cmu.edu](mailto:huntinst@andrew.cmu.edu)  
Web site: [www.huntbotanical.org](http://www.huntbotanical.org)

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

*Usage guidelines*

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

*About the Institute*

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Raja Vicca. Rayph. 37. 28. spec. in Sineci ana et Catalpinae.  
arbor littorea. fol. 2 pin. 5 p. ov. med. s. ovata. fl. p. ovata. termin.  
Liquor rest. plan. 8 loc. 8 p. ov. at.

DECANDRIA MONOGYNIA.

nosissima, flore luteo spicato minimo, siliqua latis-  
ma echinata. Breyn. 16. 58. t. 28. <sup>arb. alta. cortice fuso p. ov. brevis? Kanda.</sup>

Habitat in Zeylona. <sup>fol. 1 pin. pinnatis alt. cum imp. vel ov. is, basi</sup>  
<sup>ter. min. lam. congesta. fl. ov. 5 p. ineq. unguiculatis. quori h. lava et 5 p. ov. ovata.</sup>

3. CAESALPINIA foliolis emarginatis, filamentis lana-  
tis. Fl. zeyl. 158. \* Mat. med, 203. <sup>fol. 2 pin. ov. 2 pin.</sup> Campred  
ad 314

Ligno brasiliano simile. Bauh. pin. 393. <sup>flor. p. ovata. 11. 12. p. ovata. malle</sup>  
Tiam-pangam. Rheed. mal. 6. p. 3. t. 2. <sup>3 p. ov.</sup>

Habitat in Indiis. <sup>Ant. 10 p. ov. p. ovata. r. ovata. in r. ovata. d. ovata. ovata.</sup>  
<sup>ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>

4. CAESALPINIA foliolis emarginatis, leguminibus ful-  
catis ovalibus <sup>mimosa unguis cati. Plum. 200. 2.</sup> Campred  
ad 314

Caesalpina. Amm. herb. 604.  
Senna spuria arborea spinosa, foliis alatis ramosis f. de-  
compositis, flore luteo, siliquis brevibus fulcatis ni-  
gris, sabinæ odore. Sloan. jam. 149. hist. 2. p. 150.  
t. 181. f. 12. Raj. dendr. III.

Colutea veræ crucis vesicaria. Pluk. alm. III. p. 165. t. 3. Bonduc  
ad 314

Habitat in America calidiore. <sup>Bonduc. Carotta. ovata. ovata. ad.</sup>  
<sup>ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>

GUILANDINA.

1. GUILANDINA aculeata, foliolis ovalibus acumina-  
tis. Fl. zeyl. 156. Hort. ups. 101. <sup>Bonduc. Senna. Indica.</sup>

Guilandina caule fructuque aculeatis. Hort. cliff. 158. <sup>Mate. Indica. Senna. Indica.</sup>  
Bonduc vulgare minus polyphyllum. Plum. gen. 25. <sup>ovata. Syl. ovalif.</sup>

Arbor exotica spinosa, foliis lentisei. Bauh. pin. 399. <sup>ovata. Senna. Indica.</sup>  
Caretti. Rheed. mal. 6. p. 35. t. 22. <sup>Klitzji. Plum. 5. 2. 48.</sup>

Habitat in Indiis. <sup>ovata. Senna. Indica.</sup>  
<sup>ovata. Senna. Indica.</sup>

2. GUILANDINA inermis, foliis subbipinnatis: foliolis  
inferioribus ternatis. Fl. zeyl. 155. Mat. med. 202. <sup>Moringa. ovata. 318.</sup>

Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens. Bauh.  
pin. 415. <sup>Moringa. ovata. 318.</sup>

Moringha zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore ma-  
jore, fructu anguloso. Burm. zeyl. 162. t. 75. <sup>Moringa. ovata. 318.</sup>

Morungu. Rheed. mal. 6. p. 19. t. 11. <sup>Moringa. ovata. 318.</sup>  
Habitat in Zeylona. <sup>Moringa. ovata. 318.</sup>

Semina ex Asia tribus membranis longitudinaliter alata  
fuere, ex Africa vero membranibus his caruere. <sup>Balaam myrsinica. Dion.</sup>

3. GUILANDINA inermis, foliis bipinnatis: basi apice-  
que simpliciter pinnatis. Gen. plant. 2. p. 518. <sup>Balaam myrsinica. Dion.</sup>

Habitat in Canada. <sup>Balaam myrsinica. Dion.</sup>  
<sup>Balaam myrsinica. Dion.</sup>

GUAJACUM.

1. GUAJACUM foliolis bijugatis obtusis. <sup>officinale. Gua-</sup>  
guajacum ad

<sup>gondo. Klitzji. Brasilia. Rayph. 57. 49. spec. minima Bonduc</sup>  
<sup>foliolis oppositis ovatis 2 ad m. ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>

<sup>leg. 2 p. ovata. 2 ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>  
<sup>ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>

<sup>ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>  
<sup>ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata. ovata.</sup>

Maggi. frag. 5. Guaiaco virtut. Amity India In Sue 1748  
Indi morbum venereum. Cunctis ejus suffragio sudor movendo

Mucitaiba, fr. maye 188  
-mocitaiba  
Pasante Lij

DECANDRIA MONOGYNIA.

Guajacum foliis pinnatis: foliolis quaternis obtusis. Hort. cliff. 187. Mat. med. 207.

Guajacum flore cæruleo, fructu subrotundo. Plum gen.

Guajacum jamaicense, foliis velut muria conditis spissius virentibus, flore subcæruleo. Pluk. alm. 180. t. 35. f. 4.

Guajacum magna matrice. Bauh. pin. 448.

Pruno vel Evonymo affinis arbor, folio alato buxæo subrotundo. Sloan. jam. 186. hist. 2. p. 133. t. 222. f. 3. 4. 5. 6.

Arbor ligni Sancti vel Guajacum. Seb. thes. 1. p. 86. t. 53. f. 2.

β. Guajacum jamaicense, lentisci subrotundis foliis late virentibus, flore albo. Pluk. alm. 180. c. 35. f. 3. Habitat in Hispaniola, Jamaica. ♪

X sanctum.  
Guajacum ad

2. GUAJACUM foliolis multijugatis obtusis.

Guajacum foliis pinnatis, foliis obverse ovatis integerrimis. Roy. lugdb. 208.

Guajacum flore cæruleo fimbriato, fructu tetragono. Plum. gen. 39.

Guajacum propemodum sine matrice. Bauh. pin. 448.

Jasminum vulgo americanum s. Evonymo affinis occidentalis, alatis rusci foliis, nucifera, cortice ad genicula fungoso. Pluk. alm. 139. t. 94. f. 4. Habitat in Americis insula s. Johannis de Porto Ricco. ♪

afrum.

3. GUAJACUM foliolis multijugatis acutis.

Guilandinoides. Hort. cliff. 489.

Acacia africana, quæ Acaciæ similis, foliis myrti parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloide. Waltb. hort. 2. t. 2.

Afra arbor acaciæ similis, foliis myrti aculeatis splendens. Barb. lugdb. 2. p. 57. Habitat in Æthiopia. ♪

CYNOMETRA

cauliflora.  
Iripa Bauh.

1. CYNOMETRA trunco florifero. Act. ups. 1741. p. 79. Fl. zeyl. 166.

Cynomorium. Rumpf. amb. 1. p. 163. t. 62. Habitat in India. ♪

Iripa ad 506  
ramiflora.  
Iripa h. m.

2. CYNOMETRA ramis floriferis. Act. ups. 1741. p. 79. Fl. zeyl. 167.

Saimbaiba  
Saimbaiba Prop. maye III.  
Caiveira h. m. h. g.

arb. fol. alt. aciju ad durities regnat hupidi.  
fl. umbell. multi pari iandai. maritima flor. (sterilis) et

Eburn. The  
Vah. co  
art. maye  
DECA  
Cynomoriu  
Iripa. Rbee  
Habitat in  
Anacardi  
Mat. me  
Anacardii a  
Pomifera  
Catesb. c  
Acaiou. P  
Cachou. I  
Kapa-mava  
Habitat in  
Dictamn  
Mat. m  
232.  
Dictamnus  
Fraxinella.  
Habitat in  
1. RUTA  
ups. 102  
Ruta sylve  
p. 507.  
Ruta chal  
tibus. A  
Ruta hort  
Ruta hort  
Ruta grav  
Ruta hort  
1. p. 2  
Ruta afric  
Habitat in  
sterilibz  
Flos prim  
Bot. 1  
Confer: R  
epit. 4  
136. a  
Lacu  
furu  
Dyde  
cun  
luru  
nos  
9  
col

401  
1764

Ebany, Thwato, in India...  
Vaher. cordus et...  
arb. magna...  
DECANDRIA MONOGYNIA. 383

Ebany...  
habanum...  
guirapanta...

Cynomorium sylvestre. Rumpf. amb. 1. p. 164. t. 63.  
Iripa. Rheed. mal. 4. p. 65. t. 31.  
Habitat in India. h

acajou ad 344.

ANACARDIUM. In regno diam...  
I. ANACARDIUM. Hort. cliff. 161. Fl. zeyl. 165. occidentalis.

Mat. med. 206. Hort. ups. 102. Roy. lugdb. 463.  
Anacardii alia species. Baub. pin. 512.  
Pomifera f. potius Prunifera indica, nuce reniformi.  
Catesb. car. 3. p. 9. t. 2.  
Acajou. Pis. bras. 58. mant. 193.  
Cafchou. Mer. jurin. 16. t. 16.  
Kapa-mava. Rheed. mal. 3. p. 65.  
Habitat in Indiis. h

acajou. Sij. Ulu  
cajo. Ulu  
cajou. antic. clus.  
anacardium. C. B.  
Kapamava...  
Lak Lak. fentes  
Naur Lak. Venid...  
acailla. Bras. mangr. 95.

DICTAMNUS.  
I. DICTAMNUS. Hort. cliff. 161. Hort. ups. 102.  
Mat. med. 208. Roy. lugdb. 463. Sauv. monsp. 232.

Fraxinella ad 343  
albus.  
Nativ. Ulu  
Fraxinella. candi  
Nativ. Ulu  
Septemium. Belle. clus.

Dictamnus albus vulgo Fraxinella. Baub. pin. 222.  
Fraxinella. Reneal. spec. 122. t. 121.  
Habitat in Germania, Gallia, Italia. 4

RUTA.

I. RUTA foliis decompositis. Hort. cliff. 145. Hort. ups. 102. Mat. med. 209. Roy. lugdb. 461.  
Ruta sylvestris major. Baub. pin. 336. Moris. hist. 2. p. 507. f. 5. t. 14. f. 3.

Ruta ad 343  
graveolens.  
Ruta. Montf. Ray. phos.  
Ruta. Dica  
Ruta. gree  
Ruta. Dabul  
Wein ruten. Cassid.

β. Ruta chalepensis tenuifolia, florum petalis villis scatentibus. Moris. hist. 2. p. 509.  
Ruta hortensis altera. Baub. pin. 336. Raj. hist. 874.  
γ. Ruta hortensis latifolia. Baub. pin. 336.  
Ruta graveolens hortensis. Dod. pempt. 119.  
δ. Ruta hortensis latifolia arbusculæ similis. Bærb. lugdb. t. p. 260.

Ruta africana maxima. Schwer. hort. 24.  
Habitat in Europæ australis, Alexandriæ, Mauritanie sterilibus. h  
Flos primarius quinquesidus, reliqui quadrifidi. Phil. Bot. 178.

Confer: Ruta sylvestris minor. Baub. pin. 336. Cam. montana. epit. 495. Ruta montana legitima. Clus. hist. 2. p. 136. app. alt. fig. structura eadem, facie distincta.

Loca officinarum. B. Pin. 499. Engargia...  
Lacca offic. ad 345  
Cajalacca...  
Croc...  
Chevon...  
Beru Indiae arbor  
Roy. p. 466.

*patavina.*  
*Ruta ad. 343*

2. RUTA foliis ternatis sessilibus.  
PseudoRuta patavina trifolia, floribus luteis umbellatis.  
*Mich. gen. 22. t. 19.*  
*Habitat prope Patavium.*

*trifolia.*  
*Ruta ad. 343*

3. RUTA foliis simplicibus indivisis.  
Ruta foliis simplicibus solitariis. *Hort. cliff. 146.*  
Ruta sylvestris linifolia hispanica. *Bocc. mus. 2. p. 82. t. 73. Barr. ic. 1186.*

β. Ruta montana, foliis integris subrotundis. *Buxb. cent. 2. p. 30. t. 28. f. 2.*

γ. Ruta orientalis, linariæ folio, flore parvo. *Tournef. cor. 19. Buxb. cent. 2. p. 30. t. 28. f. 1.*

*Habitat in Hispania; β. in Rodastro; γ. in Media.*

*Cassia ad 317*

*Callidam perit.* TOLUIFERA.

*Balsamum.* 1. TOLUIFERA. *Mat. med. 201.*

*Balsam. Tor. Dion. 465. Balsamum Tolutanum, foliis ceratiæ similibus. Baub. pin. 401.*

*Cassia. ind. oim.* *Habitat in America prope Carthagenam. t.*

*hematoxylinum ad. 318.*

HÆMATOXYLUM

• *Campechia-* 1. HÆMATOXYLUM. *Hort. cliff. 160. Roy. lugdb. 465. Lignum campechianum, species quædam. Sloan. jam. 213. hist. 2. p. 183. t. 10 f 1. 2. 3. 4. Catesb. car. 3. p. 66. t. 66.*

*Lignum campechianum, species quædam. Sloan. jam. 213. hist. 2. p. 183. t. 10 f 1. 2. 3. 4. Catesb. car. 3. p. 66. t. 66.*

*Habitat in Campeche Americæ, t. ad 5 p. 2. Baub. pin. 401.*

*Gonji. Mann ad 318.*

ADENANTHERA.

*pavonina.* 1. ADENANTHERA foliis decompositis. *Roy. lugdb. 462. Vir. cliff. 36. Fl. zeyl. 160. \**

*fl. dupl. pinn. impari. 20000.* Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis alternis. *Hort. cliff. 158. arbor mandina. 20000.*

*fl. pinn. impari. 20000.* Mandiadi. *Rheed. mal. 6. p. 25. t. 14.*

*mandiadi. H. M.* *Habitat in India. t. ad 5 p. 2. Baub. pin. 401.*

*azedarach ad. 342.*

MELIA.

1. MELIA foliis bipinnatis. *Fl. zeyl. 162.*

*azedarach. 20000.* Melia foliis decompositis. *Hort. cliff. 161. Roy. lugdb. 462.*

*azedarach. Dod. pempt. 848.*

*azedarach. Dod. pempt. 848.* Arbor fraxini folio, flore cæruleo. *Baub. pin. 415.*

*azedarach. Dod. pempt. 848.* Pseudo-Sycomorus. *Cam. epit. 181. t. 5 p. 2. Baub. pin. 415.*

*azedarach. Dod. pempt. 848.* *Habitat in India. t. ad 5 p. 2. Baub. pin. 401.*

*Melia gu...*  
DEC  
Azedarach  
Azadirachta  
bo subcæ  
p. 147. t.  
Habitat in  
MELIA fo  
Roy. lugdb  
Olea malaba  
f. 1.  
Azedarach f  
Azadirachta  
Arbor indic  
416.  
Aria Bepou.  
Habitat in I  
ZYGOPH  
Hort. up  
Zygophyllu  
lugdb. 46  
Capparis po  
Capparis Fa  
Habitat in  
Folia ovata  
zygophyllu  
ZYGOPH  
membran  
Fabago tri  
membran  
f. 2.  
Fabago cap  
116. f. 1  
Planta afr  
syrorum  
t. 429.  
Habitat in  
Folia obve  
ZYGOPH  
Zygophyl  
lugdb. 4  
Fabago c  
116. f.  
fl. 4. ann  
ad dracem  
munitur  
fl. 4. ann  
p. 116.





Medicago. Meun. 2. 201. 1. prout et Linn. arb. fol. 1. pinn. 2. ad. g. in pinn.  
Hinn. 2. pro. 2. pinn. 2. ad. g. in pinn. 2. ad. g. in pinn. 2. ad. g. in pinn.  
Pl. penicill. tenuis. papilionis. Legumin. falcata. siccit. pinn. 2. ad. g. in pinn.  
anagallis. 2. ad. g. in pinn. 2. ad. g. in pinn. 2. ad. g. in pinn. 2. ad. g. in pinn.

medicago stuebel  
ouapa ad 201.  
522.

DECANDRIA ~~TETRAGYNIA~~ 387

Tribulus terrestris major, flore maximo odorato. Sloan.  
jam. 90. hist. 1. p. 209. t. 132. f. 1. Raj. suppl. 650.  
Habitat in Jamaicae aridis. ☉

2. TRIBULUS foliolis quinquejugatis subæqualibus. lanuginosus.  
Tribulus foliolis quinque parium. Fl. zeyl. 168. \* Tribulus ad  
Tribulus terrestris zeylanicus, cauliculis villosis, fructu  
acuminato. Burm. zeyl. 226. t. 106. f. 1.  
Habitat in Zeylona. ☉

3. TRIBULUS foliolis sexjugatis subæqualibus. Hort. terrestris.  
cliff. 160. Hort. ups. 103. Roy. lugdb. 460. Sauv. Dardan. cely  
monsp. 227. hasek. Turcar.  
Tribulus terrestris, ciceris folio, fructu aculeato. Bank. Tribulus ad  
pin. 250. Tribulus ad  
Tribulus terrestris. Lob. ic. 2. p. 84. Tribulus ad  
Tribulus terrestris minor incanus hispanicus. Barr. rar. Tribulus ad  
54. t. 558. Tribulus ad  
Habitat in Europa australi ad semitas. ☉

4. TRIBULUS foliolis octojugatis subæqualibus. Cistoides.  
Tribulus foliis octo parium pinnatis. Roy. lugdb. 460. Tribulus ad  
Tribulus terrestris major curassavicus. Herm. par. 236. Tribulus ad  
t. 236. Tribulus ad  
Tribulus terrestris americanus, argemones flore flavo.  
Pluk. alm. 374. t. 64. Raj. suppl. 649.  
Habitat in America calidiora. ☉

MONOTROPA

orobanchoides ad

1. MONOTROPA floribus lateralibus octandris; termi- Hypopithys. • 443.  
nali decandro. Fl. suec. 329. Phil. bot. §. 178.  
Orobanche quæ Hypopithys dici potest. Bank. pin. 88.  
prodr. 31.  
Orobanche Hypopithys lutea. Mentz. pug. 3. f. 5.  
Orobanche flore brevior duplici, verbasculi odore.  
Moris. hist. 3. p. 504. f. 12. t. 16. f. 20.  
Orobanche verbasculi odore. Plot. oxf. 146. t. 9. f. 6.  
Pluk. alm. 273. t. 209. f. 5.  
Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Angliæ, Canadæ  
sylvis. Parasitica radicam.

2. MONOTROPA caule unifloro decandro. uniflora.  
Monotropa flore nutante. Gron. virg. 41.  
Orobanche monanthos virginiana, flore majore penta-  
petalo. Moris. hist. 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 5.  
mal.





Cubebis affinis Sagara major. D. Pin. 412.

Fagara. avic. clus  
Fagara. Impen.

DECANDRIA MONOGYNIA.

389) *Jussub. amazon. clus.*  
*? Fagara. ad 364*

Lentiscus africana. *Seb. thes. 2. p. 7. t. 5. f. 5.*  
Molle. *Clus. monard. 322. t. 322.*  
*Habitat in Peru. b*

3. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo æquali, foliolis in-  
tegerrimis æqualibus. *Fl. peruv. ad 4. p. 15 ad 17/16817*  
*compari minoru. flor. ovium an. 11.*  
Molle foliis non ferratis. *Few. peruv. 3. p. 43. t. 30.*  
Arœira. *Pis. bras. 132. 64. Resinam fida frigiditatem ducit*  
*lentiori, contra frigiditatem affectiva*  
*Habitat in Brasilia, Peru. b. exhalat unguem. in Brasilia certe fit vinum*  
*Præparat. sanguinis colat. unguis oleum chymicatum. flos ad ad quatuor. idem v. dicitur ad 2. unguis.*

*I. genus*  
*Arcæira, arœira. Molle.*  
*molle. ad 341.*

4. SCHINUS foliis pinnatis: foliolis oblongis, petiolo mar-  
ginato articulato inermi. *Mat. med. 533.*  
Lauro affinis, jasmini folio alato, costa media membra-  
nulis utrinque extantibus alata, ligno duritie ferro  
vix cedens. *Sloan. jam. 137. hist. 2. p. 25. t. 162.*  
*f. I. Raj. dendr. 86. no condimentis ciborum aromaticis loco pipere*  
*Habitat in Jamaica campestribus. b. 12 ped. teretibus lign. hinc undulato*  
*Confer Seo I. Sanjo. Kämpf. amben. 892. dentat. per nitid.*  
*capitulum h. h. v. vid. lutea. calice cor. 7 ad 8 fol. et l. 11. hinc. caps. glab. quandoque*  
*capitulum 1 ad 2. 2 ad 4. 4 ad 8. 8 ad 12. 12 ad 16. 16 ad 20. 20 ad 24. 24 ad 28. 28 ad 32. 32 ad 36. 36 ad 40. 40 ad 44. 44 ad 48. 48 ad 52. 52 ad 56. 56 ad 60. 60 ad 64. 64 ad 68. 68 ad 72. 72 ad 76. 76 ad 80. 80 ad 84. 84 ad 88. 88 ad 92. 92 ad 96. 96 ad 100.*

*Fagara. Lin. 2. Genus.*  
*avic. Suhm. 1. 2.*  
*Seo Kämpf. 892. 97.*  
*Sanjo 57. Seo. 2. 97.*  
*Padri Karmi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

5. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo marginato articulato  
subtus aculeato.  
Schinoides petiolis subtus aculeatis. *Hort. cliff. 489. \**  
Rhoi obsoniorum similis leptophyllos tragodes ameri-  
cana spinosa, rachi medio appendicibus aucto. *Pluk.*  
*alm 319. t. 107. f. 4. ?*  
*Habitat in America. b*

*tragodes. 3. Gen.*  
*Pterota. Mon.*  
*Pterota. ad 342.*

6. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo marginato articula-  
to, spinis axillaribus solitariis. *Fl. zeyl. 175. \**  
Malus Limonia india, fructu pusillo. *Raj. hist. 1658.*  
Tferou katou Naregam. *Rheed. mal. 4. p. - - - t. 12.*  
*Habitat in India utraque. b*

*Limonia. 4. Gen.*  
*Naringi. Mon.*  
*ad 345.*  
*Limonia. Mon. 296.*

BARTRAMIA. *in quibus triumfetta p. 444.*

1. BARTRAMIA. *Fl. zeyl. 174.*  
Triumfetta XIII. *Amm. herb. 370.*  
Lappula benghalensis tetraspermos, ribesii folio, echinis  
orbicularibus ad foliorum ortum plurimis simul ses-  
silibus. *Pluk. alm. 206. t. 41. f. 5.*  
Agrimonia maderaspatana, folio rotundo singulari sub-  
tus incano. *Pet. gaz. 31. t. 42. f. 10.*  
*Habitat in India. b*

*Triumfetta ad*  
*Lyn. 327*  
*indica. \**  
*Bartramia*

MELASTOMA.

1. MELASTOMA foliis denticulatis ovatis acutis.  
Melastoma foliis ovato-lanceolatis crenatis nervis quin-  
que

*melastoma ad*  
*85*  
*Acinoden-*  
*dron.*

*aringa per. Mar. p. 116.*  
*gruine de makax.*  
*fall. Kairea. Bavan*  
*Melastomax. 85.*  
390 DECANDRIA MONOGYNIA.

que longitudinalibus: extimis obsoletioribus. Hort. cliff. 162.

Acinodendrum americanum pentaneuron, foliis crassis hirsutis ad ambitum rarioribus ferris. Pluk. mant. 4. t. 159. f. 1.

Grossularia americana, plantaginis folio amplissimo. Plum. spec. 18.

Grossularia fructu non spinosa, malabathri foliis longa & rufa lanugine hirsutis, fructu maiore caeruleo. Sloan. an. jam. 165. hist. 2. p. 85. t. 197. f. 2.  
Habitat in America calidiore

2. MELASTOMA foliis denticulatis ovatis acuminatis; nervis interioribus ante basin coadunatis.

Grossularia alia plantaginis folio, fructu rariore violaceo. Plum. hist. mss.

Arbor americana, latiori & acuminato folio trinervio, utrinque glabro & margine leviter crenato. Pluk. alm. 40. t. 249. f. 4.  
Habitat in Surinamo. D. Bartsch.

3. MELASTOMA foliis denticulatis lanceolatis quinque-nervibus, caule hispido.

Grossularia plantaginis folio angustiore hirsuto. Plum. spec. 18.

Arbuscula jamaicensis quinquenervis, minutissime dentatis foliis & caule pubescentibus. Pluk. alm. 40. t. 264. f. 1.  
Habitat in America meridionali.

4. MELASTOMA foliis integerrimis ovato-lanceolatis subtus sericeis; nervis ante basin coadunatis. Hort. cliff. 162.

Acinodendrum americanum, ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano, maximo utrinque glabro. Pluk. mant. 4. t. 250. f. 2.

Arbor racemosa brasiliiana, folio malabathri. Breyer. cent. 3. t. 2. 4.  
Muiva. Marcgr. bras. 117.  
Habitat in Brasilia, Jamaica, Surinamo.

5. MELASTOMA foliis lanceolato-ovatis quinquenervibus scabris. Fl. zeyl. 171.

Melastoma quinquenervia hirta major, capitulis sericeis villosis. Burm. zeyl. 155. t. 73.  
Kadali. Rheed. mal. 4. p. 87. t. 42.  
Habitat in India.

*Uicora Kadali. h. m. 42. 44.*  
*f. ovata: min. fol. myrti Brev. d. cordata.*  
*f. ovata, corymbosior minima.*

6. ME-

DE  
6. MELAST  
bris. Fl.  
Katou-Kada  
1493.  
Habitat in  
7. MELAST  
ne hisp  
Habitat in  
1. KALMIA  
nov. 107  
Andromed  
infundib  
160.  
ChamaeDa  
2. p. 98.  
Cistus Cha  
bus exp  
Pluk. al  
Habitat in  
KALMI  
Gen. n  
Azalea fo  
bris, co  
ChamaeD  
folioru  
17. f.  
Cistus ser  
tis. Pl  
Anonym  
Habitat  
1. LEDU  
Ledum  
bofis.  
Cistus  
467.  
Rosmar  
Habitat  
sis. t

Caaghiyayo. Hist. anagy. 59. 2. sp. ... } Caaghiyayo. Proy  
3. n. n. fl. comp. ... } Melastoma ad 85

DECANDRIA MONOGYNIA. 391

6. MELASTOMA foliis lanceolatis <sup>5 nuda</sup> trinerviis sca-aspera.  
bris. Fl. zeyl. 172. <sup>Caulis fructu. Alai. Lipp.</sup>  
Katou-Kadali. Rheed. mal. 4. p. 91, t. 43. Raj. hist.  
1493.  
Habitat in India. ♪

7. MELASTOMA foliis ovatis trinerviis glabris margi- octandra.  
ne hispidis. Fl. zeyl. 173. \*  
Habitat in India. ♪

KALMIA.

Rhododendron 2164

1. KALMIA foliis ovatis, corymbis terminalibus. Gen. latifolia.  
nov. 1079. \*

Andromeda foliis ovatis obtusis, corollis corymbosis  
infundibuliformibus, genitalibus declinatis. Gron. virg.  
160.

ChamæDaphne foliis tini, floribus bullatis. Catesb. car.  
2. p. 98. t. 98.

Cistus ChamæRhododendros mariana laurifolia, flori-  
bus expansis summo ramulo in umbellam plurimis.  
Pluk. alm. 49. t. 379- f. 6.

Habitat in Marilandia, Virginia, Pensylvania. ♪

2. KALMIA foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. angustifolia. ♪ Sen.  
Gen. nov. 1079. \*

Azalea foliis lanceolatis integerrimis non nervosis gla-  
bris, corymbis terminalibus. Gron. virg. 21.

ChamæDaphne sempervirens, foliis oblongis angustis,  
foliorum fasciculis oppositis. Catesb. car. 3. p. 17. t.  
17. f. 1.

Cistus sempervirens laurifolia, floribus eleganter bulla-  
tis. Pluk. alm. 106. t. 161. f. 3.

Anonyma. Cold. noveb. 100.

Habitat in Pensylvania, Nova Cæsarea, Noveboraco. ♪

LEDUM. <sup>ut nomen Cisti. in 155.</sup>

Dulia 2165  
palustre. +

1. LEDUM. Fl. lapp. 160.

Ledum foliis linearibus subtus hirsutis, floribus corym-  
bosis. Fl. succ. 341. Mat. med. 210.

Cistus Ledon foliis rosmarini ferrugineis. Baub. pin.  
467.

Rosmarinum sylvestre. <sup>matt. 789. p. 454.</sup> Cand. epit. 546. <sup>Ledum. S. micheli pag. 225.</sup>

Habitat in Europæ septentrionalis paludibus uligino-  
sis. ♪

*Rhododendron ad 164.*

RHODODENDRON.

*fl. fr.* • ferrugineum 1. RHODODENDRON foliis glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus.

*Evonymus, theophrasti Dalech.*

Azalæa maculis ferrugineis subtus adpersa, floribus decandris. Lemonier. Sauv. monsp. 57.

Ledum foliis glabris, flore tubuloso. Hall. helv. 417.

Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus. Baub. pin. 468. Raj. hist. 1005.

Evonymus theophrasti. Dalech. hist. 27.

Montana allobrogum lentiscifolia. Lob. ic. 366.

Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis, Pyrenæis. *Moors utaq. latere revoluta venter plano comit. plurim. in quibus*

*fl. fr.* • dauricum. 2. *Rhododendron, ad*

RHODODENDRON foliis glabris utrinque nudis, corollis rotatis.

Chamærhododendros folio glabro majusculo, amplo flore roseo. Amm. ruth. 181. t. 27.

Habitat in Dauria. *Rami cili. rubent. pubes.*

*Rhododendron.*  
• hirsutum. 3.

RHODODENDRON foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus.

Ledum foliis glabris ciliatis ovatis, flore tubuloso. Hall. helv. 418.

Ledum alpinum hirsutum. Baub. pin. 468. Raj. hist. 1005.

Ledum alpinum. Clus. hist. 1. p. 82.

Balsamum alpinum. Lob. ic. 468.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Styriacis, *end. huyet. in cordia carniola*

*Julia ad 165.*  
Chamæcistus 4.

RHODODENDRON foliis ciliatis, corollis rotatis

Ledum foliis serpylli ad margines cili instar pilosis, flore purpureo. Mich. gen. 225. t. 106.

Chamæcistus hirsuta. Baub. pin. 466.

Chamæcistus VIII. Clus. hist. 1. p. 76.

Cistus pumilus montis baldi. Baub. hist. 2. p. 19. Raj. hist. 1005.

Cistus Chamærhododendros foliis confertis ferrea rubigine nitentibus margine pilosis. Pluk. alm. 106. t. 23. f. 4.

Habitat in Baldo & prope Salisburgum. *huyet. in cordia carniola*

*fl. val 2 terminus caul*  
*fl. alt. lull. ant. p. am. d. m.*  
*cal. 5 pd. p. m. d. d.*  
*an. 1 pt. valata 5 pd.*  
*st. 10. cor. lute. int.*  
*stigma 2. cyl. h. u.*  
*cap. 5. low. ap. de. h. d.*  
*st. h.*  
*stigma 2. h. u. centrale*  
*5 g. u. u. u. u. u. u. u. u.*

*maximum.* 5.

RHODODENDRON foliis nitidis ovalibus margine acuto reflexo.

Ledum laurocerasi folio. Amœn. acad. 2. p. 200.

Chamærhododendros, lauri folio, sempervirens, floribus bullatis corymbosis. Catesb. car. 3. p. 17. t. 17. f. 2.

Habitat in Virginia. Collinson. *Rami*

Rami & Fol  
rocerasi di  
flexa.

1. ANDROM  
rollis cam  
revolutis.

Andromeda  
suec. 338.

Andromeda  
lis florens  
Habitat in

2. ANDROM  
corollis c  
Andromed  
t. 1. f. 3

Habitat in

3. ANDRO  
tis, foliis  
Andromed  
165. t.

Erica folio  
t. 53.

Habitat in

4. ANDRO  
lindricis  
Androme  
lis pent  
Arbuscula  
virentib  
spicatin  
448.

Habitat i

5. ANDR  
tis, fol  
Androm  
Fl. la  
163.

Polifolia  
Erica hu  
cistio  
Habitat

Habitat

Rami & Folia magnitudine & consistentia *Padi Lapa-  
rocerasi dicti, venis reticulatis inscripta, marginere-  
flexa.*

ANDROMEDA:

*Rhododendron*  
*tetragona.*

1. ANDROMEDA pedunculis solitariis lateralibus, co-  
rollis campanulatis, foliis oppositis imbricatis obtusis  
revolutis.  
Andromeda foliis quadrifariam imbricatis obtusis. *Fl.*  
*suec.* 338.  
Andromeda, foliis quadrifariam imbricatis obtusis, ex a-  
lis florens. *Fl. lapp.* 166. t. 1. f. 4. *Hort. cliff.* 163.  
*Habitat in Alpibus Lapponicis.* ♀
2. ANDROMEDA pedunculis solitariis terminalibus, *hypnoides.*  
corollis campanulatis, foliis confertis subulatis.  
Andromeda foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165.  
t. 1. f. 3. *Fl. suec.* 337.  
*Habitat in Alpibus Lapponicis.* ♀
3. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ova-  
tis, foliis sparsis linearibus obtusis planis. *cærulea.*  
Andromeda foliis linearibus obtusis sparsis. *Fl. lapp.*  
165. t. 1. f. 5. *Fl. suec.* 336. *Hort. cliff.* 163.  
*Erica folio abietis, flore arbuti.* *Buxb. cent.* 4. p. 26.  
t. 53.  
*Habitat in Lapponia Alpibus.* ♀
4. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis cy-  
lindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *mariana.*  
Andromeda foliis ovatis, pedunculis fasciculatis, capsu-  
lis pentagonis apice dehiscentibus. *Gron. virg.* 49.  
*Arbuscula mariana, brevioribus evonymi foliis pallide*  
*virentibus, floribus arbutis ex eodem nodo plurimis,*  
*spicatum uno versu erumpentibus.* *Pluk. mant.* 25. t.  
448.  
*Habitat in Virginia.* ♀
5. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ova-  
tis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Polifolia.*  
Andromeda foliis alternis lanceolatis margine reflexis.  
*Fl. lapp.* 163. t. 1. f. 3. *Fl. suec.* 335. *Hort. cliff.*  
163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 416.  
*Polifolia.* *Buxb. act.* 2. p. 345. *cent.* 5. p. 28. t. 49. f. 1.  
*Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore, capsula*  
*cistocide.* *Pluk. alm.* 136. t. 175. f. 3.  
*Habitat in Europæ frigidioris paludibus turfosis.* ♀

*Rhododendron*

*in idea in Camb. B. p. Royal*

6. AN-

- paniculata.* 6. ANDROMEDA racemis secundis nudis paniculatis, corollis subcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis.  
 Andromeda foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 162. *Gron. virg.* 48.  
 Frutex foliis serratis, floribus longioribus spicatis subviridibus, spica pentagona. *Catesb. car.* 2. p. 43. t. 43.  
 Vitis idæa americana, longiori mucronato & crenato folio, floribus urceolatis racemosis. *Pluk. alm.* 391.  
*Habitat in Virginia.*
- racemosa.* 7. ANDROMEDA racemis secundis bracteatis, corollis gibbo-cylindricis, foliis alternis oblongis serratis.  
*Habitat in Pennsylvania. Kalm.*  
*Hæc differt a priori 1. Racemis minus paniculatis. 2. Bractea sub singula flore lineari-lanceolata, stricta, flore longiore, viridi, decidua; in præcedenti nulla bractea. 3. Capsulis retinentibus stylum, quem antecedens dimittit. 4. Foliis magis serratis.*
- arborea.* 8. ANDROMEDA racemis secundis nudis, corollis rotundo-ovatis.  
 Andromeda arborea, foliis oblongo-ovatis integerrimis, floribus paniculatis nutantibus, racemis simplicissimis. *Gron. virg.* 48.  
 Frutex foliis oblongis acuminatis, floribus spicatis uno versu dispositis. *Catesb. car.* 1. p. 71. t. 71.  
*Habitat in Virginia, Carolina. h*
- calyculata.* 9. ANDROMEDA racemis secundis foliaceis, corollis subcylindricis, floribus alternis lanceolatis obtusis punctatis.  
 Cistus Ledon s. Andromeda, floribus monopetalis parvis albis tubulosis spicatum in summis ramulis dispositis, foliis & facie vitis idææ, capsula minima sicca quinquepartita. *Gron. virg.* 21. ?  
 ChamæDaphne. *Buxb. act.* 1. p. 241. t. 8. f. 1.  
*Habitat in Virginia, Canada, Sibiria h*  
 Frutex foliis ovali-lanceolatis, coriaceis, myricæ consistentia, obtusis, margine recurvis, adpersis punctis vix conspicuis, callosis, ab utraque parte. Racemi ex ramis propriis, foliolis ovalibus alternis, in quorum ala Flos solitarius, pedicellatus. Calyx a basi tegitur duobus foliolis ovatis. Flores ad unum latus nutant. Stamina 10, antheris oblongis.





*In nomen graecum Alvi.* CLETHRA,

- alnifolia.* 1. CLETHRA. *Gron. virg.* 47.  
*Euclia* *adans. famil.* *alnifolia americana ferrata, floribus pentapetalis albis*  
*Tunia* *187.* *ad. Linn.* *in spicam dispositis. Pluk. alm. 18. t. 115. f. 1. Catesb.*  
*car. 1. p. 66. t. 66.*  
*Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania. 5*

PYROLA. *ad 165*

- rotundifolia.* 1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Fl. suec.* 330. *Mat. med.* 212. *Amoen. acad.* 1. p. 156.  
*Pyrola. Minif. melle*  
*Linnaeus Arag. p. 174*  
 Pyrola staminibus & pistillis declinatis. *Fl. lapp.* 169.  
 Pyrola foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 440.  
 Pyrola foliis subrotundis, scapo racemoso. *Hort. cliff.* 162.  
 Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191.  
 Pyrola noveboracensis. *Cold. noveb.* 99.  
*Habitat in Europa septentrionaliore, Virginia, Brasilia. 2* *vis attingens vulneraria.*
- minor.* 2. PYROLA floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *It. gotl.* 206. *Fl. suec.* 331.  
 Pyrola foliis subrotundis, scapo undique racemoso, genitalibus rectis. *Act. stockh.* 1741. p. 192.  
 Pyrola foliis obiter ferratis subrotundis racemosis, floribus tuba recta. *Hall. helv.* 420. *1009*  
 Pyrola minor. *Riv. pent.* 149. *Raj. angl.* 3. p. 363.  
*Habitat in Europa frigidior.* 2
- secunda.* 3. PYROLA racemo unilaterali. *Fl. suec.* 332.  
*flor. pedati albis corvini uno vertice dispositis. Ray 1. p. 174. f. 1. Catesb. 1. p. 66. t. 66.*  
 Pyrola floribus uno vertice dispersis. *Fl. lapp.* 168.  
 Pyrola folio mucronato ferrato. *Baub. pin.* 181.  
 Pyrola 2 tenerior. *Clus. pan.* 506.  
*Habitat in Europæ borealis sylvis. 5* *vis 1. p. 174. f. 1. Catesb. 1. p. 66. t. 66.*  
*15. fl. pedati albis corvini uno vertice dispositis. Ray 1. p. 174. f. 1. Catesb. 1. p. 66. t. 66.*
- umbellata.* 4. PYROLA pedunculis subumbellatis. *Fl. suec.* 333.  
 Pyrola frutescens, arbuti flore. *Baub. pin.* 191.  
 Pyrola 3 fruticans. *Clus. pan.* 507.  
*Habitat in Euroqæ, Asiæ & Americæ septentrionalis sylvis. 5*
- maculata.* 5. PYROLA pedunculis bifloris.  
 Pyrola petiolis apice bifloris vel trifloris. *Gron. virg.* 48.  
 Pyrola marilandica minor, folio mucronato arbuti. *Pet. mus.* 675.

Pyro-

Pyrola mar  
medium  
nem disc  
Habitat in

6. PYROLA  
Hall. he  
Pyrola rot  
Singulari f  
t. 10. f.  
Habitat in

1. ROYEN  
Roy. lug  
Staphyloc  
dentibu  
Staphyloc  
Herm.  
Pistacia a  
Habitat a

2. ROYEN  
Royena  
Vitis ida  
Comm  
Vitis ida  
bus. I  
Habitat

3. ROYEN  
Arbutus  
cliff.  
Staphyl  
ni lat  
Habitat  
fl. alt. ex  
incun.

1. HYD  
Habitat  
Frutex  
flori  
fl. sp  
fl. a

Pyrola mariana, arbuti foliis angustioribus, trifoliata ad medium nervium linea alba utrinque per longitudinem discurrente. *Pluk. mant. 157. t. 349. f. 4.*  
*Habitat in Americæ septentrionalis sylvis. †*

*Pyrola. ad. 165*

6. PYROLA scapo unifloro. *Fl. lapp. 167. Fl. suec. 334. uniflora.* • *! Scopoli.*  
*Hall. helv. 420.*

Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin. 191.*  
 Singularem flore ampliore. *Moris. hist. 3. p. 505. f. 12.*  
*t. 10. f. 2. Haller 1011*  
*Habitat in Europæ borealis sylvis. †. Camerl. D. Niebuhr.*

DIGYNIA.

ROYENA.

1. ROYENA foliis ovatis scabriusculis. *Hort. cliff. 149. lucida.* •  
*Roy. lugdb. 411.*

*Royena. ad 165.*

Staphylodendron africanum sempervirens, foliis splendentibus. *I. p. 187. t. 96.*

Staphylodendrum africanum, folio singulari lucido.  
*Herm. parad. 232. t. 232.*

Pistacia africana. *Pluk. alm. 298. t. 63. f. 4. t. 317. f. 5.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

2. ROYENA foliis lanceolatis glabris. *Roy. prodr. 441. glabra.* • X  
*Royena. ad*

Royena foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 149.*  
 Vitis idæa æthiopica, buxi minoris folio, floribus albis.  
*Comm. hort. 1. p. 125. t. 65.*

Vitis idæa æthiopica, myrti foliis, flosculis dependentibus. *Pluk. alm. 391. t. 321. f. 4.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

3. ROYENA foliis lanceolatis hirsutis. *Roy. lugdb. 441. hirsuta.* •  
 Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirsutis. *Hort. cliff. 163.* *Royena. ad 165*

Staphylodendrum africanum, folio lanuginoso rosmarini latiore. *Boerb. lugdb. 2. p. 235.*

*Habitat ad Cap. b. Spei. †*

HYDRANGEA.

*Hydrangea. ad 244*  
*arborescens. •*

1. HYDRANGEA. *Gron. virg. 50. †*

*Habitat in Virginia. †*  
 Frutex ex ordine Arbustivarum XIX, foliis oppositis, floribus in cymam digestis.

*fl. epicypis novario inud.*  
*fl. aut. engleri concava sic comit.*

CHRY-



*Sedum alpinum hirsutum lutescens flore*

} *Saxifraga* C.B. mont.

DECANDRIA DIGYNIA.

399

Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. *Bauh. pin.* 285.

*onoblitum hippur*  
*Salvia Rab*

β. Cotyledon minor, foliis subrotundis ferratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133.

γ. Saxifraga, sedi folio, flore albo, multiflora. *Tournef. inst.* 252. *Sed*

*Sedum ferratum*, flore albo, multiflorum. *Dod. pempt.* 113.

δ. Saxifraga, sedi folio, pyrenaica ferrata. *Tournef. inst.* 252.

*Pyrenaeid alba*

3. Cotyledon pyramidale, lato crenato & retuso folio, polyanthos. *Bocc. mus.* 2. p. 109. t. 86.

*Saxifraga sedi folio angustiore ferrato.* *Segu. ver.* 448. t. 9. f. 1.

*Habitat in Alpibus Europæ.* 2

2. SAXIFRAGA foliis lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, floribus subcapitatis. *penisylvanica*

*Saxifraga ad 243*

*Saxifraga foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, caule subnudo piloso ramoso, floribus confertis capitatis.*

*Gron. virg.* 49.

*Saxifraga noveboracensis.* *Cold. noveb.* 105.

*Saxifraga pensylvanica, floribus muscosis racemosis.* *Dill. elth.* 337. t. 253. f. 328.

*Sanicula virginiana alba, folio oblongo mucronato.*

*Pluk. alm.* 331. t. 59. f. 1. & t. 222. f. 5.

*Habitat in Virginia, Pennsylvania, Canada.*

3. SAXIFRAGA foliis lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifloro. *androsacea*

*Saxifraga ad*

*Saxifraga caule paucifloro, foliis subhirsutis lingulatis & tridentatis.* *Hall. helv.* 405.

*Sedum alpinum tertium.* *Col. ecphr.* 2. p. 66. t. 67. f. ult.

*Saxifraga alpina, habitu androsacea, villosa.* *Hall. norib.* 1736. t. 1. f. 3.

*Habitat in Sibiria, Helvetia.* *hall. 984*

4. SAXIFRAGA foliis linearibus subtus punctatis aggregatis recurvatis, caule nudo multifloro. *caesia*

*Saxifraga rosulis densissimis, foliis crassis glaucis repandis subtus sulcatis.* *Hall. helv.* 402.

*Saxifraga alpina minima, foliis caëlis deorsum incurvis.* *Tournef. inst.* 253. *Segu. veron.* 449. t. 9. f. 2.

*Sedum alpinum album, foliis compactis.* *Bauh. pin.* 284. *Moris. hist.* 3. f. 12. t. 7. f. 32.

*Sedum alpinum minimam, foliis cinereis, flore candido.* *Scheuch. alp.* 341. 141. t. 21. f. 1.

*Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis; Pyrenacis, Baldo.* *hall. 982.*

Fo-

Folia duplici ordine punctorum callosorum notata evadunt albida.

*burseriana.* 5. SAXIFRAGA foliis aggregatis imbricatis subulatis laevibus, caule subnudo unifloro. Sedum alpinum, saxifragæ albæ flore. *Baub. pin. 284. Burs. XVI: 6.*

*Habitat in Tauro, Rastadiensi, & Facies Sedi minoris. Folia juniperina, dense imbricata, acuta, carinata, glabra. Caulis vix digitalis, rufescente hispida s. glutinosus, foliolis 3. s. 4. alternis, linearibus. Flos magnitudine Saxifragæ granulata: venis incarnatis.*

*bryoides.* 6. SAXIFRAGA foliis ciliatis reflexis, caule nudiusculo unifloro. Saxifraga foliis densissimis, foliolis ciliatis, caule unifloro. *Hall. helv. 403.*

Saxifraga pyrenaica minima lutea musco similis. *Tournef. inst. 253.*

Sedum muscosum. *Baub. hist. 3. p. 695. Seheuch. alp. 142. t. 21. f. 2.*

Sedum ejusdem alpinum quartum. *Col. ecphr. 2. p. 66. t. 67. f. 1. 2. Hall. 969.*

*Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis.*

*bronchialis.* 7. SAXIFRAGA foliis imbricatis subulatis ciliatis spinosis, caule subnudo multifloro. *Habitat in Sibiria.*

Stolones oblongi, confertim imbricati; Foliis planis, subulatis, mucronato-spinosis, spinoso-ciliatis. Caulis altus nudiusculus, foliis aliquot minimis mucronatis margine levibus. Panicula parva.

*geum ad. 245. stellaris.*

8. SAXIFRAGA foliis serratis, caule nudo ramoso petalis acuminatis.

Saxifraga foliis lanceolatis dentato-serratis, caule nudo simplici. *Fl. suec. 355.*

Saxifraga caule nudo simplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. *Fl. lapp. 175.*

Sanicula myosotis, floribus albicantibus fere umbellatis. *Pluk. alm. 331. t. 58. f. 2. & t. 222. f. 4.*

Sedum montanum hirsutum, mucronato & dentato folio, flore albo guttato. *Moris. hist. 3. p. 478. f. 12. t. 9. f. 13.*

*Habitat in Alpibus Spitsbergenibus, Lapponicis, Helveticis, Styriacis, Westmorlandicis. D. Willd.*

*Handwritten notes:*  
- ~~Saxifraga - ad. 245. stellaris.~~  
- ~~14 opposita - Haller. Hist. Stir. v. no 941.~~  
- ~~odorata - Hall. no 985. D. Willd. - cum fereis ovatis capite. fol. radice~~  
- ~~nov. pl. innotuit alpinum. D. Willd. fol. opp.~~

9. SAXIFRAGA petiolatis, Saxifraga f. Habitat in Radix crassa ovalia, re dine fere le omnino tis, sed m  
10. SAXIFRAGA caule nud Saxifraga fo capitatis. Saxifraga e dis crena 5. 6. Saxifraga fo caule hir Saxifraga fo petalis. R Sempervi f. A. Habitat in cis, Arv  
11. SAXIFRAGA lagineo- 167. \* Geum foli caule ra Sanicula r Habitat in  
12. SAXIFRAGA do pani Geum fo Magn. Habitat in Facies Sa.  
13. SAXIFRAGA le nudo Geum bic ribus pu Habitat in  
9. SA-  
gum f Sedum fol rad Fl. pari cali va an 5 pl et 10 an 1 2