



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

363.
 fl. pudent
 NIA
 cintae frigida
 k. alm. 198. t.
 vi viscosa ondulata. bl. lutea
 h. ovatum 3 cm. ang.
 onis. Vir. cliff.
 oy. lugdb. 18.
 . 40. Argentea.
 rnef. cor. 50.
 my. Ried et medior.
 agna longa 1744.
 to-canaliculatis
 red. 15. Runia fl.
 lis imberbis.
 mirella concreta
 novia. Segm. gl.
 ntibus, corollis
 L.
 b. pin. 38.
 n. 40. Mon. 14.
 my. 7. macr. 4.
 g. abr.
 to-canaliculatis
 . tenuifolia
 corollis im-
 m. 16. imbuta
 reducta 2. folia
 gato. Tournef.
 a bulbosa concreta
 tenuifolia non virgin.
 min. meditata 1744.
 iculatis, bulbis
 solo.
 hist. I. p. 216.
 loco barbae; bul-
 sis Xiphiis 16.
 mposito, ut in
 his ante dictis nota
 liis ovato-lan-
 Hort. upf. 18.
 e procumber-
 irid. cliff. 6.
 rg. 130. Com-
 at.
 ta cum
 rionita.
 i. quod
 n. p. 890.

- remorallis ligule leviss. 2. 2. Sol. Ridi. flore 2 ad 3 terminis. } Ligule. Persic. ad 57.
 Sere regulares tridi. apicimacula Rhumbodia. } alstroemeria hin. 57.
 Commelina procumbens annua, saponaria folio. Dill. pl. ter
 elth. 93. t. 78. f. 89. ? Commelina latiflora cernuella Plum.
 Habitat in America. ○ Vx. report. Rida. vaginis floribus rubris tubulis
 1/2 internodiorum tegentibus, antice usque medium latus. fol. tenui. lanceol. 1 1/2 long. q. late
 2. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis lanceola- *africana*. *Commelina ad*
 tis glabris obtusis, caule repente. 47
 Commelina radice perenni, foliis lanceolatis, caule re-
 pente glabro, petalis duobus majoribus. Wach. ultr.
 323.
 Commelina procumbens, flore luteo. Roy. lugdb. 538. +
 Habitat in Æthiopia. 4 1/2 in. tenui. tota laevi. ovata lucida. fol. sessilis arva
 Differt a prima petalis istis majoribus reniformibus 1 1/2 internodi
 teis, tertio ovato filamentis longioribus equali, vagi- tegentis.
 nis foliorum ciliatis, involucro non reticulato.
 3. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovatis ob- *benghalensis*. *Commelina ad*
 tufis, caule repente.
 Ephemerum benghalense serpens, folio subrotundo bre-
 vi, phalangoides. Pluk. alm. 130. t. 27. f. 3.
 Habitat in Bengala.
 4. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato- *erecta*. fl. p. 18.
 lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo. Hort. *Commelina ad*
 upf. 18.
 Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule erectiusculo
 scabro, petalis duobus majoribus. Virid. cliff. 16. Hort.
 cliff. 495. Gron. virg. II. Roy. lugdb. 38.
 Commelina erecta, ampliore subcærulo flore. Dill.
 elth. 94. p. 77. t. 88.
 Habitat in Virginia. 4 1/2 in. tenui. tota caule subfoliis villosar. fol. lanceol.
 3 1/2 long. q. late. petiolas brevi. int. 3. Vagina int. longa totum internodium tegenti
 rubra, ciliis rufis longis coronata.
 * * *Tripetalæ Zanoniae Pl.*
 5. COMMELINA corollis æqualibus, foliis ovato-lan- *tuberosa*. *Commelina ad*
 ceolatis subciliatis. Hort. upf. 18.
 Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus ma-
 joribus æqualibus. Hort. cliff. 21. Roy. lugdb. 38.
 Commelina radice anacampserotidis. Dill. elth. 94. t.
 79. f. 90.
 Habitat in Mexico. 2 1/2 in. tenui. tota viridis caule et subfoliis rufis 1/2 in. +
 fol. sessil. 3 1/2 long. q. late, vagina internodis plus 3 brachii, brevi, foliis totaliter rufis non ciliatis,
 6. COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis incras- *Zanonia*. *Commelina ad*
 satis, foliis linearii-lanceolatis. + *Planta inornata Margr. fig. 8.*
 Zanonia graminea perfoliata. Plum. gen. 38.
 Habitat in America Gallieæ æquinoctialis.
 7. COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis capil- *undiflora*.
 laribus, foliis linearii-lanceolatis, involucro nullo. Fl. ? *Graea cantiana ad*
 zeyl. 31. Ephe-

42

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Ephemerum phalangoides maderaspatense minimum, foliis perangustis, perfoliatum. *Pluk. alm.* 135. t. 27. f. 4.
Habitat in India.

Melanophaeus robust. angustifl. lutei fasciis littigostari amine virg.
J. Schaubain fol. 2. 1 p. 1. strob. fl. rad. tenu. luteo-yl. 3 no
crown palea vagin. glauca cana crass. mid. obt. fl. obt. pale
bol. strob. bl. luteo-yl. sp. 1. 10 mm. inaequata. non vagin
TRIANDRIA MONOGYNIA 43
fl. 1. 10 mm. glauca capilla simile testa br. cypr. aqu. prof. alt.
strob. 1. 10 mm. 3 cyl. 1. 10 mm. 3 cyl.
pus culmo tereti. foliis tribus patulis flosculisque et.

TRIANDRIA MONOGYNIA

43

*Scirpus culmo tereti, foliis tribus patulis flosculisque ag-
gestis terminato. Sauv. monsp. 9.*

Scirpus maritimus, capite glomerato. *Tournef.* *inst.* 46.
Scheuchz. *gram.* 367.

Gramen Cyperoides maritimum. Baub. pin. 6. theatr. 91.
Gramen junceum maritimum, capite squamofo foliaceo.
Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 6.

*Habitat in Galliæ, Narbonæ, Tyrrheni, Smyrnæ mari-
timis.*

Folia et jam involucri apice pungunt. Spicæ oblongæ, sessiles,
apicibus distantes; Involucrum triphyllum, interdum
diphyllum.

Solapuram.

4. SCHOENUS culmo tereti nudo., capitulo ovato: in-
volucrī diphyllic valvula altera subulata longa. Fl. suec. *nigricans.* • C.
36. it. gotl. 234. *Dalib. paris.* 113. *melanochonus. mich. ad. 2. 31.*

Scirpus flosculis spicatis. *Act. Stockh.* 1741. p. 182.

Juncus lœvis minor, panicula glomerata nigricante. *Moris hist.* 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 28.

Junco affinis capitulo glomerato nigricante. Scheuch.
gram. 349. *melanochonus 2 palustris angustiflora, juncus purpureus. 2. 31.*

Habitat in Europæ paludibus æstate, exsiccatis. 2

5. SCHOENUS culmo tereti nudo, spica dupli, invo- *ferrugineus.*
lucrī valvula majore spicam æquante.
Gramen Cyperoides minimum, caryophylli proliferi ca-
pitulo simplici squamato. *Moris. hist.* 3. p. 245. f.
8. t. 12. f. 40.

Habitat in Gotlandiæ, Angliæ paludibus. 2

* * Culmo triquetro.

6. SCHOENUS culmo triquetro, capitulo subrotundo, *coloratus.* X
involucro longissimo, plano, variegato.
Schœnus florum capitulis in involucro longissimo radiatis.
Hort. cliff. 495.

Gramen Cyperodes spica compacta alba, foliis ad spicam,
partim albis partim viridibus. *Sloan. hist.* 1. p. 119. t. 78. f. 1.

Habitat in Jamaica, Bahama.

7. SCHOENUS culmo subtriquetro nudo, spica disti- *compressus.* X
cha, involucro monophyllo,
Cyperella montana spicata, radice repente, caule totun-
do triquetro, spica fusca compressa disticha, semine
cinereo, *Mich. gen.* 53. 2. 31. fl. ignorati.

Gramen Cyperoides spica simplici compressa disticha.
Pluk. alm. 173. t. 34. f. 9. *Scheuch. gram.* 490. *Raj.*
hist. 1910. *Moris. hist.* 3. p. 245.

Habitat in Anglia, Helvetia, Italia. 8

- glomeratus.* 8. SCHOENUS culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis. Schoenus culmo triquetro, pedunculis geminis lateralibus, floribus conglomeratis. *Gron. virg.* 131.
Habitat in Virginia.

albus.
at mich.
en medu
dy. ad
uy. 6
wn. p. 251

9. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. *Fl. svec.* 34. *Dalib. paris.* 14. Schoenus flosculis fasciculatis. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugd.* 48. *Cyperella palustris capituli florum umbellatum*. *Cyperus palustre*, *minum albo*, *sain fuligineum*. *33.* 2. 31. Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis. *Moris. hist.* 3. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 39. *Fl. lapp.* 17.
Gramen Cyperoides palustre leucanthemum. *Scheuchz.* Gram. 503.
Habitat in Europæ borealis paludibus siccatis. 26

CYPERUS.

Tarapava: quando em $\frac{1}{2}$ Radin contrá veneno de lagarto B. Ribeirão e viajante
Ballaí.

Mallotus aquatica ^{var.} *zeylanicus*. { *Inocarpus* aquatica *radice dentata fibrosa*, *obtuse tuberosa*, *erecta* *generulata*, *castaneum fructu*
eduli. *Koenig* *amoen.* 827. ? *spec. Zeyl. Cyl. edulis*.

*Botta pullu h.m. 12. 2. 50. lauore. Braun. 4 pedunculi. Saynt piers.
fil. rad. 1. caud. 3 gen. umbella involv. 2 fl. spicis confertis distichis
Kod. p. 12. 2. 57. Dangshan.*

*Cyperus ad. 41 { Melanocheirus retic. angustif. novi gen. lithosperm. tenuine.
mich. 46 TRIANDRIA MONOGYNIA*

elegantissima. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 117. t. 75, f.

I. Raj. suppl. 623.

Habitat in Jamaicæ paludosis maritimis.

odoratus.

10. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata foliosa, pedunculis propriis distiche spicatis. Roy. lugdb. 50. Gron. virg. 131.

Cyperus longus odoratus, panicula sparsa, spicis strigofioribus viridibus. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1.

Habitat in America ad fluviorum ripas.

compressus.

11. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus, spicis alterno-digitatis lanceolatis distichis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa, pedunculis simplicibus, spicis alternis subulatis distichis. Roy. lugdb. 51. Gron. virg. 131.

Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula sparsa compressa viridi. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Raj. suppl. 623.

Habitat in Americæ septentrionalis pratis arenosis.

12. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanceolatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa supradecomposita, spicis confertis distiche compressis. Dalib. paris. 14.

Cyperus minimus, panicula sparsa flavescente. T. Scheuch. gram. 385. Hall. helv. 246.

Cyperus minor pulcher, panicula lata compressa subflavescente. Moris. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 11. f. 37.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subflava. Baub. pin. 6. theatr. 88. t. 88.

Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ paludosis.

*C. fuscus.
Cyperus ad.*

13. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla supradecomposita, spicis strigofioribus confertis distiche compressis. Dalib. paris. 15.

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante. T. Scheuch. gram. 384.

Pueho-Malo. Cyperus odorensis degener.

Cy-

*Varia pullu. 1. 2. 50. lauore. Braun. 4 pedunculi. Saynt piers.
caud. 3 gen. umbella involv. 2 fl. spicis confertis distichis
Kod. p. 12. 2. 57. Dangshan.*

TRIAN

Cyperus minor pu

Moris. hist. 3.

Gramen Cyperoi

Baub. pin. 8.

Habitat in Galliae,

Diffr. a C. flat

fioribus fuscis &

14. CYPERUS cu

spiculis linearibu

Cyperus rotundus

rugineis. Sloan.

Habitat in paludib

Radix subrotunda

li, instructi spicis

confertissimis, n

cule communi p

15. CYPERUS cu

foliosa, peduncu

lugdb. 50.

Cyperus omnium p

lugdb. 50.

Hara pulchra h. m. 2.42. Seite Bram. ~~cult.~~ Papuasprachl. nalle 3 zw.
caulis 3 years, base latus florifer fl. 3 years) umbella involucrata 1/2 fls long. an umbellif. plant
(ignis et al 2 fls al paucibus) angust. altius cymis gl. Kraeuter

TRIANDRIA MONOGYNIA.

47} older aster. (imm.)
Debet

47 *Satyrus arcturus* (Linnaeus)
Dabie

Cyperus minor pulcher, panicula compressa nigricante.

Moris. hist. 3: p. 239. f. 8. t. 9. f. 38.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa nigricante.

Bauh. pin. 8. 1. ped. integr. quinque nigris in unum long. flor. ex. multo raro.

Habitat in Galliæ, Germaniæ, Helvetiæ pratis humidis.

C. flavescente vix manifeste, spiculis angustis.

Differet a G. haematocheilus et manifestioribus fuscis & foliis magis scabris.

14. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella simplici, *strigosus*, spiculis linearibus confertissimis horizontalibus.
Cyperus rotundus, panicula sparsa, spicis strigosis ferrugineis. *Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 23.*
Habitat in paludibus Jamaicæ, Virginiam.
Radix subrotunda. Umbellæ radii simplices, erectiusculi, instructi spiculis linearibus, longiusculis, ferrugineis, confertissimis, numerosissimis, horizontaliter a pedunculo communi patentibus vel etjam deorsum flexis.

Cyperus, ad. 41
Papyrus. Theophr. Papyrus. Plin.

15. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella simplici foliosa, pedunculis simplicissimis distiche spicatis. *Roy. lugd. 50. Papirus. Theophr. L. 4. c. 2. Relatio in Egypto et Syria propter Papirus. 3. angl.*
Cyperus omnium maximus Papyrus dictus. (Mont. gram. Papiro. Itali. Radix diversa ad agnum et vates crudus, vel loculi faulis, edulis ad pastores regnatur. Papirus. Theophr. L. 4. c. 2. Relatio in Egypto et Syria propter Papirus. 3. angl.) Ilocutis minimis. Mich. gen. 41. t. 10. Quibus ex dīcūt. et castis ad entus.
Cyperus enōdis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus. Schenck. gram. 387.
Cyperus niloticus vel syriacus maximus papyraceus. Morris. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 11. f. 41.
Papyrus syriaca & siciliana. Bauhin. 12. theatr. 333. — sari. Theophr. Habitat in Calabria, Sicilia, Syria, Ægypto.

Papyrus nilotica sive *egyptiacus* B. M. 19
Cari. Theophr. L. & C. g. **SCIRPUS.** alio nomen cyperi caule trigonum. Cyperus.
uti regnum at certa rurale subtectum in canis qui et expugnat. ~~Cyperus~~ ad 41.
2 cultus longi. p. M. R. saltus * **Spica unica.** radix dividitur cardoem
rotundum factum non furvum; folia articulatis. • Sp. R.
SCIRPUS culmo tereti nudiusculo f. r. i. l.

1. Scirpus culmo tereti nudiusculo semigeniculato, capitulo glomerato lateral. stam 3. styl 1. exstyli 3 genit. articulatus. • 36 No^o
Tsieli. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71. Ravapocala. Drapetisca. in Malabariæ aquosis arenosis. folia 2-3 ad culmum radae cyl. Culmus cavus, geniculis cinctus, at non undique. Spicae foliatae globosæ ex parte laterales in capitulum semiverticillatum collectæ. palustris. • flammans.
Habitat in Malabariæ aquosis arenosis. 2-3 folia ad culmum radae cyl. articulatae in crusta: ex parte laterales in capitulum semiverticillatum collectæ. wat. austri planit. illi per cypris
2. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subovata imbricata. Scirpus ad. Fl. suec. 41. Dalib. paris. 16.
Scirpus culmo nudo, spica terminali subovata. Roy. lugdb. 48.
Scirpus equiseti capitulo majore. T. Scheuchz gram. 360.
Fl. lapp. 19.
Juncus palustris, capitulo equiseti, major. Bauh. pin. 12.
Habitat in Europæ fossis & inundatis.

Mission Thys. 3-4 paratypes *Hartmannia folia* Mision Thys.
opposite to var. glabrat. adult stem milky or flecked ~~white~~

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Marbuchen-geyr *Sciurus manteus* *apogon*
Rausofj

- 48 TRIANDRIA MONOGYNIA.

Scirpus acutus · caule geniculato *caule geniculato* *caule geniculato*

geniculatus. 3. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subglobosa terminali. Scirpus culmo nudo, spica terminali subrotunda. Hort. cliff. 21. * Roy. lugdb. 48.
Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equiseto major & minor. Sloan. jam. 37. hist. 1. p. 122. t. 75. f. 2. & t. 81. f. 3. Raj. suppl. 628.
Habitat in Jamaica.

cespitosus. 4. SCIRPUS culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. Fl. suec. 42. Dalib. paris. 17.
Scirpus folio culmi unico. Fl. lapp. 20. Roy. lugdb. 49.
Scirpus montanus, capitulo breviore. Scheuch. gram. 363. t. 7. f. 18.
Habitat in Europæ paludibus cespitosis sylvaticis. 2

capitatus. 5. SCIRPUS culmo tereti nudo setiformi, spica subglobosa.
Scirpus culmo setaceo nudo, spica subglobosa. Gron. virg. 12.
Habitat in Virginia.

acicularis. 6. SCIRPUS culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi, seminibus nudis. Fl. suec. 43. Dalib. paris. 17.
Scirpus magnitudine aciculæ. Fl. lapp. 21. Roy. lugdb. 49.
Juncellus minimus, capitulis equiseti. Pluk. alm. 20L t. 40. f. 7. Moris. hist. 3. p. 234. f. 8. t. 10. f. 37.
Habitat in Europa sub aquis purioribus.

fluitans. 7. SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido.
Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica terminali. Guett. stamp. 141.
Scirpus caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis. Roy. lugdb. 49. Sauv. monsp. 9.
Scirpus equiseti capitulo minori. T. Scheuch. gram. 365. t. 7. f. 20.
Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. Bauh. pin. 12. prodr. 23. theatr. 187.
Gramen junceum clavatum minimum. Raj. hist. 1310.
Moris. hist. 3. p. 230. f. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. 180. t. 35. f. 1.
Habitat in Angliæ, Galliæ undis.

* * Culmo tereti polystachio.

- lacustris. 8. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus, pe-
nunculatis terminalibus. Fl. svec. 40. Dalib. paris. 16.
Manicay. Plin. 17-12. *Scirpus rubens* altissimus. Zorn. 528. Scir-
Biado. Ital. nich
Phleo. { Theophr. nich
(Phleod.)
Enrich. gen. p. 50. den. Salvinio. ex phleo ^{ex Phleod.} grac.
naturae phleo. ex phleo facit Biado apud Etat. (ut in
voce Niada. Etrusc. Niada (a / y Niada Nia) et
Del gracum facit Niada vermentum terminatum
Do, unde exprimit plura Biado. nich. p. 50. genus.

Motta pulla. n. m. 12. t. 38. 3 polli. caule teretis. f. radis granae 2 globus
caul. lot. p. 2 ad 3 rotundatae cul. long. caule teretis. cul. flos 1. longo per invulv.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

49

Scirpus spicis copiosis. Roy. lugdb. 48.

Juncus maximus s. scirpus major. Baub. pin. 12. theatr. 178.

Habitat in Europæ aquis puris stagnantibus & fluviatibus.

9. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inaequali mucronato. *Holoëneus*, lugd. c. 3. *Scirpus* ad. 41ⁱⁱ

Scirpus panicula solum foliosa, spicis globosis pedunculatis lateralibus. Sauv. monsp. 8.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Baub. pin. 11. theatr. 17.

Scirpoides maritimum, capitulis sparsis glomeratis. Scheuch. gram. 371.

Holoschoenus. Dalech. hist. 987.

Habitat in Europa australi. 2. Red. orang. 2 ad 3 radice nudo. culm. cyl. longa basi vaginæ membr. manu. monsp.

10. SCIRPUS culmo tereti nudo, capitulo lateralí conglobato, bractea reflexa. *romannus*.

Scirpus capitulo singulari, radice tomentosa. Barr. rar. 1249. t. 255. f. 3.

Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato solitario. Scheuch. gram. 373. Mich. gen. 52.

Habitat in Galloprovincia & Romæ. 2.

11. SCIRPUS culmo nudo setaceo, spicis lateralibus sub-solitariis sessilibus. it. scan. 227. * *setaceus*. *folius* *Scirpus* ad

Scirpus culmo nudo setaceo, spicis pedunculatis. Roy. lugdb. 49. *Scirpus 2 omnium minimi cyl. natus?*

Scirpus omnium minimus, capitulo breviore. T. Scheuch. gram. 358.

Juncellus omnium minimus. Moris. hist. 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 23. *Junellus instabilis*. B. pin. 12. Rodo 22.

Habitat in Europæ litoribus maritimis.

12. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. *supinus*. *Scirpus*

Scirpus supinus minimus, capitulis conglobatis, foliis rotundo-teretibus. Tournef. inst. 528.

Habitat Parisiis.

13. SCIRPUS culmo nudo capillari, spicis pedunculatis sessilibusque lateralibus. *capillaris*.

Scirpus culmo teretiusculo seminudo, spicis capitatis sessilibus, involucro diphyllo setaceo. Fl. zeyl. 39.

Cyperus culmo tereti spicas infra apicem ferente. Hort. cliff. 21.

D

Gra-

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Gramen juncum perpusillum, capillaceis foliis, æthiopicum. *Pluk. alm.* 179. t. 300. f. 5.
 Gramen pusillum, junci capitulis minimis, ad basin foliolis binis acutis. *Burm. zeyl.* 108. t. 47. f. 2.
Habitat in Virginia, Æthiopia, Zeylona.

* * * *Culmo triquetro, panicula nuda.*

mucronatus. 14. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda.

Scirpo-Cyperus maritimus. *Mich. gen.* 47. *ord. c.* 2. 3.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *Bauh. pin.* 11. *prodr.* 22. *Morif. hist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 20.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido & molli. *Pluk. alm.* 200. t. 40. f. 1. 3.

Habitat in Anglia, Italiæ, Helvetiæ, Virginiam stagnis maritimis.

dichotomus. 15. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella decomposita, spicis dichotomiae sessilibus. *Fl. zeyl.* 40. *

Gramen Cyperoides maderaspatanum, juncelli gesneri capitulis sparsis. *Pluk. alm.* 179. t. 119. f. 3.

Habitat in India.

echinatus. 16. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella simplici, spicis ovatis. *Fl. zeyl.* 38. *

Cyperus floribus capitatis erectis pedunculatis. *Gron. virg.* 12.

Gramen Cyperoides americanum, spicis grandioribus oblongo-rotundis, sparganii in modum echinatis, ad summum caulem pediculis longis innitentibus. *Pluk. alm.* 179. t. 91. f. 4.

Habitat in India utraque.

retrofractus. 17. SCIRPUS culmo triquetro, umbella simplici: spicarum flosculis retrofractis.

Cyperi genus indianum, panicula speciosa, spiculis propendentibus atris. *Pluk. phyt.* 415. f. 4.

Habitat in Virginia. 2

ferrugineus. 18. SCIRPUS culmo triquetro subnudo, pedunculis nudis numerosis, spicis ovatis solitariis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla, pedunculis quibusdam subdivisis, spicis ovatis solitariis. *Roy. lugdb.* 50.

Gramen Cyperoides majus spicis ex oblongo-rotundis compactis ferrugineis. *Sloan. jam.* 36. *hist. I.* p. 36. t. 77. f. 2.

Habitat in Jamaicæ paludibus maritimis.

{ Rel. pullu. h. m. 12. /
caut. 39. nov. 4. inv.
c. 1117

TRIAND

19. SCIRPUS culm

spicis oblongis se

Scirpus culmo triq

nis subseffilibus, F

virg. 132.

Gramen Cyperoide

mis junceis sparsi

ceis. *Sloan. jam.*

Habitat in Jamaicæ

* * * * Culm

10. SCIRPUS culm

liacea, spicularum

Fl. suec. 39. *Dal*

Cyperus culmo triq

simplissimis, spicis

Cyperus panicula su

stamp. 2. p. 414.

Cyperus rotundus i

theatr. 215. *Lindb.*

3. Cyperus rotundus

7. Cyperus panicula c

bus-composita. 5

Gramen Cyperoides

1. Scirpo-Cyperus pal

ra, panicula sparsa

Habitat in Europe

Anatome partium fra

jussit. Radix 4. rupes

Cor. 3. Sphaer. 1. *abdu*

11. SCIRPUS culm

cea, seminibns of

Kaden-pullu. *Rheed*

Habitat in India.

Culmus nudus, triq

longitudinis. Spica

vix spica longio

nitida, nuda, pron

ximo americano, 1

p. 237. f. 8. t. 11.

12. SCIRPUS culmo

pedunculis nudis s

Fl. suec. 38. *Dalib*

Cyperus culmo triq

Kolpukku. h.m 12.7.63. Driedg arenosa. 2 pds. fol. capri undian alg. caud.
caulif. 3 gms. involucrads fls umbella cypelis prob 8-10 pedunculatij rotig lacinia
cross

TRIANDRIA MONOGYNIA.

53

19. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella subnuda, *spadicens*.
spicis oblongis sessilibus terminalibusque.
Scirpus culmo triquetro nudo, panicula laxa, spicis alter-
nis subsessilibus, pedunculis longis terminalibus, *Gron.*
virg. 132.

Gramen Cyperoides majus aquaticum, paniculis pluri-
mis junceis sparsis, spicis ex oblongo-rotundis spadi-
ceis. *Sloan. jam.* 36. *hist.* 1. p. 118. t. 76. f. 2.
Habitat in Jamaicæ fluviis.

* * * * Culmo triquetro panicula foliacea. *Scirp. ad 41.*

20. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata fo- *maritimus.* *Fl. suec.* 39. *Dalib. paris.* 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis simplissimis, spicis confertis. *Roy. lugdb.* 50

Cyperus panicula subsessili, capitulis subovatis. *Graeff.* stamp. 2. p. 414. *Cyperus vulgaris panicula parva* ? 527. 2. 23 pud.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 215. *foliæ radice atrovir. angul. & crev. capitulo & l. subtili. r. subtili. l. subtili. v. subtili.*

β. Cyperus rotundus inodorus anglicus. *Bauh. pin.* 14.

γ. Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassiori-
bus composita. *Scheuch. hist.* 400.

δ. Gramen Cyperoides panicula sparsa majus. *Bauh. pin.* 6. *ypennum. tab.*

ε. Scirpo-Cyperus palustris, radice repente nodosa inodo-
ra, panicula sparsa, capitulis majoribus. *Mich. gen.* 48.

Habitat in Europæ litoribus maritimis. 2. 2 pud. in ripa sequane.

Anatome partium fructificationis conjunctionem β. γ. δ. ε.
jussit. Radix 2. repente ex nodis globos. 5 linear diam. constantes, rigidi
duri, utr. siccus, nudatus, abry. odore.

21. SCIRPUS culmo triquetro folioso, panicula folia *lithospermus*
cea, seminibns osseis.
Kaden-pullu. *Rheed. mal.* 12. p. 89. t. 48. *Voy. flagellariae pag.*
Habitat in India.

Culmus nudus, triqueter, crassitie filii. Panicula sim-
plex; ramulis alternis. Folium sub panicula ejusdem
longitudinis. Spicæ parvæ, ovatæ, subjecto Folio seta-
ceo vix spica longiore. Semina magna, nivea; subovata
nitida, nuda, prominentia, diversissima a Cypero ma-
ximo americano, lithospermi semine. *Moris. hist.* 3.
p. 237. f. 8. t. 11. f. 16.

22. SCIRPUS culmo triquetro folioso, umbella foliacea, *sylvaticus*. πολυκαρπος. *Fl. suec.* 38. *Dalib. paris.* 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, peduncu-

*mottenga h.m. 12. 2. 52. Gram. mudd. 1. pedunculare Radice 3 ft. tuberosos
 florum radic. late grande caule 3 goni. umbella involucrum 3 ft. dantis odore
 gressus 3. ovata. culm. tenuis*

TRIANDRIA MONOGYNIA.

52

*lis nudis supra-decompositis, spicis confertis. Roy.
 lugdb. 49.*

Gramen cyperoides miliaceum. Baub. pin. 6.

*Gramen arundinaceum, foliis acutissimis, panicula mul-
 tiplici, cyperi facie. Lœf. pruss. 119. t. 33.*

Habitat in Europæ sylvis. 2.

*scirpus glomeratus. 23. SCIRPUS culmo triquetro folioso, capitulo glo-
 merato, involucro folioso.*

*anuphi. 24. Cyperus culmo triquetro folioso, capitulo glomerato
 triphylo, spicis teretibus. Gron. virg. 131?*

*see mottenga malab. Pee-mottenga. Rheed. mal. 2. p. 99. t. 53. Nardina marta-
 ad le uor gen. 21. Syl.*

Habitat in Virginia, India.

*Culmus subnudus, triquierter, semipedalis. Involucrum nu-
 tans foliis 3. f. 4, longitudine culmi. Spiculae plu-
 rimæ, ovato-oblongæ, sessiles, in capitulum fabrotun-
 dum congestæ. Nardina. 1. pedunculare lateri culm-
 i caule rotund. teretis infloresc. umbella 4 ft. fl. capitulum 1. 9 ft. 7 mil.*

*michelianus. 24. SCIRPUS culmo triquetro, capitulo globoso, invo-
 lucro polyphyllo longo.*

Cyperus italicus omnium minimus. Till. pis. 51. t. 20. f. 5.

Habitat in Italia rarius.

ERIOPHORUM.

*vaginatum. 1. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, spica pa-
 cea. Fl. svec. 45. Dalib. paris. 18.*

*Eriophorum spica erecta, caule tereti. Fl. lapp. 23. Roy.
 lugdb. 51. Linagrostis pura virginali a laeviori varia. 1. pedunculare lateri culm-*

*Gramen tomentosum alpinum & minus. Baub. pin. 5.
 prodr. 10. Burs. 1: 43.*

*Juncus alpinus capitulo lanuginoso f. Schœnolagurus.
 Baub. pin. 12. prodr. 23. theatr. 188. Scheuch. gram.
 302. t. 7. f. 1.*

Habitat in Europæ frigidis sterilibus. 2.

stegur cum pale mai flor.

*polystachion. 2. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis spicis
 pedunculatis. Fl. svec. 44. Dalib. paris. 18.*

Eriophorum spicis pendulis. Fl. lapp. 28. Hort. cliff.

22. Roy. lugdb. 51. Eriophorum pendulus angustifolius. 2.

*Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa. Baub.
 pin. 4.*

Habitat in Europæ uliginosis, turfosis. 2.

*virginicum. 3. ERIOPHORUM culmis foliosis teretibus, foliis pla-
 nis, spica erecta.*

*Eriophorum spica compacta erecta foliacea, caule com-
 pressio. Gron. virg. 132.*

Gra-

*Rauha radice qua spica
 et parvum clavigram
 oblongum.*

TRIAN

*Gramen tomentosum
 pacta aureo colo-
 f. 4.*

*Gramen tomentosum
 aceo. Moris. hij
 Habitat in Virgin*

*ERIOPHORUM
 breviore. Fl. suc-*

Eriophorum ipica

Linagrostis juncea

ore. Scheuch. g.

Juncus alpinus bo-

Habitat in Europa

Nardus spica line-

Gramen sparteum

gram. 90.

Gramen sparteum

nus. Baub. pin.

f. 8. t. 7. f. 8.

Habitat in Europa

NARDUS spica

Nardus spuria nar-

Nardus gangitis sp-

hij. 3. p. 257.

Habitat in G. Na-

NARDUS spica

Nardus spica subbul-

Gramen loliaceum,

gram. 43.

Gramen loliaceum

hij. 3. p. 182. f.

Egypt. inservia

Cal. 2nd. f. flan-

ca. 2nd. Roy. a ut-

10th. 2. 6th.

Vita tendit literam

Nardus Indica grossa spica crassi et spica Indica officinalis. A Pin 13
ad gangum et in Syria Samphoriticā erunt 2 ad 3 spithameum altitudo
od opacit.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Gramen tomentosum virginianum, panicula magis compacta aureo colore perfusa. Pluk. almt. 179. t. 299.
f. 4.

Gramen tomentosum, capitulo ampliore fusco & foliaceo. Moris. hist. 3. p. 224. f. 8. t. 9. f. 2.

Habitat in Virginia. 2

4. ERIOPHORUM culmis nudis triquetris, spica pappo *alpinum*. *Linnagottet J.*
breviore. Fl. suec. 46. *C 57.*
Bombycinus. C 62. 12

Eriophorum spica erecta, caule triquetro. Fl. lapp. 31

Linagrostis juncea alpina, capitulo parvo: tomento rari-

ore. Scheuch. gram. 305. t. 7. f. 4

Juncus alpinus bombycinus. Bauh. pin. 12. prodr. 6. 200

Habitat in Europæ alpibus, locisque affinibus. $\frac{1}{2}$ helveticæ d. comit.

Nardus scutellata. L. p. c. 7. In liquido agnoscitur et in India. Nardus cicutaria. L. p. 11.
fructu bus. folia longiora. fl. flava. caulis et radicum ac Vahliana.
Wesst.

1. NARDUS spica setacea recta. Fl. suec. 47. Dalib. striata • G
paris. 18.

Nardus spica linearis. Fl. lapp. 40, Hort. cliff. 42.

Gramen sparteum juncifolium. Benth. pin. 5. Scheuch.
gram. 90.

Gramen sparteum hollandicum, capillaceo folio, & minus. *Bauh. piæ. 5. prodr. II. Moris. hist. 3. p. 217.*

Institute for Botanical Documentation

Habitat in Europæ asperis, sterilibus, duris. 2

NARDUS spica recurva, †

Nardus spuria narbonensis.

2. NARDUS spica recurva. + gangitis. , Mega.
Nardus spuria narbonensis. B. L.

Nardus gangitis spuria narbonensis. *Lob.* ic. 84. *Moris.*

bist. 3. p. 257. f. 8. t. 13. f. ult. Raj. bist. 1911.

Habitat in G. Narbonensi.

3. NARDUS spica incurva ciliata.

Habitat in India.

ciliaris.

Folia graminea, plana. Culmus spicatus, Spica dimidiata s. altero latere tantum Elosculis alternis, erectis, 12 a 15: valvula exteriore ovato-oblonga, mutica, margine ciliata pilis scabris, numerosis. Calyx proprius nullus, sed ad alterum latus flosculorum seta, brevior ipsa gluma.

4. NARDUS spica cylindrica articulata.

Nardus spica subulata disticha. Roy. Lugdb. 58.

Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis. T. Scheuch.
Gram. 43.

Gramen loliaceum maritimum, spicis articulatis. Moris.
hirt. 2. t. + 8o. f. 8. i. 6. f.

bist. 3. p. 182. f. 8. t. 5. f. Gr. 2-
gomm bleue jaune mirey flave l'c. 6. 2f. 2 ad 3 sp. presentes Milga ad
egypt. incisa. L. pyramidalis. 1307. Sol. bas. vaginale cyl. ex. rameo brev. 31.
Cal. 2 valv. 1. flor cil. D. 2 lo expander largus aperte cutes non arct. laterales
con. 2 valv. long. et rot. cal. manif. membran. acic. carnos. 1. calix
ex. 3.
D. 2 sp. 2. bas. 2. 2 parallel. petala distincta. v. 1. 2. cret. v. 3. ventre eti. sp. 2
sp. 2. tubular. flava. flava. 15. 8. 17. 11. 12. 13. 14.

Taccaea. Prosp.
Tapa. lugd.

Taccaea *Arct.* *Sapae* *Lugit.* *compl.* *gramen* *unum* *tenue* *cavum* *laxum* *3* *ad.*
folia *grandia* *tecta*, *non* *flava* *ha* *fruct.* *Pi.* *96.*
ex *loc* *legatura* *fit* *pone* *mostrum* *ornatum* *maru*, *et* *venerum* *altra* *em*
lapt. *54.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen myuros erectum minimum arundinaceum. Bocc.
mus. 70. t. 59.

Habitat in Italia, Hispania, G, Narbonensi.

DIGYNIA.

BOBARTIA. 41.

• *indica.*

1. BOBARTIA.

Bobartia spicis capitatis, involucro folioso, Fl. zeyl. 41.*
Amoen. acad. 1. p. 388. *

Scirpus maderaspatanus, capitulo squamoso subrotundo.
Scheuch. gram. 369.

Habitat in India.

Refert ita Schoenum mucronatum, ut ejus figura pro huius
ubique venditari possit.

CORNUCOPIÆ.

• *cucullatum.*

1. CORNUCOPIÆ. Hart. cliff. 490. Roy. lugdb. 52.

Juncus clavatus vaginatus polycephalus. Pet. gaz. t. 73.
f. 5.

Gramen orientale vernum in uidis proveniens, capitulo
inflexo. Scheuch. gram. 117.

Habitat Smyrnæ, D. Hasselquist.

SACCHARUM.

1. SACCHARUM floribus paniculatis. Hort. cliff. 26.

Mat. med. 33. Roy. lugdb. 52.

Arundo saccharifera. Bauh. pin. 18. Sloan. jam. 31.
hist. 1. p. 108. t. 66. Zulu. Rupr. 52. 74.

Habitat in Indiæ utriusque locis inundatis. 10 ad 12 ft.

Alpinum cerasum.

2. SACCHARUM floribus spicatis.

Gramen indicum alopecuroides holosericeum majus, spi-
ca longa pappescente. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 5.

Tjeria-kuren-pullu. Rheed. mal. 12. p. 117. t. 62.

Habitat in Indiæ petrosis.

PHALARIS

• *canariensis.*
Phalaris *ad.* *31*

1. PHALARIS panicula subovata spiciformi, glumis ca- rinatis. Hort. ups. 19.

Phalaris radice annua. Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63.
Dælib. paris. 20.

Phalaris major, semine albo. Bauh. pin. 28. Moris. hist.
3. p. 186. f. 8. t. 3. f. 1. *pro* *Bieton.* *Sierra*
neige *collas* *gland* *dolitum* *ob* *brevi* *an* *a* *flosca*. B. Pha-
-lari. spic.

TRIAN

Sierra *miles* *in* *ad*

Phalaris major, fer-

Phalaris radice pere-

Phalaris bulbosa, fer-

gram. 53.

Habitat in Europa

2. PHALARIS pani-

Phalaris spica cylind-

Gramen typhoides 2

ucl. gram. 61. H

Habitat in Europæ

3. PHALARIS pani-

Phalaris panicula ob-

Arundo foliis plani-

Hort. cliff. 26.

Gramen aquaticum

Scheuch. gram. 1

Gramen arundinace-

Gramen aquaticum

Gramen arundinace-

angl. 3. p. 400.

4. Gramen paniculatu-

Habitat in Europa

PHALARIS pani-

ris.

Dactylis spicis nu-

gitudine internod

57. Gmel. sibir. 1

Gramen palustre,

1158. t. 2.

Habitat in Sibilia,

PHALARIS pani-

Oryza glumis cari-

Habitat in Virginii

10. *Reaumur.* illau-

PANICUM spi-

tis unifloris, flo-

Gramen geniculatu-

ro-sericea. Pluk.

Habitat in China.

Spica longa, ferru-

TRIANDRIA DIGYNIA.

- Semen minus ex uterum undum corolla, Plantae 1 maz 2 ped. Linn. sive.* 55
 ♂ Phalaris major, semine nigro. Bauh. pin. 28. *Carex*. multicaudum Dalech.
 ♀ Phalaris radice perenni. Roy. lugdb. 63.
 ♂ Phalaris bulbosa, semine albo. Raj. hist. 1249. Scheuch.
 gram. 53.

Habitat in Europa australi, Canariis.

2. PHALARIS panicula cylindrica spiciformi.

Phalaris spica cylindrica. Fl. suec. 49. Dalib. paris. 19.
 Gramen typhoides asperum primum. Bauh. pin. 4. Scheuch. gram. 61. Hall. helv. 232.

Habitat in Europæ versuris.

3. PHALARIS panicula oblonga ventricosa.

Phalaris panicula oblonga. Fl. suec. 48. Dalib. paris. 19. *Phalaris* ad. 31.
 Arundo foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis.
 Hort. cliff. 26. Roy. lugdb. 66.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis semine. T.
 Scheuch. gram. 126.

Gramen arundinaceum spicatum. Bauh. pin. 6. theatr. 94.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Bauh. pin. 6.

Gramen arundinaceum, acerosa gluma, jerserianum. Raj. angl. 3. p. 400.

- ♂ Gramen paniculatum, folio variegato. Bauh. piu. 3. pieta. •

Habitat in Europæ subhumidis ad ripas lacuum.

4. PHALARIS panicula linearis secunda, calycibus bifloris.

Dactylis spicis numerosis alternis culmo adpressis longitudine internodiorum, calycibus bifloris. Roy. lugdb. 57. Gmel. sibir. 1. p. 130. t. 29.

Gramen palustre, loculis erucæformibus. Barr. rar. 1158. t. 2.

Habitat in Sibiria, Russia, Europa australi.

5. PHALARIS panicula effusa, glumarum carinis ciliatis. oryzoides. •

Oryza glumis carina hispidis. Gron. virg. 153.

Habitat in Virginiam paludibus nemorosis. Indiæ. ? Oryzae. ?

PANICUM.

* Spicata.

1. PANICUM spica tereti, involucris setaceis fasciculatis unifloris, flosculo quadruplo longioribus.

Gramen geniculatum brevifolium crispum, spica purpureo-sericea. Pluk. alm. 177. t. 119. f. 1.

Habitat in China.

Spica longa, ferruginea; Floculi sparsi, pedunculis bre-

1. Capitulum bras. p. 1025 gramine 2 ad 3 pd. fl. graminis spicae & tenui digesta
Capitulum
Pedicellata. lugit 56 Radix cetera, et propinata quadam venenum contulat.

TRIANDRIA DIGYNIA.

vibus, cincti setis longis, erectis; Scapus infra spicam
parum villosus; pedicelli omnes uniflori.

Pandurina
glauca.

i. Dau.
— Panikusa vulg.
Deno Konkusa
Innebie.

2. PANICUM spica tereti, involucellis bifloris fascicu-
lato-pilosif. Fl. zeyl. 44.

Gramen alopecuroides maderaspatanum, spica quasi ge-
niculata molli. Pluk. alm. 177. t. 190. f. 6.

B. Gramen paniceum s. Panicum sylvestre, simplici spica.
Scheuch. gram. 46.

γ. Panicum spica simplici, aristis aggregatis flosculo sub-
jectis. Gron. virg. 134.

Panicum indicum altissimum, spicis simplicibus molli-
bus in foliorum alis, pediculis longissimis insidentibus.

Tournef. inst. 515.

Habitat in Indiis. ○

Setae in spica longitudine flosculorum. Foliorum vaginæ
oris pilosæ. Dum spica recens prodiit Flosculi in series
dispositi observantur.

Panicum ad. 35

• americanum
Dog. n. 10. 1. 1. 1.
mil. on chandelle.

3. PANICUM spica simplici æquali, pedunculis bifloris.
Roy. lugab. 54.

Panicum indicum, spica obtusa cærulea. Bauh. pin. 7.
theatr. 522.

Panicum americanum. Clus. hist. 2. p. 215.

Habitat in America. Os ad 3 pd. vaginæ fl. pedunculus
car. luteo pilosum.

4. PANICUM spica composita, spiculis glometatis setis
immixtis, pedunculo hirsuto.

Panicum spica composita, aristis flosculo brevioribus. Vir.
cliff. 7. Hort. up. 19. Roy. lugab. 54. Gron. virg.
134. Panicum vulg. J. A.

Panicum italicum s. panicula majore. Bauh. pin. 27.
theatr. 519.

Habitat in Indiis. ○ Eculentum in Europa aust.

Pandurina
italicum.

C. 396.

Zypern Dis

Elymus

Tema adan

ad. 34.

+ • Crugalli. et 5.
numen Pandurina
dactyli foli latiori.

Bauh. G

— obanaa vulg. japa
Susuki.

5. PANICUM spicis alternis conjugatisque spiculis subdi-
visis, glumis aristatis hispidis.

Panicum spicis alternis remotis declinatis compositis. Vir.
cliff. 7. Roy. lugab. 55. Daleb. paris. 22.

Panicum spicis alternis remotis laxis. Hort. cliff. 27.
Gramen paniceum, spica divisa. Bauh. pin. 8.

B. Gramen paniceum, spica divisa, aristis longis armata.
Bauh. pin. 8. Panicum vulg. spica multispica

Habitat in Europa, Virginie cultis. ○

Variat aristis, in aliis longitudine glumarum, in aliis de-
cies longioribus.

Tema h. m. 12 2. 79. Varai. Ann. p. 151.

{ in arenos. 3 pd. ad 4. plante major q. in Europa
ad spica cad. apica. Sem. edulca.

rotunda plantarib. Quibridy venorū importans

6. PA-

gramen meane
Clementea geranoides

TRIAND

PANICUM spicul-
nacea extorsum in

Dactylis spicis alterna-
floris. Roy. lugdb.

Gramen paniceum, fi-
binis granorum or-

canum. Pluk. man-

Gramen dactylon ma-
nudis crassif. Sloan.

Habitat in Indiis.

PANICUM spica
membranacea extra-

Gramen bermudense
tus, spica crassif.

versu granifera. Pl.

Habitat in India.

Folia latissima vagini-
branaceo, plano, cu-

alternatim conferti

PANICUM spicis a-
flosculis geminis mu-

Panicum spicis alterna-
tum misericordis, flo-

cunculato. Roy. lug-

paris. 22.

Gramen dactylon, fo-

llis. Scheuch. gram.

Gramen dactylon maj-

mis gracilioribus pu-

stante. Sloan. jam.

Habitat in America.

PANICUM spicis si-

liformibus: rachi flex-

Habitat in America se-

Folia lanceolata. Culmi-

retti; spica filiformis;

tim utrinque ad den-

ro pedicellato; Spica

matre quasi in unum.

PANICUM spica
cundis flosculis gemi-

zeyl. 42. *

Habitat in Zeylona.

Panicum Angli.

TRIANDRIA DIGYNIA.

gramen manuas C.B. Dactylon ciliatum - ? Capniola Leonis C.B. &
Chumenten. germani
Schweden
· TRIANDRIA DIGYNIA. 57 Sabrat. ad

Panicum Angl. 76. f. 2. D. 5 * Pani-
ca. Dokat. ssp. agum. floribunda.

*Levata pallid. h. m. 12 f. 44 in arenis radiata repente. 2 ped. caulis
fl. peduncula 2. tendit. 203 dat. Aug. 1 latice 2 and. florum alterat.
Spt. p. 58*

TRIANDRIA DIGYNIA.

* *Paniculata.*

- dichotomum* II. PANICUM paniculis simplicibus, culmo ramo di-
chotomo. Gron. virg. 133. *

Habitat in Virginia.

Habitat in Virginia.
Statura refert arbusculam inferne simplicem, superne fa-
sciculatam.

m̄l̄ius^a clandesti-
• *num:*

291 · G

12. PANICUM racemis occultatis intra foliorum vaginas.

Gramen cyperoides polystachyon, spicis ad nodos ex foliorum alis prodeuntibus. *Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 120. t. 80.*

Habitat in Jamaica, Pensylvania. Kalm.

Culmi dichotomi, ramosi; Folia ovato-lanceolata, vaginis punctatis, pilosis, intra quas Racemi fructificatio-
num omnino occultantur, ut extus ne vestigium eo-
rum appareat.

miliu*m* ^a capillare.
G-286.

G-246-

13. PANICUM panicula capillari ereta, foliis pilosis.
Gron. virg. 13.

Panicum miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capillacea. Sloan. Jam. 35. hist. I. p. 115. t. 72. f. 3.
Habitat in Virginia, Jamaica.

Habitat in Virginia, Jamaica.

nt Insti patens.
Glycine pallidula Wm. W.

T. siama-pullu. Rheed. mal. 12. p. 75. t. 41. *Rana*. Bonn.
Habitat in India; similis e Lusitania.

Habitat in India; similiis e Luntania.
PANICUM spicis digitatis patentibus: basi interiore

Capnodia dactylon. 15. PANICUM spicis digitatis patentibus: basi interiore
villoso, floribus solitariis, farmentis repentibus.
Polydactylon micheli. Gramen dactylon, folio arundinaceo, majus aculeatum.
Bauh. pin. 7.

milium. ad. 34
• miliaceum

miliaceum.

Sioke
Kibi
Komai } Japan.

16. PANICUM panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. Hort. cliff. 27. Hort. ups. 20. Mat. med. 34. Roy. lugdb. 55. Dalib. paris. 22.
Milium femine luteo & albo. Bauk. pin. 26. theatr. 502.
Habitat in India. Only, sativum pro aviculæ.

milium ♂ latifolium.
G ♂ Calumet

4 } calumet

17. PANICUM panicula raceimis lateralibus simplicibus,
foliis ovato-lanceolatis collo pilosis.

Gra-

1. *PHLEUM spica*
 Suec. 50. Hort. c.
 ris. 20.
 Gramen typhoides
 pin. 4. Scheuch.
 Habitat in Europæ

2. *PHLEUM spica*
 Suec. 51. Dalib.
 Gramen typhoides
 villosa. Scheuch.
 Habitat in Alpibus

Panicum Indicum pīta ottata coerulea. B. Pl. 27.
Gramen Indicum seu miliaceum Indicum B. Pl. 24. enho secentur.
Gramen Indicum grano avellanea angustitaria B. Pl. 25.

} *Dogon*
Lucum. corianus
} manigette aestiva
59 grain. Batav.

TRIANDRIA DIGYNIA.

Miliaceum Sabiceum A. Pl. 26. Inquiritur rororum mili formae sed dulcis, angus
Gramen virginianum, lato brevique folio, panicula ra-
tiore. Moris. hist. 3. p. 196. f. 8. t. 5. f. 4.

Gramen miliaceum sylvaticum maximum, semine albo.

Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 114. t. 71. f. 3.

Habitat in America.

Folia latitudine Commelinæ, ad fauces amplexicaulia;
extus collo circum fauces villoso, etiam basi foliorum
marginè pilosa. Panicula valde mediocris ex racemis
lateralibus, non subdivisis, sed pedicellos proprios, nec
subdivisos proferentes. Flores mutici, majusculi.

18 PANICUM paniculatum, foliorum vaginis longitu- brevifolium.
dissimiliter ciliatis.

Panicum miliaceum, latiole folio, maderaspatanum. Pluk.
alm. 176. t. 189. f. 4.

Habitat in India.

Gramen pedale vel bipedale. Folia ovata, amplexicaulia;
Panicula tenuissima, folio supremo & majore compresso.
Variat foliis angustis & lanceolatis.

19. PANICUM paniculatum raimosissimum, foliis ova- arborescens.
to-oblongis acuminatis. Fl. zeyl. 43.

Panicum panicula laxa sparsa, foliorum vaginis glabris.

Hort. cliff. 27.

Habitat in India.

Altitudine certat cum altissimis arboribus; Culmus vix
penna anserina latior.

20. PANICUM panicula virgata, glumis acuminatis læ- virgatum.
vibus extima dehiscente.

PANICUM paniculatum, glumis acutis Gron. virg. 133.

Habitat in Virginia.

PHLEUM.

1. PHLEUM spica cylindrica longissima. Fl. lapp. 26. Fl. pratense. • G
suec. 50. Hort. cliff. 22. Roy. lugdb. 53. Dalib. pa- *Stelaphorus*. *Thelyph.*
ris. 20. *ad. 31*

Gramen typhoides maximum, spica longissima. Baub.
pin. 4. Scheuch. gram. 60.

Habitat in Europæ versuris & pratis. *& circa goettingam.*

2. PHLEUM spica ovato-cylindracea. Fl. lapp. 25. Fl. alpinum. *barbatum.*
suec. 51. Dalib. paris. 20. *Stelaphorus. ad*

Gramen typhoides alpinum, spica brevi densa & velut
villosa. Scheuch. gram. 64.

Habitat in Alpibus. *& haller. 1529.*

3. PHLE-

*Befordia ad am. { gramen nodosum spica procta. B. Nodum. 3. Rad. bulbosa
cina Befordia prope Batileam.*

Onocordon uliginosum { gramen Phalaroides grata in illi. 1. germinatum Beford. 10.

S. alopecurus. 2. qu. 60

TRIANDRIA DIGYNIA.

*arenarium. 3. PHLEUM spica ovata ciliata, caule ramoso. Hort.
cliff. 23. it. scan. 109. Roy. lugdb. 54.*

*Gramen typhinum maritimum minus. R. Pluk. alm.
177. t. 33. f. 8.*

*Habitat in Europæ locis arenosis. ♂
Spica vix absolute e vagina folii exit.*

*Scheenoides. 4. PHLEUM spicis ovatis obvolutis foliis brevissimis mu-
cronatis amplexicaulibus.*

*Gramen maritimum typhinum, brevi & crassiori spica
ad singula genicula prodeunte s. secundum. Scheuch.
gram. 86.*

Habitat in Italia, Smyrna, inque Hispania. Lœfling.

*Habitus Schœnii aculeati foliis floralibus amplexicau-
libus, brevibus mucronatis.*

ALOPECURUS.

*pratinus. 1. ALOPECURUS culmo spicato erecto. Roy. lugdb.
alopicurus. ad. 32. 54. Fl. suec. 52. Dalib. paris. 21.*

*Gramen phalaroides majus s. italicum. Baub. pin. 4.
theatr. 55.*

*Gramen alopecuro simile glabrum cum pilis longiuscu-
lis in spica Onocordon. Baub. hist. 2. p. 475.*

3. Gramen typhoides spica angustiore. Baub. pin. 4.

Habitat in Europæ pratis. 2.

*geniculatus. 2. ALOPECURUS culmo spicato infraeto. Fl. suec. 53.
alopicurus. ad. C. Dalib. paris. 20.*

*Alopecurus culmo infraeto, aristis gluma longioribus.
Roy. lugdb. 54.*

Alopecurus a istis gluma longioribus. Fl. lapp. 37.

*Gramen aquaticum geniculatum spicatum. Baub. pin. 3.
Scheuch. gram. 72.*

β. Alopecurus aristis gluma æqualibus. Fl. lapp. 38.

Habitat in Europæ uliginosis. 2.

*bordeiformis 3. ALOPECURUS racemo simplici, flosculis aristis
circumvallatis.*

Habitat in India.

*Habitus omnino Hordei murini. Culmus pedalis. Folia
plano- canaliculata, nervosa, culmo scapus longiora.
Spica racemosa, longa. Flores numerosi; pedicelli Flo-
rum brevissimi, simplicissimi. Calyces obvallati setis
aristiformibus, numerosis, floribus triplo longioribus,
gluma bivalvi, altera minore. Corolla bivalvis glu-
mis oblongis, acuminatis. Pistillum flore longius. Sta-
mina tria.*

4. ALO-

*Kunze nullum. h. m. 12
Al. gradi. grandul.
U. malle. h. m. 12
verb. velut. h. m. 12
Gymn. 2. annul. 12
ALOPECURU*

*voluta. SAVV. m
Gramen alopecuru*

*4. theatr. 57. S
Gramen alopecuru*

*Barr. ic. 115. f.
Cauda vulpis moni*

*Lob. ic. 45.
Habitat Monspelii*

*Atypium cap. prec. ad
gra. cuncta. cap. ad
gr. 2. typ. cap. ad
gra. 2. typ. cap. ad*

MILIUM foliis

23. Milium glumis dip

Gramen sylvaticum

*8. theatr. 141.
f. 8. t. 5. f. 10.*

Habitat in Europæ

MILIUM floribus

Gramen paniculatu

liacea sparsa. Scb

Habitat in Helvetia

AGROSTIS pet

etam strictam lo

58. Gramen segetum

Scheuch. gram.

Gramen capillatum

Habitat in Europa

AGROSTIS caly

giore; interiore a

Habitat in Europa

tis. 4 habet

cal. 1. fl. 2 valv.

cop. 2. 2d. valv.

aut. 3. 3d. valv.