



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Stati centunculum vocant vestitum (sic) ad similitudinem capituli penularum jacentem in arboribus: proci autem climati dicitur centunculus flor. l. 24
sed ab omni invidio arboribus: idem tamen nomen dicitur cum synonymo dicitur pen. l. 15
sed proci climati dicitur ab aliis habentibus. l. 15

DECANDRIA TRIGYNIA. 421 *4. p. 437.*

conata rogiu.
 Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Bauh. pin. 205.*
 Armerius flos quartus. *Dod. pempt. 176.*
 Habitat in Anglia, Gallia. ☉ *1 ped.*

25. SILENE floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. suec. 367. It. rupestris. Silene ad 255*
*W: goth. 144. **

Silene floribus erectis laxè distantibus, caule dichotomo. *Fl. lapp. 183.*

Alfne alpina glabra. *Bauh. pin. 251. prodr. 118.*

Auricula muris alpina glabra. *Bauh. hist. 3. p. 360.*

β. Caryophyllus holosteus alpinus gramineus. *Bauh. pin. 210. prodr. 104. Burs. XI. 117. Haller No 917.*

Habitat in montibus aridis Sueciæ, Helvetiæ. ♂
 Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

26. SILENE caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis. *Saxifraga. Saxifraga. Cestri. Saxifraga. Silene*

Caryophyllus saxifragus. *Bauh. pin. 211.*

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Bauh. hist. 3. p. 338.*

Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. ♀

Radix lignosa, ramosa. Caules plures, digitales, simplicissimi, glabri. Folia opposita linearia acuta glabra, per 4 ad 6 oppositiones. Pedunculus terminalis, filiformis longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis. Flos unicus. Calyx clavatus glaber. Petala bifida limbo calyce brevior.

Utrugo - hall. 919. multus alp. Schuy. alaudis.

27. SILENE caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis a-cutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff. 171. Roy. lugdb. 446.*

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor. 2. itin. 2. p. 139. t. 154.*

Habitat in Persia.

STELLARIA. *Drumh. 4. alpina p. 103. Centunculus ad nemorum. 256.*

1. STELLARIA foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis. *Alfne altissima nemorum. Bauh. pin. 251. Alfne montana hederacea maxima. Col. eeph. 1. p. 289. t. 290.*

Habitat in Europæ nemoribus. *Haller No 886.*

2. STELLARIA foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis.

acervum congesta. Caules digitales, filiformes, maxima parte nudi: superne bifidi in 2 pedunculos subjecto pari foliorum: altero pedunculo in medio foliolis duobus.

ARENARIA.

Gypsophila ^{trina} ~~trina~~ 256.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosis. Fl. succ. peploides. 375. Fl. lapp. 149. It. oel. 151.

Alfene litoralis, foliis portulacæ. Baub. pin. 251.

Telephium maritimum, portulacæ folio. Buxb. act. 3.

Habitat ad littora maris Europæi borealia. 2/3 p. 15. April. fl.

2. ARENARIA foliis ovatis carinatis recurvis quadri-fariam imbricatis. Baub. pin. 211. prodr. 125. Bursf. XI. 135.

Habitat in Pyrenæis 2

Herba omnino Gypsophila aggregata, sed Pedunculus uniflorus, terminalis.

3. ARENARIA foliis ovatis obtusis, pedunculo laterali lateriflora, biflora.

Habitat in Sibiria.

Caulis digitalis filiformis simplicissimus. Folia ovata obtusa subpetiolata glabra. Pedunculus axillaris unicus longus bifidus. Corolla calyce longior.

4. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. trinervia.

Hort. cliff. 173. Fl. succ. 374. * Roy. lugdb. 471.

Alfene plantaginis folio. Baub. hist. 3. p. 364.

Habitat in Europæ sylvis. 2

5. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. Fl. succ. 373. Hort. cliff. 173.

Roy. lugdb. 451.

Alfene minor multicaulis. Baub. pin. 251.

Alfene minor. Fuchs. hist. 23.

Habitat in Europæ sylvis glareosis. 2

6. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membrana- ceis vaginantibus. Fl. succ. 376.

a. Alfene, spergulæ facie, minor f. Spergula minor, sub-cæruleo flore. Baub. pin. 251. prodr. 119.

Polygonum foliis gramineis, spergulæ capitatis. Læf. pruss. 203. t. 63.

β. Arenaria foliis linearibus longitudine intermediorum. Hort. cliff. 173. Gron. virg. 161. Roy. lugdb. 451.

ex vultu ^{stan. 10. 2} D d 4 ^{argentea p. 440.} Sper-

Spergula ^{rupestris} ~~rupestris~~ p. 440. *Vardarad* ^{asturica} ~~asturica~~ p. 270. *Stefania* ^{4. p. 100.} ~~4. p. 100.~~

Gypsophila ^{trina} ~~trina~~ *trina* ^{trina} ~~trina~~

Gypsophila ^{trina} ~~trina~~ *trina* ^{trina} ~~trina~~

Kouratan, Kaiuan. Malpighia aquifolia u. ample juglandis foliis. Namore
les acuminat polare lunt bay uale h' feuille qui ont bay uale

Cerasus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbo tetrapyreno. Pluk. alm. 94. t. 157. f. 7. *Munf.*

Arbor baccifera

Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino sulcato rubro polypyreno: officulis canaliculatis. Sloan. jam. 172. hist. 2. p. 106. t. 207. f. 2. Raj. dendr. 74.

Habitat in Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curacao. *h*

ovens.

Bois de Capitaine.

*Arbor baccifera Namore
ibipitanga. Pij.*

2. MALPIGHIA foliis oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis.

Malpighia angustifolia & latifolia, fructu subtus spinoso. Plum. gen. 46.

Melampus americana, folio lato subtus spinoso, fructu rubro. *Phyt. ref. inst. 642.*

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtus obliquo, fructu cerasino sulcato polypyreno: officulis canaliculatis. Sloan. jam. 172. hist. 2. p. 106. t. 207. f. 2. Raj. dendr. 74.

Habitat in America calidiore. *h* 6 ped. uti.

crassifolia.

K&S n&K&S. Kaiuan.

3. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis terminalibus.

Malpighia latifolia, cortice sanguineo. Barr. equin. 72.

Tiliae affinis laurifolia, arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono. Sloan. jam. 136. hist. 2. p. 20. t. 163. f. 1. *h*

Habitat in America calidiore. *h*

Arbor. Foliis ovatis palmaribus crassis subpetiolatis integerrimis, supra pubescentibus, subtus tomentosis. Racemi terminales longi tomentosi.

verbascifolia

*Mourei. Kaiuan.
Namore*

4. MALPIGHIA foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus.

Malpighia humilis, verbasci folio & facie, caule crassissimo. Barr. equin. 71.

Habitat in America calidiore. *h*

Folia lanceolato-ovata, in petiolos desinentia, pedalia, villosa, subtus densissimo tomento vestita. Racemi terminales, longi, villosi.

2200 • aquifolia.

5. MALPIGHIA foliis lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis.

Malpighia angustis & acuminatis aquifolii foliis. Plum. gen. 46.

Habitat in America calidiore. *h* 2 ped. fol. longa bi. cordata limbo & dentis spinosa purpurea duodecim terminata.

coccigera.

6. MALPIGHIA foliis subovatis dentato-spinosis.

Mal-

DEC
Malpighia hum
gen. 46.
Habitat in An
BANISTER
Paullinia foliis
97.
Lupulus sylve
alm. 229. t.
Habitat in Ba
BANISTER
Acer scandens
Clematis angu
t. 92. Raj.
Habitat in A
BANISTER
nibus erect
Acer scanden
te. Plum.
Habitat in A
BANISTE
cemis later
Acer scanden
spec. 18.
Acer scanden
p. 26. Ra
Acer bengha
alm. 7. F.
Habitat in I
BANISTE
Banisteria fo
trorsum t
bus. Hort
Habitat in
BANISTE
bus extro
Banisteria fo
sum ten
Hort. cl
Acer scand
Plum. J

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferæ foliis. Plum.
gen. 46.

Habitat in America calidiore. b

BANISTERIA.

1. BANISTERIA foliis alternis lanceolatis ferratis.

Paullinia foliis simplicibus lanceolatis ferratis. Hort. ups.

97.

Lupulus sylvestris americana claviculis donata. Pluk.

alm. 229. t. 201. f. 4. & t. 163. f. 3.

Habitat in Barbados. b *aliud genus ut flos Epicarpio.*

9. Gran. ad. 1769

Myrtilloides. 1. Geny

gouana. L. p. 675

ad. 80.

• 2

2. BANISTERIA foliis sinuato-angulosis.

Acer scandens, folio anguloso. Plum. spec. 18.

Clematis anguloso folio, aceris fructu. Plum. amer. 77.

t. 92. Raj. suppl. 328.

Habitat in America calidiore. b

angulosa. 2. Geny.

Banisteria ad

famil. Pl. 1763

49. famil.

garumion

pag. 388

3. BANISTERIA foliis ovatis, spicis lateralibus, semi-
nibus erectis.

Acer scandens, pseudoacaciæ folio, flore purpurascen-
te. Plum. spec. 18.

Habitat in America meridionali. b

purpurea.

Banisteria ad

4. BANISTERIA foliis ovato-oblongis acuminatis, ra-
cemis lateralibus, seminibus patentibus. Fl. zeyl. 176. *

Acer scandens, foliis citri, flore cæruleo spicato. Plum.
spec. 18.

Acer scandens, foliis laurinis. Sloan. jam. 137. hist. 2.
p. 26. Raj. dendr. 94.

Acer benghalensis, laurinis foliis, fructu tergemino. Pluk.
alm. 7. t. 3. f. 1.

Habitat in Indiis b

Banisteria ad

benghalensis.

5. BANISTERIA foliis ovatis, ramis dichotomis.

Banisteria foliis ovatis, ramis dichotomis, seminibus ex-
trorsum tenuioribus, introrsum lacinulam emittenti-
bus. Hort. cliff. 169. *

Habitat in America calidiore. b

dichotoma. 1. ad

6. BANISTERIA foliis ovatis, ramis brachiatis, semini-
bus extrorsum tenuioribus.

Banisteria foliis ovatis, ramis ramosis, seminibus extror-
sum tenuioribus, introrsum lacinulam emittentibus.
Hort. cliff. 169. *

Acer scandens, convolvuli folio, flore ex aureo cinereo.
Plum. spec. 18.

fulgens. 2.

1753

Acer

Anacampseros flore flavo. *Amm. ruth.* 96. t. II.
Habitat in Sibiria. 5

5. SEDUM foliis cuneiformibus concavis subdentatis aggregatis, ramis repentibus, coma terminali. *Hort. upj.* 116. *hybridum.* 248
in thaly. roman
Protogonm. Dicu
adul.

Sedum minus repens, chamædryos foliis, e singulis foliorum alis radices agens. *Amm. ruth.* 93.
Habitat in Tataria ad radices montium uralensium. 5

6. SEDUM foliis planiusculis angulatis, floribus lateralibus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456. *stellatum.*
in thaly. roman 7. 3. flor
anacampsero

Sedum echinatum vel stellatum, flore albo. *Baub. hist.* 3. p. 680.

Coryledon stellata. *Baub. pin.* 285.
Habitat in Italia, Gallia, Helvetia.

7. SEDUM foliis planis, caule ramoso, floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 176. * *Roy. lugdb.* 456. *Sauv. monsp.* 76. *Cepæa. mult.* +
anacampsero

Sedum annuum album, oblongo portulacæ minoris folio. *Moris. hist.* 3. p. 473. f. 12. t. 7. f. 37.

Cepæa. *Baub. pin.* 288. *Clus. hist.* 2. p. 68.
Habitat Monspeli, Genevæ. *Paris. bobone, calvin*

* *Teretifolia.*

8. SEDUM foliis oppositis ovatis obtusis carnosiss, caule infimo, floribus sparsis, *dasyphyllum. Dalech.*
Sedum foliis cordato-ovatis compressis sæpius oppositis, *LEAETES.*
floribus sparsis. *Sauv. monsp.* 8. *Leopety.*

Sedum foliis semiglobosis subovatis sessilibus quadrifariam imbricatis. *Wachend. ultr.* 391. *circinatum*

Sedum parvum, folio circinato, flore albo. *Baub. hist.* 3. p. 691. *abaty. 1754.*

Sedum minus, folio circinato. *Baub. pin.* 283. *Moris. hist.* 3. p. 473 f. 12. t. 7. f. 35.

Aizoon dasyphyllum. *Dalech. hist.* 1133. *montag.* *Verital. ad 1754.*

Habitat in Helvetia, Lusitania, Hispania. *montag.* *Verital. ad 1754.*

9. SEDUM foliis subulatis confertis basi membranacea solutis, floribus cymosis. *Hort. cliff.* 176. *It. gotl.* 178. *Fl. suec.* 388. *Roy. lugdb.* 466. *Gort. gelr.* 268. *rupestre.* *Rudicio*

Sedum rupestre repens, foliis compressis. *Dill. elth.* 343. t. 256. f. 333.

10. Sedum minus luteum, folio acuto. *Baub. pin.* 283. *Se-*

Sedum minus luteum, ramulis reflexis. Bauh. pin. 283.
Habitat ad radices montium Europæ. 2

10. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. Hort. cliff. 177. Fl. suec. 387. Roy. lugdb. 457. Hall. helv. 398.
Sedum minus teretifolium album. Bauh. pin. 283.
Vermicularis f. Illecebra major. Lob. hist. 205.
Habitat in Europæ petris. 2.

11. SEDUM foliis subcylindricis obtusis alternis, cyma semper erecta.
Sedum arvense, flore rubente. Bauh. pin. 283. prodr. 132.
Habitat in Gallia, Italia. 2

12. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis cretiusculis alternis, cyma trifida. Hort. cliff. 177. Fl. suec. 389. Mat. med. 218. Roy. lugdb. 456.
Sempervivum minus vermiculatum acre. Bauh. pin. 283.
Illecebra f. Sempervivum tertium. Dod. pempt. 129.
Habitat in Europæ campis siccissimis sterilissimis. 2

13. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis cretiusculis sexfariam imbricatis. Fl. suec. 390.
Sempervivum minus vermiculatum insipidum. Bauh. pin. 284.
Sempervivum minimum. Cam. epit. 856.
Habitat in Europæ borealis campis apricis siccis. 2
Differt a precedenti, cui simillimum, Foliis sexfariam oblique imbricatis, Ramis nunquam copiosis, ut cespitem constituent, Floribus in singulo ramo cymæ raro ultra tres.

14. SEDUM caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. Fl. suec. 391.
Sedum minimum non acre, flore albo. Raj. angl. 3. p. 270. t. 12. f. 2. figura tenuis.
Habitat in Europa boreali. 2

15. SEDUM caule erecto, foliis planiusculis, pedunculisque subpilosis.
Sedum palustre subhirsutum purpureum. Bauh. pin. 283.
Sedum minus III. f. palustre. Clus. hist. 2. p. 59.
Habitat in pratis paludosis Germaniæ, Angliæ, Galliæ.

PENTHORUM.
*1. PENTHORUM. Gron. virg. 51. * Act. ups. 1744. p. 12. t. 2.*
Habitat in Virginia. 2. 2

Cental. D. 248.
album.
Cental. adans. 1754.
Tragus. com.
Vermicularis. L.
Trique madame. G.
Sedum 3. Sep.

Gomara ad. 248.
rubens.
W. p. 226.
Pamphanes. C.

Cental.
Cental. ad.
Stove. exp. angl.
Miccha. D. L.
Indice. pa. D.
Dactylone. C.
M. p. p. D. B.
Sexangulare.

Fl. Cental. ad.
Sexangulare.

anceamples. 2.
villosum.
Cuspia. p.

sedoides.
Penthorum ad. 248.

DE
1. OXALIS
mofa-a
lugdb.
Oxalis fo
Trifolium
Trifolium
2. Oxys flo
Oxys flo
Habitat i
2. OXAL
bola
Oxalidi a
magnif
Oxys bul
purpura
Oxys bul
t. 27.
Habitat i
OXAL
lobis
Habitat
Caulis nu
per ter
& flor
libus p
culus
Flos m
OXAL
Oxalis b
luteo.
Oxys af
nimis
Oxalis a
flore f
Oxalis b
re lute
Habitat
OXAL
Oxalis
458.

434 DECANDRIA PENTAGYNIA.

fl. carui umbellati, capitula intylos. s. angulo spirantibus.

Oxys bulbosa æthiopica minor, folio cordato, flore exalbido purpurascente. *Comm. hort. 1. p. 43. t. 22.*
Habitat in Æthiopia. 4 3 Pluk. alt. auy.

violacea.

6. OXALIS scapo umbellifero, foliis ternatis obcordatis.

Oxalis caule aphylo, flore purpureo, radice tuberosa rotunda. *Gron. virg. 161.*

Oxys purpurea virginiana, radice lili more nucleata. *Pluk. alm. 274. t. 102. f. 4.*

Habitat in Virginia, Canada. 4

• Pes caprae.

7. OXALIS scapo umbellifero, foliis ternatis bipartitis.

Oxalis bulbosa pentaphylla & hexaphylla, floribus magnis luteis & copiosis. *Burm. afr. 80. t. 29.*

Habitat in Æthiopia. 4 1 martii flor. Zidnam aculey.

sensitiva.

8. OXALIS scapo umbellifero, foliis pinnatis. *Fl. zeyl. 180.*

Oxyoides malabarica sensitiva, caule viridi glabro, flore luteo majore. *Garc. act. angl. 1730. p. 379. t. 2.*

Herba Mimosa malabariensium. *Zan. hist. 199. t. 61.*

Herba viva. *Clus. exat. 290. gub.*

Herba viva foliis polypodii. *Baub. pin. 259.*

Todda vaddi. *Rheed. mal. 9. p. 33. t. 19.* *Lachni Brin*

Habitat in India. Dauu 2 Col. manilla dupl. 52. 404.

fl. flavi radice rub. sing. pet. com 4 ad 5 pet. 12. 10. alt. brev. coleophylla cap. 5. gma. cing. ang. 2 bulb.

Senticola 2 Luyit s. Sensitiva 2 Seschy nome ap. Medoni Scap.

in uidi untray

fl. caerulea caule tereti pedunculo unifloro abbreviato. 4 1 ped. cany. fol. caulinis alternis 12 ad 14

versicolor. 9. OXALIS caule simplici, pedunculo unifloro abbreviato, foliis filiformibus subramosis

Oxalis bulbosa trifolia, foliis linearibus obtusis, flore externe rubro, intus albo. *Burm. afr. 65. t. 27. f. 1.*

Oxys africana, foliis tenuissimis in summitate caulis. *Raj. suppl. 598.*

β. Oxys bulbosa africana angustifolia, flore rubro obsoleto amplo. *Raj. suppl. 548.*

Oxys africana, foliis tenuissimis, flore amplo versicolore. *Pluk. amalb. 169. t. 434. f. 6.*

Oxalis bulbosa angustifolia, caule folioso, flore rubro. *Burm. afr. 66. t. 27. f. 2.*

Habitat in Æthiopia. 4

hirta.

10. OXALIS caule ramoso, pedunculis unifloris, foliis sessilibus lanceolatis.

Oxalis caule ramoso, foliis lineari-lanceolatis sessilibus, floribus lateralibus solitariis. *Roy. lugdb. 532.*

Oxalis radice longa fibrosa, caulibus ramosis, foliis ternis angustis, florum petiolis longissimis. *Burm. afr. 71. t. 28. f. 2.*

Oxys

- Oxys africana, hirsutis latioribus foliis, flore magno purpureo. *Pluk. amalth.* 164.
- β. Oxalis bulbosa, foliis angustis ternis hirtis, flore purpureo. *Burm. afr.* 70. t. 28. f. 1.
- Oxys africana bulbosa, flore purpureo, caule folioso. *Raj. suppl.* 599.
- Oxys africana bulbosa, dorychnii monspeliensium parvis foliis, floribus purpureis amplis. *Pluk. amalth.* 164. t. 434. f. 7.
- Habitat in Æthiopia.*
11. OXALIS caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis. *Hort. cliff.* 175. *Hort. ups.* 116. *Roy. lugdb.* 458. *Sauv. monsp.* 173. *Gort. gelr.* 91.
- Oxys flavo flore. *Clus. hist.* 2. p. 249.
- Trifolium acetosum corniculatum. *Baubi pin.* 330. luteum minus repens etiam procumbens. *Moris. hist.* 2. p. 183. f. 2. t. 17. f. 2.
- Habitat in Italia, Sicilia.* ☉
- Confer.* Oxalis lutea annua, floribus dentatis. *Few. per.* 3. p. 49. t. 24.
12. OXALIS caule ramoso erecto, pedunculis umbelliferis. *Gron. virg.* 161.
- Oxys americana erectior. *Tournef. inst.* 88.
- Trifolium acetosum corniculatum luteum majus rectum indicum s. virginicum. *Moris. hist.* 2. p. 184. f. 2. t. 17. f. 3.
- Habitat in Virginia.*
13. OXALIS caule fruticoso, foliis ternatis: intermedio petiolato. *frutescens.*
- Oxys lutea frutescens, trifolii bituminosi facie. *Plum. spec.* 2.
- Habitat in America meridionali.* †

AGROSTEMMA.

1. AGROSTEMMA hirsuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis.
- Agrostemma. Hort. cliff.* 175. *Fl. suec.* 383. *Roy. lugdb.* 449.
- Lychnis segetum major. Baub. pin.* 204.
- Lolium. Fuchs. hist.* 127.
- Habitat inter Europæ segetes.* ☉

githago ad. 255
githago Ital.
Githago. Cray.
2 nigella. Buss. Luc
1 anthriscum. gal. 2nd
4 Sand. melanthodum. malta
5 nigellatum 2nd
4 Lolium Fuchs.
gith. quæc Mon. Ruem
4. nigella p. 534

• *Celivosa.*

- 2. AGROSTEMMA glabra, foliis lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. Hort. upf. 115. *
 Lychnis segetum, Nigellastrum minus glabrum dicta flore eleganter rubello. Moris. hist. 2. p. 543. f. 5. t. 22. f. 32.
 Lychnis foliis glabris, calyce duriore. Bocc. sic. 27.
 PseudoMelanthium glabrum ficulum. Raj. hist. 999.
 Habitat in Sicilia. ☉

Coronaria ad 254.

Coronaria.
 Σεφάρων. Σεφάρων. Σεφάρων. Σεφάρων.
 Βερεν. Σεφάρων. Σεφάρων. Σεφάρων.
 Βαλλάρια. Βαλλάρια. Βαλλάρια. Βαλλάρια.
 Μαδοίον. Μαδοίον. Μαδοίον. Μαδοίον.
 Παιρίον. Παιρίον. Παιρίον. Παιρίον.
 Απορβίον. Απορβίον. Απορβίον. Απορβίον.
 Βρυπτον. Βρυπτον. Βρυπτον. Βρυπτον.
 Γενικύον. Γενικύον. Γενικύον. Γενικύον.

- 3. AGROSTEMMA tomentosa, foliis ovato lancinatis, petalis integris coronatis. Hort. upf. 115.
 Coronaria. Hort. cliff. 174. Roy. lugdb. 449.
 Lychnis coronaria dioscoridis sativa. Baub. pin. 203.
 Lychnis. Cam. epit. 569.
 Habitat in Italia. ♂

Coronaria

Conymbium gna

- AGROSTEMMA tomentosa, petalis emarginatis.
 Lychnis coronaria sylvestris. Baub. pin. 204. Moris. hist. 2. p. 540. f. 5. t. 36. f. 2.
 Lychnis umbellifera montana helvetica. Zan. hist. 128. t. 51. Raj. hist. 993.
 Habitat in Helvetia.

Flos vespr.

LYCHNIS.

chalcedonica
scymnidy. qm
luxvis. veter. quibz
φλδξ. (Chrysothymus)
πόλος
phlox. (Thym)
Flammra. (Thym)
Flora cuculi. (Thym)

- 1. LYCHNIS floribus fasciculatis fastigiatis. Hort. cliff. 174. Hort. upf. 115. Roy. lugdb. 449.
 Lychnis hirsuta, flore coccineo, major. Baub. pin. 203.
 Flos constantinopolitanus. Dod. pempt. 178.
 Habitat in Tataria. ♀
- LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Hort. cliff. 174. Fl. suec. 304. Roy. lugdb. 139.
 Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici s. Flos cuculi. Baub. pin. 210. *Captula. (Thym)*
 Caryophyllus pratensis, flore pleno. Baub. pin. 210.
 Odontites plinii. Clus. hist. 1. p. 292. 293.
 Habitat in partis Europæ humidiusculis. ♀

odontites. (Thym)
Flora. (Thym)
Flora. (Thym)

Viscaria. (Thym)

Storis. (Thym)

Lychnis. (Thym)

- 3. LYCHNIS petalis integris.
 Silene floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus. Hort. cliff. 172. Fl. suec. 364. Roy. lugdb. 445
 Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. Baub. pin. 205.
 Lychnis sylvestris VI. Clus. hist. 1. p. 289.
 Habitat in Europæ septentrionalis pratis siccis. ♀
- 4. LYCHNIS petalis bifidis corymbosis.
 Silene floribus corymbosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. Roy. lugdb. 447.

DEC.
 Silene lappo
 Silene florib
 t. 7.
 Habitat in
 Pyrenais
 LYCHNIS
 hirtis.
 Habitat in
 Natura Sile
 nus glabra
 LYCHNI
 361. Roy
 Cucubalus
 Fl. lapp.
 Lychnis syl
 pin. 204.
 Lychnis syl
 limo. Ti
 Melandrium
 Cucubalus
 unilocula
 Lychnis syl
 Lychnis all
 Habitat in
 LYCHNI
 le subuni
 Cucubalus
 breviorib
 Cucubalus
 Fl. lapp.
 Habitat in
 In Sibiria
 CERAST
 upf. 115
 Myofotis
 cor. 18.
 Habitat i
 CERAS
 174. Fl
 c

Silene lapponica alpina, facie viscaria. Fl. lapp. 185. *
Silene floribus in capitulum congestis. Hall. belv. 376.

t. 7.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibiricis,
Pyrenaicis. & ♂ ~~2. tribu.~~

5. LYCHNIS petalis bifidis, caule dichotomo, foliis sub-
hirtis.

Habitat in Sibiria. Gmelin. &

Statura Silenes rupestris, sed Radix perennis, Folia mi-
nus glabra, & Styli 5 distingunt plantam.

Flora
~~Lychnis~~ ad. 254
Melandrium

6. LYCHNIS floribus dioicis. Hort. cliff. 171. Fl. suec. dioica.
361. Roy. lugdb. 448.

Cucubalus caule composito, calycibus oblongo-ovatis.
Fl. lapp. 182.

Lychnis sylvestris f. aquatica purpurea simplex. Baub.
pin. 204.

Lychnis sylvestris noctiflora alba simplex, calyce amplis-
simo. Till. pis. 105. t. 41. f. 1.

Melandrium plinii genuinum. Clus. hist. 1. p. 294. mas.

β. Cucubalus floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis
unilocularibus. Hort. cliff. 171.

Lychnis sylvestris alba simplex. Baub. pin. 204.

γ. Lychnis alba multiplex. Baub. pin. 204.
Habitat in Europæ frigida pratis succulentis. &

geminum
Melandrium Plin. Chy.
Oxyanthum Math. Luc.
Basilicum Agl. Cast.
apocathemum Causs.
ανθοκαλυσπευς ταυρος. Mon.
Erasopodium.
Ερασοπόδιον
Caphagina Rom. Vet.
τραγογονατον. Diosc.
Eragrostis
Fam. Egypt. V. p. 264.
Walt. Kent. Lond.

7. LYCHNIS calyce inflato, corolla calyce brevior, cau-
le subunifloro.

Cucubalus caule simplicissimo unifloro, petalis calyce
brevioribus. Fl. suec. 363.

Cucubalus caule simplicissimo unifloro, corolla inclusa.
Fl. lapp. 181. t. 12. f. 1.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Sibiricis.
In Sibiria planta caule multifloro lecta est.

Reveration

CERASTIUM. *et nomen generum. Siliqua 256*

* Capsulis oblongis.

1. CERASTIUM foliis connatis. Hort. cliff. 173. Hort. persoliatum.
ups. 115. Roy. lugdb. 450.

Myosotis orientalis perfoliata, lychnidis folio. Tournef.
cor. 18. Dill. elth. 295. t. 217. f. 284.

Habitat in Græcia. ☉ 1 ped. & mai. fl. t. l. 10 emb.

2. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. Hort. cliff. viscosum.
174. Fl. suec. 379. Roy. lugdb. 450.

Reveration

Ce- *viscaria. can.*

fl. foliis ovalis raris...
Ceraſtium corolla calyci æquali. *Fl. lapp.* 193.

Myofotis hirsuta altera viscosa. *Vaill. paris.* 142.

Alſine hirsuta altera viscosa. *Baub. pin.* 257.

Habitat in Europæ pratis macilentis. ☉

Kerastium ad

• *semidecan.*

3. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 382. *It. æl.* 17. *Roy lugdb.* 450. *Gron. virg.* 51. *Gort. gelr.* 90.

~~*Cerastium ad*~~

256

Ceraſtium corolla calyce brevior. *Fl. lapp.* 193.

Ceraſtium hirsutum minus, parvo flore. *Raj. angl.* 3. p. 348. t. 15. f. 1.

Gana adau

aut ypan.

Myofotis arvensis hirsuta minor. *Vaill. paris.* 142. t. 30. f. 2.

Habitat in campis apricis sterilissimis Europæ borealis. ☉
Filamenta huic 5 sterilia, 5 antherifera.

2. *gera pentandrum.*

4. CERASTIUM floribus pentandris, petalis integris. *Læfl. descr.* 26.

Preotia adau

ad. Puv. & Holand.

Habitat in Hispania.

Planta minima, similis C. semidecandro, a quo differt: colore viridi nec incano. Staminibus 5 fertilibus; nec 5 aliis anthera destitutis. Petalis calyce longe brevioribus lanceolatis acutis; nec acute emarginatis.

Kerastium

arvense

5. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Fl. suec.* 381.

Ceraſtium foliis calycibusque hirsutis. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 450.

Myofotis arvensis hirsuta, flore majore. *Vaill. paris.* 141. t. 30. f. 4.

tanu. cellafig.

de vaillat quest

caplavelluc

Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore. *Baub. pin.* 210.

Habitat in Scania & australiori Europa. ☉

Kerastium ad

• *dichotomum*

6. CERASTIUM foliis lanceolatis, caule dichotomissimo, capsulis erectis. *Roy. lugdb.* 450.

Lychnis togetum minor. *Baub. pin.* 204.

Alſine corniculata. *Clus. hist.* 2. p. 184.

Habitat inter segetes Hispaniæ. ☉

• *alpinum.*

7. CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis, caule diviso, capsulis oblongis.

Ceraſtium foliis lanceolatis, corollis calyce majoribus. *Fl. suec.* 380.

Ceraſtium foliis lanceolato-ovatis, caule subunifloro. *Roy. lugdb.* 451.

Cera-

DECANDRIA PENTAGYNIA.

Cerastium 48.

- tomentosum, 14. CERESTIUM foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis.
- Cerastium foliis lanceolato-linearibus subhirsutis, corolla calycem superante. *Sauv. monsp.* 142.
- Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius. *Baub. pin.* 210. *prodr.* 104.
- β. Caryophyllus holosteus tomentosus angustifolius. *Baub. pin.* 210. *prodr.* 104.
- Habitat in Granada. 4

Spergula ad 271

SPERGULA.

- I. *genus* • arvensis. 1. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decandris. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 377. *Roy. lugdb.* 451. *Fl. lapp.* 100. *Spergula*, *Dod. pempt.* 527. *Alfina* *Spergula* dicta major. *Baub. pin.* 251. *Habitat in Europa agris.* *Scritura in Flandria pro heribus*
- Spergula*, *Dod. pempt.* 527. *Alfina* *Spergula* dicta major. *Baub. pin.* 251. *Habitat in Europa agris.*
- 2. *genus* • pentandra. 2. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentandris. *Spergula* foliis filiformibus verticillatis raris, seminibus nigris. *Sauv. monsp.* 167. *Alfina* *Spergula* facie minima, seminibus emarginatis. *Tournef. inst.* 244. *Vall. paris.* 8. *Alfina* *Spergula* facie minima. *Magn. monsp.* 14. *Arenaria* *teretifolia* verna, flore albo, semine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 101.
- Spergula* annua, semine foliaceo nigro circulo membranaceo albo cincto - - - *Moris. hist.* 2. p. 551. *bles.* 28. *Dill. giff.* 46. *E. N. C. cent.* 5. p. 275. *t. 4.* *Habitat in Germania, Gallia, Anglia, Hispania.* ☉
- Genus* • nodosa. 3. SPERGULA foliis oppositis subulatis laevibus, caulibus simplicibus. *Spergula* foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 378. *Roy. lugdb.* 451. *Alfina* *nodosa* germanica. *Baub. pin.* 251. *Alfina* *palustris*, ericæ folio, polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. alm.* 23. t. 7. f. 4. *Polygonum*, foliis gramineis, alterum. *Læs. pruss.* 204. t. 64. *Habitat in Europa frigidaioris campis subhumidis.* 4

arenaria ad 256

Buda ad 271

Alfina *Spergula* dicta major. *semine* *foliaceo* *nigro*. *Moris* *hist.* *bles.* *28.* *Dill.* *giff.* *46.* *E. N. C. cent.* *5.* *p.* *275.* *t.* *4.* *Habitat* *in* *Germania,* *Gallia,* *Anglia,* *Hispania.* ☉

Alfina *Spergula* facie minima, seminibus emarginatis. *Tournef. inst.* 244. *Vall. paris.* 8. *Alfina* *Spergula* facie minima. *Magn. monsp.* 14. *Arenaria* *teretifolia* verna, flore albo, semine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 101.

Spergula annua, semine foliaceo nigro circulo membranaceo albo cincto - - - *Moris. hist.* 2. p. 551. *bles.* 28. *Dill. giff.* 46. *E. N. C. cent.* 5. p. 275. *t. 4.* *Habitat in Germania, Gallia, Anglia, Hispania.* ☉