



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

POLYANDRIA MONOGYNIA. 521

27. MIMOSA spinis oppositis longitudine foliorum, foliis bipinnatis: partialibus bijugatis.

Acacia maderaspatana, foliis parvis, aculeis e regione binis prægrandibus horrida, cortice cinereo. Pluk. alm. 3. t. 121. f. 4.

Habitat in India. h

28. MIMOSA spinis geminis approximatis, foliis bipinnatis: partialibus bijugatis. Hort. cliff. 208. Roy. lugdb. 470.

Acacia foliis scorpioidis leguminosæ. Bauh. pin. 392. Acacia ægyptiaca. Hern. mex. 866. t. 866. bona.

Acacia vera s. Spina ægyptiaca, subrotundis foliis, flore luteo, filiqua brevi & paucioribus isthmis glabris & cortice nigricantibus donata. Pluk. alm. 3. t. 123. f. 1.

Habitat in Ægypto, Arabia. h

29. MIMOSA spinis ternis: intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus spicatis.

Mimosa aculeata, floribus polyandris spicatis, legumine compresso lævi elliptico. Adanson, ex B. Jussieu.

Mimosa spinis geminis distinctis, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque quino-pluribus. Hort. cliff. 209. Hort. upf. 146. Roy. lugdb. 411. Mat. med. 261.

Acacia. Bauh. pin. 392. Alp. ægypt. 9. t. 9.

Acacia altera vera, filiqua longa villosa, cortice candidante donata. Pluk. alm. 3. p. 251. f. 1.

Habitat in Arabia. h

Cortice albo distinguitur hæc species primo intuitu. Spinæ ad folii exortum tres.

30. MIMOSA spinis geminis distinctis, foliis bipinnatis: partialibus octojugatis.

Acacia indica farnesiana. Ald. farnes. 2. Raj. hist. 977.

Habitat in Domingo. h

31. MIMOSA spinis geminis patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interstinctis.

Habitat in Ægypto, unde semina per D. Hasselquist. h

Habitus A. Farnesiana & Senegal; differt a priore ramis absque punctis callosis, ut ab hoc cortice minime albo sed purpurascete; nec Spinæ habet ternas ut senegal, sed binas easque longiores quam farnesiana. Rami purpurascetes, læves. Folia bipinnata, 5 circicolum inquis en bellidulphæ a 5 floris captate lævis. Legum. articulata articulis compressis longis

horrida.
 ~~gummi arabicum~~
 ~~gummi arabicum~~
 ~~gummi arabicum~~

acacia. ad.
 scorpioides.
 Schitte. cely
 Schamath. arab
 Schack. Turan
 Pant. col.
 Cardem. u. illoque.
 axacia. Ugh. Diva. gmeis
 acacia. gul. Div.
 axacia. hippoan.
 nub. nub. syl.
 Senegal.

Ugh. Diva. gmeis. adary.

differt hæc,
 cut. lævis
 nub. nub. syl.

acacia ad.
 nilotica.
 ? gumdan
 ruy. adary
 nub. nub. syl
 Schitte. cely.

utiq. Ansil. margin. 120. arb. forma globosa, pinnis at foliis, arboribus famelicis 2 pinnatis,
 pinnis paribus 4 ad 7. pinnulis paribus 2 ad 4 plus 12. fl. capit. axill. alb.
 lignum alb. lentum

522 POLYANDRIA MONOGYNIA.

ter parium foliorum partialium; inter duo paria partialium exteriorum glandula petiolo communi inserta est.

* Foliis duplicato-pinnatis: aculei sparsi.

- caesia. 32. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: foliolis ovali-oblongis oblique acuminatis. Fl. zeyl. 217.
 Acacia spinosa, indiae orientalis, foliis subtus caesiis, floribus globosis luteis. Pluk. mant. 1. t. 330. f. 3.
 Habitat in India. h
- X pennata. 33. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis numerosissimis lineari-acerosis, panicula aculeata, capitulis globosis. Fl. zeyl. 216. *semispinosa*
 Acacia aculeata multiflora, foliis pennas avium referentibus. Barm. zeyl. 2. t. 1.
 Habitat in Zeylona. h
- intidosa Intsia. h. m. 34. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, foliolis incurvis, caule angulato.
 Mimosa aculeis undique sparsis solitariis, foliis duplicato-pinnatis, caule angulato. Hort. cliff. 209. Gron. virg. 195.
 Acacia maderaspatana spinosa, pinnis veluti lunulatis: nervo pinnularum ad unicum latus vergente. Pluk. alm. 4. t. 122. f. 2.
 Intsia. Rheed. mal. p. 7 - - t. 122. f. 2.
 Habitat in India. h *arboris maxima ramis et vitiis de p. h. m. alt. 2 pin. flor capit. albi odor. 3 capit. in pinnis terminantur*
- semispinosa. 35. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, articulis caulinis superne aculeatis.
 Mimosa aculeis ad summitatem internodiorum confertis, foliis duplicato-pinnatis. Hort. cliff. 208.
 Habitat in America. h
- caesia gemma quadrivalvis 36. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, caule quadrangulo, aculeis recurvis, leguminibus quadrivalvibus.
 Mimosa undique aculeata, caule angulato, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque ternis. Roy. lagdb. 471.
 Mimosa herbacea procumbens ac spinosa, caule quadrangulo, filiquis quadrivalvibus. Houst. mss. fig. bon. Amm. herb. 586.
 Habitat in Vera Cruce. 2
 Aculei recurvi, sparsi in caule, petiolis, pedunculis. Folia partialia utrinque terna foliolis plurimis. Pedunculi axillares, terminati Capitulo globoso.

37. MI-

37. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus viginti-^{tenuifolia.} jugatis: propriis multijugatis.

Acacia repens aculeata, flore albo, foliis omnium minimis. *Plum. spec.* 17.

Habitat in America calidiore.

Aculei recurvi in caule & Pedunculis communiter. Flores capitati, laterales, plures.

38. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quin-^{ceratonia.} que-jugatis: propriis tri-jugatis trinerviis.

Acacia repens aculeata, flore albo, foliis filiquæ. *Plum. spec.* 17.

Habitat in America calidiore.

Aculei recurvi in caule & petiolis. Pedunculi laterales, conferti. Flores capitati. Legumina obtusa, sutura aculeata.

39. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quin-^{tamarindifolia.} que-jugatis: propriis decem-jugatis, petiolis inermibus.

Acacia aculeata, flore albo, foliis tamarindi. *Plum. sp.* 17.

Habitat in America meridionali. h

Pedunculi ramosi. Flores spicati.

CISTUS. *av.* 442.

* *Exstipulata fruticosa.*

1. CISTUS arborefcens, foliis cordatis lævibus acuminatis petiolatis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 474. ^{populifolia.}

Cistus Ledon, foliis populi nigræ, major. *Bauh. pin.* 467.

Ledum latifolium 2. majus. *Clus. hist.* 1. p. 78.

β. Cistus Ledon, foliis populi nigræ, minor. *Bauh. pin.* 467.

Ledum latifolium 2 minus. *Clus. hist.* 1. p. 78.

Habitat in Lusitania. h

2. CISTUS arborefcens, foliis ovatis petiolatis trinerviis supra glabris: petiolis basi connatis. ^{laurifolia.} *Cal. 3 phyll. v. bib. o.*

Cistus Ledon, foliis laurinis. *Bauh. pin.* 467. ^{cap. 5 l. v. v. v.}

Ledon 1 latifolium. *Clus. hist.* 1. p. 77. ^{pubula alba basi unguis atamb.}

Habitat in Hispania. h

3. CISTUS arborefcens, foliis lanceolatis supra lævibus, petiolis basi coalitis vaginantibus. ^{ladanifera.} *Hort. cliff.* 205. ^{Ladon 1. dodi. clus}

Sauv. monsp. 147. 150. ^{editus ledanif. hisp. labry folio. flor. alb. munda. munda. in signa. l. 260.}

Cistus ladanifera hispanica incana. *Bauh. pin.* 467. ^{alta. hisp}

Cistus Ledon 1. angustifolius. *Clus. hist.* 1. p. 77. ^{sata}

Habitat in Hispaniæ, Lusitaniæ collibus. h

Flores umbellati. Folia crispa, utrinque acuta. *Sauv.*

4. CI-

*Cistus mas maj. folio retundiore. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. foliis subrotundis. viti
 1. longioribus & latioribus nervis longis & carentibus. 2. foliis ovalibus alt. petiolo brevi insid. compressis
 3. calice 4. lobulato acuto. corolla 1. brevior. 2. stylis longis. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

• incana.

4. CISTUS arborescens, foliis sessilibus utrinque villosis rugosis: inferioribus ovatis basi connatis; summis lanceolatis. *Hort. cliff. 205. Hort. ups. 143. Roy. lugdb. 475. Cistus mas 2. folio longiore. 18.*
 Cistus mas angustifolius. *Bauh. pin. 464.*
 Cistus mas 2. *Clus. hist. 1. p. 69.*
 Habitat in Hispania, G. Narbonensi. †

• monspeliensis.

*both. caly
 Ledum } matth.
 Ladannum }
 Lada } cordi.
 Ladon }
 Ladannum loni
 Ledon gem
 Ladon. Dier
 Ladon. Nier.*

5. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis sessilibus utrinque villosis trinerviis, alis nudis. *Hort. cliff. 205. Hort. ups. 144. Roy. lugdb. 1475. Sauv. monsp. 147.*
 Cistus ladanifera monspeliensium. *Bauh. pin. 467.*
 Ledum. *Dalech. hist. 230.*
 β. Cistus Ledon foliis oleæ, sed angustioribus. *Bauh. pin. 467.*
 Ledon 5. *Clus. hist. 1. p. 79.*
 Habitat in Narbonensi & Regno Valentino. †

• albida.

+ *Cistus. matth. gaud.
 Kisos. Dier
 Kisos
 u. 266 apud*

6. CISTUS arborescens, foliis oblongis tomentosis incanis sessilibus supra aveniis, alis nudis. *Sauv. monsp. 150.*
 Cistus mas, folio oblongo incano. *Bauh. pin. 464.*
 Cistus mas 1. *Clus. hist. 1. p. 68.*
 Cistus mas 4. monspeliensis, folio oblongo albido. *Bauh. hist. 2. p. 3.*
 Habitat in G. Narbonensi, Hispania. †

• Salvifolia.

+

7. CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis utrinque hirsutis, alis nudis. *Hort. cliff. 205. Roy. lugdb. 475. Sauv. monsp. 150.*
 Cistus femina, folio salviæ. *Bauh. pin. 464.*
 Cistus femina. *Clus. hist. 1. p. 60.*
 Habitat in Italia, Sicilia, Narbona. †
 Pedunculi uniflori, diphylli. Corollæ albæ. *D. Sauv.*

*in pulacæ.
 Cistus. 20
 Cistispa.*

+

8. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis hirsutis repandis, alis nudis. *Hort. cliff. 206. Roy. lugdb. 475. Sauv. Monsp. 147. Cistus mas folio undulato et rugoso. 259.*
 Cistus mas, foliis chamædryos. *Bauh. pin. 464.*
 Cistus mas 5. *Clus. hist. 1. p. 69.*
 Habitat in Lusitania. † *3. fol. latis undul. pp. rugis. viti. 2. long. 3. lat. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*
 Ramuli, pedunculi & calyces tenui lana adpersi.

• balniifolia.

9. CISTUS arborescens, alis nudis, foliolis duobus calycinis linearibus. *Hort. cliff. 205. Roy. lugdb. 475. Sauv. monsp. 147.*
 Cistus femina, portulacæ marinæ folio latiore obtuso. *Bauh. pin. 465.*
 Cistus

POLYANDRIA MONOGYNIA. 525

Cistus folio halimi 1. *Clus. hist. 1. p. 71.*

β. Cistus femina, portulacæ marinæ folio angustiore mucronato. *Bauh. pin. 465.*

Cistus halimi folio 2. *Clus. hist. 1. p. 71.*

Habitat in Lusitanix maritimis. h

* *Exstipulatæ, suffruticosæ.*

10. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis, floribus umbellatis. *ispula. ad*

Cistus foliis linearibus non stipulatis, caule florali umbellato lignoso. *Guett. stamp. 2. p. 180. Dalib. paris. 158.*

Cistus Ledon foliis thymi. *Bauh. pin. 467.*

Ledon X. *Clus. hist. 1. p. 81.*

Habitat in Gallia, Hispania. h

11. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis alternis linearibus, pedunculis unifloris. *Sumana. Gu. ad*

Cistus caule procumbente, foliis alternis. *Fl. suec. 435. Guett. stamp. 157.*

Cistus fruticosus procumbens, foliis aciformibus nudis. *Sauv. monsp. 45.*

Helianthemum foliis linearibus sæpius alternis non stipulatis, pedunculis unifloris, caule lignoso. *Guett. stamp. 2. p. 18.*

Chamaecistus, ericæ folio, luteus elatior. *Bauh. pin. 466.*

Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, luteo flore. *Bauh. hist. 2. p. 18.*

β. Cistus fruticosus procumbens, foliis aciformibus nudis, floribus auriculatis. *Sauv. monsp. 46.*

Chamaecistus, ericæ folio, luteus humilior. *Bauh. pin. 466.*

Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum sparsum. *Bauh. hist. 2. p. 18.*

Habitat in Gallia, Gotlandia, Helvetia. h

Corolla calyce vix major est.

12. CISTUS suffruticosus exstipulatus procumbens, foliis oppositis villosis subtus tomentosis. *canus.*

Cistus foliis ovatis subtus incanis, alis nudis, caule procumbente. *Sauv. monsp. 148.*

Chamaecistus foliis myrti minoris incanis. *Bauh. pin. 466.*

Chamaecistus foliis myrti tarentinæ canis & cinereis. *Bauh. hist. 2. p. 18.*

Cha-

ChamaeCistus 3. *Clus. hist. 1. p. 74.*

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. 5

- X *marifolius.* 13. CISTUS suffruticosus exstipulatus, foliis oppositis ovatis petiolatis planis subtus tomentosis. Helianthemum luteum, thymi durioris folio. *Barr. rar. 521. t. 441.*
Habitat Massiliae. 5

- Oelandicus.* 14. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis, petalis emarginatis. Cistus caule procumbente, foliis oblongis utrinque glabris, stipulis nullis. *Fl. suec. 434. **
Habitat in rupibus apricis Oelandiae. 5

* *Exstipulatae, herbaceae.*

- Tuberaria ad.*
Tuberaria. 15. CISTUS exstipulatus perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentosis: caulinis glabris lanceolatis: summis alternis.

Cistus perennis, foliis humi appressis villosis; summis glabris. *Sauv. monsp. 149.*

Cistus folio plantaginis. *Bauh. pin. 465.*

Tuberaria nostras. *Bauh. hist. 2. p. 12.*

Tuberaria major. *Bauh. hist. 2. p. 12.*

Habitat in Galloprovincia, Hispania, Pisis. 2

Tuberaria ad.
Tuberaria.
curtatus.

16. CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis oppositis trinerviis, racemis ebracteatis.

Cistus annuus, foliis radicalibus oppositis lanceolatis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. *Sauv. monsp. 148.*

Cistus foliis oblongo-acuminatis non stipulatis, caule florali racemoso. *Guett. stamp. 2. p. 181. Dalib. paris. 158.*

Cistus flore pallido, punicante macula insignito. *Bauh. pin. 465.*

Helianthemum flore maculoso. *Col. ecphr. 2. p. 78. t. 77.*
Habitat in G. Narbonensi, Italia. 6

Racemi capillares omnino, absque ullis vel minimis bracteis.

- canadensis.* 17. CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis omnibus alternis lanceolatis, caule ascendente.

Habitat in Canada. Kalm. 2

Facies C. Helianthemis, sed Folia alterna.

* *Sti-*

* *Stipulatae, herbaceae.*

18. CISTUS herbaceus erectus glaber stipulatus floribus *ledifolius*. •
solitariis subsessilibus, folio ternato oppositis. Hort. *alythem 3gonum. Lob. Dalech*
ups. 144. Sauv. monsp. 178.
Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis, caule erecto.
Hort. cliff. 475.
Cistus ledi folio. *Baub. pin. 465.*
Cistus annuus, foliis ledi. *Lob. ic. 2. p. 118.*
Habitat Monspelii. ☉
19. CISTUS herbaceus patulus villosus stipulatus, floribus *salicifolius*. •
solitariis subsessilibus bractea triplici oppositis. Hort. *hydrophyllon. athen. ch*
ups. 144.
Cistus stipulis quaternis, foliis subovatis subtus tomentosis, caule procumbente. *Hort. cliff. 206.*
Cistus folio salicis. *Baub. pin. 465.*
Cistus annuus 1. *Clus. hist. 1. p. 76.*
Habitat in Lusitania, Hispania. ☉
20. CISTUS herbaceus erectus stipulatus, foliis lineari-*egyptiacus*. •
lanceolatis petiolatis, calycibus inflatis corolla majoribus.
Habitat in Aegypto. B. Jussieu. ☉
Conf. CystiCistus foliis inferioribus confertis, superioribus oppositis. *Burm. zeyl. 85. t. 36.*
- * *Stipulatae, suffruticosae.*
21. CISTUS suffruticosus procumbens stipulatus, foliis *surrejanus*.
ovato-oblongis subpilosis, petalis lanceolatis.
Helianthemum vulgare, petalis florum perangustis. *Dill.*
elth. 177. t. 145. f. 174.
Habitat in Angliæ comitatu Surrejano prope Croydon. ☽
28. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis inferioribus or-*nummulari-*
biculatis, superioribus ovatis. *us.*
Cistus humilis f. ChamæCistus nummulariæ folio.
Magn. monsp. 293.
Helianthemum ad nummulariam accedens. *Baub. hist. 2.*
p. 20.
Habitat Monspelii. ☽
23. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis oblongis, ca-*serpillifolius*. •
lycibus lævibus. *Sauv. monsp. 148.*
ChamæCistus repens serpillifolia lutea. *Baub. pin. 466.*
ChamæCistus serpylli folio nigricante & hirsuto, flore
aureo odorato. *Baub. hist. 2. p. 17.*

ChamæCistus 2. *Clus. hist. 1. p. 73.*
Habitat in Alpibus Austriæ, Stiria. h

• *thymifolius.* 24. CISTUS suffruticulosus stipulatus procumbens, foliis ovali-linearibus oppositis congestis. *Sauv. monsp. 148. †*

Helianthemum folio thymi incano. Bauh. hist. 2. p. 19.
ChamæCistus incanus, tragorigani folio, hispanicus. *Barr. rar. 512. t. 415.*

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. h

Helianthem. ad pelosus. chrysanthemis. lob

25. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis linearibus subtus bifulcatis incanis, calycibus lævibus. *Sauv. monsp. 147.*

ChamæCistus foliis thymi incanis. *Bauh. pin. 466.*

ChamæCistus 4. *Clus. hist. 1. p. 74.*

β. Cistus stipulis quaternis, foliis lineari-ovalibus incanis, calycibus tomentosis. *Sauv. monsp. 148.*

Helianthemum flore albo, folio angusto hirsuto. Bauh. hist. 2. p. 17.

γ. Cistus foliis villosis lanceolatis, axillis foliosis, stipulis subulatis. *Sauv. monsp. 148.*

Helianthemum f. Cistus humilis, folio sampfuci, capitulis valde hirsutis. Bauh. hist. 2. p. 20.

Habitat Monspeli. h

Hae tres α. β. γ. vel varietates vel valde affines: certiora determinant autoptæ.

Helianthem. av

26. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis.

Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis, caule procumbente. Hort. cliff. 206. Roy. lugdb. 476.

Fl. suec. 433. Helianthemum vulg. Fl. vicia. 2. dilution. 7.

ChamæCistus vulgaris, flore luteo. *Bauh. pin. 465. Læs. pruss. 43. t. 8.*

Flos solis, Panax chironium. Cam. epit. 501.

Habitat in Europæ pascuis siccis h

Petala suborbiculata, integerrima, flava, annulo receptaculum ambiente sæpius fulvo. Racemus ante florescentiam nutans. Folia pilis raris adspersa.

hirtus. 27. CISTUS suffruticosus stipulatus foliis ovatis, calycibus hispidis.

Cistus foliis oblongo-linearibus margine revolutis. Lemnier. Sauv. monsp. 148.

Helianthemum torismarini folio subtus incano. Bauh. pin. 467.

Heli-

Helianthemum, angusto serpilli folio, villosum, flore aureo, italicum. *Barr. rar.* 511. t. 488.

Ledon 8. *Clus. hist.* 1. p. 8.

Habitat in Hispania, Narbona. 5

28. CISTUS suffruticosus stipulatus erectus, foliis lance-olatis hirtis. *apenninus. Helianth*

Helianthemum album germanicum. *Tabern. icon.* 1062.

Helianthemum saxatile, foliis & caulibus incanis oblongis, floribus albis. *Mentz. pug.* 8. f. 3. *Dill. elth.* 170.

Habitat in Apenninis, Italiae montibus. 5

Cistorum historia maxime omnium obscura ob varietatum copiam, illustrabitur si determinant auctores in singulis

1. Caudicem arborescentem, fruticulosum, annuum s. perennem.

2. Caulem erectum s. decumbentem.

3. Folia opposita s. alterna: cum figura eorundem.

4. Stipulas s. nullas.

5. Pedunculum uniflorum, multiflorum: nudum s. bracteatum.

6. Petalorum figuram.

7. Capsulas sloculares s. 3valves.

8. Calycem aequalem s. inaequalem.

Corchorus. capsula linearis. tantis, foliis subcordatis (senti); infra } *Corchorus Brown p. 147.*

1. CORCHORUS capsulis linearibus compressis bivalvisiliquosus. *Hort. ups.* 147. *Corchorus. ad 382*

Corchoro affinis chamædryos folio, flore stamineo; seminibus atris quadrangulis duplici serie dispositis.

Sloan. jam. 50. *hist.* 1. p. 145. t. 94. f. 1. *Raj. suppl.* 516.

Habitat in Jamaica. ☉

2. CORCHORUS capsulis oblongis ventricosis, foliorum infimis ferraturis setaceis reflexis. *Fl. zeyl.* 213. *Hort. ups.* 147. *olitorius. Corchorus. Maluchi. Arab. Pers. Corchorus. Min Malochia alp*

Corchorus foliorum infimis ferraturis maximis reflexis. *Hort. cliff.* 209. *Roy. lugdb.* 478.

Corchorus plinii. *Bauh. pin.* 317.

Corchorus. *Cam. hort.* 47. t. 12.

β. Alcea cibaria s. Corchorus americana. *Pluk. alm.* 17. t. 127. f. 3.

γ. Alcea olitoria s. Corchorus americana. *Pluk. alm.* 17. t. 127. f. 4.

Habitat in Asia, Africa, America. ☉

3. CORCHORUS capsulis subrotundis depresso-rugocapsularis. *Fl. zeyl.* 214. *

POLYANDRIA MONOGYNIA

herba purgativa. Sull 178. 3 ped. Boerhaav. p. 1
fol. ovato-cordata. fl. umbell. ad 6. alt. 1/2 tam
lanceolata tuberculosa.

capitula geminata liliata
Tuga. Tacai f. 2. 19. fol. alt. alata 8. fl. rubra protuberante alata, ab 2 ped.
fl. purpurea. cal. ^{2.5} tubo long. 5. d. tubo long. 3. ad 6. dent. 1/2
200. Sull. 2 ped. ^{caerulea} ^{alta} ^{pauciflora} ^{et} ^{monochroma} ^{et} ^{longiflora}.

Leigueria. f. 2.

Lepida
Searna
Uffer
abus.
Poca

Corchorus foliorum infimis serraturis minoribus. Hort. cliff. 210. Roy. lugdb. 478.

Alcea olitoria f. Corchorus americanus, praelongis foliis, capsula striata subrotunda brevi. Pluk. alm. 18. t. 255. f. 4.

Habitat in India. ☉

Guazuma ^{hirsutus} ad 342.

4. CORCHORUS capsulis subrotundis lanatis, foliis ovatis obtusis tomentosis.

Corchorus americanus lanuginosus, folio chamædryos, siliqua tricapsulari lanuginosa & subsæpera. Breyn. prodr. 3. p. 56.

Guazuma frutex chamædryfolia, fructu lanuginoso, major & minor. Plum. gen. 36.

Habitat in America meridionali.

DIGYNIA.

PÆONIA.

Pæonia ad 454

• officinalis.

Παρορία. Diosc.

Pæonia feminea.

Saxifraga ^{Japan} ^{γλυκύδα}
Kawu ^{Japan} ^{γλυκύδα}
Humboldt ^{Japan} ^{γλυκύδα}

mascula,

Πευτόφορος. Min

1. Πευτόφορος.

aglaophotis ^{aliciæ} ^{centaur}

Protan ^{Japan}

Kamigwa

ratskongwa

Pisaxia ^{græc.} } *Pæonia* ^{fl. subty incans} ^{fl. alb. vel pallid.} ^{cf. Pl. 323.}

Pisphacia ^{belli} }

Pispheliida ^{Belon} ^{Canur.}

Polygonoides

1. PÆONIA. Hort. cliff. 212. Hort. ups. 149. Mat. med. 267. Sauv. monsp. 307.

a. Pæonia foliis difformiter lobatis. Hall. helv. 311.

Pæonia communis f. femina. Bauh. pin. 323.

Pæonia femina. Fuchs. hist. 202. Lob. ic. 602.

β. Pæonia foliis lobatis ex ovato-lanceolatis. Hall. helv. 311.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. Bauh. pin. 323.

Pæonia mas. Lob. ic. 684.

Habitat in Nemoribus montium Idæ, Helvetiæ. 2

Limites inter species non reperi, hinc conjunxi.

CALLIGONUM. ad 262.

1. CALLIGONUM. Hort. cliff. 212. Polygonoides orientale, ephedræ facie. Tournef. cor. 47. itin. 3. p. 214. t. 214.

Habitat in monte Ararat. 5

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. ad 457

* Unicapsulares.

Delphinium ad 457

• Consolida.

Delphinium ^{Dos}

Onicium ^{galid.}

Evanthemum ^{Fuchs.} ^{Dalser}

1. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule subdivi- so. Hort. cliff. 217. Fl. suec. 440. Mat. med. 268. Roy. lugdb. 482. Dalib. paris. 158.

Con-

POLYANDRIA TRIGYNIA.

chamaemelum Eranthum. Fisch. Dalech. C.B.

Consolida regalis arvensis. *Baub. pin. 142.*

Consolida regalis. *Cam. epit. 521.*

Habitat in agris Europæ restibilibus. ☉

2. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule simplici.

Hort. cliff. 213. Hort. ups. 150. Roy. lugdb. 482.

Consolida regalis hortensis, flore majore & simplici.

Baub. pin. 142.

Consolida regalis hortensis, flore minore. *Baub. pin. 142.*

Consolida regalis flore majore & multiplici. *Baub. pin.*

142. Delphinium hortense fl. majore et nectariis caeruleis 16426.

Flos regius. *Dod. pempt. 353.*

Habitat - - - ☉ *et Staphis*

Delphinium - ad.

Ajacis. • Dod. 457.

Delphinium. Dod. gal

consolida regalis. matth

flos regius. Dod

flos capucio. etruscis. calaly

Calceoppa. cordi

ac

peregrinum. 2700.

3. DILPHINIUM nectariis diphyllis, capsulis solitariis,

foliis multipartitis obtusis. *Hort. cliff. 213.*

Consolida regalis latifolia, parvo flore. *Baub. pin. 142.*

prodr. 74. t. 74. Moris. hist. 3. p. 466. f. 12. t. 4. f. 3.

Habitat in Italia, Sicilia, Melita.

* *Tricapulares*

4. DELPHINIUM nectariis diphyllis labellis integris, flo-

ribus subsolitariis, foliis compositis lineari-multiparti-

tis. *Hort. ups. 150. **

Delphinium lusitanicum glabrum, aconiti folio. *Ratof.*

hort. 61. t. 3.

Delphinium elatius subincanum perenne, floribus amplis

azureis. *Amm. ruth. 175.*

Habitat in Sibiria. 2

grandiflo. Staphis

rum. agris. ad

5. DELPHINIUM nectariis diphyllis: labellis bifidis a-

pice barbatis, foliis incis; caule erecto. *Hort. ups.*

*151. **

Delphinium nectariis diphyllis, foliis peltatis multiparti-

tis acutis. *Hort. cliff. 213.*

Aconitum cæruleum hirsutum, flore consolidæ regalis.

Baub. pin. 131.

Aconitum lycoctonum, flore delphini filifaci. *Clas.*

hist. 2. p. 94.

Habitat in Sibiria. 2 *helont. hall. 1201.*

elatium. • Staphis

ad

6. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palmatis:

lobis integris. *Hort. cliff. 213. Hort. ups. 150. Mat.*

med. 269. Roy. lugdb. 482. Sauv. monsp. 214.

Staphisagria. *Baub. pin. 324. Dod. pempt. 366.*

Habitat in Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta:

Galloprovincia. 3

L 1 2

ACO =

Staphisagria ad 457

Staphisagria. Ray. fuchs. mult

Staphis agria. dim. +

staphis } Plin

staphis }

ϕλειπόκρον } Graec. ve

ϕληροκρον }

Staphisagria. Cord

*aconitum theophr. Lg. c. 16. Radix montana ex loco aconis ab' nasuta pinguis
licet alio melleo, non habet folia et fructus in nova co. tunc pum
pudenter pcora hujusmodi sic pcora hujusmodi induit pcora
hoc 2 metri, alia 3 metri. 4a. 7 annis 5a. 2 anni elapsi
interimunt qui sub intermunt non patitur, qui vix de
tabacant et languent, nullum remedium contra d. venenum.*

POLYANDRIA TRIGYNIA.

ACONITUM. ad 457

aconitum ad 457

lycoctonum.

Lupinus Trag

Cor. 2. put.

1. ACONITUM foliis palmatis multifidis villosis.
Aconitum foliis peltatis multifidis, petalo supremo cylindraceo. *Fl. lapp. 211. Hort. cliff. 213. Fl. suec. 441. Roy. lugdb. 482. Hall. helv. 312.*
Aconitum lycoctonum luteum. *Bauh. pin. 183.*
Aconitum lycoctonum, flore luteo. *Beisl. eyst. est. 25. f. 2.*
Aconitum II. *Cam. epit. 827.*
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Austriæ, Italiæ. &

variegatum. 2. ACONITUM foliis mutifidis: laciniis semipartitis: *Thora. chy. caenar* superne latis. *Hort. cliff. 214. Hort. ups. 151. Roy. lugdb. 482.*
Aconitum cæruleum minus. f. Napellus minor. *Bauh. pin. 183.*
Aconitum cæruleum parvum. *Dod. pempt. 441. Dalech. hist. 1743.*
Habitat in Italiæ, Bohemiæ montibus. &

Napellus

*aconitum Gal. Dod
ασπιτόν. Diosc.*

ACONITUM foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff. 214. Fl. suec. 442. Gron. virg. 165. Hall. helv. 312. Roy. lugdb. 483. Act. stockb. 1739. p. 41. t. 2.*
Aconitum cæruleum f. Napellus I. *Bauh. pin. 183.*
Napellus verus. *Lob. hist. 387.*
Habitat in Helvetia, Bavaria, Gallia. &

pyrenaicum. 4. ACONITUM foliis multipartitis: laciniis linearibus incumbentibus squarrosis. *Hort. ups. 152. **
Aconitum pyrenaicum luteum, foliorum segmentis sibi invicem incumbentibus. *Raj. europ. 367.*
Habitat in Sibiria, Tataria, Pyrenæis. &

Anthora. 5. ACONITUM floribus pentagynis. *antiφλοπά. avicem*
Aconitum foliorum laciniis linearibus distinctis ubique ejusdem latitudinis. *Hort. cliff. 214. Hort. ups. 152. Mat. med. 270. Hall. helv. 313. Roy. lugdb. 483.*
Aconitum salutiferum f. Anthora. *Bauh. pin. 184.*
Anthora f. Antithora. *Cam. epit. 837.*
Habitat in Alpibus Pyrenæis, Helveticis, Taurinis, Allobrogicis. &

Taurinum. Helv. hall. 1198 fl. maj. conul. muenster.

TE

TETRAGYNIA.

TETRACERA. ad 249.

1. TETRACERA. Hort. cliff. 214. * volubilis.

Petræa floribus spicatis, scabris lauri foliis. Amm. herb. 581.

Fagus americanus, ulmi amplissimis foliis, capsulis bigemellis. Pluk. amalt. 87.

Arbor americana convolvulacea platyphyllos barbadosibus dicta, foliis ferratis. Pluk. alm. 48. t. 146. f. 1.

Habitat in Barbados, Vera Cruce, Marilandia. 5

PENTAGYNIA

AQUILEGIA. ad 457

1. AQUILEGIA nectariis incurvis. Hort. upf. 152. Mat. vulgaris. med. 272. aquilegia vulgaris

Aquilegia. Hort. cliff. 215. Roy. lugdb. 482. Dalib. paris. 160. aquilina matth.

Aquilegia sylvestris. Baub. pin. 144. Potth. vater. Cortaco

B. Aquilegia hortensis simplex. Baub. pin. 144. Parione. Theoph. Casp.

γ. Aquilegia hortensis multiplex, flore magno C. B. 144. Hippocras. Diosc. Col

δ. Aquilegia hortensis multiplex, flore inverlo. C. B. 144. Tord. flo. Dalech

ε. Aquilegia flore roseo multiplici. C. B. 144. Colub. line. g. h. d. g. n.

ζ. Aquilegia degener virescens. Baub. pin. 144.

Habitat in Europæ nemoribus saxosis. 4

2. AQUILEGIA nectariis rectis petalo lanceolato brevioribus. alpina. aquilegia ad 457.

Aquilegia montata, magno flore. Baub. pin. 144. prodr. 75. Burs. VII: 108. Baub. hist. 3. p. 484. Raj. hist. 707. Cortostoma g. n.

Habitat in Helvetia. 3 d. Biblioth. hall. 1196.

Folia duplicato-ternata, parva: foliolis multifidis: lobis sublinearibus, obtusis, facie & teneritudine sequentis; Nectarii cornicula erectiuscula, brevia, petalis dimidio breviora. Petala lanceolata, longissima.

3. AQUILEGIA nectariis rectis, staminibus corolla longioribus. Hort. upf. 153. canadensis.

Aquilegia corolla simplici, nectariis fere rectis. Gron. virg. 59.

Aquilegia pumila præcox canadensis. Corn. canad. 60. t. 60. Lob. ic. 26.

Aquilegia præcox canadensis, flore externe rubicundo medio luteo. *Moris. hist. 3. p. 457. f. 12. t. 2. f. 4.*
Habitat in Virginia, Canada. 2

NIGELLA.

* *Pentagynæ.*

• *damascena.* 1. NIGELLA floribus involucro folioso cinctis. *Hort. cliff. 215. Hort. ups. 153. Roy. lugdb. 481.*
Nigella angustifolia, flore majore simplici cæruleo. *Baub. pin. 145.*
Melanthium sylvestre. *Matth. diosc. 529.*

• *Sung. ægypt. clb.* 2. Nigella flore majore pleno cæruleo. *Baub. pin. 145.*
Habitat inter segetes Europæ australis. ☉

• *lativa.* 2. NIGELLA petalis subtricuspidatis foliis subpilosis. *Hort. ups. 154. Mat. med. 271. Bœhm. lips. 173.*
gith. Nica. 1. gith. 3. præc. Curu. Nigella flore minore simplici candido. *Baub. pin. 145.*
2. gith. cu. nonu. Lycub. M. 435. Melanthium fativum. *Cam. epit. 551.*
Nigella flore minore pleno & albo. *Baub. pin. 146.*
Habitat in Ægypto, Creta. ☉

• *arvensis.* 3. NIGELLA pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. *Nigella flore foliis nudo, pistillis corollam æquantibus. Hort. cliff. 215. Roy. lugdb. 481. Hall. helv. 316. Dalib. paris. 160. Bœhm. lips. 174.*
Melanthium 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
malay pennum Nigella arvensis cornuta. *Baub. pin. 145.*
Melanthium sylvestre alterum. *Cam. epit. 553.*
Habitat in Germaniæ, Galliæ, Italiæ agris. ☉
Hujus Capsula inferne angustior, præcedentis inferne ventricosior, superne utraque contra.

* *Decagynæ.*

• *hispanica.* 4. NIGELLA pistillis denis corollam æquantibus. *Hort. ups. 154. Sauv. monsp. 253.*
Nigella latifolia, flore majore simplici cæruleo. *Baub. pin. 145. prodr. 75. Moris. hist. 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 8.*
Habitat in Hispania, Monspeli. ☉

• *orientalis.* 5. NIGELLA pistillis denis corolla longioribus. *Hort. cliff. 215. Hort. ups. 153. Roy. lugdb. 481.*
Nigella chalepensis lutea, corniculis longioribus. Moris. hist. 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 10. Raj. app. 525.
Habitat circum Alepum. ☉

• *ovarium 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.*

Arboribus... folio laurino, flore narcissino, lumine...
capitulis octonis...
arb. laurini magni...
535

POLYANDRIA HEXAGYNIA.

HEXAGYNIA

STRATIOTES

1. STRATIOTES foliis ensiformi-triangularis ciliato-
culeatis.

Stratiotes. Fl. lapp. 222. Fl. suec. 444. Hort. cliff. 221.
Roy. lugdb. 10. Gort. gelr. 313.
Stratiotes militaris aizoides. Lob. hist. 904.
Aloë palustris. Bauh. pin. 286.
Habitat in Europæ septentrionalis aquis pigris. 4

2. STRATIOTES foliis cordatis. Fl. zeyl 223.

Oel-ambel. Rheed. mal. 11. p. 95. t. 46.
Habitat in India. 4

POLYGYNIA

DILLENIA

1. DILLENIA. Hort. cliff. 221.
Syalita. Rheed. mal. 3. p. 39. t. 38. 39.
Habitat in Malabar. 5

LIRIODENDRON

1. LIRIODENDRON. Hort. cliff. 223. Hort. ups. 154. Tulipifera.
Gron. virg. 60. Roy. lugdb. 494.

Tulipifera arbor virginiana. Herm. lugdb. 612. t. 613.
Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio: media laci-
nia velut abscissa. Pluk. alm. 379. t. 117. f. 5. & t.
248. f. 7. Catesb. car. 1. p. 48. t. 48.

β. Tulipifera caroliniana, foliis productioribus magis an-
gulosis. Pluk. alm. 379. t. 68. f. 3.
Habitat in America septentrionali. 5

MAGNOLIA

1. MAGNOLIA.
Magnolia foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 222. Gron.
virg. 61. Roy. lugdb. 493.

a. Magnolia foliis ovato-lanceolatis subtus glaucis. Anon. glauca.
Magnolia lauri folio subtus albicante. Catesb. car 1. p.
39. t. 39. Dill. elth. 207. t. 168. f. 205.

Tulipifera virginiana, laurinis foliis averfa parte rore
æruleo cinctis, conibaccifera. Pluk. alm. 379. t. 68.
f. 4. 4

? Sivi empesi...
Lau

arb. corali magnitud. ramis tortuosis...
fil. alt. inepili. fl. aprili ante folia...
Zulipia vel Sivi alt. magnitud. petalis...
ob ovario tubum. crassi vel comidi. stem. ovum. longa.

S Kimmi Japan
Sone
Sanna S Minni
Sanna S Kita
S Kimmi ad
364
335
Aldides. Pusch
Stratioty. gal. 30. 66
Stratioty ad.
76

Alismoides.
ottel ambel. Am.
Syalita mal. ad
364
indica.

ad.
ad. 364
truncata ad.

virginiana. fl. fr.
Sivi Japan
Carfeli
Koby. vulgo
Sidi Kobeli
Moke fitgwa
Kitingwa
Tokurangwa

Malaguianicia qua totius mundi poma superat. B. Pin. 433
mala americana Syriacae. B. Pin. 434

Pinas. p. 8. Ind. occid.
Nicaraguae } Balesh
Bantoni }
micaraguae }

POLYANDRIA POLYGYNIA. 537

Cotoneum ablatum. Rami alb. cito junctis viti. sub pubelli parte nuda
Sedibus p. hinc? fundit ligna canalibus. caulis articulis. fol. autem plic. sordat.
Anona indica latifolia, fructu squamoso aspero. Pluk.
alm. 31. t. 134. f. 2. *forma impressa.*

Anona indica fructu conoide viridi squamis veluti aculeato. Pluk. alm. 32. t. 135. f. 2.

Anona maxima, foliis latis splendentibus, fructu maximo viridi conoide: tuberculis s. spinnulis innocentibus aspero. Sloan. jam. 203. hist. 2. p. 196. t. 225.

Anona. Comm. hort. 1. p. 133. t. 69.

Guanabanus fructu e viridi lutescente molliter aculeato. *Carosol. comua. Kaireu*
Plum. gen. 43. f. 2. 29. atamaram h. m. 3. 2. 29. inter tubercula. laev. nitid. B. Pin. 434

Habitat in America calidiora. *20 ped. fol. ovatae aut. detri. lata. fl. plit.*
fruct. glob. velut squamosus. virid. aut. inter alba molli carne eduli / uand. lino. 20 / carosol.

2. ANNONA foliis oblongis, fructibus obtuse subsquamatis. *gualanensis. Ind. occid.*

Anona foliis odoratis minoribus, fructu conoide squamoso parvo dulci. Sloan. jam. 205. hist. 2. p. 168. t. 227. Raj. dendr. 77. *fructus squamosus obtusior / velut utiq.*

Habitat in America meridionali. *oblongis. B. Pin. 511.*

3. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus ovatis reticulato-areolatis. *reticulata.*

Anona maxima foliis oblongis angustis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro in areolas angulares distincto. Sloan. jam. 264. hist. 2. p. 167. t. 226.

Catesb. car. 2. p. 62. t. 62. Raj. dendr. 77. inuram h. m. 3. 2. 30. 31.
Habitat in America meridionali. *ann.*

4. ANNONA foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoi glabris.

Anona maxima, foliis latis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro. Catesb. car. 2. p. 64. t. 64.

Habitat in Carolina. *h*

5. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus trifidis. *arimina. ad.*

Anona fructu lutescente levi serotum arietis referente. *triloba. fl. fr.*
Catesb. car. 2. p. 85. t. 85. *arimina.*

Habitat in Carolina. *h*

6. ANNONA foliis lanceolatis glabris nitidis secundum nervos fulcatis. *asiatica.*

Hort. cliff. 222. * Fl. zeyl. 225. Roy. lugdb. 494. *anon. ovial*
Annona sylvestris. Burm. zeyl. 21. *anona. ad*

Habitat in Zeylona. *h*

7. ANNONA foliis lanceolatis pubescentibus. Hort. cliff. africana. 222. Roy. lugdb. 494.

Habitat in Aethiopia. *h*

anona fr. p. p. Plum. 5. ped. totus pubes. fl. umbellata nuda crassi
fructus plati. LIS ANE } *ambrosia*

anona marum. h. m. 2. 2. 30. et 31.
24. arbor. 20 ped. fol. uti 1. ad angustiora.
flor. p. nati. et 10.
fructus. glob. laev. aut. hyacinthini. coloris
synonymis fructus alter nos. h. m. B. Pin. 439

anona marum h. m.
} *anona*
} *gualanensis* } *cent.*
} *manoum h. m.*

Malagui anentia qua totius mundi poma superat. B. Pin. 433 — } Pinas. part. 8. ad. occid.
mala americana Syriacis. B. Pin. 434 } Nicarague. } Babia
} Pantoni. }
} micarague.

POLYANDRIA POLYGYNIA.

- ^{Cotoneum plant. Linn. alt. cit.}
^{Solidus (Pin. B. Pin. 433) fundit. (Pin. B. Pin. 434)}
1. Anona indica latifolia,
alm. 31. t. 134. f.
Anona indica fructu
culeato. Pluk. alm.
Anona maxima, foli
ximo viridi conoide
tibus aspero. Sloan.
Anona. Comm. hort.
Guanabanus fructu e vi
Plum. gen. 43. f. 100.
Habitat in America co
puit. glo. v. lat. (Guatemala)
2. ANNONA foliis obl
matis.
Anona foliis odoratis
mofo parvo dulci. S
t. 227. Raj. dendr. 7
Habitat in America m
3. ANNONA foliis lan
lato-areolatis.
Anona maxima foliis
mo luteo conolde:
res distincto. Sloan. f
Catesb. car. 2. p. 62.
Habitat in America m
4. ANNONA foliis lan
dibus glabris.
Anona maxima, foliis
noide: cortice glabro
Habitat in Carolina, t
5. ANNONA foliis lan
Anona fructu lutescer
Catesb. car. 2. p. 8.
Habitat in Carolina, t
^{f. 100. plant. alt. Cit. Linn. alt. cit.}
6. ANNONA foliis lan
nervos fulcatis. Hor
Roy. lugdb. 494.
Annona sylvestris. B
Habitat in Zeylona.
7. ANNONA foliis lan
222. Roy. lugdb. 4
Habitat in Aethiopia.
^{anona fr. pinna Plum. 5. p. 1}
^{f. 100. plant. alt. cit.}

agavaria guinea. Marg. 55. alt. cit. cortice vobul. pinna. Eua novna. lugdb. 494. ?
Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433. Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433.
Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433. Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433.
Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433. Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433.
Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433. Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433.
Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433. Anona maxima. Carib. acene in herb. pinna. B. Pin. 433.

nosol. comau. Raica
na. (car. nitid.)
lata. fl. plit.
naulino v. lita / aurose
anosa.
anona ad
iculata.
rona. ad
3 2 30 31
bra.
rimina. ad.
iloba. fl. fr
rimina
atica.
non. ovia
nuna. ad
ricana.
licana

anona marian. h. m. 2. 2. 30 et 31.
24. arbor. 20 pd. fol. uti 1. ad angustina.
flor. p. 10. et 11.
Retic. glab. lacer. aut. hyacinthinis coloris
Synonymis fructu alt. nov. h. p. B. Pin. 439 } anona }
} guanavaro } aert.
} mansuetibona }

POLYANDRIA POLYGYNIA. 537

- Contenitum ab Anon. Rami aut eae junctis vid. sub rubell. parte annua
Petidus An. Anon. (und sub) ligni canalibus caulis articulis, foliis amplexat. p. 134.*
- 1. Anona indica latifolia, f
alm. 31. t. 134. f. 2.
- 2. Anona indica fructu co
culeato. Pluk. alm. 3
- 3. Anona maxima, foliis
ximo viridi conoide:
tibus aspero. Sloan. ja
- 4. Anona. Comm. hort. 1.
- 5. Guanabanus fructu e viri
Plum. gen. 43. f. 104. p. 1
- Habitat in America cal
fructu glo. valde ignominis.*
- 6. ANNONA foliis oblo
matis.
- 7. Anona foliis odoratis m
mofo parvo dulci. Sl
t. 227. Raj. dendr. 7
- Habitat in America me*
- 8. ANNONA foliis lanc
lato-areolatis.
- 9. Anona maxima foliis o
mo luteo conoide: c
res distincto. Sloan. ja
Catesb. car. 2 p. 62.
- Habitat in America me*
- 10. ANNONA foliis lanc
dibus glabris.
- 11. Anona maxima, foliis l
noide: cortice glabro.
Habitat in Carolina, 5
- 12. ANNONA foliis lanc
Anona fructu lutescen
Catesb. car. 2. p. 85
- Habitat in Carolina, 5
fructus plani uti Alida. rami alt. 10 ft.*
- 13. ANNONA foliis lan
nervos sulcatis. Hor
Roy. lugdb. 494.
- 14. Annona sylvestris, B
Habitat in Zeylona.
- 15. ANNONA foliis lan
222. Roy. lugdb. 4
- Habitat in Aethiopia.
Anona fructus Plum. 5. p. 1
fructus plani.*

I ~~...~~ plantae...
 2. Anona indica fructu co
 5. Guanabanus fructu e viri
 6. ANNONA foliis oblo
 8. ANNONA foliis lanc
 10. ANNONA foliis lanc
 12. ANNONA foliis lanc
 13. ANNONA foliis lan
 15. ANNONA foliis lan

Anona indica
 Anona maxima
 Guanabanus
 Annona foliis odoratis
 Annona foliis lato-areolatis
 Annona foliis glabris
 Annona foliis lutescentibus
 Annona foliis nervos sulcatis
 Annona sylvestris
 Annona foliis lan...
 Annona foliis lan...

*Annona manava. h. m. 2. l. 30 et 31.
 2. arb. 20 pd. fol. uti l. ad angustina.
 flor. picante. et l. m.
 fructus. glo. laev. cutis hyacinthinis coloris
 Annona fructus alter nos. h. p. B. Pin. 439*

{ Pomada canelle } guarabany fusta amara et in illam qualem. Murr. Mendo. 2. 3. 14.
 { Cochimari } guarabany fusta turbinata, in dno latus. Murr.
 { Batil consol. } guarabany fusta videtur subulata. Murr.
 Coriol. Ranc. 538

POLYANDRIA POLYGYNIA.

260 πυρον. Dm. contra rabium & scorpionum & et hominibus valet. (Gratol.) Murr. 2m

ANEMONE.

I. Gen. *Hepatica*, gal. Bruist. Dm.
 * *Hepaticæ flore calycato.*
 1. ANEMONE foliis trilobis integerrimis.
Hepatica. Hort. cliff. 223. Fl. suec. 445. Hort. ups. 155. Mat. med. 277. Gron. virg. 61. Roy. lugdb. 487.
Trifolium hepaticum, flore simplici & pleno. Bauh. pin. 339.
Habitat in Europæ nemoribus lapidosis. 2

2. Gen. *palmata.*
 2. ANEMONE calyce hexaphyllo colorato.
Pulsatilla foliis palmatis. Hort. cliff. 224. Roy. lugdb. 487.
Anemone, cyclaminis f. malvæ folio, lutea. Bauh. pin. 173. Moris. hist. 2. p. 425. f. 4. t. 25. f. 3.
Anemone horrensis latifolia i. Clus. hist. 1. p. 248.
Habitat in Lusitania ad Tagum. 2
Calyx sexpartitus, integerrimus, villosus, coloratus, nec a flore remotus, conjungit Anemones T. & Hepaticas. D.

3. Gen. *Pulsatilla ad patens.*
 * *Pulsatillæ pedunculo involuocrato, seminibus lanatis.*
 3. ANEMONE pedunculo involuocrato, foliis digitatis multifidis.
Pulsatilla folio anemones secundæ f. subrotundo. Bauh. pin. 94. prodr. 94.
Pulsatilla polyanthos violacea, anemones folio, Breyn. cent. 132. Helw. puls. 52. t. 2. 3.
Pulsatilla, anemones folio dissecto, lanuginosa, flore majore dilute luteo patente. Amm. ruth. 104.
Habitat in Tobolsko Sibiria, Lusatia inferiore. 2
Folia radicalia ternato-digitata: Foliolis sessilibus, laciniatis, acuminatis: Foliolo intermedio tripartito; lateralibus bipartitis. Scapus uniflorus, foliis brevior.
Involucrum remotum, villosum. Corolla alba, subtus villosa. Stamina lutea.

4. Gen. *vernalis.*
 4. ANEMONE pedunculo involuocrato; foliis pinnatis, flore erecto.
Pulsatilla foliis simpliciter pinnatis: foliolis lobatis, flore erecto. Fl. suec. 448.
Pulsatilla involuocrato piloso nitido. Fl. lapp. 223.
Pulsatilla, apii folio, vernalis, flore majore. Bauh. pin. 177. prodr. 94. Helw. puls. 63. t. 9.
 5. *Pulsatilla, apii folio, vernalis, flore minore. Bauh. pin. 177. prodr. 94. Helw. puls. 64. t. 10.*

Pul-

POLYANDRIA POLYGYNIA. 539

2. Pulsatilla lutea, apii hortensis folio. Baub. pin. 177.
Hall. helv. - - t. 6. *hall. 1147.*

Habitat in Sueciæ, Helvetiæ sylvis sterilissimis. 4 *Pulsatilla ad 460.*

5. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis rectis, fo- Pulsatilla. *Bruss. herb.*

liis bipinnatis. *herbariis? herb. Sav. 30.*
Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore nutante: lim- *Nepesina. Pagan.*
bo erecto. Hort. cliff. 223. Fl. suec. 446. Mat. med. 276. Roy. lugdb. 487. Dalib. paris. 160. Sauv. monsp. 254.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore. Baub. pin. 177.
Helw. puls. 62. t. 8.

Pulsatilla. Cam. epit. 398. *hall. 1146.*
Habitat in campis sylvestribus exaridis, collibusque apri- *Helvetia d. Nibelis*
cis Europæ borealis. 4 *Pulsatilla ad*

6. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis apice re- pratenfis. *D. gen. pharon. Men.*
flexis, foliis bipinnatis.

Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore pendulo: lim-
bo reflexo. Hort. cliff. 223. * Fl. suec. 447. Roy. lugdb. 487. Sauv. monsp. 254.

Pulsatilla flore minore nigricante. Baub. pin. 177. Helw. puls. 66. t. 12.

Pulsatilla vulgaris, saturatiore flore. Clus. hist. 1. p. 246.

Pulsatilla flore clauso obsoleto: petalis reflexis. Helw. puls. 65. t. II.

Habitat in Scania, Germaniæ campis pratensibus apri-
cis aridis. 4

* Anemones caule folioso, seminibus caudatis.

7. ANEMONE foliis radicalibus ternato-decompositis, *anemone ad 460.*
involucro folioso. *coronaria. Gram. anemone. Dier. 68.*

Pulsatilla foliis decompositis ternatis. Hort. cliff. 223.
Hort. zps. 155. Roy. lugdb. 487.

Anemone tenuifolia, simplici flore. Baub. pin. 174. 2.
2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

β. Anemone tenuifolia multiplex rubra. Baub. pin. 176.
Anemone. Cam. epit. 386.

Habitat in Oriente, Constantinopoli allata. 4 *anemone ad 460.*

8. ANEMONE foliis caulinis ternis connatis suprade- alpina.
compositis multifidis, seminibus hirsutis caudatis.

Anemone tubis caudatis, foliis omnibus duplicato-pin-
natis: pinnulis remotis. Hall. helv. 331.

Anemone sylvestris 2. Clus. hist. 1. p. 245.

Pulsatilla flore albo. Baub. pin. 177. Lob. ic. 282.

β Anemone alpina alba major. Baub. pin. 176. prodr. *γ. A-*
94. Burs. IX. 80. *hall. 1149.*

7. Anemone alpina alba minor. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 194. *Burs. IX:* 81.

Habitat in Alpibus Styriacis, Helveticis. &

Confer: Pulsatilla lutea, pastinaca sylvestris folio. C.B. 177. quæ vix videtur ab hac diversa.

• hortensis.

anemone ad

9. ANEMONE foliis digitatis.

Pulsatilla foliis digitatis. Hort. cliff. 224.

Anemone, geranii rotundo folio, purpurascens. Bauh. pin. 173.

Anemone hortensis latifolia 3. Clus. hist. 1. p. 249.

Anemone 1. Dod. pempt. 434.

Habitat ad Rhenum & in Italia. &

* Anemonoide flore nudo, seminibus ecaudatis.

• sylvestris.

anemone ad

10. ANEMONE pedunculo nudo, seminibus subrotundis hirsutis.

Anemone seminibus hirsutis. It. oel. 112. *Fl. suec.* 449.

Anemone seminibus seta plumosa terminatis. Hort. cliff. 224. *Roy. lugdb.* 224.

Anemone sylvestris alba major. Bauh. pin. 176.

Anemone sylvestris 1. Clus. hist. 1. p. 244.

β. Anemone sylvestris alba minor. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 93.

Habitat in Germania. &

anemone ad

• virginiana.

11. ANEMONE pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, seminibus hirsutis muticis.

Anemone caule ramoso, petalis lanceolatis. Roy. lugdb. 488. *Gron. virg.* 165.

Anemone virginiana tertiæ similis, flore parvo. Herm. lugdb. 645. *parad.* 18. t. 18.

Habitat in Virginia. &

Caulis nudus, terminatus Foliis ternis, ternatis: medio trilobo, acuto, serrato, lateralibus bipartitis, lobato-serratis. Pedunculus exit e centro petiolorum, longus, nudus. Flos parvus petalis ovatis, viridibus, instar calycis cujusdam. Pistillorum capitulum elongatum, cylindricum, resolvitur in Semina hirsuta. Juxta pedunculi basin exit caulis ulterius, terminatus pedunculo florifero & foliis duobus oppositis & sic ulterius.

• dichotoma.

anemone ad

12. ANEMONE caule dichotomo, foliis sessilibus amplexicaulibus palmatis. *Amœn. acad.* 1. p. 155. *

Habitat in Canada, Sibiria. & Anemone aneth. Fl. ill.

• trifolia.

13. ANEMONE foliis ternatis ovatis integris serratis, caule