



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

anemone nemorosa (terre) p. 177. c. 177.

} *ΣΙΧΤΟΡΟΥΛΟΣ. Cat. alt. dry.*

POLYANDRIA POLYGYNIA. 541

caule unifloro. Hort. ups. 155. Hort. cliff. 224. Roy. lugdb. 488. Dalib. paris. 161.

Anemone trifolia, flore albo. Baub. hist. 3. p. 412.

Anemone trifolia. Dod. pempt. 436.

Habitat in Gallia. 4

14. ANEMONE foliis quinatis ovalibus ferratis, caule *quinquefolia* unifloro.

Ranunculus nemorum, fragariae foliis, virginianus. Pluk.

alm. 310. t. 166. f. 3.

Habitat in Virginia, Canada. Kalm. 4

anemone ad nemorosa. 460.

15. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. Hort. cliff. 224. Fl. suec. 450. Roy. lugdb.

488. Mat. med. 275. Dalib. paris. 161.

Anemone nemorosa, flore majore. Baub. pin. 176.

Ranunculus sylvarum. Clus. hist. 247.

Habitat in Europæ asperis, duris, nemoribus. 4

anemone ad nemorosa. 460. Ranunculus nemorosus. Ranunculus nemorosus. Ranunculus nemorosus.

16. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incis, petalis lanceolatis numerosis.

Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, apennini montis. Mentz. pug. t. 8. f. 2.

Ranunculus nemorosus, flore purpuro-cæruleo. Park. theatr. 325. Raj. angl. 3. p. 259.

Anemone, geranii robertiani folio, cærulea. Baub. pin.

174? Habitat in Apenninis, Anglia. 4

apennina.

17. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incis, petalis subrotundis, caule sub-bifloro. Hort. cliff. 125.

Fl. suec. 451. Roy. lugdb. 488. Dalib. paris. 161.

Ranunculus nemorosus luteus. Baub. pin. 178.

Ranunculus phragmites luteus nemorosus. Baub. hist. 3. p. 413.

Habitat in Europæ borealis pratis nemorosis. 4

ranunculus des. anemone ad

18. ANEMONE caule unifloro, involucrio folioso obtuso.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 4

Folia radicalia digitata, multifida, marginibus praesertim hirsuta: petiolis pilosis basi vaginantibus. Scapus nudus, pilosus. Involucrum sub flore tripartitum, lobatum: laciniis lanceolatis. Flos patens: petalis 6, subrotundis, fulvis. Staminibus flavis. Pistillorum capitula subrotunda, muricata.

anemone ad Sibiria.

19. A-

POLYANDRIA POLYGYNIA.

anemone 342
narcissifolia 460.

19. ANEMONE floribus umbellatis, seminibus depresso-ovalibus nudis.

Anemone multiflora, semine lævi latissimo, petalis senis ex rotundo-acutis. *Hall. helv.* 330.

Ranunculus montanus hirsutus humilior, narcissi flore. *Bauh. pin.* 182.

Ranunculus montani 2 species altera. *Clus. hist.* 1. p. 235.

Habitat in Alpibus Austriae, Helvetiae, Sibiriae. 2

fasciculata. 20. ANEMONE floribus umbellatis congestis, foliis multifidis. †

Ranunculus orientalis, aconiti lycoctoni folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 20. *itin.* 3. p. 92. t. 92.

Habitat in Oriente.

Obscure adhuc distincta a precedente, (cui simillima) quamdiu hujus semina non descripta sunt.

Thalictroides. 21. ANEMONE foliis caulinis simplicibus verticillatis, radicalibus duplicato ternatis.

Ranunculus nemorosus, aquilegiae foliis, virginianus, asphodeli radice. *Pluk. alm.* 310. t. 106. f. 4.

β. Thalictrum caule unifloro, ex eodem puncto foliis quatuor simplicibus instructo. *Gron. virg.* 62.

Habitat in Virginia, Canada.

Canadensis plantae a, a D. Kalmio lectae, Radix tuberosa. Folia radicalia petiolis longis, duplicato-ternata: foliolis subcordatis, angulatis. Scapus foliis paulo altior, terminatus foliis quatuor simplicibus, foliolis radicalibus similibus, petiolis longis insidentibus. Pedunculi terminales, conferti s. fasciculati 1, 2, 3. s. 5, simplices, uniflori, aequales. Corollae albae: petalis ovatis, obtusis, patentibus. Stamina flavescentia. Pistilli capitulum ovatum, mucronatum.

anemone ad 460.

Haldensis. 22. p. n. ed. 12. p. 375. s. tuberosa habet.

Raravel. Zeyl. ad 460.
zeylanica.

ATRAGENE. *nomen clusii.*

1. ATRAGENE cirrhis diphyllis. *Fl. zeyl.* 226. *

Atragene. *Amoen. acad.* 1. p. 405.

Clematis zeylanica, floribus obsoletis parvis. *Herzm. zeyl.* 35.

Habitat in Zeylona. 5

alpina.

2. ATRAGENE foliis duplicato-ternatis ferratis.

Clematis foliis cordatis crenatis indivisis trilobis ternatisque. *Roy. lugdb.* 487.

Cle-

Clematis alpina geranifolia. *Bauh. pin.* 300. *prodr.* 135.
Pluk. alm. 109. t. 84. f. 7.

Clematis cruciata alpina. *Pon. bald.* 335.
 Anemone, tubis caudatis, tetrapetala, pinnis latissimis.
Hall. helv. 332.

Habitat in Helvetia, Baldo, Sibiria. b

3. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis tripartitis subserratis. *sibirica.*

Habitat in Sibiria subhumidis ubique.

Caulis sarmentosus. Folia opposita, ternata, subserrata;
 foliolis trifidis: lobo exteriori profundiore. Flores paniculati, rubri, pleni. *Facies Aquilegiae stellatae.*

4. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis incisissimis laceris. *capensis.*

Pulsatilla foliis trifidis dentatis, flore incarnato pleno.
Burm. afric. 148.

Pulsatilla apii folio rigido, flore magno. *Herm. afr.* 18.
Habitat ad Cap. b. Spei. z

CLEMATIS.

* scandentes.

1. CLEMATIS foliis compositis decompositisque: foliolis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486.

Clematis caerulea vel purpurea repens. *Bauh. pin.* 300.

Clematis altera. *Clus. hist.* 1. p. 122.

Clematis caerulea, flore pleno. *Bauh. pin.* 300.

Habitat in Italiae, Hispaniae sepibus.

2. CLEMATIS foliis compositis decompositisque: foliolis quibusdam trifidis. *Gron. virg.* 62.

Flammula scandens, flore violaceo clauso. *Dill. elth.* 144. t. 118. f. 444.

Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis. *Raj. hist.* 1928.

Scandens caroliniana planta, viornae folio. *Pet. sicc.* 27.
Habitat in Virginia, Carolina.

3. CLEMATIS foliis simplicibus ternatisque: foliolis integris trilobisve. *crispa.*

Clematis flore crispo. *Dill. elth.* 86. t. 73. f. 84.

Habitat in Carolina.

4. CLEMATIS foliis compositis: foliolis incisissimis angulatis lobatis cuneiformibus. *orientalis.*

Cle-

Clematis ad
Vitcella. Lin. 460

Pallas *Thunb.* ? *no* *malis*
notae
Sui *in* *Kad* *ira* *Japuni*

Viorna. Lin.
Clematis ad

Clematis ad

penugo. clus. { Clematidis Romana. P. Sin 300. ad atragone sarmentata promissa
 cortice cinerea gustus lenti deum acri, deinde fauces reventes.
 Machina purgat et mechocaco proficitur. Clus.
 4. Coa. L. / n. 75. 544

POLYANDRIA POLYGYNIA.

Clematis orientalis, apii folio, flore e viridi-flavescente
 posterius reflexo. *Tournef. cor. 20.*

Flammula scandens, apii folio glauco. *Dill. elth. 144.*
t. 119. f. 145.

Clematis ad 460 *Habitat in Oriente.*

Vitalba. Dod.
αλεματιτι. Dod.
Clematidis. Dod.
Viorna vulgi Lob.
atragone. Theophr.
ατραγενη. Theophr. ang.

1. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis cordatis scandentibus. *Hort. cliff. 225. Roy. lugdb. 486. Hall. helv. 334. Gron. virg. 62. Sauv. monsp. 249. Gort. gelr. 315*

Clematidis latifolia integra. *Bauh. hist. 2. p. 125.*

Clematis tertia. *Cam. epit. 697.*

β. Clematis latifolia dentata. *Bauh. hist. 2. p. 125.*
Vitalba. Dod. pempt. 404.

γ. Clematis sylvestris latifolia. *Bauh. pin. 300. Sloan. jam. 84.*
Habitat in sepibus Europæ australis, Virginiae, Jamaicae.

2. Genus. *cirrrosa.*
Muralta. adan.
ad. muralta. Dod.

6. CLEMATIS cirrhis scandens. *Hort. cliff. 226. Roy. lugdb. 487.*

Clematidis peregrina, foliis pyri incis. *Bauh. pin. 300.*

Clematis altera batica. *Clus. hist. 1. p. 123.*

Clematis peregrina, foliis pyri incis: nunc singularibus, nunc ternis. *Tournef. cor. 20.*

Habitat in Batica, arbores operiens & deprimens.

7. Clematis ad
Flammula. Dod.
Viticella. Coep.

7. CLEMATIS foliis inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Hort. cliff. 225. Roy. lugdb. 486. Hall. helv. 334. Sauv. monsp. 249.*

Clematidis f. Flammula repens. *Bauh. pin. 300. Raj. hist. 621.*

Flammula. *Dod. pempt. 404. Dalech. hist. 1171.*

β. Clematidis maritima repens. *Bauh. pin. 300. prodr. 135.*
Habitat Monspelii, Jenæ, inque Rhetiae sepibus.

Clematis ad
recta.

Flammula. Matth.
centella. Monard.

8. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis intererrimis, caule erecto. *Hort. cliff. 225. Hort. ups. 155. Roy. lugdb. 486. Sauv. monsp. 249.*

Flammula recta. *Bauh. pin. 300.*

Flammula. *Cam. epit. 698. Clus. hist. 1. p. 124.*

Habitat in collibus Austriae, Pannoniae, Tatariae, Monspelii.

9. Clematis ad
integrifolia.

9. CLEMATIS foliis simplicibus ovato-lanceolatis. *Hort. cliff. 225. Hort. ups. 156. Roy. lugdb. 486.*

Clematidis caerulea erecta. *Bauh. pin. 300.*

{ Clematis curad. 3 folia dentata. Bauh.
 (virginiana) folia ternata, foliolis cordatis scandentibus sarmentata rubent.

*Clematis dioica. Lin. Jam. Scandib. fol. 3 nate foliolis pidi dioica. Lin
inty. 3 ad 5 nervib. Flor. panicul. Calin putulu
flor. maluli val in aod. val in alt. indivisus. Sem caudavillox.*

POLYANDRIA POLYGYNIA 545

*Clematis cærulea pannonica. Clus. hist. 1. p. 123.
Habitat in Hungaria, Tataria. 2*

THALICTRUM.

Thalictrum ad

1. THALICTRUM caule simplicissimo subnudo, race-
mo simplici terminali. *Hort. cliff 227. Fl. suec. 455.
Roy. lugdb. 485.*

alpinum. 459.

*Thalictrum caule subnudo simplici, foliolis obtusis. Fl.
lapp. 225. **

*Thalictrum montanum minimum præcox, foliis splen-
dentibus. Moris. hist. 3. p. 325. f. 9. t. 20. f. 14.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Arvonix. 2*

*Petala 4, Stamina 12, Pistilla 8, Racemus simplex flo-
ribus cernuis.*

Thalictrum ad

2. THALICTRUM caule paniculato ramosissimo fo-
lioso.

fœtidum. gillenium. aduy

*Thalictrum caule filiformi ramosissimo in paniculam di-
perso subjectis foliolis. Hort. cliff. 227. * Roy lugdb.
485. Sauv. monsp. 251.*

*Thalictrum minimum fœtidissimum. Baub. pin. 337.
prodr. 147. Baub. hist. 3. p. 488. Moris. hist. 3.
p. 325. f. 9. t. 20. f. 13. Pluk. alm. 367. t. 65. f. 4.
Habitat Monspeli, inque Vallesia, Helvetia. 2*

3. THALICTRUM floribus pentapetalis, radice tubero-
sa. *Hort. cliff. 227. Roy. lugdb. 486.*

tuberosum. myconium?

*Thalictrum minus, asphodeli radice, magno flore. Tour-
nesf. inst. 271.*

Thalictrum ad

*Ranunculus thalictri folio, asphodeli radice. Moris. hist.
2. p. 438. f. 4. t. 28. f. 13.*

*Oenanthe folio hederæ. Baub. pin. 163.
Habitat in Hispania. 2*

4. THALICTRUM floribus pentapetalis, radice fibrosa.
Roy. lugdb. 486.

cornuti.

Thalictrum d.

*Thalictrum canadense: Corn. canad. 186.
Thalictrum americanum. Park. theatr. 265.*

*Thalictrum majus, foliis aquilegiæ, flore albo. Moris. hist.
3. p. 325.
Habitat in Canada. 2*

5. THALICTRUM floribus dioicis.
Habitat in Canada. Kalm.

dioicum.

*Altitudo vix pedalis. Caulis rectus. Flores tetrapetali,
corollis & staminibus 40 albis. Antheræ flavescens.*

M m

Folio

Foliola cernua sunt, qua nota distinctissima evadit planta ex habitu.

minus
Thalictrum ad
459

6. THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis. Thalictrum caule folioso, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. Fl. suec. 454. It. gotl. 180. * Dalib. paris. 454. Thalictrum minus. Bauh. pin. 337. Dod. pempt. 58. Ruta pratensis minor. Tabern. ic. 55. Habitat in Europæ pratis. & *hall. 1139*

sibiricum,

7. THALICTRUM foliis tripartitis divaricatis, floribus cernuis. Habitat in Sibiria D. Gmelin. Habitus, Semina & omnia antecedentis, at Folia basi tantum tripartita, & foliola tenella, glauca, parva, uti in Fumaria.

purpurascens

8. THALICTRUM foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis. Habitat in Canada? & Habitus Thalictri minoris, at vix pedalis evadit, ubi illa tripedalis. Caiyces purpurascens, staminibus luteis. Caulis etiam purpurascens.

angustifolium.
4. *rep.*

9. THALICTRUM foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. Hort. cliff. 226. Pl. hybrid. 28. Roy. lugdb. 487. Hall. helv. 308. Sauv. monsp. 250. Thalictrum pratense, angustissimo folio. Bauh. pin 337. prodr. 146. t. 146. Pluk. alm. 364. t. 65. f. 6. Habitat in Germania rarius. & Petala 4, stamina 16. Pistilla 7.

Thalictrum ad
flavum.

10. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. Hort. cliff. 226. Fl. suec. 453. Roy. lugdb. 485. Hall. helv. 308. Dalib. paris. 162. Thalictrum pratense. Fl. lapp. 224. Thalictrum majus, siliqua angulosa s. striata. Bauh. pin. 336.

speciosum.
Vandennarum vulgo

Thalictrum magnum, Dod. pempt. 58. Thalictrum majus flavum, ~~floribus~~ luteis s. glauco folio. Bauh. pin. 336. staminibus fulvis. Habitat in Europæ septentrionalioris subhumidis, & in Hispania. & Petala 4, Stamina 24, Pistilla 10--16.

lucidum.
Thalictrum ad

11. THALICTRUM caule folioso sulcato, foliis linearibus carnosis. Dalib. paris. 162. †

Thalictrum minus lucidum, libanotidis coronariæ foliis. *Pluk. alm.* 363. t. 65. f. 5.

Thalictrum minus alterum parisiensium, foliis crassioribus & lucidis. *Tournef. inst.* 271.

Thalictrum 1, vel pratense 1. *Clus. hist.* 1. p. 234.

Habitat Parisiis & in Hispania.

Planta, an satis distincta, a T. flavo? videtur temporis filia.

12. THALICTRUM fructibus pendulis triangularibus ^{aquilegifoli.} rectis, caule tereti. ^{foliola lingulæ folii ad exortum squamata & pedicellata, um.}

Thalictrum seminibus triangularibus pendulis, stipulis caulinis. *Hort. cliff.* 226. *Fl. suéc.* 452. *Roy. lugdb.* 285. *Hall. helv.* 309.

Thalictrum ad 459.

Thalictrum majus, florum staminibus purpurascens. *Bauh. pin.* 337.

Thalictrum majus, folliculis angulosis, caule lævi. *Bauh. hist.* 3. p. 487.

Habitat in Scania. Helvetia. &

Petala 4, *Stamina* 60, *Pistilla* 16.

13. THALICTRUM fructibus pendulis triangularibus ^{contortis,} contortis, caule subancipiti.

Thalictrum hybridum seminibus contortis. *Pl. hybrid.* 27. *

Thalictrum ad

Habitat in Sibiria. *G. Demidoff.* 2

Petala 4, *Stamina* 60, *Pistilla* 8. *antecedenti similis, sed humilior floribus albis.*

ADONIS.

adonis ad 459

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. *Hort. ups.* 156.

Adonis radice annua. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. paris.* 162. *Sauv. monsp.* 253.

annua. adonis cratha aculeata. hony Eranthium. Elyth. C. B. p. 530. Theophr. quibus.

a. Adonis sylvestris, flore phœniceo ejusque foliis longioribus. *Bauh. pin.* 178.

Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.

B. Adonis hortensis, flore minore atro-rubente. *Bauh. pin.* 178.

atrorubens. adoniam Betanum. Tab.

Flos adonis. *Clus. hist.* 1. p. 336.

Habitat inter segetes Europæ australis. ☉

Hæ a. B. distincta persistunt, structura tamen eadem.

2. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato.

Adonis radice perenni. *Hort. cliff.* 231. *Fl. suéc.* 456. *It. æl.* 73. *Roy. lugdb.* 488. *Sauv. monsp.* 253.

adonis ad. vernalis. + New o. Elleborum. Matth. 1224. 17852

Ranunculus fascicularis folia alba nigra radice mar.

Helle-

Ranunculus ad

2. RANUNCULUS foliis linearibus, caule repente. *reptans.* 459

Fl. lapp. 236. t. 3. f. 5. Fl. suec. 459

Ranunculus flammeus minimus, spergulæ folio. *Buxb.*

Cent 5. app. 41.

Ranunculus repens, gramineis foliis, e singulis geniculis radices agens. *Amm. ruth. 80. t. 13. f. 1.*

Habitat in Suecia, Russia ad ripas lacuum antecedenti valde affinis & forte varietas.

3. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Lingua. Miu*

Hort. cliff. 228. Fl. suec. 457. Roy. lugdb. 489. Dalib. Paris. 163.

Ranunculus longifolius palustris major. *Bauh. pin. 34.*

Ranunculus lanceolatus major. *Tabern. ic. 48.*

Habitat in Europæ borealis fossis, aquis limosis.

4. RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis, floribus sessilibus. *nodiflorus.*

Hort. cliff. 229. Dalib. Paris. 164.

Ranunculus parisiensis pumilus, plantaginellæ folio.

Pet. gaz. 40. t. 25. f. 4. Vaill. act. 1719. p. 52. t. 4. f. 4.

β. Ranunculus ficulus, folio rotundo vix serrato. *Pet.*

gaz. 39. t. 24. f. 9.

Habitat Parisiis & in Sicilia locis paludosis.

5. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus sessilibus, caule erecto, radice bulbosa.

Hort. cliff. 288. Roy. lugdb. 489. Dalib. Paris. 163. Sauv. monsp. 75.

Ranunculus, gramineo folio, bulbosus. *Bauh. pin. 180.*

Ranunculus pumilus, gramineis foliis. *Bauh. hist. 3. p. 866.*

Hydropiper lanceolatum. *Daelch. hist. 1038.*

Habitat in Pyrenæis & Gallia pratis aridis.

6. RANUNCULUS foliis subovatis nervosis integerrimis petiolatis.

Ranunculus montanus, graminis parnassifolio. *Tournef. inst. 286.*

Habitat in Europa australi.

7. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus, caule subunifloro, radice fasciculata.

Hort. cliff. 229. Roy. lugdb. 484. Sauv. monsp. 76.

Ranunculus montanus, folio plantaginis. *Bauh. pin. 180.*

Morif. hist. 2. p. 444. f. 4. t. 30 f. 36.

Ranunculus dulcis, foliis latis rapistri perfoliatis, floribus albis. *Menz. pug. t. 8. f. 6.*

Hydropiper. Dalub

β. Ranunculus montanus, folio gramineo. *Bauh. pin. 181.*
Moris. hist. 2. p. 441. f. 4. t. 30. f. 38.
Habitat in Pyrenæis, Apenninis. & Helvetia 1179.

• *bullatus.*

8. RANUNCULUS foliis ovatis ferratis, scapo nudo unifloro. *Hort. cliff. 229.*

Matanus.

Lycopnos. græc.

Ranunculus latifolius bullatus, asphodeli radice. *Bauh. pin. 181.*

Ranunculus lusitanicus. *Dod. pempt. 429.*

Ranunculus grumosa radice 1. *Clus. hist. 1. p. 238.*

β. Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, flore pleno & prolifero. *Moris. hist. 2. p. 447. f. 4. t. 31. f. 49. 50. 51.*

Agrina. ad 459.

Habitat in Lusitania, Creta. & milite. novamur.

Scotianum ad

2. Gen. • *Ficaria. Brunf.*

Savagello. cap.

hamonhaddaly. Brunf.

Scotianum ad 419

aurilletoy. Sw. Ranunc.

RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis, *Fl. suec. 460. Hort. cliff. 228. Mat. med. 274. Roy. lugdb. 490. Dalib. paris. 167.*

Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin. 167.*

Chelidonium minus. *Fuchs. hist. 866.*

Chelidonia rotundifolia major. *Bauh. pin. 167. prodr. 137. in hincis. quibus. Galley cortex et abellio. Dilling. v. l. um. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

Habitat in Europæ ruderatis, umbrosis, spongiosis. &

• *Thora.*

Limeum. Nieu gallen

Ab. Thora. Valdenium

παρδαλιανης.

χαμπερον

εγροφουον

εγροφουον

μυοτολον

*Pseudocalamita
radalymath*

10. RANUNCULUS foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule sub-bifloro. *Ranunc. exlaminis folio asphodeli rad. major. Cam.*

Aconitum pardalianches 1, f. Thora major. *Bauh. pin. 184. Hypetel. cu. maltha.*

Thora major. *Cam. epit. 825.*

Ptora valdensium. *Lob. ic. 604. Clus. hist. 1. p. 230.*

β. Aconitum pardalianches alterum, f. Thora minor. *Bauh. pin. 184.*

Thora minor. *Cam. epit. 826.*

Limeum pardalianches genus, uno tantum folio. *Dalecb. hist. 1738.*

Ranunculus foliis radicalibus cordato subrotundis, caulinis sessilibus lanceolatis integerrimis. *Hall. helv. 327. * 1174*

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis. &

* *Foliis dissectis & divisis.*

• *creticus.*

Ned

Chlorophis. græc.

11. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis sublobatis, caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro.

Ranunculus foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis

linis tripartitis sessilibus lanceolatis integerrimis. Roy. lugdb. 490.

Ranunculus, asphodeli radice, creticus. Bauh. pin. 181.

Ranunculus creticus latifolius. Clus. hist. 1. p. 239.

Habitat in Creta. & 1/2 apud. 1 apud flor. ulqui 20.

12. RANUNCULUS foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis; caulinis digitatis dentatis, caule multifloro. *cassubicus.* • *Maseruy. Vet.*

Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus major vel cassubicus, folio thoræ calthæ. Breyn. prodr. 1. p. 45.

Habitat in Cassubia, Sibiria. &

13. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis incis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. Hort. cliff. 229. Fl. suec. 462. Roy. lugdb. 490. Hall. helv. 327. Dalib. paris. 167.

Ranunculus nemorosus s. sylvaticus, folio subrotundo. Bauh. pin. 178.

Ranunculus 1. sylvestris. Dalech. hist. 1028.

Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. &

14. RANUNCULUS foliis radicalibus cordatis crenatis; caulinis ternatis angulatis, caule subtrifloro. *abortivus.* • *nod*

Ranunculus foliis radicalibus crenatis, caulinis digitatis petiolatis. Roy. lugdb. 490.

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus crenatis petiolatis; caulinis paucis digitatis sessilibus. Gron. virg. 166.

Ranunculus virginianus, flore parvo, molliori folio. Herm. lugdb. 514.

Habitat in Virginia, Canada.

15. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis. Hort. cliff. 230. Fl. suec. 463. Roy. lugdb. 490. Hall. helv. 323. Gron. virg. 63. Dalib. paris. 167.

Ranunculus palustris, apii folio, lævis. Bauh. pin. 180.

Ranunculus sylvestris 1. Dod. pempt. 426.

Habitat ad Europæ fossas & paludes. ☉

16. RANUNCULUS foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso-ferratis. Hort. cliff. 229. Hort. ups. 156. Roy. lugdb. 490. Hall. helv. 325.

Ranunculus montanus, aconiti folio, albus: flore majore. Bauh. pin. 182.

β. Ranunculus montanus, aconiti folio, albus flore minore. *Bauh. pin.* 182.

Ranunculus montanus 4. *Clus. hist.* 1. p. 236.

γ. Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. *Bauh. pin.* 179.

Ranunculus pleno flore albo. *Clus. hist.* 1. p. 236.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis. 2

2400. illyricus.

Rebicheg. vet

17. RANUNCULUS foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *It. æl.* 71. *Fl. suec* 471.

Ranunculus foliis tripartitis: laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Sauv. monsp.* 181.

Ranunculus lanuginosus angustifolius, grumosa radice, major & minor. *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus grumosa radice 4. *Clus. hist.* 1. p. 240.

Habitat in Oelandia, Hungaria, Narbona, Italia. 2

Ranunculus

asiaticus.
Ranunculus. recent.

18. RANUNCULUS foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis incis, caule inferne ramoso.

Ranunculus foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Hort. ups.* 156. *Roy. lugdb.* 490.

Ranunculus, grumosa radice, ramosus. *Bauh. pin.* 181.

Ranunculus asiaticus polyclonos f. grumosa radice. 2. *Clus. hist.* 1. p. 241.

β. Ranunculus grumosa radice, flore flavo vario. *Bauh. pin.* 181.

γ. Ranunculus grumosa radice, flore albo. *Bauh. pin.* 181.

δ. Ranunculus grumosa radice, flore albo leniter crenato. *Bauh. pin.* 181.

ε. Ranunculus grumosa radice, flore niveo. *Bauh. pin.* 181.

ζ. Ranunculus grumosa radice, flore phœniceo minimo simplici. *Bauh. pin.* 181.

η. Ranunculus asphodeli radice, flore sanguineo. *Bauh. pin.* 181.

θ. Ranunculus asphodeli radice, flore subphœniceo rubente. *Bauh. pin.* 181.

ι. Ranunculus, asphodeli radice, prolifer miniatus. *Bauh. pin.* 181.

Habitat in Asia vel Mauritania. 2

• *maculatus.*

michel. vet

19. RANUNCULUS foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifolio, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491.

Ra-

Ranunculus rutaceo folio, flore suave rubente. *Baub. pin. 181. Moris. hist. 2. p. 448. f. 4. t. 31. f. 54.*

Ranunculus præcox 1, rutæ folio. *Clas. hist. 1. p. 232. Habitat in Alpibus Austriæ, Delphinatus. & hall. 1165*

20. RANUNCULUS calycibus hirsutis, caule bifloro, foliis multifidis. *Fl. suec. 464.*

Ranunculus caule bifloro, calyce hirsuto. *Fl. lapp. 233. t. 3. f. 1.*

Ranunculus montanus purpureus, calyce villoso. *Baub. hist. 3. p. 868. Scheuch. alp. 339. t. 20. f. 1.*

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. & hall. 1166.

21. RANUNCULUS calyce hirsuto, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis; caulinis multipartitis fessilibus. *Fl. lapp. 232. t. 3. f. 2. Fl. suec. 465. Hall. belv. 326.*

Ranunculus minimus alpinus luteus. *Baub. hist. 3. p. 861. f. interior.*

β. Ranunculus idem pygmæus. *Fl. lapp. 232. t. 3. f. 3. Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. &*

22. RANUNCULUS foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis: lobis trilobatis; caulino lanceolato integerrimo, caule unifloro.

Ranunculus caule aphylo unifloro, foliis subrotundis femitrifidis. *Hall. belv. 326. Sauv. monsp. 205.*

Ranunculus alpinus humilis rotundifolius, flore majore & minore. *Baub. pin. 181.*

Ranunculus alpinus humilis albus, folio subrotundo, *Segu. ver. 1. p. 489. t. 12. f. 1.*

Ranunculi montani 1. species 1. & 2. *Clas. hist. 1. p. 234.*

Habitat in Alpibus Austriacis, Helveticis. &

23. RANUNCULUS foliis tripartitis lobatis obtusis, caule subnudo unifloro. *Fl. suec. 461. **

Ranunculus caule unifloro unifloro, foliis tripartitis. *Fl. lapp. 231. t. 3. f. 4. **

Habitat in Alpibus Lapponicis.

24. RANUNCULUS foliis tripartitis crenatis, caule simplici villoso subnudo unifloro. *Sauv. monsp. 181. †*

Ranunculus saxatilis, magno flore. *Baub. pin. 182. prodr. 96.*

Habitat Monspeli.

Ranunculus ad 459.

glacialis. • Kimisot. vet

nivalis. Rhodina vet.

alpestris. • Phacellium vet

Bojuel. gall. Vallot. or Antiphrasa

554 POLYANDRIA POLYGYNIA.

• bulbosus.

cur galli. Brunf
Batrachium. apul. gal. Dod.
Hautfenula. Gron

25. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis
fulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Fl. suec.* 469.
Dalib. paris. 165.

Ranunculus radice simplici globosa. *Hort. cliff.* 230.
Roy. lugdb. 491. *Hall. helv.* 323.

Ranunculus bulbosus. *Lob. ic.* 666. *Fl. lapp.* 229.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda.
Bauh. pin. 179.

Habitat in Europæ pratis, pascuis. ♀

• repens.

xlórov
clomon.

26. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis
fulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Fl.*
suec. 468.

Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis: me-
dio productiore, caule multifloro. *Hort. cliff.* 230.
Gron. virg. 166. *Roy. lugdb.* 491.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Bauh. pin.* 179.
Fl. lapp. 230. *Ranunculus dulcis fl. plenus. C. D.*

Ranunculus hortensis 1. *Dod. pempt.* 425.
Habitat in Europæ cultis. ♀ *halut hall.* 173.

• polyantho-
mos.

27. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ful-
catis, caule erecto, foliis multipartitis. *Fl. suec.*
467.

Ranunculus polyanthemus simplex. *Lob. ic.* 666.

Ranunculus sylvestris. *Tabern. ic.* 42. *hist.* 117.

Habitat in Europæ borealis graminosis. ♀

• acris.

xavstiq.
Lupavt. Claven. j.

28. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis te-
retibus, foliis tripartito-multifidis: summis lineari-
bus. *Fl. suec.* 466. *Dalib. paris.* 164.

Ranunculus foliis peltatis quiquangularibus multiparti-
tis: laciniis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.*
231. *Roy. lugdb.* 492.

Ranunculus pratensis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Fl.*
lapp. 228.

Ranunculus hortensis. *Dod. pempt.* 426.

β. Ranunculus hortensis erectus, flore pleno. *Bauh. pin.*
179.

Habitat in Europæ pratis, pascuis. ♀

lanuginosus.

haliab. vet.

29. RANUNCULUS foliis tripartitis acute sinuatis
tomentosis.

Ranunculus foliis radicalibus pinnatis. *Sauv. monsp.* 227.

Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi
pratensis repentis. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.

Ra-

Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo. *Bauh.*

hist. 3. p. 417.

Habitat Monipelii. & *helvat hall.* 1172.

Caulis altus, erectus. Folia Aconiti s. Ran. agris, sed magis incisa. Semina acuta, compressa.

30. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis charophyllos •
sulcatis, caule erecto, foliis compositis, radice granu-
lulosa. *Guett. stamp.* 275. *Dalib. paris.* 166.

Ranunculus charophyllos, asphodeli radice. *Bauh. pin.* 181. *Bary. ic.* 581.

Ranunculus montanus leptophyllos, asphodeli radice.
Col. ephr. 1. p. 312. t. 311.

Habitat in Gallia, Italia.

31. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis supe-
rioribus decompositis linearibus. *Hort. cliff.* 229. *arvensis.* •

Fl. suec. 470. *It. æl.* 104. *. *Roy. lugdb.* 491. *Dalib. paris.* 166. *copot*

Ranunculus arvensis echinatus. *Bauh. pin.* 179.

Ranunculus sylvestris 3. *Dod. pempt.* 427.

Habitat in Europæ australioris agris. ☉

32. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis sim-
plicibus palmatis incis. *Hort. cliff.* 229. *Hort. ups. æker. germ.* •

157. Roy. lugdb. 491. *Sauv. monsp.* 204.

Ranunculus palustris echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95.

β. Ranunculus rotundifolius repens echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95.

γ. Ranunculus stellatus echinatus creticus. *Bauh. pin.* 180.

δ. Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. *Raj. angl.* 3. p. 248. t. 12. f. 1. *Pluk. alm.* 311. t. 55. f. 1.

Ranunculus arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo. *Moris. hist.* 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 21. *(purpureum)*

Habitat in Europæ australis fossis & humentibus. ☉

33. RANUNCULUS seminibus spinoso-subulatis re-
curvis, calycibus reflexis, foliis multidis. *orientalis.* •

Carthana. aegypt

Habitat in Oriente.

34. RANUNCULUS caule erecto bifolio, foliis mul-
tidis; caulinis alternis sessilibus. *Roy. lugdb.* 492. *grandiflorus.* •

Ranunculus orientalis, aconiti folio, flore maximo. *Nora chion arab*

Tournef. cor. 22. *Synachon aeg.*

Habitat in Oriente. &

- falcatus.* 35. RANUNCULUS foliis filiformi-ramosis, calycibus appendiculatis. *Hort. ups.* 157. *Sauv. monsp.* 205. *Myosuros* foliis ramosis. *Hort. cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 492. *Melampyrum luteum minimum.* *Bauh. pin.* 234. *Ranunculus ceratocephalus*, feminibus falcatis in spicam adactis. *Morif. hist.* 2 p. 440. f. 4. t. 28. f. 22. *Habitat inter segetes Europæ australis.* ☉
- Ranunculus arab. hanc*
• *hederaceus.* 36. RANUNCULUS foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Dalib. paris.* 167. *Gort. gelr.* 325. *Ranunculus aquaticus hederaceus luteus.* *Bauh. pin.* 180. *Morif. hist.* 2. p. 441. f. 4. t. 29. f. 29. *Habitat in aquis vadosis Angliæ, Belgii.*
- Mileum. vet.*
• *aquatilis.* 37. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, emersis peltatis. *Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis.* *Fl. lapp.* 234. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328. *Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.* *Bauh. pin.* 180. *Ranunculus aquatilis.* *Dod. pempt.* 387.
- Ἰδαίον*
1. Sep.
• β. *Ranunculus foliis submersis capillaceis.* *Fl. suec.* 472. *Dalib. paris.* 168. *Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis.* *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328. *Ranunculus aquaticus albus, circinnatis tenuissime divis foliis.* *Pulk. alm.* 311. t. 52. f. 2. *Millefolium aquaticum cornutum majus.* *Bauh. pin.* 141.
- γ. *Ranunculus foliis capillaceis circumscriptione vago brevioribus.* *Hall. helv.* 328. *Ranunculus aquaticus capillaceus.* *Bauh. pin.* 180. *Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus.* *Col. ecphr.* 1. p. 315. t. 316.
- δ. *Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis.* *Roy. lugdb.* 492. *Ranunculus albus fluitans, peucedani foliis.* *Herm. lugdb.* 517. *Habitat in Europæ aquis undosis, fossis, rivulis.*

Trollius. ad 454

TROLLIUS.

- *europæus.* 1. TROLLIUS corollis conniventibus, nectariis longitudine itaminum. *Helleborus flore clauso erecto petiolato, caule simplicissimo.* *Fl. suec.* 474. *Hal-*

POLYANDRIA POLYGYNIA.

Ranunculus montanus pinnatis folio flore globofo. B. Pin 182.

Helleborus foliis angulatis multifidis, flore globofo.

Hort. cliff. 227. Roy. lugdb. 484. un ramore, apice 1 flori.

Helleborus caule simplici, flore pedunculato. *Fl. lapp. 226.*

Ranunculus flore globofo. *Dod. pempt. 430.*

Habitat in Alpibus & subalpinis Sueciae, Germania,

Angliae. *2 p. radice. fol. radi. et caulina Ranunculi, radice in rotula*

2. TROLLIUS corollis patentibus, nectariis longitudine asiaticis.

petalorum. Trollius humilis, flore patulo. Buxb. cent. 1. p. 15. t. 22.

Helleborus niger orientalis, ranunculi folio, flore nequa-

quam globofo. *Tournef. cor. 20.*

Helleborus acconiti folio, flore globofo croceo. *Amm. ruth. 101.*

Habitat in Sibiria, Cappadocia, &

ISOPYRUM.

1. ISOPYRUM stipulis subulatis, petalis acutis. *Hort. Fumarioides.*

aps. 157. cauda 10 a 15 long. ad 10 cum ovato.

Helleborus fumaricae foliis. *Amm. ruth. 74. t. 12.*

Habitat in nemoribus Sibiriae. ☉

2. ISOPYRUM stipulis ovatis, petalis obtusis.

Thalictrum batrachioides, flore albo, italicum. *Boec. mus. 84. t. 79. f. 1. **

Ranunculus nemorosus, thalictri folio. *Bauh. pin. 178.*

Raj. hist. 584. Moris. hist. 2. p. 437. f. 4. t. 28. f. 12.

Ranunculus praecox 11, thalictri folio. *Clus. hist. 1. p. 233.*

Habitat in Alpibus Italicis, Gratianopoli, inque agro Vi-

ennensi.

3. ISOPYRUM stipulis obsoletis.

Aquilegia montana, flore parvo, thalictri folio. *Bauh. aquilegioides*

pin. 144. prodr. 75. Bauh. hist. 3. p. 484. Raj. hist.

707. Moris. hist. 3. p. 458. f. 12. t. 11. f. 5. Hall.

helv. 310.

Habitat in Alpibus Helveticis, Tridentinis, Apenninis.

HELLEBORUS.

1. HELLEBORUS flore folio infidente. *Hort. cliff. 227.*

Hort. apf. 158. Roy. lugdb. 484.

Helleborus ranunculoides praecox tuberosus, flore luteo.

Moris. hist. 3. p. 459. f. 12. t. 2. f. 4.

Aconitum unifolium bulbosum. *Bauh. pin. 183.*

Habitat in Lombardia, Italia, Apenninis, &

Syda Libano.

2. HEL-

IA POLYGYNIA.
foliis filiformi-ramosis, caly
Hort. apf. 157. Sauv. monsp. 2
Hort. cliff. 117. Roy. lugdb. 4
minimum. Bauh. pin. 234
caules, lacinibus falcatis in
hist. 2 p. 440. f. 4 t. 28. f
Europa australi. ☉
foliis subrotundis trilobis inter
Hort. cliff. 231. Roy. lugdb. 4
7. Gort. gelr. 325
hederaceus luteus. Bauh. pin. 1
p. 441. f. 4 t. 29. f. 29
Anglia, Belgi.
foliis submersis capillaceis, p
ribus capillaceis, superio
Roy. lugdb. 492. Hall. belv.
folio rotundo & capillaceo.
Dod. pempt. 387.
mersis capillaceis. Fl. sum.
des capillaceis circumsc
f. 231. Roy. lugdb. 492.
albus, circinnatis tenuissim
311. t. 52. f. 2.
cornatum majus. Bauh. pin. 1
capillaceis circumscriptione
elo. 328.
capillaceus. Bauh. pin. 18
los aquaticus medio luteus.
316.
ribus capillaceis circumscrip
p. 492.
is, peucedani foliis. Herm.
is unguis, fissis, ritalis.
ROLLIUS.
is compositus, nectariis
so erecto petiolata, caule
74.

olfa ad
ad 458
thalictroides
olfa ad
helleboroides ad
helleboroides Bauh. ad
hemalis. 2. gemas
Ellaborum Cephal
Prodrum Bauh. ad
Nava ad
Septem ad

Hunt Institute for Botanical Documentation

melampyrium officinale helleborus niger hortensis alter. C. A. P. 185.
 helleborus, valde purgativa, et Eudamus 1 di. 20 nota magis eno purgit
 me purgativa, nec vomit, quod sic habet. Pat. 7 duntaxat puricum 2168 puri
 aceto 3/8 Saeri apponit. helleborus, valde purgativa, et Eudamus 1 di. 20 nota magis eno purgit
 helleborus, valde purgativa, et Eudamus 1 di. 20 nota magis eno purgit

Helleborus ad.
 • niger.
 stiraecum. Tab.
 Prodiar na. Dac.
 Hanta hanc. gabdo
 πρῶτιον. graec
 Protiou.
 Caraca. Rom
 Camelag. aegypt.
 Noa. eg.
 viridis.
 Helleborus
 comitago. Niu. c. b.
 xuipanior. graec

POLYANDRIA POLYGYNIA.
 2. HELLEBORUS scapo sub-unifloro subnudo, foliis pedatis. Hort. ups. 157. Roy. lugdb. 484. Mat. med. 273.
 Helleborus scapo florifero subnudo, petiolo communi bipartito. Hort. cliff. 227.
 Helleborus niger, flore roseo. Bauh. pin. 186.
 Elleborus niger legitimus. Clus. hist. 1. p. 275.
 Habitat in Austria, Hetruria, Apenninis. 2

Helleborus ad.
 • foetidus.
 emmaphyllum. Niu.
 Pedicularia. v. Reg
 comitago. Ruell
 Helleboraster. Lob. Tab.
 Epapiritior. mag.
 Elaphina. reg.

3. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis digitatis. Hort. ups. 158. Roy. lugdb. 484.
 Helleborus caule aequali folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. Hort. cliff. 227. Hort. ups. 158. Roy. lugdb. 484.
 Helleborus niger hortensis, flore viridi. Bauh. pin. 185.
 Elleborum nigrum alterum. Cam. epit. 941.
 Habitat in montibus Viennensibus, Euganeis. 2

Helleborus ad.
 • trifolius.
 Sagoparov ymi.
 Estouon.

4. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pedatis. Hort. cliff. 227. Roy. lugdb. 484. Dalib. paris. 169. Sauv. monsp. 180.
 Helleborus caule inferne angustato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus. Hort. cliff. 227. Roy. lugdb. 484. Dalib. paris. 169. Sauv. monsp. 180.
 Helleborus niger foetidus. Bauh. pin. 185.
 Heileboraster maximus. Lob. ic. 679.
 Helleborus femina. Sterb. fung. 372. t. 36. f. C.
 Helleborus niger trifoliatus. Moris. hist. 3. p. 460. f. 12. t. 4. f. 7.
 Habitat in Germania, Helvetia, Gallia.

Populago ad.
 • palustris.
 amellus. Virgilius. Reg.
 Caltha
 Populago. Tab.
 Populago. Tab.
 Populago. Tab.
 Populago. Tab.
 Populago. Tab.
 Populago. Tab.

5. HELLEBORUS foliis ternatis, scapo unifloro. Amoen. acad. 2. p. 356. t. 4. f. 18.
 Habitat in Canada, Sibiria. 2

CALTHA.

1. CALTHA. Fl. lapp. 227. Fl. suec. 473. Hort. cliff. 228. Roy. lugdb. 484. Gron. virg. 166. Dalib. paris. 169.
 Caltha palustris, flore simplici. Bauh. pin. 276.
 Populago major. Tabern. ic. 750.
 Populago minor. Tabern. ic. 750.
 Caltha palustris, flore pleno. Bauh. pin. 276.
 Habitat in humidiusculis Europæ. 2

Conditum hispanorum in radibus hellebori eritum
 oleum iunctura sua
 susus alii
 herbae venenatae en aurea
 venena. hellebori
 acaun antidota. B. Pin. 184.
 antidota

1. suoni	✿✿✿✿✿✿	1. Curava
2. apavaepo	✿	2. Wape
3. Corami	✿	3. Astropama
4. Saopava	✿	4. Macatto

AD.

Opie. macastor
 Upa. malai
 Savariq
 Venenatum macastorizum Popula Coluber
 ex Spiori arbori varietate colligitur. Est que
 hucus lacteus in faviata arbore stillans cujus
 venentis aura vapor lethalis vel arbori arborum
 vulniantem tunc solantibus. Rossm. amoen. 575.
 ? Cely mali vel apryni spca? quo Zela illiunt

ADDENDA.

Pag. 358. post Gnidiams.

STELLERA.

1. STELLERA foliis linearibus, floribus quadrifidis.
Amoen. acad. 1. p. 400. Sauv. monsp. 69.
Passerina. Baub. hist. 3. p. 456.
Lithospermum, linearæ folio, germanicum. Baub. pin. 259.
Linaria altera botryoides montana. Col. ecphr. 1. p. 82. t. 80.
Habitat in Europæ arvis, campis, apricis, aridis. h
2. STELLERA foliis lanceolatis, corollis quinquefidis.
Amoen. acad. 1. p. 400.
Chamæjasme radice mandragoræ Amm. ruth. 16. t. 2.
Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 2

Stellera ad 285.

Stellera. ad. 285

Passerina. Baub. 3. p. 289.

Stellera ad.

Chamæjasme Stellera ad 285 sine.

PASSERINA.

1. PASSERINA foliis linearibus convexis quadrifariam filiformis imbricatis, ramis tomentosis.
Passerina foliis linearibus. Hort. cliff. 246. t. 11. Roy. lugdb. 208.
Thymelæa æthiopica fruticosa, foliis in longum striatis, firculis valde tomentosis. Pluk. mant. 180.
Thymelæa æthiopica, passerinæ foliis. Breyn. cent. 10. t. 6.
Thymelæa foliis oppositis cruciatis angustis, floribus tubulosis in spicæ modum e foliorum alis erectis. Burm. afr. 127. t. 47. f. 1.
Habitat in Æthiopia. h
2. PASSERINA foliis carnosis extus glabris, caulibus tomentosis.
Thymelæa tomentosa, foliis sedi minoris. Baub. pin. 463.
Sanamunda 3. Clas. hist. 1. p. 89.
Sesamoides parvum dalechampii. Baub. hist. 1. p. 595.
Habitat in Hispania. h
3. PASSERINA foliis lanceolatis subciliatis erectis, ramis nudis.
Passerina foliis lanceolatis. Hort. cliff. 146. Roy. lugdb. 208.
Thymelæa foliis chamelææ minoribus hirsutis. Baub. pin. 463.
Thymelæa foliis oblongo-acutis ad oras fimbriatis. Burm. afr. 129. t. 47. f. 2.
Sanamunda 1. Clas. hist. 1. p. 88.

Passerina ad nomen arocari. p. 289.

Sanamunda p. p.

Sanamunda ad 285.

Sanamunda ad 285.

Sanamunda ad 285.

Sanamunda p. ch. quæ purgat.

Sanamunda ad 285.

Eri-

1753

Belvata ad
ad. Bellera. Bot.
p. 285.

Passerina (12 andralia) fluit lanceol. glab. acuminat. floribus lateralibus
latioribus. involucris. lin. cent. 4. 2 ad 4 ped. tota laevis. fol. parva sunt
plana opposita sess. crumatum liti. Plur. / flit. amill. quicet in pedem.
calicibus 602 phyll. lateralibus longis. **ADDENDA**
4. flosa cum apertibus 8 ymponia pariter 9. 17-4. helle bary. in m. t. h.
176. 1. long. 14. a. 17. 1. m. h. ut m. h. sem. 1. 15. m. a. flon.

Erica africana, rusci folio. Seb. thes. 2. p. 15. t. 12. f. 9.
Habitat in Æthiopia, Hispania. h

Forella ad
Lacum. uniflora.
ad 285.

4. PASSERINA foliis linearibus oppositis, floribus terminalibus solitariis, ramis glabris.
Thymelæa foliis triquetris cruciatim oppositis, flore sericeo. Burm. afr. 132. t. 48. f. 2.
Thymelæa ramosa, linearibus foliis angustis, flore solitario. Burm. afr. 131. t. 48. f. 1.
Habitat in Æthiopia. h

Lachnæa ad 285.

LACHNÆA.

Lachnæa ad
285. eriocephala.

1. LACHNÆA capitulis solitariis lanatis, foliis quadri-fariam imbricatis.
Habitat in Æthiopia. h
Folia trigona, gibba. Capitula terminalia, solitaria, tomentosa, cincta lana candida.

conglomerata.

2. LACHNÆA capitulis confertis, foliis laxis.
Thymelæa africana, polii angustioribus foliis, floribus in capitulis summo caule glomeratis. Pluk. mant. 179.
Raj. dendr. 54.
Sanamunda 3. clusii affinis, polii folio. Breyn. cent. 18. t. 7.
Habitat ad Cap. b. Spei. h

Pag. 35. inter Melothriam & Læstingiam.

ORTEGA.

hispanica.
Morina. ad
272.

1. ORTEGA. Læst. epist. VIII: 43.
Rubia linifolia aspera. Bauh. pin. 333.
Juncaria salmatica. Clus. hist. 1. p. 174.
Habitat in Castilia Minuart, Bætica Velez, Salmantica. O
Pag. 79.

membranacea.

4. STIPA pedicellis dilatatis membranaceis.
Habitat in Hispania. Læsting.
Gr. vix pedale, habitu Avenæ. Panicula simplex, vix subdivisa, laxa, debilis. Pedicelli membranacei, ancipites, obtusiusculi. Calycis arista longitudine arista corollinae.
Pag. 84.

Hystrix.

6. ELYMUS spiculis involucre destitutis.
Gramen avenaceum, locustis aristatis, paniculis echinum referentibus. Gronov.
Habitat in - - -
Spica composita ex spiculis duabus ad singulum dentem.
Spiculæ quadrifloræ; aristis longis. Involucra nulla, sed horum loco Calli duo.

1753

