



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Classis. XVIII.

DIDYNAMIA, GYMNOSPERMIA.

AJUGA. *Clusii nomen in usum (adanson 1754) a Botanica relinquendum. Bugula ad 1788*

1. AJUGA floribus resupinatis. *orientalis.*

Teucrium staminibus tubo corollae brevioribus. Roy.

lugdb. 306. flor. 3 anill. pult. cat. tubo med. 5. lacin. tubo aeq.

Bugula orientalis villosa, flore inverso candido cum o-

ris purpureis. *Tournef. cor. 14. corollam non tantis esse videtur*

2. Bugula orientalis villosa, flore inverso caeruleo: alba

macula notato. *Tournef. cor. 14. Dill. eth. 60. t.*

43. f. 61.

Habitat in Oriente.

2. AJUGA tetragono-pyramidalis. *Fl. suec. 475. Mat. pyramidalis.*

med. 306. Dalib. paris. 169. Consolida media. Bauh. pin. 260. non

Consolida media pratensis caerulea. *Bauh. pin. 260. non*

Consolida media genevensis. *Bauh. hist. 3. p. 432.*

Bugula foliis angulose dentatis, caule simplici. *Hall.*

herb. 635.

Phyllochois. *Reneal. spec. 125. **

Habitat in Suecia, Helvetia, Germania.

3. AJUGA foliis tomentosis, calycibus hirsutis

Bugula carneo flore. *Clus. hist. 2. p. 43.*

Habitat in Europa australiori.

4. AJUGA stolonibus reptatricibus.

Ajuga foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, sto-

lonibus reptatricibus. *Gort. gelr. 230.*

Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simpli-

cissimo, stolonibus reptatricibus. *Hort. cliff. 301.*

Roy. lugdb. 306. Dalib. paris. 170.

Consolida media pratensis caerulea. *Bauh. pin. 260.*

San. Bugula. Dod. pempt. 135. purpurea.

Habitat in Europa australiori.

Linn 1753 (adanson 1754)

Class. XIV. p. 561

1753. adanm.

CAROLI LINNÆI

S: R: GIÆ M: TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Cum Privilegio S. R. M: tis Sueciæ & S. R. M: tis Poloniae ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Chamaepitys *adans.* *famil. pl. 1764 et 1765. imprimis* TEUCRIUM.

1. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus solitariis. ^{verticillatis}
Teucrium foliis cuneiformibus trifidis: laciniis divisis, floribus solitariis. *Roy. lugdb.* 306.
Teucrium, calyce campanulato, laciniatum, flore magno & parvo subcæruleo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 131.
Habitat in Oriente.

Chamaepitys. ad. *orientale.* 2. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus racemosis. ^{verticillatis}
Teucrium foliis pinnatifidis, laciniis linearibus, infimis divisis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 307.
Teucrium orientale angustifolium laciniatum, flore magno suaverubentè. *Tournesf. cor.* 14.
Habitat in Oriente.

Chamaepitys. ad. 3. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis.
Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. paris.* 171.
Sauv. monsp. 248.

Botrys. *ad. 1768* Botrys chamædryoides. *Baub. pin.* 138.
flor. 2 ad 3 cuneis ala flori. Chamæpitys altera. *Dod. pempt.* 46.
pedunculatis in abq. (quod) cal. 2 lab. 5 fid. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. *Habitat in Germaniæ, Galliæ, Helvetiæ, Italiæ apricis cultis.* ☉

Chamaepitys. adans. 4. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis subracemosis, caule erecto. ^{verticillatis}
Chamaepitys spuria, multifido folio, lamii flore. *Baub. pin.* 250.
Pseudochamaepitys. *Clus. hist.* 2. p. 185.
Chamaepitys alia. *Cam. epit.* 680.
Habitat in Hispania.

Chamaepitys. 5. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus. *Hort. ups.* 160. *Mat. med.* 287.
Teucrium foliis simpliciter trifidis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Guett. stamp.* 2. p. 248. *Gron. virg.* 64. *Dalib. paris.* 173. *Sauv. monsp.* 175.

Chamaepitys. ad. *1. 9. 40.* Chamæpitys lutea vulgaris s. folio trifido. *Baub. pin.* 249.
Chamæpitys prima. *Dod. pempt.* 46.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ, Hungariæ, Helvetiæ arvis. ☉

6. TEUCRIUM foliis tripartitis linearibus, racemo terminali, caule repente.

Teucrium repens, folio trifido. Nissol.

Habitat - - -

Folia tripartita, linearia, glabra. Flores in racemo terminali, oppositi, pedunculati.

Chamaepitys adu...
nissoliana... 1754 MS
el 1785 facit plant
impr.

7. TEUCRIUM foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus.

Teucrium foliis lanceolatis obtusis dentatis, floribus solitariis sessilibus. Roy. lugdb. 306. Sauv. monsp. 141.

Chamaepitys moschata, foliis serratis. Baub. pin. 249.

Chamaepitys spuria prior. Dod. pempt. 47.

Anthyllis altera. Clus. hist. 2. p. 186.

Habitat in Lusitania, G. Narbonensi, Monspeli.

Bugula ad 1888
monsp. lob.
Bugula ad.

8. TEUCRIUM foliis pinnato-multifidis, caule simplicissimo erecto, bracteis subulato-palmatis.

Teucrium, delphinii folio, non ramosum. Shaw. afric. 575. t. 575.

Habitat in Mauritania.

Chamaepitys adu...
mauritanium

9. TEUCRIUM foliis integerrimis oblongo-ovatis petiolatis; supra glabris subtus tomentosis.

Teucrium foliis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis. Hort. cliff. 302. Roy. lugdb. 305.

Teucrium peregrinum, folio sinuato. Baub. pin. 247.

Teucrium fruticans baticum. Clus. hist. 1. p. 348.

Habitat in Baticæ, Siciliæ maritimis. h

fruticans, a -
Paderota. Siciliana. B. 227.
Teucrium ad 1888

10. TEUCRIUM foliis integerrimis rhombeis acutis villosis; subtus tomentosis.

Teucrium fruticans baticum, ampliore folio. Dill. elth. 397. t. 284. f. 367.

Teucrium baticum humilius & ramosius, folio subrotundo. Hort. angl. t. 3.

Habitat in regione Batica. h

latifolium •
Melanophyllum quibus
Teucrium B. Pin 388.

11. TEUCRIUM foliis lanceolato-linearibus integerrimis, racemo subpicato.

Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus, floribus solitariis pedunculatis. Hort. cliff. 303. Hort. ups. 159. Mat. med. 286. Roy. lugdb. 307.

Polium angustifolium creticum. Baub. pin. 221.

Rosmarinum stœchados facie. Alp. exot. 103. t. 102.

Habitat in Creta. h

creticum •
Teucrium

Scordis. Plin. Scordium alterum sanguinarius verticillatum B. 248.
Nili. Sordidus.

471 181.

566

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Teucrium ad 188
supinum.

Teucrium. disc. ch.

22. TEUCRIUM corymbo terminali, foliis linearibus.
Polium montanum repens. Bauh. pin. 220.
Polium montanum supinum minimum. Lob. ic. 488.
Habitat in agro Viennensi.
Precedenti maxime affinis est.

Teucrium ad.

pyrenaicum.

23. TEUCRIUM corymbo terminali, foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis.
Teucrium foliis cuneiformibus crenatis, corymbo terminali, foliolis floralibus linearibus. Vir. cliff. 55.
Roy. lugdb. 305.
Teucrium foliis suborbiculatis crenatis, spica laxa orbiculata depressa. Hort. cliff. 301.
Polium pyrenaicum supinum, hederæ terrestris folio. Tournef. inst. 206.
Polium saxatile purpureum chamædryoides, ampla coma. Bocc. mus. 2. t. 61. Barr. rar. 315. t. 1086. folia male.
Habitat in Pyrenæis. 2

Teucrium ad 188

Polium. 1. m. h. l. ch.
τονον. disc.

24. TEUCRIUM spicis subrotundis, foliis oblongis obtusis, crenatis tomentosissimis sessilibus. Hort. cliff. 302.
Roy. lugdb. 305. Sauv. monsp. 141.

flor. in capitulum terminal. coll. R.

Polium montanum luteum. Bauh. pin. 220.

Polium montanum album. Bauh. pin. 221.

cal. cyl. 5 dent. aeq.

Polium montanum supinum alterum. Bauh. pin. 221.

Polium maritimum supinum venetum. Bauh. pin. 221.

con lab. infer. 5 fid.

Polium montanum 5. Clus. hist. 1. p. 362.

apulus. disc.

Habitat in Italia, Hispania, Lusitania, Narbona. 2

Species Polii, a varietatibus distinctas, hodie confusas, inquirant solidi Botanici, in solo natali.

epipodium. (B. 221.)

Teucrium ad

capitatum.

πικριδίου. disc. cypri

flor. album 3 disc. m. h. l. ch.

manu candidi mendic. purpur. (c. p. m. h. l. ch.)

471 472.

25. TEUCRIUM capitulis pedunculatis, foliis lanceolatis crenatis tomentosissimis, caule erecto.

Polium montanum album ferratum latifolium. Barr. rar. 325. t. 1079. 1078.

Habitat in Hispania.
Habitus Organi majoranae, sed tomentosum & angustifolium.

Teucrium ad

spinosum.

Bambia. adamp.

26. TEUCRIUM spinosum, calycibus labio superiore ovatis corollis reclinatis. Læf. descr. VII. 38.

Chamædrys multifida spinosa odorata. Griseb. luss.

Chamædrys spinosa. Bauh. pin. 248. prodr. 117. f. 117.

Morif. hist. 3. p. 423. f. 11. v. 22. f. 17.

Habitat in Lusitania.

macrodonatum

27. TEUCRIUM foliis serratis, spinis terminalibus, corollis rectis.

Scor

Marum repens verticillatum C.B. 224

Solito affinis guacatana B. Sin 221. Plantula solis montano hanc
simili S. uodora. merand. in piballa compublis. frag

Samp. usuy. Dico. lob
V. maj. m. a. s.
guacatana. amnic.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 567

Scordium spinosum odoratum. *Corae. can.* 123. *Barr.*
rar. 319. *t.* 202.

Habitat - - - - - †

SATUREJA.

1. **SATUREJA** capitulis terminalibus, foliis lanceolatis. *virginiana.*

Satureja virginiana. *Herm. par.* 218. *t.* 218.

Sureva. aduy
193

Pulegium erectum virginianum angustifolium, floribus
in cymis dispositis. *Moris. hist.* 3. p. 371. f. 11. t.
7. f. 8.

Clinopodium foliis lanceolatis acuminatis, capitulis ter-
minalibus. *Hort. cliff.* 304. *Gron. virg.* 65. *Roy.*
lugdb. 314.

Clinopodium, pulegii angusto rigidoque folio, virginia-
num, flosculis in cymis dispositis. *Pluk. alm.* 110. t.
54. f. 2.

Serpentaria virginiana. *Bocc. mus.* 2. p. 161. t. 115.

Habitat in Virginia. † *Nov. genuit.*

Stamina in fundo corollae latent Antheris minimis effœ-
tis, ut fere posset genere proprio tradi.

mentha ad
193

2. **SATUREJA** verticillis fastigiatis concatenatis, foliis
lineari-lanceolatis. *juliana.*

Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis glabris.
Roy. lugdb. 324.

Kanifaya Vera. Dico. Bonuc
Salub

Satureja spicata. *Bauh. pin.* 218.

Satureja perennis, verticillis spicatum & densius disposi-
tis. *Moris. hist.* 3. p. 412. f. 11. t. 17. f. 4.

*Habitat in Hetruria, in Tyrreni maris asperis, Floren-
tia.* †

Satureia ad
193.

3. **SATUREJA** floribus verticillatis, foliis ovatis acutis. *Thymbra.*

Roy. lugdb. 324.

Thymus g. greci reunt.
Thym. Belli.

Thymus frutescens, verticillis fere nudis globosis, foli-
is ovato-lanceolatis *Hort. cliff.* 306.

Thymbra legitima. *Clus. hist.* 1. p. 358.

Thymum creticum pone verticillatum. *Barr. rar.* 279.
t. 898.

Habitat in Creta.

Mastichina ad
194

4. **SATUREJA** verticillis lanuginosis, dentibus calyci-
nis fetaceis pilosis. *Hort. cliff.* 306. *Hort. ups.* 160.

sub Thymo.

Clinopodium gal. ad
helenium. Thym.

Sampficus f. Marum mastichen redolens. *Bauh. pin.* 224.

Marum vulgare f. Clinopodium. *Dod. perempt.* 271.
Habitat in Hispania petrosis. †

Thymbra h. p. maj. an. p. r. ?
Thym. gallic.
Thym. gallic.

Chrysothymum mastichina gallicum P. B. 243
maun. h. Ept. Aest. 14. chry.

Thym. gallic.
Thym. gallic.
Thym. gallic.

‡

Thym. gallic.
Thym. gallic.

• græca.

Satureja
Satureja
Satureja

5. SATUREJA pedunculis corymbosis lateralibus geminis, bracteis calyce brevioribus.

Satureja annua orientalis tenuior, ad singulos nodos florifera. *Moris. hist. 3. p. 411. f. II. t. 17. f. 2.*
Clinopodium creticum. Alp. exot. 265. t. 264.

Habitat ad Archipelagum. ☉

Facie convenit cum *S. montana*, a qua differt foliis minus mucronatis; sed præcipue corymbis florum, qui utrinque non soli sed bini; accedit quod bractea s. involucrium in hac minimum est; in montana vero longitudine corymbi.

• montana.

Satureja
Satureja
Satureja

6. SATUREJA pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, foliis mucronatis.

Satureja pedunculis dichotomis, verticillis concatenatis. *Vir. cliff. 57. Hort. ups. 161. Roy. lugdb. 324. Sauv. monsp. 142.*

Satureja montana. *Bauh. pin. 218.*

Satureja perennis. *Riv. mon. 41. 64*

Melissa foliis linearibus integerrimis. *Hort. cliff. 308.*

Habitat in Hetruria, Narbona. ♀

Satureja ad 193.

Satureja
Satureja
Satureja

7. SATUREJA pedunculis bifloris. *Vir. cliff. 87. Hort. ups. 161. Mat. med. 284. Roy. lugdb. 324. Sauv. monsp. 142.*

Satureja hortensis. *Bauh. pin. 218.*

Satureja altera. *Cam. epit. 487.*

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff. 306.*

Habitat in G. Narbonensi & Italia. ☉

Thymus ad 194.

Thymus
Thymus
Thymus

8. SATUREJA floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Mat. med. 283.*

Thymus capitatus qui dioscoridis. *Bauh. pin. 219.*

Thymum legitimum. *Clus. hist. 1. p. 357.*

Habitat in Creta, Bætica, Hispali, Græcia. ♀

Thymus ad 195.

Thymus
Thymus

9. SATUREJA foliis ovatis ferratis, corymbis terminalibus dichotomis.

Thymus foliis ovatis acuminatis ferratis, corymbis lateralibus terminalibus pedunculatis. *Gron. virg. 64.*

Calamintha mariana, mucronatis rigidioribus & crenatis foliis, flosculorum calyculis villis argenteis summo margine fimbriatis. *Pluk. mant. 35. t. 344. f. 2.*

Calamintha erecta virginiana, mucronato folio glabro. *Moris. hist. 3. p. 413. f. II. t. 19. f. 7.*

Habitat in Virginia. ♀ 2 juv. flosculi clausi lenticulis equalibus nat. fl. corymb. nulli et terminalibus cal. 5 dent. sequit. T H Y M -

Thymus

Thymus

THYMBRA.

1. THYMBRA floribus spicatis.

Thymbra spicata verior hispanica. *Barr. rar.* 281. t. 1230.

Thymum majus longifolium, stoechadis foliaceo capite purpurascete, pilosum. *Pluk. alm.* 368. t. 116. f. 5.

Hyssopum montanum macedonicum valerandi dourez. *Bauh. hist.* 3. p. 276.

Hyssopus capitata africana, saturejæ rigido hirsuto folio. *Moris. hist.* 3. p. 361.

Satureja hirsuta purpurea olibani. *Dodart. mem.* *Habitat in Macedonia: Libano.*

spicata. •
abulfali. ad
ad. 190.

†
Thymum mat
p. 721. p. 430.

2. THYMBRA floribus verticillatis.

Hyssopus angustifolia montana aspera. *Bauh. pin.* 218.

Hyssopus montana. *Dalech. hist.* 934.

Habitat in Europa australi.

Planta 1. 2. similis Caules vix pedales. Folia opposita, lineari-lanceolata, integra, punctata: Floralia paulo latiora, acutiora, sed ciliata. Hæc omnino verticillata, floribus sessilibus; Præcedens obsolete spicata, spica oblonga bracteis s. foliis ciliatis imbricata. Calyx monophyllus, durus, utrinque latere linea hirsuta exaratus, bilabiatus: labio superiore latiore, semitrisido, equali; l. inferiore angustiore, bipartito. Corolla ringens: labio superiore concavo, semibifido, obtuso; l. inferiore trisido, subequali; Stamina didynama sub labio superiore. Antheræ didymæ. Stylus semibifidus, filiformis. Semina 4

verticillata.

HYSSOPUS.

1. HYSSOPUS spicis secundis. *Hort. cliff.* 304. *Hort. officinalis.* •
ups. 152. *Mat. med.* 290. *Roy. lugdb.* 323. *Gort. gelr.* 336.

Hyssopus officinarum cærulea s. spicata. *Bauh. pin.* 217.

Hyssopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.

β Hyssopus rubro flore. *Bauh. pin.* 217.

Habitat in - - - 4

2. HYSSOPUS corollis transversalibus, staminibus inferioribus corolla brevioribus. *Hort. ups.* 162. *

Habitat in Sibiria. 4 aliud genus ut.

3. HYSSOPUS caule acuto quadrangulo. *Hort. ups.* 3. * *nepetoides.*

Nepeta caule acute quadrangulo glabro. *Vir. cliff.* 58.

Roy. lugdb. 316. *Gron. virg.* 66

N n 5

Hyssopus ad 192

†
Hyssopus. Bruch. Cray.
566 nos. dia.

Lophanthus ad 194
Lophanthus. •

Belangen. singulari

1796. 192

Bru-

570 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA

*Cataria canad. altissima Scrophularia foliis caule
pinnatis vel lobatis bipinnatis*
Brunella bracteis lanceolatis Hort. cliff. 316.

Betonica virginiana elatior, foliis scrophulariæ glabris,
flore ochroleuco. Pluk. alm. 67. t. 150. f. 3. Moris.
hist. 3. p. 365. f. II. t. 4. f. II.

Habitat in Virginia, Canada. ♂
Ex me ~~supra~~ *supra* ~~per~~ *per* ~~ed~~ *ed* p. 571.

NEPETA.

+ • *cataria. mult.*
nepe. mag
Cataria ad 192

1. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis,
foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis.

Nepeta floribus interrupte spicatis pedunculatis. Hort.
cliff. 310. Hort. ups. 163. Fl. suec. 486. Roy. lugdb.
316. Gron. virg. 65. Mat. med. 291. Dalib. paris.
116.

Mentha cataria vulgaris & major. Baub. pin. 228.
Cataria herba. Dod. pempt. 99.
Habitat in Europa. ♀

pannonica. 2. NEPETA floribus paniculatis, foliis cordatis petio-
latis obsolete crenatis.

Nepeta caule paniculato, pedunculis partialibus ramosis
multifloris. Roy. lugdb. 316.

Nepeta pannonica major & elatior. Moris. hist. 3. p. 415.
f. II. t. 6. f. 6.

Mentha montana verticillata. Baub. pin. 227.
Habitat in Pannonia. ♀

• *violacea.*
Cataria

3. NEPETA verticillis pedunculatis corymbosis, foliis
petiolatis cordato-oblongis dentatis.

Nepeta foliis ovatis petiolatis glabris, verticillis diffuse
spicatis glabris. Sauv. monsp. 151.

Nepeta montana purpurea major, sparsa spica. Barr.
ic. 601. Bocc. mus. 2. p. 46. t. 36.

Cataria hispanica, betonicae folio angustiore, flore ca-
ruleo. Tournef. inst. 202.
Habitat in Hispania. ♀

• *ucranica.*
Cataria

4. NEPETA floribus paniculatis, foliis lanceolatis ferra-
tis sessilibus.

Cataria betonicae folio angustiore, flore caeruleo.
Gerb. tan. 87.

Habitat in Ucraina.

• *nuda.*
Cataria

5. NEPETA foliis cordato-oblongis subsessilibus ferra-
tis, racemis verticillatis nudis.

Nepeta foliis sessilibus, verticillis nudis.

Nepeta foliis sessilibus nudis, calycibus fructus ovatis
æqualibus. Hort. ups. 164. *

Hunt Institute for Botanical Documentation

manam pedam h'm 10 2.65. fady catarice Jyl. cui aund el folia ym? mentat per
 inudy nali. fl. oval ott ocimi Jyl. huy Jyl. ggn. rami 4 ggn.
 fl. pandula en vortelle) (ing. pendula, fuchia rami Jyl. 2. ggn. pedula. Culle altopy
 ludo h' d. subag. mentat 164. f. 1. t. 90. Saikilo h'm
 odolata ad 188. f. 1. t. 90. Saikilo h'm

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Katu-kurka. Rheed. mal. 10. p. t. 90. Saikilo h'm
 Habitat in India. Jyl. inarum v. datur Betonicae p.
 fl. ggn. ob. cul. munita lyp. f. 1. t. 90. Saikilo h'm
 Labium corollae superius brevissimum omnium, integrum,
 fl. rami. fl. rami. fl. rami. fl. rami. fl. rami. fl. rami.
 Stamina autem, longitudine labii inferioris. Flores
 verticillati.

sibirica. 11. **NEPETA** corymbis geminis pedunculatis axillaribus,
Cataria ad 192. foliis cordato oblongis acuminatis serratis. Hort. ups.
 164. *
 Cataria montana, foliis veronicae pratensis. Buxb. cent.
 3. p. 27. t. 50. f. 1.
 Habitat in Sibiria. Jyl. Lophanti p. ex m.

multifida. 12. **NEPETA** floribus spicatis, foliis pinnatifidis integer-
Fabricia ad 194. rimis.
 Lavendula montana, folio valerianellae varie secto, ca-
 rulea. Amm. ruth. 69.
 Betonica sibirientis. Walth. hort. 122. t. 20.
 Habitat in Dauria.
 Caulis erectus absque ramis; Folia inferiora petiolata;
 superiora sessilia, non crenata, oblonga, triloba, qua-
 driloba, quinqueloba: lobis alternis, oblongis. Flores
 valde parvi; Antherae bipartitae.

LAVANDULA

Spica. 1. **LAVANDULA** foliis lanceolatis integris, spicis nu-
 2900. dis. Hort. cliff. 303. Hort. ups. 162. Mat. med. 296.
 Lavandula angustifolia. Bauh. pin. 216. Roy. lugdb. 322. Sauv. monsp. 143.
 Lavandula angustifolia. Bauh. pin. 216. Roy. lugdb. 322. Hort.
 Lavandula atera. Dod. pempt. 273.
 Lavandula latifolia. Bauh. pin. 216. Roy. lugdb. 322. Hort.
 Habitat in Europa australi. b

multifida. 2. **LAVANDULA** foliis duplicato-pinnatifidis. Vir-
Fabricia ad 188. cliff. 56. Hort. cliff. 303. Roy. lugdb. 322. Hort.
 ups. 162.
 Lavandula folio dissecto. Bauh. pin. 216.
 Lavandula multifido folio. Clus. hist. 1. p. 345.
 Habitat in regione Baetica. Jyl. Roy. lugdb. 322. Hort.

dentata. 3. **LAVANDULA** foliis pinnato-dentatis. Hort. cliff.
Stachas ad 188. Succuduy. aric. Salub. 303. Roy. lugdb. 322.
 Stachas folio serrato. Bauh. pin. 216.
 Stachas crispo folio. Clus. hist. 1. p. 346.
 Habitat in Hispaniae Calape. b

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 573

4. LAVANDULA foliis lanceolato-linearibus, spica comosa. Hort. cliff. 303. Hort. ups. 162. Mat. med. 297. Roy. lugdb. 323. Sauv. monsp. 143. Stæchas purpurea. Bauh pin. 216. Stæchas brevioribus ligulis. Clus. hist. I. p. 344. β. Stæchas cauliculis non foliatis. Bauh. pin. 216. Stæchas longioribus ligulis. Clus. hist. I. p. 344. Habitat in Europa australi. ♀

Stæchas ad 1488
Stæchas. Trag. herb. mult.
Stæchas. Diosc.
Stæchas. Lully. †

BETONICA.

1. BETONICA spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata. Roy. lugdb. 316. Fl. suec. 487. Hort. ups. 164. Betonica. Dod. pempt. 40. Hort. cliff. 310. Betonica purpurea. Bauh. pin. 235. β. Betonica alba. Bauh. pin. 235. Habitat in Europa. ♀
2. BETONICA spica integra, corollarum lacinia labii intermedia integerrima. Roy. lugdb. 316. Betonica orientalis, angustissimo & longissimo folio, spica florum crassiori. Tournef. cor. 13. Habitat in Oriente. ♀

Betonica ad 1907
officinalis.
Betonica Brunf. Trag. mult.
Betonica. Diosc.
Betonica. Galen.
Betonica. Græci.
Βουχότροπος. Plin. alius p. 117.

3. BETONICA spica basi foliosa. Horminum minus album, betonicæ facie. Bauh. pin. 239. prodr. 114. Burs. XIII: 119. Betonica montana lutea. Barr. icon. 339? Bocc. mus. 2. p. 82. t. 7.? Betonicæ folio, capitulo alopecuri. Bauh. pin. 235. Betonicæ folio Alopecuros quorundam. Bauh. hist. 3. p. 303. Alopecuros alpina, betonicæ folio, capitulo alopecuri. Pont. anth. 253. Segu. ver. 318. Horminum alpinum luteum, betonicæ spica. Raj. hist. 547. Habitat in montibus Sabaudicis, Austriæ superioris, Lessanensibus, Italicis, Galloprovinciæ. ♀

alopecuros.
Betonica ad

4. BETONICA verticillata, calycibus spinosis. Hort. ups. 165. fl. 3 ann. lully. 2 ad 4 lully. purpurea v. lully. Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. Hort. cliff. 310. Gron. virg. 66. β. Dalib. paris. 180. Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente. glabra. Tournef. inst. 203.

Retrahit ad 1907
D. g. g. g. g.
Retrahit ad
Stachys. 9
annua d. p. n.
395

Zetahit ^{1. d. 2. d. 3. d.} Sideritis hirsuta proumbens. *Clus. 233. alius generis ut*
 Zudaica. ^{3. d.} 525.
 Zetahit ad, 574

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Betonica foliis inter diffusos verticillos longioribus ellipticis ferratis. *Hall. helv. 645.*

Sideritis arvensis latifolia glabra. *Bauh. pin. 233.*

Alyssum majus. *Tabern. hist. 929.*

β. Sideritis vulgaris hirsuta erecta. *Bauh. pin. 233.*

Sideritis vulgaris 1. *Clus. hist. 2. p. 39.*

Betonica foliis inter verticillos diffusos brevibus in aristam terminatis integris. *Hall. helv. 646.*

Habitat ad agrorum margines Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ. ☉

De Genere dubium, utrum ad Betonicas vel Stachydes pertineat; prius statuit *Tournefort*, posterius *Spinae calycis* inadent.

SIDERITIS.

• canariensis. 1. SIDERITIS fruticosa tomentosa, foliis cordatis, pedunculis ante florescentiam nutantibus.

Stachys fruticosa, foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis. *Hort. cliff. 310.*

Stachys canariensis frutescens, verbasci folio. *Comm. hort. 2. p. 197. t. 99.*

Stachys amplissimis verbasci foliis, floribus albis parvis non galeatis, spica betonica. *Pluk. alm. 356. t. 322.*

Habitat in Canariis. ♪

• cretica. 2. SIDERITIS fruticosa villosa, foliis cordato-oblongis petiolatis, ramis divaricatis

Stachys cretica latifolia. *Tournef. inst. 186.?*

Habitat in Cræta. ♪

• syriaca. 3. SIDERITIS fruticosa tomentoso-lanata, foliis linearilanceolatis.

Cunila calycibus inermibus lanigeris. *Hort. cliff. 313.*

Sideritis cretica tomentosa candidissima, flore luteo. *Tournef. cor. 12.*

β. Stachys fruticosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus. *Hort. cliff. 310.*

Stachys minor italica. *Bauh. pin. 236.*

Stachys lychnoides incana angustifolia, flore aureo. *Barric. 1187.*

Pilosella syriaca. *Bauh. pin. 262.*

Habitat in Cræta. ♪

Fruticulus facie *Salviae*, sed longior. Folia *salviae*, tomentosa, lanata, alba: inferiora petiolata, superiora sessilia. Flores ex albo flavescentes.

hirsuta,
Sideritis 1. d. 2. d.
Zetahit. Dalech

Ca. canariensis

cretica.

italica. ad

Sideritis foliis hirsutis protunde crenatis. *Bauh. pin.* 232.

Sideritis montana scordioides altera. *Barr. ic.* 1160.
Habitat in G. Narbonensi.

MENTHA. ¹⁷⁹³

mentha ad 25.

• *crispa.*

mentha. 1. gal. f. 89

1. MENTHA floribus spicatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Hort. ups.* 168. *Mat. med.* 278.

Mentha crispa danica f. germanica speciosa. *Morif. hist.* 3. p. 367. f. 11. t. 6. f. 5.

Mentha crispa. *Riv. mon.* 77 p. 72.
Habitat in Sibiria. 4

• *spicata.*

2. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis serratis. *Hort. ups.* 168.

Mentha sylvestris, longioribus nigrioribus & minus incanis foliis. *Bauh. pin.* 227.

2 • *viridis.*

α. Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis serratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. paris.* 177.

Mentha angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 227.

Mentha III. IV. *Dod. pempt.* 95.

Mentha aquatica spicata, foliis oblongis viridibus serratis acuminatis. *Gron. virg.* 167.

longifolia.

β. Mentha spicis confertis, foliis serratis tomentosis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. paris.* 177. *Mat. med.* 279. *Gort. gelr.* 341.

Mentha sylvestris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.

Menthastrum spicatum, folio longiore candicante. *Bauh. hist.* 3. p. 321.

3 *rotundifolia.*

γ. Mentha sylvestris, rotundiore folio. *Bauh. pin.* 227.
Habitat in Dania, Germania, Anglia, Gallia. 4

• *Subgium ad aquatica.*

mentha palustris. Theophr.

Silymbrium. tabern.

3. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Fl. suec.* 482. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. paris.* 177.

Mentha rotundifolia palustris f. aquatica major. *Bauh.*

Silymbrium mutato in mentham fit, quando cultura neglecta

Silymbrium sylvestre. Dalech. hist. 677 *Theophr. h. s. c. 9*

Habitat in Europa ad aquas. 4

Planta non hirta. Verticilli terminales in capitulum f.

spicam obtusam conferti; Stamina corollâ longiora.

• *piperita.*

4. MENTHA floribus capitatis, foliis lanceolatis serratis subpetiolatis.

Men-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 577

Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis menthæ fuscæ, sapore fervido piperis. *Raj. angl. 3. p. 234. t. 10. f. 2.*

Habitat in Anglia. 2

5. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corolla brevioribus. *Pubgium*

Mentha hortensis verticillata, ocymi odore. *Baub. pin. 227.*

Mentha verticillata minor acuta non crispa, odore ocymi. *Baub. hist. 3. p. 216.*

Mentha quarta. *Fuchs. hist. 291.*

Habitat in Europa australiore. 2

Simillima M. arvensi, at minus hirta, Caulibus rubris; Stamina Tubo corollæ non longiora; Verticilli laterales.

6. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corollam æquantibus. *arvensis. Hort. cliff. 307. Fl. suæc. 481. Roy. lugdb. 326. Hall. herb. 658. Dalib. paris. 178.*

Mentha arvensis verticillata procumbens. *Moris. hist. 3. p. 369. f. 11. t. 7. f. 5.*

Calamintha arvensis verticillata. *Baub. pin. 229.*

Habitat in Europæ agris frequens post messem. 2

Caulis diffus; Verticilli laterales; Planta tota hirta; Stamina corollæ limbo longitudine equalia.

7. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolatis serratis petiolatis. *canadensis.*

Habitat in Canada. Kalm.

Differt a precedenti Caule altiore, non ramoso, multum piloso. Foliis dimidio angustioribus, acutioribus, profundius serratis, obscurioribus pilis vagis adpersis, uti etiam calyces. Calyces quinquedentati, subæquales.

Corolla 4fida: lobo superiore oblongo, longiore, integro; reliquis equalibus. Stamina 4, intra tubum corollæ. Stylus corollæ longior, apice bifidus.

8. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus. *Pubgium. Hort. cliff. 307. Roy. lugdb. 326. Dalib. paris. 178. Mat. med. 280. Gort. gelr. 344.*

Pulegium latifolium. Baub. pin. 222.

Pulegium. Fuchs. hist. 199.

Habitat in Angliæ, Galliæ, Helvetiæ inundatis. 2

Pulegium ad 193

Pulegium. Bruff. Aug. f. 193

χλῆρα. 3. dir. χλῆρα. 3. dir.

pulegium. ad apudic. M.

Dimorph. Pulegium sic. Chm.

Pulegium. Mart. abrotum. gall. hirt.

9. MEN-

abrotum.

2/ Judaei h. m. 10 2. 48. 2/ ab. Pram. in arenor. caul. 49 in ramis opp. fl. Lami.
2/ doli fl. ulin lamio inter fl. doli in Cardua. Cal. 5 dent. tuta. Cor. 2 lab. 11. 4. tubata
109 2. d. ca. lam. 4. fl. l. imp. v. r. p. l. a. 6 ad 30. 1. d. m. i. a. t. q. 1. gram. Le. Lami. spec. rom
579 fl. purpureum. sum. r. 3. lab.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

LAMIUM.

1. **LAMIUM** foliis cordatis acuminatis serratis petiolo-
tis. Hort. cliff. 314. Fl. suec. 493. Mat. med. 307.
Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 178.

Lamium album non foetens, folio oblongo. Baub. pin.
231. *archangelica. Lb. ad.*

Galeopsis. Cam. epit. 865.

β. **Lamium maculatum.** Baub. pin. 231.
Habitat in Europæ cultis. 2

2. **LAMIUM** foliis cordatis obtusis petiolatis. Hort. cliff. purpureum. +
314. Fl. suec. 494. Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 179. *Lamium ann. vulg. rubrum. Lam.*

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo. Baub.
pin. 230. *galeopsis minor fl. in milpavilla*

Urtica iners altera. Dod. pempt. 153.
Habitat in Europæ cultis. ⊙

3. **LAMIUM** foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus
obtusis. Hort. cliff. 314. Fl. suec. 495. Roy. lugdb.
319. Gron. virg. 66. Dalib. paris. 179.

Lamium, folio caulem ambiente, minus. Baub. pin.
231. *amplexicaul. le. Xap. n. t. e. s. Thal.*

Morsus gallinæ, folio hederulæ, alterum. Lob. ic. 463.

β. **Lamium**, folio caulem ambiente, majus. Baub. pin. 231.
Habitat in Europæ cultis. ⊙

4. **LAMIUM** foliis multipartitis. Hort. cliff. 315. *multifidum. •*

Lamium orientale, foliis eleganter laciniatis. Tournef.
cor. II. Comm. rar. 26. t. 26. *Dallota fl. y. s. can. sub Dallota lanata p. 382.*

Habitat in Oriente.

GALEOPSIS.

1. **GALEOPSIS** internodiis caulinis æqualibus: verticil-
lis omnibus remotis. *galeopsis petula Septem. C. A. galeobdolon*
Galeopsis ramis summis pubescentibus. Hort. cliff. 314.
Fl. suec. 492. Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 181. *Ladanum. Pin. +*

Sideritis arvensis angustifolia rubra. Baub. pin. 233. *190.*

Ladanum segetum folio latiore. Riv. mon. 24.

Habitat in Europæ arvis & campis sabulosis. ⊙

2. **GALEOPSIS** internodiis superne incrassatis, verticillis
summis subcontiguis. *? galeops non tan. subarven. lob. Ter. habit. p. 574. Cam. h. 2. 1. p. 2. Roy. Can. p. 1. 2. 3. 4.*

Galeopsis ramis summis strigosis. Hort. cliff. 314. Fl.
suec. 491. Roy. lugdb. 319. Dalib. paris. 181.

~~Sideritis angustifolia p. 233. Sideritis~~ Gale-

~~galeopsis p. 233. Sideritis~~ *galeopsis p. 233. Sideritis* *galeopsis p. 233. Sideritis* *galeopsis p. 233. Sideritis* *galeopsis p. 233. Sideritis*

alvayru.
 Galeopsis corolla rubra aut alba. *Fl. lapp.* 237.
 Urtica aculeata, foliis ferratis. *Bauh. pin.* 232.
 Cannabis spuria. *Riv. mon.* 44.
 Galeopsis corolla flava: labio inferiore maculato. *Fl. lapp.* 193. ~~Lamium fl. luteo. Riv. p. 28.~~
 Lamium cannabinum aculeatum, flore specioso luteo: labiis purpureis. *Pluk. alm.* 204. t. 41. f. 4.
 Cannabis spuria, flore majore. *Riv. mon.* 45.
 Habitat inter Europæ segetes & olera. ☉

hirsuta
 Galeopsis caule piloso, calycibus labio corollæ superiore longioribus. *Galeopsis hirsuta rotundum fl. 2.*
 Marrubium nigrum rotundifolium. *Bauh. pin.* 230.
 Ocymastrum valentinum. *Clus. hist.* 2. p. 42.
 Habitat in Hispania. ☉

Galeobdolon ad 190.
 Galeobdolon 4. GALEOPSIS verticillis sexfloris: involucri tetra-
 phyllo.
 Leonurus foliis ovatis ferratis acutis. *Hort. cliff.* 313.
 Roy. lugdb. 310. *Fl. suec.* 479. *Dalib. paris.* 182.
 It. scan. 64.
 Lamium folio oblongo luteum. *Bauh. pin.* 231.
 Urtica iners tertia f. Lamium flore luteo. *Dod. pempt.* 153. ~~Lamium unguiculatum. Riv. p. 28.~~
 Habitat in Europæ nemoribus. ☉
 Fructificatio parum recedit a congeneribus, vix tamen distincto genere nominari meretur.

Galeopsis ad 187.
 I. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Fl. suec.* 489. *Dalib. paris.* 180.
 Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317. *Hall. helv.* 642.
 Lamium maximum sylvaticum foetidum. *Bauh. pin.* 231.
 Galeopsis legitima. *Clus. hist.* 2. p. 35.
 Habitat in Europæ nemoribus umbrosis. ☉

Galeobdolon ad 190.
 2. STACHYS verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semi-amplexicaulibus. *Fl. suec.* 490. *Dalib. paris.* 180.
 Stachys foliis lineari-lanceolatis sessilibus basi emarginatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.
 Stachys palustris foetida. *Bauh. pin.* 236.
 Stachys aquatica. *Tabern. ic.* 577.

Hunt Institute for Botanical Documentation