



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA 581

Habitat in Europa ad ripas, inque cultis humidiusculis. 2³mo.

3. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis apice cartagineis. *galeops alp. Petreana flor flvng. 2.* Stachys verticillis duodecim-floris, caule villoso. *Hort. upf. 170 * fl. 6 ad 8 long. ann. 200 quama 6. gal. 2. cib. 2. ad. 2. t. 2. lata.* Stachys foliis lanceolato-ovatis basi emarginatis, verticillis tomentosis. *Hort. cliff. 301. Roy lugdb. 317. Dalib. paris. 180. cal. subspinosus.*
- Stachys latifolia major, foliis obscure virentibus, flore galeato ferrugineo. *Pluk. alm. 356. 16. 317. f. 4.* Pseudo-stachys alpina. *Baub. pin. 236. prodr. 113.*
- Habitat in Germania, Helvetia. 2
- S. alpina minor, colore obscuro, corollarum galea horizontali, foliorum dentibus apice cartagineo fuso. S. germanica altior, lana alba, corollarum galea erecta. Foliorum serraturis subimbricatis.
4. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis. Stachys verticillis quadraginta-floris, caule lanato. *Hort. upf. 170. ** Stachys foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis. *Hort. cliff. 309. Roy. lugdb. 317. Dalib. paris. 179.* Stachys major germanica. *Baub. pin. 236.* Stachys. *Fuchs. hist. 766.*
- Habitat in Germania, Anglia, Gallia. 2
5. STACHYS verticillis triginta-floris, calycibus punctatis. *gentibus. Hort. upf. 170. ** Stachys folio obscure vidente, flore purpurascente. *Walth. hort. 108. t. 19.* Stachys cretica. *Baub. pin. 236. prodr. 113.*
- Habitat in Creta. 2
6. STACHYS ramis ramosissimis, foliis lanceolatis glabris. *Hort. cliff. 310. Roy. lugdb. 318.* Sideritis glutinosa bitumen redolens. *Moris. hist. 3. p. 389. Sideritis saturea odora. Zanoni.* Sideritis viscosa cretica bitumen redolens. *Zan. hist. 136.*
- Habitat in Creta.
7. STACHYS ramulis spina terminatis. *Hort. cliff. 310. spinosa. Roy. lugdb. 318.* Stachys spinosa cretica. *Baub. pin. 236. Moris. hist. 3. p. 283. f. 11. t. 10. f. 9.*

582 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Gaidarothymo. Clus. hist. 2. p. 311.

Habitat in occidentali Cretæ.

orientalis.

8. STACHYS foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floribus verticillo brevioribus. Roy. lugdb. 318.
Stachys orientalis altissima foetidissima. Tournef. cor. II.
Boerb. lugdb. 1. p. 154.
Habitat in Oriente.

BALLOTA.

nigra

~~Ballota nigra f. foetida~~

~~μέλανη πράσινη~~

~~marrubium nigrum~~

1. BALLOTA foliis cordatis indivisis ferratis. Fl. suec.

484.

Ballota. Hort. cliff. 311. Roy. lugdb. 315.

Ballote. Fuchs. hist. 154. Cam. epit. 572.

Marrubium nigrum foetidum. Bauh. pin. 230.

Habitat in Europæ ruderatis. 2

lanata.

2. BALLOTA foliis palmatis dentatis, caule lanato.

Ballote foliis geranii batrachoides. Anam. ruth. 47.

Habitat in Sibiria.

Caules lana alba induti. Verticilli hirsutissimi. Folia grossulariae, semiſſida s. ſemiſſida, lobis obtusis tridentatis, ſupra glabra, subtus hirsuta. Calyces dentati denticulis ſetaceis. Corollæ albæ, ventricofe, magnæ in hac gente.

MARRUBIUM.

* Calycibus 5dentatis.

~~Alyſſon gal. 300. Carduus sp. ex calyx ſeminis quin levigatis.~~

- MARRUBIUM foliis cuneiformibus, verticillis in volucro deſtitutis. Hort. cliff. 311. * Roy. lugdb. 314. Sauv. monsp. 151.

~~calyx ſeminis quin levigatis.~~

- Marrubium album, foliis profunde incisis, flore carneo. Moris. hist. 3. p. 377. f. 11. t. 10. f. 12.

Alyſſon verticillatum, foliis profunde incisis. Bauh. pin.

232. ~~na amplexum hypoleicum calice stellato et angustato.~~

Alyſſon galeni. Clus. hist. 2. p. 35. ~~ad fg. 95.~~

Habitat in Hispania. 2

~~Marubium latifolium 3. 191.~~

~~peregrinum. 2. Marubium latifolium 3. 191.~~

~~fraxinifolium calyx ſeminis quin levigatis.~~

- MARRUBIUM foliis ovato-lanceolatis ferratis, calycum denticulis ſetaceis. Hort. cliff. 311. n. 3. Roy. lugdb. 314.

Marrubium album latifolium peregrinum. Bauh. pin.

230. Moris. hist. 3. p. 577. f. 11. t. 9. f. 8.

Marrubium alterum pannonicum. Clus. hist. 2. p. 34.

B. Marrubium album angustifolium peregrinum. Bauh. Mar.

pin. 230.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 583

Marrubium creticum. Dalech. hist. 962.

Habitat in Siciliæ, Cretæ, Austræ siccis. 2

3. MARRUBIUM foliis subovatis lanatis superne emarginato-crenatis, denticulis calycinis subulatis. Hort. num. cliff. 312. n. 4.

Marrubium album candidissimum & villosum. Tournef. cor. 12.

Habitat in Creta?

4. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis rectis villosis. Hort. cliff. 312. Roy. lugdb. 315. Sauv. monsp. 151.

Marrubium album, sericeo parvo & rotundo folio. Barr. ic. 685. Bocc. mus. 2. p. 78. t. 69.

Marrubium album hispanicum majus. Barr. ic. 686.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi. 2

* *Calycibus 10 dentatis.*

5. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis uncinatis. vulgare. +

Hort. cliff. 342. Fl. suec. 485. Mat. med. 305. Roy. lugdb. 315. Hall. helv. 648. Dalib. paris. 182.

Marrubium album vulgare. Baub. pin. 230.

Marrubium vulgare. Clas. hist. 2. p. 34.

Habitat in Europæ borealioris ruderatis. 2

6. MARRUBIUM foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis. Hort. cliff. 311. Roy. lugdb. 314.

Pseudo-Dictamnus africanus, foliis subrotundis subtus incanis. Comm. hort. 2. p. 179. t. 90.

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

7. MARRUBIUM calycum limbis patentibus: denticulis acutis. Hort. cliff. 312. Hort. ups. 169. * Roy. lugdb. 315.

Marrubium album rotundifolium hispanicum. Herm. par. 201. t. 201.

Marrubium subrotundo folio. Barr. ic. 767. Bocc. mus.

2. p. 167. t. 122.

Habitat in Hispania. 2

8. MARRUBIUM calycum limbis planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso. Hort. cliff. 312. * Hort. dictamus. 191. +

Pseudo-Dictamnus verticillatus inodorus. Baub. pin 222.

Pseudo-Dictamnum. Dod. pempt. 281.

Habitat in Creta. 3

O O 4

9. MAR-

*Zumba h.m. 102.91. Dauu herba. Ruph. 6. 7. 16. f. 1. o 1. red. gravi odore leonisque. ver
runc. op. ligno ploppel 4. trinigris. 11. tritriglis. 11. tigulis alib. leonis? alib.
cal. velut 4. deu. inv. 584* DIDYNAMIA GYMNOSEPMIA.

+ acetabulo- 9. MARRUBIUM calycum limbis tubo longioribus
sum. membranaceis: angulis majoribus rotundatis.

Pseudodictamnus Pseudō Dictamnus acetabulic moluccæ. Baub. pin. 222.
ad 191. Dictamnus falsus verticillatus, pericarpio conoide, bæti-
cus. Barr. ic. 129. *

Habitat in Creta. 2

Limbus calycis absoluta florescentia excrescit, fit tubo
duplo longior, nudus & membranaceus, nec villosus
ut in precedentibus; limbi margo 20 angulis: minori-
bus scilicet acutis, latioribus obtusissimis rotundatis.

Cardiaca ad 5.84

LEONURUS.

+ Cardiaca gal. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. Hort.
Lycopus. fuchs cliff. 313. Fl. saec. 496. Mat. med. 308. It. scan.
Lycopus ang 231. Roy. lugd. 312. Dalib. parif. 182.

Marrubium Cardiaca dictum. Baub. pin. 230.

Cardiaca. Fuchs. hist. 395.

B. Cardiaca crispa. Raj. hist. 572.

Habitat in Europæ ruderatis. 2

* Marrubia- 2. LEONURUS foliis ovatis lanceolatisque serratis, ca-
strum. fuchs lycibus sessilibus spinosis.

Sideritis foliis ovatis & lanceolatis inciso-serratis. Hart.
cliff. 313. Sauv. monsp. 279.

Marrubiastrum foliis cardiacæ. Bocc. mus. 2. p. 120. t. 98.

Habitat in Bohemia, Ucrania.

tataricus.

Cardiaca ad.

3. LEONURUS foliis tripartitis laciniatis, calycibus vil-
losis. Hort. upf. 171. *

Sideritis foliis tripartito-multifidis. Hort. cliff. 313.

Hort. upf. 169.

Cardiaca, foliis tenuius & profundius incisis, glabra s. vil-
losa. Amm. ruth. 49. 50. ♂

Habitat in Tataria. ♂

Cardiaca sib.

sibiricus.

4. LEONURUS foliis tripartitis multifidis linearibus ob-
tusiusculis. Hort. upf. 170. *

Ballote inodora, foliis coronopi. Amm. ruth. 48. t. 8.

Habitat in Sibiria, China. ♂

Phlomis ad 191.

fruticoso.

X Phlomis. 191.
Phlomis. 191.

PHLOMIS.

1. PHLOMIS foliis subrotundis tomentosis crenatis, invo-
lucris lanceolatis.

Phlomis involucris tomentosis lanceolatis, foliis corda-
tis villosis, caule fruticoso. Hort. upf. 171.

Phlo-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 585

Phlomis involucri radiis lanceolatis villosis. *Hort. cliff.*

^{345:} Verbas^{cum} latis salviæ foliis. *Baup. pin.* 240.

Verbas^{cum} sylvestre alterum. *Dod. pempt.* 146.

3. Phlomis cretica fruticosa, folio subrotundo, flore luteo. ¹⁹¹
Tournef. cor. 10.

Phlomis latifolia capitata lutea grandiflora. *Dill. elth.* 316.
t. 237. f. 306.

Habitat in Sicilia, Hispania. 5.

2. PHLOMIS involucris lanceolatis, foliis ovatis subtus *purpurea*,
tomentosis.

Verbas^{cum} subrotundo salviæ folio. *Baup. pin.* 240.

Salvia fruticosa, cisti folio haud incano, floribus pur-
pureis. *Pluk. alm.* 329. *t. 57. f. 6.*

Phlomis fruticosa lusitanica, flore purpurascente, foliis
acutioribus, *Tournef. inst.* 178.

Habitat in Lusitania. 5.

3. PHLOMIS foliis radicalibus cordatis utrinque tomen- *Nissoli*.
tosis villosis.

Phlomis orientalis, foliis auriculatis incanis, flore lu-
teo. *Nissol.*

Habitat in Oriente.

Folia radicalia profunde cordata, oblonga, obtusiuscula;
Floralia ovata. Calyces hirsuti.

4. PHLOMIS foliis lanceolatis tomentosis: floralibus o- *lychnitis*. ^{angustis}
vatis, involucris setaceis lanatis. *Phlomis lychnitis clus.*

Phlomis foliis ligulatis utrinque tomentosis, radiis in-
volucri setaceis villosis. *Sauv. monsp.* 143.

Verbas^{cum} angustis salviæ foliis. *Baup. pin.* 240.

Verbas^{cum} sylvestre, foliis salviæ tenuifoliæ. *Lob. ic.*
558.

Habitat in Europa australi. D. Sauvages.

Habitus speciei 1, sed Folia angustiora. Corollæ vix ca-
lyce majores. Involuca linearia, pilis longis crinita.

5. PHLOMIS foliis alternatim pinnatis: foliolis laciniati- *laciniata*.
tis, calycibus lanatis.

Phlomis orientalis, foliis laciniatis. *Tournef. cor.* 10.

Habitat in Oriente.

6. PHLOMIS foliis ovatis subtus tomentosis, involu- *santia*.
cris subulatis strictis tripartitis.

Phlomis radiis involucri setaceis trifidis, foliis cordatis.

Sauv. meth. 152.

586 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Phlomis involucri radiis subulatis strictis. Hort. cliff.

*315. **

Phlomis famia herbacea, folio lunariæ. Tournef. cor. 10.

Habitat in Samo.

herba venti. 7. Phlomis involucris setaceis hispidis, foliis ovato-

oblongis scabris, caule herbaceo. Hort. upf. 171.

Sauv. monsp. 152.

Phlomis involucri radiis setaceis hispidis. Hort. cliff.

*315. **

Phlomis narbonensis, hominipha flava pinnata. 2178.

Marrubium nigrum longifolium. Baub. pin. 230.

Habitat in Persia, Tataria, Narbona ad aggeres. 2

tuberosa. 8. Phlomis involucris hispidis subulatis, foliis cordatis

scabris, caule herbaceo. Hort. upf. 171.

Leonurus ad. 192. Phlomis foliis cordiformibus, galea lacera. Act. gett.

211. t. 12. Lanth. 2. cm. 11.

Phlomis, urticæ foliis, glabra. Amm. ruth. 40. 39.

Galeopsis maxima, foliis hormini. Buxb. cent. I. p. 4

t. 6.

Habitat in Sibiriæ campestribus. 2

Involucra subulata & Calycis dentes patentes, hispidae.

Corolla galea dentata. Radix tuberosa.

zeylanica. 9. Phlomis foliis lanceolatis subserratis, capitulis ter-

minalibus, calycibus octodentatis.

Leonurus foliis lanceolatis subserratis obtusiusculis, ca-

*lycibus octodentatis. Fl. zeyl. 227. **

Cardiacæ s. Leonurus, hyssopi hirsutis foliis, maderaspa-

tana, floribus dilute rubris, unico tantum verticillo in

ramulorum cymis. Pluk. alm. 81. t. 118. f. 4.

Habitat in India.

indica. 10. Phlomis involucris linearibus, calycibus unilabi-

tis obliquis, foliis lanceolato-ovatis pilosis.

Habitat in India.

Folia ovata, serrata, basi attenuata, petiolata, pilis

mollibus vestita, viridia. Verticilli versus apicem duo

vel tres, crassi, cincti Involucris erectis, linearibus,

carinatis, villosis. Calyces tubulosi, oblongi, decagoni,

exteriori margine oris producti in labium 3 dentatum;

a tergo, ubi margo brevissimus, dentes duo minutis-

simi. Corolla Leonuri Cardiacæ, galea hirsutissima

pilis albis, longior, incana. Labium inferius parvum.

nepetafolia. 11. Phlomis foliis ovatis, calycibus decagonis septen-

Leopoldia ad. ad. Leopold. Botan.

192.

IA GYMNOSPERMIA.
 radis subulatis strictis. Hort.
 aca, folio lunaria. Tournes.
 ducis setaceis hispidis, foliis
 caule herbaceo. Hort. upf.
 radis setaceis hispidis. Hort.
 longifolium. Baub. pin. 130.
 Tataria, Narbona ad argenteas.
 hispidis subulatis, foliis co-
 rbus. Hort. upf. 171.
 ducibus, folia lacera. Ad.
 glabra. Auct. rath. 40.
 folia hormini. Baub. cent. 1.
 campesribus. 2
 & Calycis dentes patentia-
 ntata. Radix tuberosa.
 lanceolatis subserratis, capi-
 bus obcordatis.
 lanceolatis serratis obtusis.
 Fl. zeyl. 227.
 hissopi hirsutis foliis, ma-
 ste rubris, unico tantum ven-
 g. Plin. alm. 81. t. 118. f.
 ducis linearibus, calycibus
 lancolato ovatis pilosis.
 basi attenuata, petiolata
 iridis. Verticilli terjas apic-
 issi involucris erctis, lini-
 Calyces tabalif. oblongi, de-
 oris praesertim labiam 3 de-
 gae brevissimis, dentes duo n-
 torum Cardiae, galea hirs-
 et, iridea. Labium inferius pa-
 s ovatis, calycibus decagonis
 us. Hort. cliff. 312. sub Lou-
 1000

nov. specie de l'ile de la Guadeloupe aublet. D. Bonpland 15 juillet flor. f. ped.
 fl. tripl. angusta longa stylus. Sideritis 8 utring. Dentit. hirs. 8
 verticilli 1. ad 2. terminali. glab. 6 lin. diamet. 40 flor. fl. alti villous undulat.
 cal. long obtus. tenuat. 10 dents exqual. Corolla lobata brachii multo cattus. ac.
 } Leopoldina ad.
 192

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA 587

Cardiaca americana annua, nepetæ folio, floribus bre-
 vibus phœniciois villosis. Herm. lugdb. 115. t. 117.
 Habitat Surinami? 2

12. PHLOMIS foliis lanceolatis serratis, involueris linea- *Leonurus.*
 ribus nudis, calycibus decagonis decemdentatis. *Leonurus* ad. 192
Leonurus foliis lanceolatis obtuse serratis. *Hort. cliff.*
 312.
 Leonurus capitis bonæ spei. *Breyn. cent.* 171. t. 86.
 Stachys africana frutescens angustifolia, flore longissimo
 phœnicio, *Leonurus* dicta. *Moris. hist.* 3. p. 383.
 f. 11. t. 19. f. 17.
 Habitat ad Cap. b. Spei. 5

MOLUCCELLA.

1. MOLUCCELLA calycibus quinquedentatis: denti- *lævis.*
 culis æqualibus. *Roy. lugdb.* 314. *Hort. upf.* 172.
Molucca *lævis.* *Dod. pempt.* 92.
Melissa moluccana *odorata.* *Baub. pin.* 229.
 Habitat in Syria. 0
2. MOLUCCELLA calycibus septemdentatis. *Roy. spinosa.* *molucca*
lugdb. 314. *Hort. upf.* 172.
Molucca *spinosa.* *Dod. pempt.* 92.
Melissa moluccana *foetida.* *Baub. pin.* 229.
 Habitat in Moluccis. 0
3. MOLUCCELLA calycibus quinquefidis, corollis ca. *frutescens.*
 lyce longioribus.
Scordium spinosum, floris labio superiore s. galea lanu-
 giosa s. villofa. *Raj. suppl.* 311.
 Habitat in Pedemontio inter Tende & Braille e ru-
 pibus. *D. Sauvages.* 5
- Fruticulus *Ramulis dichotomis.* Folia ovata, pollicaria,
 pilis raris pubescentia, utrinque 2. f. 3. profundis ser-
 raturis notata, petiolata. Spinæ axillares, utrinque
 ternatæ ut in Berberide, sed tantum ad florum verti-
 cillos. Calyces infundibuliformes, parvi, decagoni,
 limbo quinquefidu, spinis terminalibus 12 ad 15. Co-
 rolla cardiace, galea lanata. Media inter Balloten, Le-
 onurum & Moluccellam.

CLINOPodium

1. CLINOPodium capitulis subrotundis hispidis, bra- *vulgar.* 188
 steis setaceis.

Clino- *clinopodium matthei* ad.

clinopodium 2

clinopodium 382

Mesaphoenum. Brown. t. 18. f. 3. membrum dactyloideum nucum. p. 71.
apriaca-brasil. Menthae monandra Sloan. t. 102.
Rota pubescens. altiss. fol. opp. menthae long-petiolata. fl. plena. nill. abg. inv.
Cat. Lyd. 5. dent. cor. latifl. 2 fl. st. 4. suber. Hdg. 2. sec. 2.
588. DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Clinopodium foliis ovatis, capitulis verticillatis. Hor.
cliff. 305. Fl. suec. 479. Roy. lugdb. 313.

Clinopodium origano simile. Baub. pin. 224.

Clinopodium. Cam. epit. 563.

Habitat in rupestribus Europæ, Canadæ. 2

Americana ex seminibus duplo minores gerit corollas, cœ
terum eadem.

2. CLINOPODIUM foliis subtus tomentosis, verticil-
lis explanatis, bracteis lanceolatis.

Clinopodium foliis lanceolatis ferratis, verticillis pedun-
culatis. Roy. lugdb. 313.

Clinopodium, menthæ folio, incanum & odoratum.
Dill. elth. 87. t. 74. f. 85.

Clinopodium majus virginianum non ramosum, verti-
cillis majoribus, floribus brevioribus carneis. Moris.
hist. 3. p. 374. f. 11. t. 8. f. 4.

Clinopodium Serpentaria dictum, latiori folio, capitulis
grandioribus. Pluk. mant. 51. t. 344. f. 7. Raj.
suppl. 298.

Origanum foliis ad summitem caulinum canis. Raj. hist.
1220.

Habitat in Europa boreali. 2

3. CLINOPODIUM foliis rugosis, capitulis axillaribus
pedunculatis explanatis radiatis.

Clinopodium rugosum, capitulis scabiosæ. Dill. elth.
88. t. 75. f. 86.

Scabiosæ affinis, chrysanthemi facie, lamii foliis, ameri-
cana. Pluk. alm. 335. t. 222. f. 1.

Sideritis spicata, scrophulariæ folio, flore albo, spicis bre-
vibus habitioribus rotundis pediculis insidentibus. Sloan.
jam. 65. hist. 1, p. 174. t. 109. f. 2.

Mentha americana inodora, foliis subincanis. Raj. suppl.
284.

Mentha melissoides americana. Pluk. mant. 129.

Melissa altissima globularia. Plum. spec. 6.

Habitat in Carolina, Jamaica, Gallia æquinoctiali. 2

ORIGANUM.

1. ORIGANUM foliis carnosis tomentosis.
Majorana rotundifolia scutellata exotica. Tournef. inst.
199.

Origano cognata Zatarhendi. Baub. pin. 223. Moris.
hist. 3. p. 360. f. 11. t. 3. f. ult:

Zatar-

Zatarhend. *Majorana*
Zatar-ana

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 589

- Zatarhendi. *Alp. ægypt.* 94. t. 95.
Habitat in Ægypto. 22nd. *Stomachica venalis in Cæri.*
- 2. ORIGANUM** foliis inferioribus tomentosis, spicis nuntantibus. *Hort. cliff.* 304. *Mat. med.* 106. *Roy. lugdb.* 323.
- Dictamnus creticus.* *Bauh. pin.* 222.
Dictamnum cretense. *Cam. epit.* 472.
Dictamnum. *Lob. ic.* 502.
Habitat in Cretæ monte Ida. 5
- 3. ORIGANUM** foliis omnibus glabris, spicis nuntantibus. *Hort. cliff.* 304. *Roy. lugdb.* 323. *Onagrum ad 188*
Origanum montis sipyli. *Herm. lugdb.* 462. t. 463.
Dictamnus sypyleus, majoranæ foliis. *Moris. hist.* 3.
p. 457. f. 11. t. 4. f. 2. *fol. glauca. glab. majorana.*
Habitat in Phrygiæ monte Sipylo. *folio nivale* *dictamnus*
grauca glab. majorana umbra.
- 4. ORIGANUM** spicis aggregatis longis prismaticis re-
 Etis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus.
Origanum foliis ovatis acutis glabris: venis scabris, spi-
 cis tetragonis. *Mat. med.* 300. *Onagrum ad 188*
Origanum foliis ovatis obtusis scabris integerrimis, spi-
 cis confertis compactis glabris. *Amœn. acad.* 1.p. 160.
Origanum creticum. *Bauh. pin.* 223.
5. ORIGANUM folio subrotundo. *Bauh. pin.* 223.
Origanum monspeliense pulchrum. *Cam. epit.* 468.
Habitat in Europa australi. 2
- 5. ORIGANUM** foliis ovatis acutis ferratis, spicis con-
 gestis umbellatim fastigiatis. *Hort. cliff.* 304. *Roy.*
lugdb. 324. *Smyrnæum ad 188*
Origanum smyrnæum. *Wheel. itin.* - - *Raj. hist.* 450.
Majorana cretica, origani foliis, villosa, saturejæ odo-
 re, corymbis majoribus albis. *Tournef. cor.* 13.
*Habitat in Creta & Smyrnæ in monte cui arx inædi-
 ficata.*
- 6. ORIGANUM** spicis longis pedunculatis aggregatis, *heracleoticum ad 188*
 bracteis longitudine calycum.
Origanum heracleoticum, *Cunila gallinacea* *Plinii.*
Bauh. pin. 223. *Oregæa lob.*
Orega, *Origanum heracleoticum*, *Cunila*. *Lob. ic.* 492.
Habitat in Europa australi, *Græcia.* 2
- Habitus *O. sylvestris*, sed spicæ digitales, laxe imbrica-
 tæ; at differt ab *O. cretico*, quod bracteæ vix calyci-
 bus longiores & demum quod spicæ pedunculatae.

7. ORI-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

- origanum ad. 188°*
- ~~7. ORIGANUM~~ spicis subrotundis paniculatis conglobatis, bracteis calyce longioribus ovatis.
- vulgare.* *Origanum vulgare. Linn.* *Origanum vulgare. Bong. Raym.* *Dobia missie. L. carnosus.* *Thymus* *Volca agnoriganum. Lob.*
- 299. Roy. lugdb. 323. Gron. virg. 65.*
- Origanum sylvestre. Baub. pin. 223.*
- Origanum sylvestre s. vulgare. Fuchs. hist. 522.*
- Habitat in Europæ, Canadæ rupestribus.*
- Americanum bracteis coloratissimis gaudet.*
- majorana ad.*
- onites. matth. grm.* *8. ORIGANUM* spicis oblongis aggregatis hirsutis, foliis cordatis tomentosis.
- Majorana gal. d. gal. gal.* *hylobry. hybr. lob. car.*
- Scarr. papa. Etowah. car.*
- 45. t. 38.*
- Origanum onites. Baub. pin. 223. an?*
- Habitat. Syracusæ. b*
- Habitus Majorana sed lignosus. Caules pilis longis patulis. Folia parva, cordata, subsessilia, acuta, rarius serrata, utrinque tomentosa, ex alis ramorum rudimenta. Spicæ congestæ, ut in Majorana, sed oblongæ, in singulo pedunculo ternæ, intermedio sessili, villosæ; Flores albi.*
- syriacum.* *9. ORIGANUM* spicis longis ternatis pedunculatis villosis, foliis ovatis villosis.
- ū60 f. pl. Dba*
- hylobry.*
- Majorana syriaca vel cretica. Baub. pin. 224.*
- Marum syriacum. Lob. ic. 499. Roy. 564.*
- Habitat*
- Habitus Majorana. Folia subrotando-ovata, acuta, pilis vagis adspersa. Rami ex axillis. Corymbus terminalis, ex ramis longioribus brachiatus. Spicæ sèpius ubique 3, terminales, longæ, erectæ, tetragonæ, villosæ.*
- Majorana. Bong. Raym.* *10. ORIGANUM* foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Hort. cliff. 304. Hort. upf. 151. Mat. med. 298. Roy. lugdb. 324.*
- Majorana vulgaris. Baub. pin. 224.*
- Amaracus vulgatior. Lob. ic. 498.*
- B. Majorana tenuifolia. Baub. pin. 224.*
- Majorana hortensis odorata perennis. Moris. hist. 3. p. 359.*
- Habitat - - - - ○*
- THYMUS.**
- Serpyllum. 1. THYMUS* floribus capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis bati ciliatis. *Fl. suec. 477. Mat. med. 282.*
- Thymus ad. 194.*

GYMNOSPERMIA.

spicis subrotundis paniculatis con-
 calyce longioribus ovatis.
 spicis laxis erectis confert-
 305. Fl. suec. 480. Mat.
 Graec. virg. 65.
 Bauh. pin. 223.
 L. vulgare. Fuchs. biss. 52.
 Canadæ rupestribus.
 spicis coloratissimis gaudet,
 oblongis aggregatis hirsutis
 sphaerulosis.
 syracusanum perenne, umbell-
 o & nervoso folio. Bocc. mus.
 Bauh. pin. 223. ex?
 lata lignosa. Caules pilosissi-
 mæ, cordata, subsessilia, acuta-
 tamentosa, ex aliis ramor-
 gressa, ut in Majorana, sed
 terne, intermedio sessili,
 longis ternatis pedunculis
 villa
 et crevica. Bauh. pin. 224.
 Lob. ic. 479. Fl. suec. 54.
 Folia subrotunda-ovata, uni-
 pari ex axillis. Corymbus
 angustioribus brachiatæ. Spica-
 les, longæ, erectæ, tetragona-
 folia ovalibus obtusis, spicis
 subfasciatis. Hort. cliff. 301.
 305. Roy. lugdb. 324.
 Bauh. pin. 224.
 Lob. ic. 498.
 Bauh. pin. 224.
 odorata perennis. Marij. hist. 1.
 THYMUS
 us capitis, caulis repente-
 bus ciliatis. Fl. suec. 477.

caulis latifolia. Bauh. pin. 225.

verticella columnæ

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 591

- Thymus repens, foliis planis, floribus verticillato-spi-
 catis. Hort. cliff. 306. Roy. lugdb. 325.
 Serpyllum vulgare minus. Bauh. pin. 220.
 Serpyllum vulgare. Dod. pempt. 277.
 B. Serpyllum vulgare majus. Bauh. pin. 220.
 Y. Serpyllum vulgare minus, capitulis lanuginosus. Tour-
 nef. inst. 197. It. gotl. 219.
 d. Serpyllum angustifolium hirsutum. Bauh. pin. 220. *sic Chegkhetz s. cap. 8. sciamum*
 e. Serpyllum foliis citri odore. Bauh. pin. 220. *in Syrphum transversum*
 Habitat in Europæ aridis apricis. 5 *En Thymo aliud Serpyllum est foliis rotundis aliud acuminatis elongatis: floræ subapicis, rotundis, alijs ciliatis et breviter divaricatis, alijs rotundis elongatis leviter ciliatis.* Thymus vulgaris degenerat.
 2. THYMUS erectus, foliis revolutis ovatis, floribus vulgaris. *Thymus ad* 194
 verticillato-spicatis. Hort. cliff. 305. Hort. upf. 160.
 Mat. med. 281. Roy. lugdb. 325. Sauv. monsp 148.
 Thymus vulgaris, folio tenuiore. Bauh. pin. 219.
 B. Thymus vulgaris, folio latiore. Bauh. pin. 219.
 Thymum durius. Dod. pempt. 276.
 Habitat in G. Narbonensis, Hispaniæ montosis saxo-
 sis. 5
 3. THYMUS floribus verticillato-spicatis, caule suffru-
 ticofo, foliis linearibus basi ciliatis. Læfl. *Zygis. Thymus non script.*
 Thymo vulgatori rigidiori simile. Bauh. hist. 2. p. 271.
 Thymum angusto longiorique folio. Barr. ic. 777.
 Serpyllum sylvestre Zygis dioscoridis. Clus. hist. 358.
 Serpyllum folio thymi. Bauh. pin. 220.
 Habitat in Hispania.
 Facies T. vulgaris; at Folia basi ciliata. *Acinos. dendrig. ad. 190.*
 4. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, *Acinos. galb. pub. 2d*
 caulis erectis subramosis, foliis acutis ferratis. *Cynodonidium. S. S. 2d*
 Fl. suec. 478. *Conopodium. D. 2d*
 Thymus caulis vix ramosis, foliis ovatis acutis, pe-
 dunculis plurimis unifloris. Hort. cliff. 306. Roy. *Hedysarum. mutt.*
 lugdb. 325. *Lobelia. 2d*
 Clinopodium arvense, ocymi facie. Bauh. pin. 225.
 Clinopodium vulgare. Lob. ic. 506.
 Habitat in Europæ glareosis, cretaceis, siccis. *○* *caulis. ad. 190.*
 5. THYMUS verticillis sexfloris, foliis obtusiusculis alpinis.
 concavis subserratis. *•*
 Clinopodium verticillis paucifloris in spicam congestis.
 Hall. helv. 653. *anthemoneby.*
 Clinopodium montanum. Bauh. pin. 225. Bocc. mus.
 2. p. 50. t. 45.
 Acini pulchra species. Bauh. hist. 3. p. 620.
flor. floral. 2d quæ de tigris *Ha-*
3 fl. annellæ parvæ. distans. chev. 1. 1/2 cm. contr.
cultivat. long. stig. r. 1/2. 5 dals.
extub. long. 5 dals. lev. 5 pp. fund. 5 dals.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Monspelii.

D. Rathgeb. ○ *D. Ribot.*

Habitus & affinitas cum antecedenti.

Cephalotes. Thymus
cephalotes. Thymus
ad. 189.

6. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis o-
vatis, foliis lanceolatis.

Thymus lusitanicus cephalotes, squamis capitulorum
amplioribus. *Tournef. inst. 196.*

Tragoriganum, dictamni capite, hispanicum. *Barr. ic.*
787. *Bocc. mus. 2. p. 50. t. 43.*

β. Thymus lusitanicus cephalotes, capitulo majori. T.

γ. Thymus lusitanicus cephalotes, capitulo minori. T.

Habitat in Hispania, Lusitania. 5

siliques.

7. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis den-
tatis, foliis setaceis pilosis.

Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite
magno purpurascente oblongo. *Tournef. inst. 196.*

β. Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite
magno purpurascente rotundo. *Tournef. inst. 190.*

Habitat in Lusitania. 5

pulegoides. 8. THYMUS rāmis verticillatis longis, foliis ovalibus
striatis.

Acinos thymi folio & facie, floribus in expansis. *Morif.*
hist. 3. 404. s. II. t. 19. f. 6.

Habitat Monspelii. D. Sauvages. ○

Habitus Melissæ pulegoidis s. *Menthæ pulegii*, at Ca-
cyces bilabiati a Satureja, ore barbati a *Melissa* &
Mentha eam distingunt. Caulis spithameus, erectus.
Rami pauci, simplices, breves. Folia ovalia, obtusa,
glabra, subtus striata. Rami & plantæ maxima pars
verticillis obvallata.

Melissa ad. 194.

officinalis.

Erythra. galba.

Thym. plm.

Melissa. Arnulf. Ray.

perfoliativa. 3dva

perfoliativa. 3dva

apiastrum. mett.

citrus. gen.

Ornella. gen.

MELISSA.

1. MELISSA racemis axillaribus verticillatis: pedicellis
simplicibus.

Melissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Hort.*
cliff. 307. Hort. upf. 163. Mat. med. 294. Roy. lugdb.
320. *Sauv. monsp. 149.*

Melissa hortensis. Baub. pin. 229.

Apiastrum s. Melissophyllum. Lob. hist. 227.
*Habitat in montibus Genevensibus, Allobrogicis, Ita-
licis. 2*

+ 2. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitu-
dine florum. Cal-

Scorffaria. gen.

Calamintha ad 193.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA 593

Calamintha magno flore. *Baub.* pin. 229. *Riv. mon.* 43.
Calamintha montana præstantior. *Besl.* eyst. æst. 7. t.

7. f. 1.

Habitat in Hetruriæ montosis. ♀

3. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitu-
diue foliorum. *Calamintha montana*
xanthopoda *var.*

Melissa floribus ex alis superioribus pedunculo commu-
ni confertis. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320. *Mat.*
med. 295. *Sauv. monsp.* 149.

Calamintha vulgaris & officinarum germaniæ. *Baub.*
pin. 228.

Calamintha montana. *Dod. pempt.* 98.

Habitat in Italiæ, Hispaniæ, Galliæ clivis saxosis. ♀

4. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio lon-
gioribus, caule decumbente. *Nepeta*. • *cardi. c. a.*

Melissa floribus ex alis superioribus, pedunculo dichoto-
mo, caule procumbente. *Hort. cliff.* 308. *Gron. virg.* 65.
Roy. lugdb. 321. *Sauv. monsp.* 149. *Gort. gelr.* 337.

Calamintha pulegii odore s. *Nepeta*. *Baub.* pin. 228.

5. *Calamintha* montana præalta, pulegii odore. *Bocc. mus.*
2. p. 45. t. 40. & 38. *Calamintha* *pulegii*

Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ, Helvetiæ aggeribus
glareosis.

5. MELISSA raeemis terminalibus, pedunculis solitariis *cretica*.
brevissimis.

Calamintha incana, ocymi foliis. *Baub.* pin. 569.

Calamintha, pulegii odore, minor. *Barr. ic.* 1166.

Calamintha clinopodii austriaci foliis, odore pulegii.

Pluk. alm. 75. t. 163. f. 4

Habitat Monspelii.

6. MELISSA fruticosa, ramis attenuatis virgatis, foliis *fruticosa*.
subtus tomentosiflos.

Melissa caule fruticoso, racemis verticillatis. *Roy. lugdb.*
321.

Calamintha hispanica frutescens, mari folio. *Tournef.*
inst. 194.

Habitat in Hispania. ♂

7. MELISSA floribus verticillatis glomeratis secundum *Pulegoid.*
longitudinem caulis, foliis tomentosis. *Gron. virg.*
167.

Habitat in Virginia, Canada. ○

Planta spithamea, brachiata: Ramis brevioribus, simpli-
P p *cibus.*

cibus. Folia lanceolata, glabra. Verticilli laxi florum a radice ad summitates plantæ conferti. Differt a Thymo pulegioide, cui simillima, non tantum floribus minime spicatis ut in thymo, verum lateralibus per caulem sparsis, sed præcipue fauce calycis vix manifeste villosa, minime pilis albis clausa. Folia in hac utrinque uno alterove dente notata, in Thymo autem sapius integerrima.

DRACOCEPHALUM.

* Spicata.

~~X 5000. virginianum 1.~~
Dracocephalum

~~cataleptike. foliis~~

~~ad. 187~~

1. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis lanceolatis serratis.

Dracocephalum foliis simplicibus, floribus spicatis. Hort. cliff. 308. Roy. lugdb. 311.

Dracocephalum. Breyn. ic. 33. t. 27. Hir. act. 1712. p. 276. t. II.

Dracocephalus angustifolius, folio glabro serrato. Moris. hist. 3. p. 407. s. II. t. 4. f. I.

Pseudodigitalis persicæ foliis. Bocc. sic. 12. t. 6. f. 3.

Lysimachia galericulata spicata purpurea canadensis.

Barr. ic. 1152. ~~genus in a mala via dom~~
Habitat in America septentrionali. 2

~~2. dracaena digitata~~
Volcamena aday 192.

~~Volcamena. heit.~~

~~Baum gilead. angl.~~

2. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis compositis. Hort. cliff. 308. Mat. med. 293.

Dracocephalo affinis americana trifoliata, terebinthina odore. Volk. nosib. 145. t. 145.

Camphorosma. Moris. hist. 3. p. 366. s. II. t. II. f. ult.

Melissa forte canarina triphyllus, odorem camphora spirans penetrantissimum. Pluk. alm. 401. t. 325. f. 5.

Cedronella canariensis viscosa, foliis plerumque ex eodem pedicello ternis. Comm. hort. 2. p. 81. t. 41.

Habitat in Canariis. 3 ~~Lypanti/potent~~

~~2. pinnata~~
Volcamena ad

~~pinnatum.~~

3. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis cordatis pinnato-sinuatis.

Dracocephalam foliis pinnato-sinuatis obtusis, floralibus spicatis villosis coloratis. Hort. upf. 165. *

Habitat ad Jerkatsch. Steller, D. Gmelin.

Caules fruticosi, decumbentes. Folia cordata, transversim pinnatifida, obtusa lobis remotis, longe petiolata.

Spica Melampyri arvensis: bracteis lanceolatis, dentato-setaceis, rubris saepe. Corollæ parvæ; Styli floribus duplo longiores.

4. DRA

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

595

~~Ruyschiana ad 194~~

~~austriacum ad 194~~

~~austria ad 194~~

~~Linen ad 194~~

4. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bra- austriacum.
Eteisque linearibus partitis spinosis.
Hyssopus spicis interruptis. Hort. cliff. 364.

Hyssopus austriacus, magno flore, folio chamæpithyos.

Herm. lugdb. 330.

Ruyschiana hirsuta, foliis laciniatis. Amm. ruth. 50.

Chamæpithys cærulea austriaca. Baub. pin. 250.

Chamæpithys austriaca. Clus. hist. 2. p. 185.

Habitat in Austria. 2 Molavica spicata? Rhyschiana

5. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bra- Ruyschiana ad 194.
Eteisque lanceolatis indivisis muticis.

Dracocephalum foliis linearibus indivisis integerrimis,
floribus spicatis, Hort. upf. 165. *

Ruyschiana glabra, foliis integris. Amm. ruth. 50.

Ruyschiana flore cœruleo magno. Boerb. lugdb. 1 p. 172.

PseudoChamæpithys austriaca. Riv. mon. 106.

Prunella hyssopi folio viridi, ampio flore cœruleo. Mo-

rif. hist. 3. p. 364. f. 11. t. 5. f. 9.

Habitat in Sibiria, Suecia. 2 Genus a molavica diversum.

* Verticillata.

6. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, foliis grandiflor- Moldavica ad 194.
ovatis inciso-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis. rum. integrata

Dracocephalum floribus verticillatis, foliis oblongis ob-
tusis sinuato-crenatis, bracteis oblongis. Gmel. miss.

Habitat in Sibiria. ☽

Folia ovata s. ovalia, profunde & obtuse serrata, nuda:
caulina trinervia; floralia integerrima. Bracteæ lan-
ceolatae, integerrimæ, parvæ, pilis adspersæ. Corol-
la maxima, cœrulea.

7. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis Moldavica, mollis ad 194.
lanceolatis: ^{ciliata} ferraturis capillaceis. Hort. upf. 166. * ~~lutea~~
Mat. med. 292.

Dracocephalum floribus verticillatis, foliis ovato-lan-
ceolatis. Hort. cliff. 308. Roy. lugdb. 312.

Melissa peregrina, folio oblongo. Baub. pin. 229.

Melissa moldavica. Cam. epit. 576.

Habitat in Moldavica. ☽ ~~lutea~~

8. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracte- canescens.
is oblongis: ferraturis spinosis, foliis subtomentosis.
Hort. upf. 66. *

Dracocephalum floribus verticillatis, foliis lanceolatis,
floribus oblongis. Hort. cliff. 308. Roy. lugdb. 312.

Moldavica orientalis, betonicæ folio, flore magno vio-
laceo. Tournef. cor. II. Comm. rar. 28. t. 28.

596 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Moldavica

• peltatum.

on bicula ad.

• nutans.

Moldavica ad. 190

• thymiflora.

Cedronella

Roy. v. p. 190

Hort. upf. 167.

Paina ad. 189

• pyrenaicum.

Paina ad.

Polyanthha

Linn.

virginicum.

Sideritis annua, flore luteo, utriculis & foliis longioribus. Moris. hist. 3. p. 389. s. II. t. 8. f. 18.

Habitat in Oriente. ◎

9. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis orbiculatis ferrato-ciliatis. Hort. upf. 166. *

Dracocephalum floribus verticillatis, foliis floralibus orbiculatis. Hort. cliff. 309. * Roy. lugdb. 312.

Moldavica orientalis, salicis folio, parvo flore cæruleo. Tournef. cor. II.

Habitat in Oriente. ◎

10. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majusculis nuntantibus. Hort. upf. 167. n. 6. *

Moldavica betonicæ folio, floribus minoribus cæruleis pendulis. Amm. ruth. 44.

Habitat in Sibiria. ◎ Rhynchisca purpurea

~~habet a cetera~~

II. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus.

Cedronella tatarica perennis, urticæ foliis, flosculis minoribus ex cæruleo rubentibus. Roy. lugdb. 1537.

Moldavica betonicæ folio, floribus minimis pallide cæruleis. Amm. ruth. 46.

Habitat in Sibiria. ◎ Rhynchisca purpurea

~~habet a cetera~~

Effe crassum grandis HORMINUM.

1. HORMINUM foliis cordatis obtusis, caule nudo. Horminum. Hort. cliff. 309.

Gallitrichum folio rotundo, flore magno violaceo. Bauh. hist. 3. p. 313. Moris. hist. 3. p. 395. Raj. hist. 546.

Melissa pyrenaica, caule brevi, plantaginis folio. T. Magn. hort. 133. t. 133.

Habitat in altis montium Tyrolensium, Pyrenæorum. *

2. HORMINUM foliis cuneiformi-oblongis, caule bifolio.

Melissa atrorubens, bugulæ folio. Dill. elth. 219. t. 175. f. 216.

Sideritis, bugulæ folio, mariana, floribus purpureis longo tubulo donatis. Pluk. mant. 171.

Habitat in Virginia, Carolina.

~~culta ab aliis medicina vir compissa. Cretaria~~

~~frenata.~~

MELIT.

albahaca. auct. scimus affixis. p. 8 in 226.
albahaca herbacea doiv. gratia in nova hys. anestitor. auct.

Sin. Japan
Ie. vulgaris
Falkneri

598

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

superiore 4 fido; Labio inferiore simplici. Stamina 4, quorum 2 basi appendiculata. Stylus flore longior, bifidus. Flores tam parvi, ut vix nudis oculis conspiciantur, qui incipiunt florere ab apice spicarum.

menthoïdes. 5. OCIMUM foliis linear-lanceolatis ferratis. Fl. zeyl.
229.

229. *Mentha zeylanica*, angustissimo folio dentato. *Raj.*
suppl. 284.

Habitat in Zeylona.

id. genitae. Tenuinum — TRICHOSTEMA.
— TRICHOSTEMA staminibus longit.

Zenium ad 188 TRICHOSTEMA staminibus longissimis exsertis.
Trichostema. Hort. cliff. 493. Gron. virg. 64. Roy.
lugd. 310.

Scutellaria cærulea, majoranæ folio, americana. Raj.
Suppl. 311.

Cassida marijana, majoranæ folio. Pet. sicc. 243.

Habitat in Virginia, Pennsylvania. ◎

Teucrium ad. ^{brachiatum.} 2. TRICHOSTEMA staminibus brevibus inclusis.
Teucrium virginianum, origani folio. Dill. elth. 380.
t. 285, f. 369.; fl. solitaria.

t. 285. f. 369. p. 100.
Habitat in America septentrionali.
Et vera Curie pecc. ex delupt. et p. Dillenii in qua legitur.
et genus trichostoma SCUTELLARIA.

Cappida. ad. 188^o orientalis. I. SCUTELLARIA foliis incisis subtus tomentosis.
Hort. upf. 173.

Hort. upf. 173.

Scutellaria foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 310. * *Rox. Engw.*
310. *Scutellaria* foliis pinnatifidis. *Flora L.* 179. *Scutellaria* foliis pinnatifidis. *Tour-*

Cassida orientalis, folio chamædryos, flore luteo. Tour-
nef. cor. II. itin. 3. p. 306. t. 306. Comm. rar.

t. 30. Mart. cent. 18. t. 18.

Scutellaria orientalis incana, foliis laci
Tournef. cor. II.

2. SCUTELLARIA foliis inciso-ferratis utrinque gla
bris, spica rotundato-tetragona. Hort. upf. 173.
Cassida alpina supina, magno flore abido. Tournes. inf.

Habitat in Siberia, Tataria. 2

3. SCUTELLARIA floribus lœvibus carina scabris, ræ
cemis lateralibus foliosis.
Scutellaria foliis cordato-lanceolatis serratis, pedunculis
multifloris. Roy. lugdb. 311. Scu-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 599

Scutellaria foliis ovato-lanceolatis petiolatis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 67.
Scutellaria palustris repens virginiana major, flore minore. *Moris. hist.* 3. p. 416. *cassia amur. prouton.*?
Habitat in Canada, virginia. 2
Racemi laterales Foliis minoribus, lanceolatis, ferratis;
insuper singuli pedicelli seta utrinque notati sunt, ut
in S. galericulata & peregrina.

Cassida ad 188

4. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, *galericulata.* floribus axillaribus. *Fl. lapp.* 239. *Fl. suec.* 499. *Hort. cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 310.

Lysimachia cærulea galericulata f. Gratiola cærulea. *Bauh. pin.* 246. *cassia palustre vulgata fl. caerulea. iust. 182.*

Lysimachia galericulata. Dalech. hist. 1060.
Habitat in Europæ littoribus. 2

5. SCUTELLARIA foliis integerrimis: inferioribus ha- *hastifolia.* statis, superioribus sagittatis. *It. gotl.* 212. *Fl. suec.* 500.*

Scutellaria folio non ferrato. Riv. mon. 113.

Habitat ad littora Sueciæ rarius. 2

An varietas praecedentis? certe maxime affinis.

6. SCUTELLARIA foliis sessilibus ovatis: inferioribus *integripolia.* obsolete serratis; superioribus integerrimis. *Gron. virg.* 67.

Scutellaria foliis integerrimis. Gron. virg. 67.
Scutellaria cærulea virginiana, lamii aut potius teucrii folio, minor. *Pluk. alm.* 338. t. 313. f. 4.

Scutellaria, teucrii folio, marilandica. Raj. suppl. 310.
Habitat in Virginia, Canada.

7. SCUTELLARIA foliis lanceolatis. *Gron. virg.* 167. *hyssopifolia.*
Cassida mariana hyssopifolia. Pet. act. angl.
Habitat in Virginia.

8. SCUTELLARIA foliis subcordatis ferratis, spicis *peregrina.* 581. interruptis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. ups.* 172. *Roy. Servotij.* 2. *Slin. Sone* *lugdb.* 311.

Cassida. Colum. ecphr. 1. p. 187. t. 189.

Lamium peregrinum f. Scutellaria. Bauh. pin. 231.

Habitat in nemoribus Florentiæ, Liburni.

Alia huic simillima Calycibus lanatis, pilis griseis, Collæ galea apice pilosa. Bracteis ovatis, brevibus.

9. SCUTELLARIA foliis ovatis crenatis, spicis *imbri-alpina.* catis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. ups.* 173. *Roy. lugdb.* 311.

600 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

*Teucrium alpinum inodorum, magno flore. Bauh. pin.
247. prodr. 116. Burs.*

Habitat in Alpibus Helvetiæ. 222

indica.

10. *SCUTELLARIA* follis subovatis crenatis petiolatis, florum racemis nudiusculis.

Habitat in China.

Planta minor; Folia suborbiculata, subovata, obsolete serrata, petiolata. Racemus terminalis. Bracteis linearibus, brevissimis. Calyces brevissimi absque tubooris. Corollæ angustæ, longiusculæ.

Cassida. ad. 188

11. *SCUTELLARIA* foliis cordato-oblongis acuminatis serratis, spicis subnudis.

Scutellaria orientalis altissima, urticæ foliis. Tournef. cor. II

Habitat in Oriente.

ap. cretica.

Cassida. ad

12. *SCUTELLARIA* foliis cordatis obtusis obtuseque serratis, spicis foliosis. *Roy. lugdb. 311.*

Cassida cretica fruticosa, folio catariæ, flore albo. Tournef. cor. II.

Habitat in Creta.

PRUNELLA.

1. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis.

1. *Brunella. Brunf. 225. Prunella braetis cordatis. Hort. cliff. 316. Fl. suec.*

2. *Brunella. febr. mag. 498. Mat. med. 309. Roy. lugdb. 314.*

Kakko utru bogata vulgo. japon. Brunella major, folio non dissecto. Bauh. pin. 260. Brunella. Dod. pempt. 136.

+ - grandiflora. 3. *Brunella cærulea, magno flore. Bauh. pin. 261. It. gotl. 219. 228.*

Brunella 1. non vulgaris. Clus. hist. 2. p. 42.

+ - laciniata. 2. *Brunella folio laciniato. Bauh. pin. 261.*

Brunella 11. non vulgaris. Clus. hist. 2. p. 43.

3. *Brunella minor alba laciniata. Bauh. pin. 261.*

4. *Brunella verbenulæ folio, flore cæruleo. Vaill. paris. 22. t. 5. f. 1.*

Habitat in Europæ pascuis. 2

Planta 2 in apricis procumbens, pollicaris; in nemoribus erecta pedalis. 3 grandiflora in rupium fissuris plurumque nascitur; 2 Laciniata tam multa habet in fructificatione communia, ut vix videatur distincta.

Brunella

- *bryophylofolia. 2. PRUNELLA* foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsestilibus. *Sauv. monsp. 141.*

Bru-