



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Brunella hyssopifolia. *Baub. pin.* 261.
 Brunella angustifolia integra hirsutior. *Moris. hist.* 3.
 p. 364. f. II. t. 5. f. 7.
Habitat Monspeli. 2

*Brunella ad-
 cleonia. lia. gen
 lusitanica. / na 736
 acume du / ty ma h per*

3. PRUNELLA bracteis pinnato-dentatis ciliatis. *Læf. descr.* 31.
Prumella odorata lusitanica, flore violaceo. Barr. ic. 561.
Clinopodium lusitanicum spicatum & verticillatum.
Tournesf. inst. 195.
Bugula odorata lusitanica. Comm. canad. 46. *Moris. hist.*
 3. p. 391. f. II. t. 5. f. 4.
Habitat in Lusitania, Hispania.

PRASIUM. *dit. ut unum gme cum marebori.*

1. PRASIUM foliis ovato-oblongis ferratis. *Hort. cliff. majus.*
 309. *Hort. ups.* 173. *galeopid. hysp. fruct. tenuifolia. Linn.*
Lamium arboreum perenne creticum. Zan. hist. 112.
 t. 46. *Raj. hist.* 561.

*Levica ad.
 190.*

*Melissa fruticosa cretica sempervirens, teucree facie, flo-
 re albo. Moris. hist.* 3. p. 408. f. II. t. 21. f. 3.
Teucrium fruticans, amplo & albo flore, italicum. Barr.
ic. 895. *sem. 4. baccata. dicitur olea, sed magis abstinere unico carne / unum de in di te de*
Habitat in Sicilia, Romæ & in agro Tingitano. 5 *Spid. cal. auct. 49 mi*

2. PRASIUM foliis ovatis crena utrinque duplici. *Hort. minus.*
cliff. 309. *

*Lamium fruticans, teucree folio lucido, calyce & flore
 magno candido: tantilla purpura varie notato. Cup.*
cathol. 106.

Habitat in Sicilia. 5

*An hæc sufficienter specie a priori distincta ulterius in-
 dagandum.*

PHRYMA. *ut unum Niu. gummi amuronicæ ferdid. in mirti.*

1. PHRYMA. *Gen. nov.* 1092.

*Leptostachya. ~~Clav~~
 mdrch*

Leptostachya. Mitch. gen. 9. *Ph. 2. 380 f. 5*
*Verbena racemo simplicissimo, floribus sessilibus, calyci-
 bus fructus reflexis racemoque appressis. Gron. virg.*
 7. *Roy. lugdb.* 536. *circa flid. Ph. 2. 380. f. 5.*
Habitat in America septentrionali.

ANGIOSPERMIA.

BARTSIA. ad 211

coccinea.

1. BARTSIA foliis alternis linearibus utrinque bidentatis. Bartsia foliis alternis. *Hort. cliff.* 235. *Gron. virg.* 68. *Amœn. acad.* 1. p. 160.
 Pedicularis f. cristæ galli affinis virginiana, ajugæ multifido folio: apicibus coccineo, floribus pallidis in spicam congestis. *Pluk. alm.* 283. t. 102. f. 5. *Raj. suppl.* 400.
 Horminum, tenui coronopi folio, virginianum. *Morif. hist.* 3. p. 395. f. 11. t. 13. f. 28.
Habitat in Virginia, Noveboraco. 4

pallida.

2. BARTSIA foliis alternis lanceolatis integerrimis, floralibus ovatis dentatis. Bartsia foliis alternis bidentatis. *Amœn. acad.* 2. p. 356. *
Habitat in Sibiria D. *Gmelin. Deruidoff.*

viscosa.

3. BARTSIA foliis superioribus alternis ferratis, floribus lateralibus.

Euphrasia latifolia viscata ferrata. Morif. blas. 264.
Euphrasia major lutea latifolia palustris. Raj. hist. 772. *angl.* 3. p. 285.
Euphrasia lutea palustris. Pluk. alm. 142. t. 27. f. 5.
Euphrasia lutea latifolia palustris. Morif. hist. 3. p. 432.
Alectorolophos italica luteo-pallida. Barr. rar. 209. t. 665.

Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ paludibus ad rivulos. ©

Rhinanthus
alpinus

4. BARTSIA foliis ^{oppositis} cordatis obtuse ferratis. *Hort. cliff.* 325. *Fl. suec.* 515. *Roy. lugdb.* 298.

Euphrasia caule simplici, foliis cordatis sessilibus obtuse ferratis. Fl. lapp. 246. *Fl. dit. anell. opp. subter.*

Clinopodium alpinum hirsutum. Baub. pin. 225. *Pluk. alm.* 110. t. 163. f. 5. *Can. sub longo virgata alab.*

Clinopodium alpinum. Pon. bald. 343.

Teucrium alpinum, coma purpuro-cærulea. Baub. pin. 247. *est. 4. anell.*

Stachelina. Hall. helv. 624. *virgin. 1. abru.*

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Allobrogicis, Baldo, Vallicis. 4

Trixago.

5. BARTSIA foliis oppositis lanceolatis obtuse ferratis. *Trixago apula unicaulis. Colum. ephr.* 1. p. 199. *Morif. hist.* 3. p. 427. f. 11. t. 2. 4. f. 8.

Rhinanthus
Trixago
f. n. 405.

Chama-

hordeum cauleum B. Sig. 23. Sicut *peruna* (en B. j. ullin) *Pedicularis* } *Cevadilla* Monard. 277
specia nov. hipp. limeti hordeos idem. *hordeum unicum* qd idem } *ou Sibadilla*
cevadilla nam *cevad* *hispanis* hordeum est. et *pedicularis* *emiat*. } *opzada monard.* 277
 on lin. *venit affinis*, sed *capitula* *indican* *afinitatem* cum *staphylagide* } *pedicularis monard.*
 et *aromato* quibus *ventus* *audit*. } — ad. 1458

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 603

Chamaedrys unicaulis spicata. Baub. pin. 248.
Antirrhinum folio dissecto. Baub. pin. 211.
Habitat in Italiae maritimis, humentibus. ☉

RHINANTHUS.

1. **RHINANTHUS** corollis labio superiore subulato orientalis, incurvo *Elephas ad. 211*
Elephas orientalis, flore magno proboscide incurva. *Tournef. cor. 48. itin. 2. p. 299. t. 299.*
Habitat in Oriente.
Calyx quadrifidus: lacinia prima (sub rostro corollae) ovata; lateralibus utrinque reflexis; quarta, recta obtusa.
2. **RHINANTHUS** corollis labio superiore subulato re- *Elephas. ad. 211.*
 ctato. *Roy. lugdb. 298.*
Elephas italica, flore magno proboscide surrecta. *Tournef. cor. 48.*
Elephas campoclarensium. *Col. ecpbr. 1. p. 186. t. 188.*
Euphrasia lutea, floribus elephantis caput cum proboscide referentibus. *Moris. hist. 3. p. 432. f. 11. t. 24. f. 14.*
Scordio affinis Elephas ob florem. Baub. pin. 248.
 β. *Elephas orientalis,* flore parvo, proboscide surrecta. *Tournef. cor. 48. itin. 3. p. 54. **
Habitat in umbrosis Italiae. ☉
Habitus precedentis, at Flos diversus calyce trifido: lacinis duabus reflexis: tertia majore erecta, plicata, acuta. *minulus. ad 211.*
3. **RHINANTHUS** corollarum labio superiore com- *Crista galli, +*
 presso brevior. *Fl. lapp. 248. Fl. suec. 503. Hort. cliff. 325. Roy. lugdb. 298.* *minulus. Plin. quibus. nati testis no minulus. ex. ch. p. 209.*
Pedicularis pratensis lutea f. Crista galli. Baub. pin. 163. *minulus. Plin.*
 β. *Crista galli angustifolia montana.* Baub. pin. 163. *prodr. 86.* *minulus. Plin.*
 γ. *Crista galli mas.* Baub. hist. 3. p. 436. *minulus. Plin.*
Habitat in Europae pratis. ☉ *minulus. Plin.*
4. **RHINANTHUS** foliis sublanceolatis pilosis integer- *indica.*
 rimis. *Fl. zeyl. 238,*
Hyssopus zeylanicus tenellus pratensis. *Burm. zeyl. 122.*
Habitat in Zeylona.
5. **RHINANTHUS** corollis fauce patente, foliis sinua- *virginica.*
 to dentatis. *Gron. virg. 168. †*
Habitat in Virginia. **EU.**

EUPHRASIA.

latifolia.

1. EUPHRASIA foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis.

Euphrasia foliis ovatis, floribus spicatis. *Sauv. monsp.* 139.Euphrasia purpurea minor. *Bauh. pin.* 111. *Magn. monsp.* 95. t. 94.Euphrasia pratensis latifolia italica. *Bauh. pin.* 234. *Moris. hist.* 3. p. 430. f. 11. t. 24. f. 8.Euphrasia tertia latifolia pratensis. *Col. ecphr.* 200. t. 202. f. 2.

Habitat in Apulia, Italia, Monspeli. ☉

Euphrasia ad 211.

officinalis.

2. EUPHRASIA foliis ovatis argute dentatis.
- Fl. lapp.*

247. *Fl. suec.* 516. *Mat. med.* 315. *Roy. lugdb.* 299. *Hall. helv.* 628.

Euphrasia caule ramoso, foliis ovatis acute dentatis.

Hort. cliff. 325.Euphrasia officinarum. *Bauh. pin.* 233.Euphrasia minor. *Dill. app.* 53.Euphrasia. *Cam. epit.* 767.Habitat in Europæ pascuis aridis. ☉ ad lapp. rami alt. 1.5 p. 1.5
fol. ovatis argute dentatis. caule ramoso. dent. ovatis. cap. ovatis. fl. lapp. 247.

tricuspidata

3. EUPHRASIA foliis linearibus tricuspidatis.

Euphrasia angustis & tricuspidatis foliis, floribus ex albo purpureis. *Pluk. alm.* 142. t. 177. f. 1. *Zan. hist.*

110. t. 76.

Habitat in Italia. ☉

Euphrasia

Odontites.

4. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus serratis.

Hort. cliff. 346. *Fl. suec.* 517. *Roy. lugdb.* 299.Euphrasia pratensis rubra. *Bauh. pin.* 234.Euphrasia altera. *Dod. pempt.* 55.

- β. Euphrasia sylvestris major purpurea latifolia.
- Col. ecphr.*

1. p. 201. t. 202. f. 1.

Habitat in Europæ arvis pascuisque sterilibus. ☉

lutea.

5. EUPHRASIA foliis linearibus serratis: superioribus integerrimis.

Euphrasia pratensis lutea. *Bauh. pin.* 234. *Moris. hist.* 3. p. 432. f. 11. t. 24. f. 16.Euphrasia lutea montana angustifolia major altera. *Col. ecphr.* 1. p. 204. t. 203.

Habitat in Europa australi. ☉

linifolia.

6. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus integerrimis.

Euphrasia foliis linearibus. *Sauv. monsp.* 138.

Eu-

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 605

Euphrasia foliis lini angustioribus. *Baub. pin.* 234.
 Euphrasia linifolia. *Col. ecphr.* 2. p. 68. t. 69.
Habitat in Italia, Helvetia, Gallia. ☉

MELAMPYRUM.

1. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus compa-
 ctis obtusis imbricatis. *Fl. suec.* 510.
 Melampyrum luteum angustifolium. *Baub. pin.* 234.
 Melampyrum luteum, linariæ folio. *Baub. prodr.* 112.
 Melampyrum angustifolium cristatum. *Pluk. alm.*
 249. t. 99. f. 2. *Rid. p. 114*
Habitat in Europæ borealis pratis asperis. ☉

Melampyrum
cristatum. ad 2H
Linopyrum c. B. +

2. MELAMPYRUM spicis conicis laxis laceris. *Fl. suec.*
 511.
 Melampyrum foliis laciniatis laxè spicatis. *Roy. lugdb.*
 298.
 Melampyrum purpurascens coma. *Baub. pin.* 234.
 Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.
 Melampyrum lanuginosum bæticum. *Baub. pin.* 234.
Habitat in Europæ agris. ☉

melampyrum
arvense. +
melampyrum gal.
melampyrum gal. Dod.

3. MELAMPYRUM bracteis cordato-lanceolatis: sum-
 mis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Fl. suec.* 512.
 Melampyrum coma cærulea. *Baub. pin.* 234.
 Parietaria sylvestris I. *Clus. hist.* 2. p. 44.
Habitat in Europæ borealis nemoribus. ☉

nemorosum.

4. MELAMPYRUM florum conjugationibus remotis,
 corollis clausis. *Fl. suec.* 513.
 Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis.
Fl. lapp. 240.
 Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin.* 243.
Habitat in Europæ borealis pratis siccis. ☉

pratense.
απαλοχρον. Dod. Lob
crates ogonum.

5. MELAMPYRUM corollis hiantibus. *Fl. suec.* 514.
 Melampyrum floribus sparsis sessilibus binatis, foliis om-
 nibus indivisis. *Hall. helv.* 627.
 Melampyrum latifolium, floribus parvis luteis. *Cels.*
ups. 32. *Fl. lapp.* 240.
Habitat in Europæ borealis sylvis. ☉
Differt a precedente corollis dimidio brevioribus, limbo
hiantibus.

? cypeda. ad.
Melampyrum
sylvaticum. +
2. Segali.

substitua. d. V. B. H. t.

LATHRÆA.

1. LATHRÆA caule ramoso subterrestri, floribus ere-
 ctis. *Clandestina.*
 La-

Clandestina.
 La-

Crossinam. h. m. g. 2. 68. ...
fl. lobis antheris magni. lob. inflat. ...
...
606

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Carpigna. caaj
arachidna. Chiph. caaj.
En caaj. diu tenemur
corymbis inuicem iacta
apragi a fengi.
caaj. l. 6. c. 40.

Lathraea foliis cordatis, floribus fasciculatis, Guett. stamp.
454. *Dalib. paris. 191.*
Clandestina, flore subcaeruleo. Tournef. inst. 652.
Dentaria aphyllis, flore purpureo. Raj. hist. 1230.
Orobanche montana. Rudb. elys. 2. p. 233. f. 14.
Orobanche flore majore ex caeruleo-purpurascete.
Bauh. pin. 87. prodr. 31. Bursf. III: 155. Rudb. e-
lys. 2. p. 229. f. 2. Raj. hist. 1227. Moris. hist. 3.
p. 502. f. 12. t. 16. f. 15.
Orobanche f. Dentaria aphyllis purpurea, cespite denso.
Moris. hist. 3. p. 503. f. 12. t. 16. f. 15.
Planta clandestina, f. Madrona. Dalech. hist. 960.
β. Clandestina, Madrona, Occulta. Borel. obs. 38.
Habitat in umbrosis Galliae Pyrenaeorum, Italiae. &
caulis infra terram corymbosus, ut fructificationes sola
supra terram emineant solitariae in singulo ramo.

Carydina caaj.
clandestina. Dalib.
madrona. flor.
occulta.

Phelypæa ad 207
Phelypæa.

2. **LATHRÆA** corollis campanulato-patentibus.
Phælypæa lusitanica, flore luteo. Tournef. cor. 47.
Orobanche elegantissima verna, flore luteo. Griseb. lusit.
*Moris. hist. 3. p. 502. **
β. Orobanche orientalis, flore coccineo. Tournef. cor. 47.
Habitat in Lusitaniæ umbrosis. &
3. **LATHRÆA** corollarum labiis indivisis. †
Anblatum orientale, flore purpurascete. Tournef. cor.
48.
Habitat in Oriente. &

amblatum ad 207
Anblatum.

amblatum ad 207
Squamaria.
Dentaria. math. 6. 6. Dalib.
amblatum. s. aphyllis. Cord. 30.
cego lathraos. Min 941.
Squamaria. Thal.

4. **LATHRÆA** caule simplicissimo, corollis pendulis:
labio inferiore trifido. *Fl. suec. 518. Dalib. paris. 191.*
Orobanche, radice dentata, major. Bauh. pin. 88.
Orobanche radice squamata, foliis rotundis, flore pen-
dente & suave rubente, fundboensis. Rudb. elys. 2. p.
234. f. 17.
Orobanche radice dentata altius radicata, foliis & flori-
bus albo purpureis. Mentz. pag. t. 3. f. 3. Moris. hist.
3. p. 503. f. 12. t. 16. f. 14.
Habitat in Europæ frigidioris umbrosissimis. &

SCHWALBEA.

americana. 1. **SCHWALBEA.** *Gron. virg. 71. **
Euphrasia major mariana, floribus spicatis amplis: tubis
longioribus: summis oris profunde incis. Pluk. mant.
73. t. 348. f. 2. ?
Habitat in America septentrionali.

TOZ.

Caa ataja. *Prosp. Marcy* v. 31. 24. pedaly. *supra* v. rami hti. *partim* repity partim
anti. fl. opp. *belli*. *subtrale* *drada* *peronica* *maris*. *flor* / *Abund.* *opp.* / *alt*
glati. *capula* *ovata* *obl.* *lunata* *aroma* *magat.* *part* *h* *op* *ny* *junia* *mem* *minima*
not. *ob* *flava* *popav* *mic* *amara* *est* *costula* *h* *du* *clis* *pro* *vomitiva*
607

Caa ataja. *Prosp.*
Ruellia - ad. 210.
L. n. 424.

TOZZIA. *Mich. ad. 200.* 26 *fam. Verum*

1. TOZZIA.

Tozzia alpina lutea, alfine folio, radice squamata. *alpina.*

Mich. gen. 20. t. 16.

Euphrasia lutea alfinefolia, radice squamata. *Baub. pin.*

234. prodr. III.

Dentaria buguloïdes, radice globosa: squamulis myon-
toideis, alpina. *Mentz. pug. t. 9. f. 3. 4.*

Orobanche bugloïfoides, radice rotunda, squamulis
myontoideis, alpina. *Moris. hist. 3. f. 12. t. 16. f. an-
tepenult.*

Anonyma f. gregorii, radice dentariæ. *Col. ecphr. 2. p.*

49. t. 50. d. Nitid.

Habitat in Alpibus Helveticis, Auftriacis, Italicis, Py-
renæis, locis asperis, humidis. 4

PEDICULARIS.

* *Caule ramoso.*

1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus calloso-palustris.
punctatis, corollis labio obliquis. *It. w-goth. 40. Mat.
med. 314.*

Pedicularis caule ramoso erecto, calycibus bifidis cre-
natis. *Hall. helv. 621. Fl. suec. 505.*

Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. hist. 700.*

Pedicularis danica maxima. *Lob. illust. 147.*

Habitat in Europæ septentrionalis paludibus. ☉

2. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus oblongis
angulatis lævibus, corollis labio cordato. *It. w-goth. 40.*

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis, calycibus
quinquefidis. *Fl. suec. 504.*

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis remotis. *Fl.
lapp. 241. Hort. cliff. 326.*

Pedicularis pratensis purpurea. *Baub. pin. 163.*

Fistularia. *Dod. pempt. 556.*

Habitat in Europæ sylvis paludosis. ☉

3. PEDICULARIS caule subramoso, corollis galea ro-
strato-acuminatis, calycibus subhirsutis.

Pedicularis alpina, foliis alternis: pinnulis incis, flori-
bus sparsis rostratis purpureis. *Hall. helv. 621. t. 16.
f. 1.*

Pedicularis alpina, filicis folio, minor. *Baub. pin. 163.*

Ale-

Pedicularis ad 211.

sylvatica. Plon.

Astularia In.

*ἀνταρρολογος. Flin. gal.
Dod. Thal.*

Phtinon. Daluhn

Alectorolophus alpina 3 minor. *Clus. hist.* 2. p. 210.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ.

* *Caule simplicissimo.*

Sceptrum Carolin. 4. PEDICULARIS caule simplici, floribus terno-verticillatis, corollis clausis, calycibus crenatis, capsulis regularibus. *Fl. suec.* 506.

Pedicularis capsulis subrotundis regularibus. Roy. lugdb. 299.

Pedicularis alpina, folio ceterach. Helv. flor. 39. t. 39.
Sceptrum carolinum. Rudb. it. 1. p. 1. *Fl. lapp.* 243.
 t. 4. f. 4. *Hort. cliff.* 326.

Habitat in Sueciæ, Borussia, Rutheni spongiosis, sylvaticis, riguis. &

Scapus nudus. Spica interrupta ex Verticillis trifloris, foliolo exceptis. Corolla non hians. Folia pinnatifida, crenata.

verticillata. 5. PEDICULARIS caule simplici, foliis quaternis. *Pedicularis alpina, floribus purpureis spicatis, foliis pinnatis verticillatis. Hall. helv.* 623. t. 17. f. 1.

Alectorolophus alpina 2, floribus purpureis. Clus. hist. 2. p. 210. *Sed rub. alp. alt. aph. de r. 2. 172.*

Filipendula montana altera. Baub. pin. 163.

Habitat in Sibiria, Helvetia, Austria. &

resupinata. 6. PEDICULARIS caule simplici, foliis lanceolatis serratis crenulatis, floribus resupinatis.

Habitat in Sibiria D. Gmelin, D. Demidoff.

Caulis pedalis, levis, simplicissimus. Folia lanceolata, indivisa, profunde serrata serraturis crenulatis, alterna. Flores ex alis superioribus solitarii, sessiles. Calyx levis, obtusus, bifidus, integer. Corolla saturatissime purpurea, resupinata. Galea adunca, compressa; Vexillum amplum, rotundatum.

reculita. 7. PEDICULARIS caule simplici, staminibus floribus galea longioribus.

Pedicularis alpina, foliis alternis pinnatis, floribus ex atrorubentibus in spicam densam congestis. Hall, helv. 623. t. 16. f. 2.

Habitat in Helvetiæ summis Alpibus.

tristis. 8. PEDICULARIS caule simplici, corollarum galeis margine villosis.

Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis: pinnulis obtusis acute serratis. Gmelin.

Habitat in Sibiria.

Caulis simplicissimus, spithameus. Folia alterna, pinnatifida, serrulata. Flores in spicam s. capitulum congesti. Corollæ obtusæ, flava: galea parum incurva, margine villosa.

9. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis retro-flammæ.
 imbricatis.

Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis obtusis: laciniis imbricatis crenatis.. *Fl. lapp.* 244. t. II. f. 2. *Fl. suec.* 509.

Pedicularis caule erecto non ramoso, pinnis foliorum retroversis imbricatis. *Hall. helv.* 622. 318. 7. 8 f. 2.

Pedicularis alpina, folio ceterach. *Baub. pin.* 163.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. 2

10. PEDICULARIS caule simplici, foliis dentato-pin-hirsuta.
 natis linearibus, calycibus hirsutis.

Pedicularis caule simplici, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis crenatis. *Fl. lapp.* 245. t. 4. f. 3. *Fl. suec.* 508.

Habitat in Lapponiæ Alpibus.

11. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis ser-incarnata.
 ratis, calycibus rotundatis glabris, corollis galea uncinatis acutis.

Habitat in Sibiria.

Folia Radicalia pinnata, pedalia; pinnis pinnatifidis, serratis. Caulina pinnatifida fere ad basin, serrata. Caulis levis, plusquam pedalis, foliis alternis. Spica nuda, Calycibus semiglobosis, quinquedentatis, glabris. Corolla incarnata: Galea falcata & uncinata, acuta, valde adunca.

12. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatifidis lapponica.
 ferratis, calycibus bifidis obtusis.

Pedicularis caule simplici, foliis lanceolatis semipinnatis ferratis acutis. *Fl. lapp.* 242. t. 4. f. 1. *Fl. suec.* 507. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 299.

Habitat in Alpibus Lapponicis frequens. 2

13. PEDICULARIS caule simplici, spica foliosa, corollæ coriosa.
 lis galea acutis emarginatis, calycibus quinquedentatis.

Pedicularis foliis alternis: pinnis pinnatis, foliis ex spica florifera longè eminentibus. *Hall. helv.* 623. t. 17 f. 3.

Pedicularis alpina, filicis folio, major. *Baub. pin.* 163.
Habitat in Alpibus Helveticis. 2

Calyx 5dentatus, tubulosus, integerrimus, parum pilosus.

Corolla labio superiore acuto, sed emarginato: dentibus duobus, acutis, nutantibus.

Handwritten notes: *tuberosa.*, *Alcatorolophus 1. clus.*, *hic anathema*, *S. Low. p. 173.*

14. PEDICULARIS caule simplici, calycibus crenatis, corollis galea rostrato aduncis.

Pedicularis alpina, foliis alternis pinnatis: pinnulis pinnatis, floribus ochroleucis rostratis in spicam congestis. Hall. helv. 620. t. 15. Sauv. monsp. 247.

Filipendula montana, flore pediculariæ. Baub. pin. 163.

Alectrolophus montana, flore luteo. Barr. ic. 469. Bocc. mus. 315. t. 8. Peduncul. alp. lutea. 63.

Habitat in Alpibus Helveticis, Italicis. &

GERARDIA. ad. 200.

Handwritten notes: *tuberosa.*, *X amn*, *caeruleo uagula. canib.*, *tuberculata. m. m. m. m.*, *End. m. d. m. p. d. m. m.*, *est adhibita p. m.*

1. GERARDIA foliis subovatis tomentosis repandis, longitudine caulis.

Gerardia humilis, bugulæ foliis, asphodeli radice. Plum. gen. 31.

Habitat in America calidiore.

Handwritten note: *purpurea.*

2. GERARDIA foliis linearibus, Digitalis foliis linearibus, floribus remotis. Gron. virg. 169.

Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis parvis angustis. Banist. virg. 1926. Gron. virg. 72. *

Digitalis virginiana rubra, foliis & facie antirrhini vulgaris. Pluk. mant. 65. t. 388. f. 1.

Habitat in Virginia, Canada. ☉

Caules pedales, filiformes, simplicissimi aut brachiati, leves. Folia linearia, integerrima, opposita, saepe & alterna. Flores oppositi: Pedunculis unifloris, filiformibus, aut sessiles. Calyces leves, parvi, campanulati, quinque-dentati. Corollæ saturatissime purpureæ aut rotatæ aut campanulatæ aut tubulosæ. Sic variat corollæ figura.

Handwritten note: *flava.*

3. GERARDIA foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule simplicissimo.

Anonymos floribus flavis speciosis digitali æqualibus. Gron. virg. 74.

Digitalis lutea elatior, jaceæ nigræ foliis. Banist. virg. 1926. Pluk. mant. 64. t. 368.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis pedalis s. altior. Folia opposita, lanceolata, subpetiolata (Lycopi aut jaceæ), basi incisa pinnatis sinuibus patulis. Spica terminalis, laxa, ex Floribus opposi-

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 611

oppositis, magnis, flavis. Antheræ in duas spinas deorsum tendentes. Stamen quintum deest.

4. GERARDIA foliis oblongis duplicato-ferratis, caule *pedicularia* paniculato, calycibus crenatis.

Pedicularis foliis lanceolatis pinnatifidis ferratis, floribus pedunculatis. Gron. virg. 68.

Digitalis, verbesinæ foliis e regione binis, americana, capsularum apicibus longissimis filamentis donata. Pluk. mant. 64.

Digitalis mariana, filipendulæ folio. Raj. suppl. 397. Habitat in Virginia, Canada.

Corollæ extus pubescentes, oblongæ. Calycis dentes crenati; exsiccatione nigra evadit, ut Pedicularis; sed folia opposita & corollæ patula.

5. GERARDIA foliis ovatis ferratis, bracteis linearibus *glutinosa* hispida.

Habitat in China

Caulis teretiusculus, erectus; ramis brevioribus. Folia opposita, petiolata, ovata, acuta, pollice latiora, profunde serrata, subvillosa. Racemi terminales, solitarii ex floribus oppositis brevissime pedunculatis. Calyces acuti, 5 partiti, lacinia superiore majore. Bractea filiformis una alterave calyci adhaeret ejusdem longitudinis, pilis glutinosi, uti calyx hispida.

CHELONE.

1. CHELONE foliis lanceolatis ferratis: summis opposi- *glabra* tis. *Hort. cliff. 493. Gron. virg. 70.*

Chelone acadensis, flore albo. Tournes. act. 1706.

- β. Digitalis mariana, persicæ folio. *Raj. suppl. 397.*

Digitalis mariana, ferratis densioribus rigidis & angustis foliis, semine fegopyri triquetro. Pluk. mant. 64. t. 348. f. 3.

Habitat in Virginia, Canada. &

2. CHELONE caule foliisque hirsutis.

Anonymos flore pallide cæruleo digitalis instar in summis caulibus disposito, foliis villosis acuminatis. Gron. virg. 71.

Digitalis virginiana, panacis colonii foliis, flore amplo pallefcente. Pluk. mant. 64.

Digitalis flore pallido transparenti, foliis & caule molli hirsutie imbutis. Banist. virg. 1928.

Habitat in Virginia.

*Huic stamen quintum longum cum Anthera villosissima
D. Jussieu.*

Pentstemon. 3. CHELONE foliis amplexicaulibus, panicula dichotoma.
chellone ad 213

*Pentstemon. Mitch. gen. 14.
Habitat in Virginia.*

Caulis herbaceus, brachiatus. Folia ovato-lanceolata, opposita, amplexicaulia, denticulata, acuminata, utrinque viridia. Caules et Ramuli terminantur pedunculo dichotomo. Calyces quinquepartiti In prima dichotomia flores communiter bini, propriis pedicellis.

GESNERIA. ^{ad 157}

humilis. 1. GESNERIA foliis lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis ramosis multifloris.
*Gesneria humilis, flore flavescente. Plum. gen. 27.
Habitat in America australi. ic-133*

tomentosa. 2. GESNERIA foliis lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Hort. cliff. 318.*
*Gesneria amplo digitalis folio tomentoso. Plum. gen. 27.
Digitalis folio oblongo serrato, ad foliorum alas florida.
Sloan. jam. 60. hist. 1. p. 162. t. 104. f. 2. Raf. suppl. 396.
Habitat ad Jamaicæ ripas. b*

ANTIRRHINUM.

antirrhinum ad 213.

* *Foliis angulatis.*

+ *Asarina. Lob.* 1. ANTIRRHINUM foliis oppositis cordatis crenatis.
*Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 295.
Hedera saxatilis, magno flore. Bauh. pin. 306.
Asarina f. Hederula saxatilis. Lob. ic. 601.
Habitat in rupibus Vegenio conterminis Genevæ.*

+ *Cymbalaria. Mon. meth.* 2. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis alternis.
*Linaria ad 213 Hort. cliff. 32. Hort. ups. 175. Roy. lugdb. 295.
Guett. stamp. 2. p. 210. Gort. gelr. 358.
Cymbalaria. Bauh. pin. 306. Cam. epit. 860. Dalech. hist. 1322.
Habitat in rupibus & muris antiquis Basileæ, Parisiis, Harlemi. ☉*

+ *Linaria ad*
Elatine. Lob. 3. ANTIRRHINUM foliis hastatis alternis, caule flacido.
velvate gall. Hort. cliff. 323. Hort. ups. 175. Gron. virg. 68. Roy. lugdb. 295. Elati-

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 613

Linaria fegetum ^{ovumularise folio aurite et villos. ?}
 Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo.

Baub. pin. 253.

Elatine. Cam. epit. 754.

β. Elatine folio acuminato, flore cæruleo. Baub. pin. 253.

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ arvis. ☉

4. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caule flaccido. Hort. upf. 175. Hort. cliff. 323. Roy. lugdb. 295.

Elatine folio subrotundo. Baub. pin. 253.

Veronica femina. Dod. pempt. 42. ^{694 p. 408.}

Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ arvis. ☉

5. ANTIRRHINUM foliis hastatis, caule erecto ramossimo.

Linaria memphitica pumila, hastato folio tricuspidi, flore luteo. Lipp.

Habitat in Ægypto.

* Foliis oppositis.

6. ANTIRRHINUM foliis ternis ovatis. Hort. cliff. triphyllum. 324. Hort. upf. 174. Roy. lugdb. 295. Sauv. monsp. 165.

Linaria triphylla minor lutea. Baub. pin. 212.

Linaria ^{valeriana} hispanica. Clus. hist. 1. p. 320.

β. Linaria triphylla cærulea. Baub. pin. 312.

Habitat in umbrosis montibus Valentinis & Hyblæis circa Syracusas. ☉

7. ANTIRRHINUM foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoso, floribus pedunculatis. Hort. cliff. 324. Roy. lugdb. 296.

Linaria americana maxima, purpureo flore. Herm. lugdb. 376. Raj. hist. 1884.

Linaria, flore purpureo, americana. Riv. mon. & 123. Habitat in Lusitania, America.

8. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis sparsis: inferioribus oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus. Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 296.

Linaria tritris hispanica. Dill. elth. 201. t. 164. f. 199. Habitat Gibraltariæ.

9. ANTIRRHINUM foliis quaternis lineari-lanceolatis, caule florifero erecto spicato. Hort. upf. 174.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis, nectariis subulatis recurvis, floribus laxè spicatis. Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 296.

Linaria ad 213

spurius. •
Elatine. Lob. H
Ex Hort. Dill.
Veronica quoniam Dabo

Linaria ad

Linaria ad
tricornitho-
phorum.

Linaria
triste.

Linaria ad

Li-

Linaria purpurea major odorata. *Bauh. pin.* 213.
 Linaria altera purpurea. *Dod. pempt.* 183.
Habitat ad radices Vesuvii.

Linaria. ad. 213
bipunctatum

10. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus, floribus in summitate caulis confertis parvis. *Guett. stamp.* 2. p. 205.

Antirrhinum erectum, foliis linearibus: imis verticillatis, pauciflorum. *Sauv. monsp.* 165.

Linaria lutea parva annua. *Bauh. hist.* 3. p. 457.
Habitat in Hispania. Læfling.

Caulis spithameus, Ramis strictis ad angulum rectum exeuntibus. Folia lanceolata, sessilia, plana, patentia, vix carnosae, fere levia: inferiora quaterna. Flores subspicati, pauci, sessiles. Corollæ flavæ, punctis duobus fulvis in palato glabro versus labium superius; Labium superius bipartitum, replicatum, lanceolatum, erectum.

repens.

11. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus: inferne quaternis, calycibus capsulæ æqualibus.

Antirrhinum foliis linearibus alternis sæpius oppositis acuminatis, floribus laxè spicatis. *Roy. lugdb.* 296.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycinis laciniis capsulæ æqualibus. *Guett. stamp.* 2. p. 204. *Dalib. parif.* 186.

Linaria angustifolia, flore cinereo striato. *Dill. elth.* 198. t. 163. f. 197.

Habitat in Anglia, Gallia. &

100. arvense.

12. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus: inferioribus verticillatis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto, *Hort. ups.* 174.

Antirrhinum foliis linearibus alternis recurvis, ramis caule brevioribus. *Roy. lugdb.* 297.

Linaria arvensis carulea. *Bauh. pin.* 213. *prodr.* 107. *Dill. elth.* 199. t. 163. f. 198.

β. Linaria pumila, foliolis carnosis, flosculis minimis flavis. *Bauh. pin.* 213.

γ. Linaria quadrifolia lutea. *Bauh. pin.* 213.

Linaria tetraphylla lutea. *Col. ecphr.* 1. p. 299. t. 300. f. 1.

Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ arvis. ☉
Flores spicati sunt.

13. ANTIARRHINUM foliis caulinis lanceolato-linearibus, radicalibus rotundis ternis. *Guett. pelisserianum*
stamp. 2. p. 204. Dalib. paris. 186.

Antirrhinum foliis ad caulem linearibus, ad radicem ovatis sæpe ternis. *Sauv. monsp. 166.*

Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *Vaill. paris. 118. Magn. monsp. 159.*

Linaria cærulea, minor. *Lob. illustr. 103.*

Linaria cærulea calcaribus longis. *Bauh. hist. 3. p. 461.*

Habitat in Gallia.

14. ANTIARRHINUM foliis oppositis lanceolatis, floribus laxe racemosis. *Roy. lugdb. 297. origanifolium*

Antirrhinum saxatile, foliis serpilli. *Bauh. pin. 212. prodr. 106. Burs. X: 7.*

Linaria folio crasso origani minore, floribus variegatis ex pallido & cæruleo rubescente. *Boerb. lugdb. 1. p. 232.?*

Habitat Massiliæ in muris vetustis, inque Pyrenæis major. ☉

An hoc varietas A. minoris? 17^{to} flor.

15. ANTIARRHINUM foliis quinque linearibus. *Hort. cliff. 324. Roy. lugdb. 296. multicaule.*

Linaria ficula multicaulis, molligulis folio. *Bocc. sic. 38. t. 19. f. 1.*

Habitat in Sicilia. 2

Caules juncei, laxi, debiles. Folia linearia, obtusa.

16. ANTIARRHINUM foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus racemosis. *Roy. lugdb. 297. Sauv. monsp. 165. Linaria ad 213*

Linaria quadrifolia supina. *Bauh. pin. 213.*

Linaria 3 stiriaca. *Clus. hist. 1. p. 322.*

β. Linaria cærulea repens. *Bauh. pin. 213.*

γ. Linaria foliis carnosis cinereis. *Bauh. pin. 213. ex Hall.*

Habitat in Helvetia, Austria, Baldo.

* Foliis alternis.

17. ANTIARRHINUM foliis linearibus acuminatis alternis, floribus racemosis, caule diffuso. *Roy. lugdb. 296. Dalib. paris. 186. Sauv. monsp. 48. Linaria ad 213*

Linaria pumila supina lutea. *Bauh. pin. 213.*

Linaria hispanica 5. *Clus. hist. 1. p. 321.*

Habitat in Gallia, Hispania arenosis.

dalmaticum. 18. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis alternis, caule fruticoso.

Linaria latifolia dalmatica, magno flore. *Baub. pin.* 211. *prodr.* 106.

Linaria maxima, folio lauri, *Baub. hist.* 3. p. 458. *Habitat in Creta.* 5

hirtum. 19. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis hirtis alternis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo maximo. *Lœfl.*

Habitat in Hispania. ☉

Caules aliquot simplices, spithamæi, non ramosi. Folia lanceolata (Lavendulæ), alterna. Flores dense spicati, colore & magnitudine A. Linariæ. Calycis foliolum superius duplo majus quam reliqua. Capsulæ subtunda.

genistifolium. 20. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata.

Linaria genistæ folio glauco, flore luteo, *Herm. par. app.* 9. *Dili. elth.* 202.

Habitat in Sibiria. D. *Gmelin.* 2

Caules subdecumbentes vel erectiusculi. Folia alterna, lanceolata, glabra, acuminata, omnino Genistæ imitatorum. Racemi longi, in paniculam dispositi: Floribus alternis, distantibus, pedicellis longitudine calycis. Calyx quinquepartitus, glaber, acutus, longitudine capsulæ. Corollæ luteæ, magnitudine A. Linariæ.

Linaria. ad. 213

+ *Linaria. 213*
Sandolinum. Brunf.
off. gal. ad. 213

21. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. suec.* 501. *Mat. med.* 313. *Roy. lugdb.* 297.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis. *Hort. cliff.* 325. Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycis laciniis capsula dimidio brevioribus. *Guett. stamp.* 2. p. 203.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212. *Osyris. Fuchs. hist.* 543. *Cam. epit.* 930.

Habitat in Europæ ruderatis. 2
Palatum villosum fulvum.

Linaria. ad.
monspessula. num.

22. ANTIRRHINUM foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Roy. lugdb.* 297. *Sauv. monsp.* 47.

Linaria, capillaceo folio, odora. *Baub. pin.* 213. *prodr.* 106. n. 4.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 617

Linaria odorata monspeffulana. Baub. hist. 3. p. 459.
Habitat in Gallia.

23. ANTIRRHINUM foliis lineari-lanceoatis alternis, ^{chalepense.} floribus racemosis, calycibus corolla ongioribus, Linaria ad
caule erecto. Roy. lugdb. 296. Hort. ups. 174.

Linaria chalepensis minor erecta, flore albo lineis vio-
laceis. Moris. hist. 3. p. 502. f. 5. t. 31. f. 9.

Linaria annua angustifolia, flosculis albis longis cauda-
tis. Triumph. obs. 87. t. 87. f. 2. Raj. hist. 1884.

Habitat in Italia. ☉

24. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtusis alter-^{minus.} nis, caule ramosissimo diffuso. Hort. cliff. 324. Fl. Linaria ad
^{Linaria pumilavulgate} succ. 502. Roy. lugdb. 295.

Antirrhinum arvense minus. Baub. pin. 212.

Antirrhinum tertium. Cam. epit. 922.

Habitat in glareosis Europæ ☉

* Corollis hiantibus aut ecaudatis, foliis alternis
integris.

25. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus ^{majus.} rotundatis. Hort. ups. 175. Mat. med. 312.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus bre-
vissimis, racemo terminali. Vir. cliff. 61. Hort. cliff.
324. n. 4. Roy. lugdb. 294.

Antirrhinum majus alterum, folio longiore. Baub. pin.
211.

Antirrhinum luteo flore. Baub. pin. 211.

Antirrhinum. Dod. pempt. 182. Lob. ic. 404.

Habitat in Europæ australis maceris, sepibus. ♂

26. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus co-
rolla longioribus. Hort. ups. 176.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus flo-
res superantibus. Hort. cliff. 324. Roy. lugdb. 294.

Antirrhinum arvense majus. Baub. pin. 212.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. Dod. pempt. 212.

Habitat in Europæ agris & arvis. ☉

27. ANTIRRHINUM foliis ovatis serratis, corollis ^{bellidifolium.} patulis. Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 295.

Antirrhinum foliis imis spathulatis, summis digitatis.

Sauv. monsp. 67.

Linaria bellidis folio. Baub. pin. 212. prodr. 106. t.
106.

Linaria odorata. Dod. pempt. 184.

Habitat in agris inter Lugdunum & Viennam, interque Lugdunum et Gratianopolin. 4

canadense. Antirrhinum ad. 213

28. ANTIRRHINUM foliis linearibus alternis, corollis hiantibus: labio inferiore explanato.

Antirrhinum caule simplicissimo longissimo, foliis caulinis linearibus; stolonum procumbentium lanceolatis minimis. Gron. virg. 67.

Habitat in Virginia, Canada. ☉

Radix fibrosa. Caulis erectus, filiformis, pedalis, vix ramosus. Folia alterna, remota, linearia, glabra. Racemus terminalis, rarior: floribus alternis, pedicellatis. Calyx quinquepartitus, acutus. Corollae labium superius breve, reflexum. Lab. inferius magnum, patens, dependens.

Cymbaria ad 208

CYMBARIA.

1. CYMBARIA.

Cymbaria daurica pumila incana, linariae folio, magno flore luteo guttato. Amm. ruth. 47. t. 1. f. 2.

Habitat in Dauriae montanis, apricis, saxosis.

Craniolaria ad. 213

CRANIOLARIA.

1. CRANIOLARIA foliis cordatis angulatis.

Martynia annua villosa & viscosa, aceris folio, flore albo tubo longissimo. Ebreth. pict. 1. f. 2.

Habitat in America. ☉

Gesnera ad

2. CRANIOLARIA foliis lanceolatis dentatis.

Gesnera arborescens, amplo flore fimbriato & maculoso. Plum. gen. 27. ic. 137.

Habitat in America calidiore.

Folia lanceolata, serrata. Pedunculi laterales multiflori. Corolla oblonga, interne punctata margine ciliato. Flores ovario invid. 9. nomen hujus generis.

Martynia ad. 213

MARTYNIA.

1. MARTYNIA caule simplici, foliis serratis.

Martynia foliis serratis. Hort. cliff. 322. t. 18.*

Habitat in America. 4

Martynia ad

2. MARTYNIA caule ramoso, foliis angulatis.

Martynia foliis dentatis. Hort. cliff. 312. Martynia annua villosa & viscosa, folio subrotundo, flore magno rubro. Mart. cent. 42. t. 42. Ebreth. pict. t. 1. f. 1. usque 11. Con tubo long. usque ad 1/2. Corolla rubra punctata.

Habitat in America Vera Cruce. ☉

Martinella ad. Martinella alterius generis. a D. Martinello. Not

TORENIA. 516.

1. TORENIA. Gen. nov. 1108.

Hederæ terrestris species. Com. mal. 35.

Kaka-pu. Rheed. mal. 9. p. 103. t. 53.

Habitat in India. Toren.

Variat Foliis glabris & villosis: Floribus majoribus & minoribus.

asiatica.

Castra ad. 209.

BESLERIA.

1. BESLERIA pedunculis ramosis, foliis ovatis.

Besleria melissæ tragi folio. Plum. gen. 29.

Habitat in America.

Besleria. ad
Melittifolia. 267.

2. BESLERIA pedunculis simplicibus conferis, foliis lanceolatis.

Besleria, virgæ aureæ foliis, flore luteo, minor. Plum. gen. 29.

β. Besleria, virgæ aureæ foliis, flore luteo, major. Plum. gen. 29.

Habitat in America.

3. BESLERIA pedunculis simplicibus foliariis, involu- cris pentaphyllis propriis.

Besleria scandens cristata, fructu nigro. Plum. gen. 29.

Habitat in America.

Radix repens. Folia ovata, serrata, petiolata. Pedunculi laterales, uniflori, terminati. Involucro pentaphyllo: foliolis cordatis, dentatis, sessilibus. Corolla solitaria, externe hirsuta. Stamina & Pistilla mire implexa; forte aut Martinia aut distincti generis planta.

SCROPHULARIA.

1. SCROPHULARIA foliis cordatis fratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. Hort. ups. 177.

Scrophularia foliis cordatis oppositis, acemo terminali. Gron. virg. 71.

Scrophularia marilandica, longo proinde ferrato urticæ folio. Raj. suppl. 396.

Habitat in Virginia. 4

Affinis maxime sequentis, ut vix disjungi mereatur.

Scrophularia. ad
213

2. SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, caule obtusangulo.

Scrophularia foliis cordatis, racem terminali. Hort. cliff. 322. Fl. suec. 520. Mat. nat. 310. Roy. lugdb. 293. Gron. virg. 71. Dalib. pai. 191.

Scrophularia. ad
nodosa. +
Scrophularia. trunc. mult.
galeopsis gal. pub. 20
Chrysanthemum. Steno. quibus
chrysiopsis
Scro- mille morborum
ficaria
parva
capitata
alib.

ANGIOSPERMIA.

gdunum & Viennam, anopolin. 4

liis linearibus alternis, ore explanato.

ssimo longissimo, foliis m procumbentium lance

67. filiformis, pedalis, remota, linearia, glabra.

floribus alternis, pediculis, acutus. Corollæ labi

Lab. inferius magis

ARIA.

incana, linearia folio, rutb. 47. t. 1. f. 2.

is, apricis, saxosis.

LARIA.

cordatis angulatis. viscosa, aceris folio, esb. pict. 1. f. 1.

lanceolatis dentatis. lo flore fimbriato &

157. Pedunculis laterales m

YNTIA.

plici, foliis serratis. art. cliff. 322. t. 18.

oso, foliis angulatis. cliff. 312.

vilcola, folio subrotundo. 42. Ebrat. 42.

Crall. 42. 42. 42.

Littor. Rumph. 32. 26. arb. fl. opp. crinit. p. 111. ap. Rumph. fl. p. 111. t. 1. f. 2. *Cumbulur*
 con. rub. 5 p. 1. b. 1. t. 1. f. 2. *ad. 199*
 at ordin. x / a / m / i / n / i /

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 619

TORENIA. 616

1. TORENIA. Gen. nov. 1108.

Hederæ terrestris species. Com. mal. 35.

Kaka-pu. Rheed. mal. 9. p. 103. t. 53.

Habitat in India. Toren.

Variat Foliis glabris & villosis: Floribus majoribus & minoribus.

asiatica.

Caesal. ad. 209.

BESLERIA.

1. BESLERIA pedunculis ramosis, foliis ovatis.

Besleria melissæ tragi folio. Plum. gen. 29.

Habitat in America.

Besleria. ad
Melittifolia. 267.

2. BESLERIA pedunculis simplicibus conferis, foliis lanceolatis.

Proxi a Cabrit paruyet put. ex St. Domingue.

2) 5. ped. lumb. tenuis, cern. a ramis jun. v. d. tenuis, raris, scab. *subret.*
 fol. opp. lanceol. petala brev. p. 1. t. 1. f. 2. *in ter. tenuia. c. 1. t. 1. f. 2. ad 4. p. 1. t. 1. f. 2.*
 lumb. raris, opp. nigra, v. d. raris, raris. *fol. opp. lanceol. petala brev. p. 1. t. 1. f. 2.*
 3) flor. simplici, pedunculo lumb. long. v. d. raris, raris. *fol. opp. lanceol. petala brev. p. 1. t. 1. f. 2.*
 Cal. ovata, germin. v. d. raris, raris. *fol. opp. lanceol. petala brev. p. 1. t. 1. f. 2.*
 4) *Hesperia. p. 18.*

Institute for Botanical Documentation

li laterales, uniflori, terminati involuaro pentaphyllo: foliolis cordatis, dentatis, sessilibus. Corolla solitaria, externe hirsuta. Stamina & Pistia mire implexa; forte aut Martinia aut distincti generis planta.

SCROPHULARIA

Scrophularia. ad 213

1. SCROPHULARIA foliis cordatis fratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. Hort ups. 177.

Scrophularia foliis cordatis oppositis, acemo terminali. Gron. virg. 71.

Scrophularia marilandica, longo proinde ferrato urticae folio. Raj. suppl. 396.

Habitat in Virginia. 4

Affinis maxime sequentis, ut vix disegni mereatur.

2. SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, caule obtusangulo.

Scrophularia foliis cordatis, racem terminali. Hort. cliff. 322. Fl. suec. 520. Mat. n. 310. Roy. lugdb. 293. Gron. virg. 71. Dalib. pat. 191.

Scrophularia
 nodosa. +
 Scrophularia. *Scrophularia. Hort. ups. 177.*
 Scrophularia. *Scrophularia. Hort. ups. 177.*
 Scrophularia. *Scrophularia. Hort. ups. 177.*
 Scrophularia. *Scrophularia. Hort. ups. 177.*
 Scrophularia. *Scrophularia. Hort. ups. 177.*

ANGIOSPERMIA.
didynamia ANGIOSPERMIA.

619

ad. 199

TORENIA. 616.

1. TORENIA. Gen. nov. 1108.

Hederæ terrestris species. Com. mal. 35.

Kaka-pu. Rheed. mal. 9. p. 103. t. 53.

Habitat in India. Toren.

Variat Foliis glabris & villosis: Floribus majoribus & minoribus.

asiatica.

Carla ad. 209.

BESLERIA.

1. BESLERIA pedunculis ramosis, foliis ovatis.

Besleria melissæ tragi folio. Plum. gen. 29.

Habitat in America.

Besleria ad
Melittifolia. 207.

2. BESLERIA pedunculis simplicibus conferis, foliis lan-

lutea.

fil. alt. pinnae abrupte spina. lacinia videtur. petala candida longiora lobulata. lobis parvis calycibus

Ranthonylum gentian. capivi folii africanae cortice cinereo. Pluch. Rumbot. Dumb. de Syle

Radix repens. Folia ovata, serrata, petiolata. pedunculi laterales, uniflori, terminati. Involcro pentaphyllo: foliolis cordatis, dentatis, sessilibus. Corolla solitaria, externe hirsuta. Stamina & Pistilla mire implexa, forte aut Martinia aut distincti generis planta.

SCROPHULARIA.

Scrophularia ad 213

1. SCROPHULARIA foliis cordatis fratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. Hort. ups. 177.

Scrophularia foliis cordatis oppositis, acemo terminali. Gron. virg. 71.

Scrophularia marilandica, longo proinde ferrato urticae folio. Raj. suppl. 396.

Habitat in Virginia. &

Affinis maxime sequentis, ut vix disegni mereatur.

2. SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, caule obtusangulo.

Scrophularia foliis cordatis, racem terminali. Hort. cliff. 322. Fl. suec. 520. Mat. nat. 310. Roy. lugdb. 293. Gron. virg. 71. Dalib. pai. 191.

Scrophularia ad

nodosa. +
Scrophularia. Plum. mult.
galeppia gal. pub. 22
Chyppia. Plin. quibus
Chyppia
Scro- millanorbra
ficaria
parva
capitata

Scrophularia nodosa fætida. Bauh. pin. 235.

Scrophularia. Cam. epit. 866.

Habitat in Europæ succulentis. ♀

Scrophularia ad. 213

• *aquatica.*

3. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upf. 177. Mat. med. 311.*

Scrophularia foliis cordatis, petiolorum alis in caulem decurrentibus. Guett. stamp. 2. p. 201.

Scrophularia aquatica major. Bauh. pin. 235, caule fimbriato. Læf. pruss. 248. t. 73.

Scrophularia femina. Cam. epit. 867.

Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ humidis. ♂

• *auriculata.*

Scrophularia ad

4. SCROPHULARIA foliis cordato-oblongis basi appendicuaris, racemis terminalibus. *Læf.*

Scrophularia betonicæ folio. Tournef. inst. 166.

Scrophularia aquatica montana mollior. Barr. rar. 189. t. 274.

Betonica aquatica septentrionalium. Lob. ic. 533. fig.

Habitat in Hispania,

Caules vixramosi, acute tetragoni, nudi. Folia opposita, petiolata cordata, oblonga, serrata, subtus villosa; infra basin auriculata utrinque. Foliolo ovato, parvo, sessili. Racemus terminalis.

• *Scorodonia.*

Scrophularia ad

5. SCROPHULARIA foliis cordatis duplicato-serratis, racemo composito. *Roy. lugdb. 296.*

Scrophulariamelissæ folio. Tournef. inst. 166.

Scrophulariascorodoniæ folio. Pluk. alm. 338. t. 59. f. 5. Raj. hist. 766.

Habitat in Lusitania & Jersea insula Angliæ.

• *orientalis.*

Scrophularia ad

6. SCROPHULARIA foliis lanceolato-linearibus acute serratis: infere incis, racemo composito. *Roy. lugdb. 294.*

Scrophularia oentalis, foliis cannabinis. Tournef. cor. 9.

Habitat in Oriente.

• *vernalis.*

Scrophularia ad

7. SCROPHULARIA foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariidichotomis. *Hort. cliff. 322. Hort. upf. 177. Roy. lugdb. 293.*

Scrophularia flo. luteo. Bauh. pin. 236. prodr. 112. t. 112.

Lamium pannocum 2 exoticum. Clus. hist. 2. p. 38.

Habitat in Italia Helvetia. ♂

• *fambucifolia*

Scrophularia ad

8. SCROPHULARIA foliis difformibus, pedunculis axillaribus aggregatis. *Roy. lugdb. 292.*

Scro-

Scrophularia fo
Scrophularia fo
chro. Pluk

Scrophularia

bist. 2. p. 4

Scrophularia

Raj. suppl.

Habitat in Hi

SCROPHU

li nudo, ped

322. Roy. l

Scrophularia E

Ruta canina.

Habitat in Ho

SCROPHU

ternis, pedu

Roy. lugdb.

Scrophularia

Scrophularia

Habitat in Ita

SCROPHU

to-dentatis,

Scrophularia

Tournef. i

Habitat in L

SCROPH

verticillatis

Scrophularia

lem ambic

Habitat in V

CELSIA

Hort. upf

Verbascum c

cent. 5. p

Blattaria ori

14. t. 20

Habitat in C

DIGITAL

obtusis: