



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA 621

- Scrophularia foliis laciniatis. *Baub. pin.* 236. *prodr.* 173.
 Scrophularia sambucifolia, flore rubro luteo vario pulchro. *Pluk. alm.* 338. t. 313. f. 6.
 Scrophularia sambuci foliis, capsulis maximis. *Moris. hist.* 2. p. 483. f. 5. t. 8. f. 6.
 3. Scrophularia lusitanica, maximo flore, foliis dissectis.
Raj. suppl. 396.
Habitat in Hispania, Lusitania. ◎
9. SCROPHULARIA foliis pinnatis, racemo termina-^{canina}.
 li nudo, pedunculis bifidis. *Vir. cliff.* 61. *Hort. cliff.* ^{Ruta canina - lob} 322. *Roy. lugdb.* 294. *Sauv. monsp.* 247. *Scrophularia ad* 213
 Scrophularia Ruta canina dicta. *Baub. pin.* 236.
 Ruta canina. *Clus. hist.* 2. p. 209. *Lob. ic.* 2. p. 55.
Habitat in Helvetia, Narbona, Italia. ◎
10. SCROPHULARIA foliis cordatis: superioribus al-^{peregrina}.
 ternis, pedunculis axillaribus bifloris. *Hort. cliff.* 322. *Scrophularia ad*
Roy. lugdb. 293.
 Scrophularia urticæ folio. *Baub. pin.* 236.
 Scrophularia peregrina. *Cam. hort.* 157. t. 43.
Habitat in Italia. ◎
11. SCROPHULARIA foliis lanceolatis obtusis ferræ frutescens.
 to-dentatis, pedunculis bifidis. *Roy. lugdb.* 294.
 Scrophularia lusitanica frutescens, verbenacæ foliis.
Tournef. inst. 167. *Raj. suppl.* 396.
Habitat in Lusitania.
12. SCROPHULARIA foliis quaternis ovatis, floribus coccinea.
 verticillatis spicatis. *Roy. lugdb.* 294.
 Scrophularia flore coccineo, foliis urticæ quaternis cau-
 lem ambientibus. *Houst. mss.*
Habitat in Vera Cruce.
- CELSIA. *celia ad. 210.*
1. CELSIA foliis duplicato-pinnatis. *Hort. cliff.* 321. *orientalis.*
Hort. upf. 179. t. 1. *Roy. lugdb.* 301.
 Verbascum orientale, sophiæ folio. *Tournef. cor.* 8. *Buxb. cent.* 5. p. 17.
 Blattaria orientalis, agrimonie folio. *Buxb. cent.* 1. p. 14. t. 20.
Habitat in Cappadocia, Armenia. ◎
- DIGITALIS. *digitalis ad* 213.
1. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis purpurea.
 obtusis: labio superiore integro. *Hort. upf.* 178. *Di-*

Ephemerum *Dicot.* *Digitali.* *lutea magniflora* C.P. 244. 2. 3 ped. orange. 15 june. flor. late.
colibri *spicata* *angustiflora* ad vel. *angustiflora* *alba*. *caerulea* *lutea* *lutea* *long. lutea*.
Calathiana *virens* *stems* *dark*.

622 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Digitalis foliolis calycinis ovatis. *Hort. cliff.* 318. *Dalib. paris.* 192. *acuminatis.* *Roy. lugdb.* 292. *Gort. gelr.* 371. *ut 4. ab aliis retinente. caule calice* *digitis* *imbricatis.*

Digitalis purpurea, folio aspero. *Bauh. pin.* 243.

Digitalis purpurea. *Dod. pempt.* 168.

B. Digitalis alba, folio aspero. *Bauh. pin.* 229.

Habitat in Europa australiore. ♂

+ Intea.
Digitalis ad. 213

2. *DIGITALIS* calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis: labio superiore bifido. *Hort. ups.* 178.

Digitalis foliis calycinis subulatis, floribus imbricatis. *Hort. cliff.* 318. *Roy. lugdb.* 293. *Dalib. paris.* 192.

alium ex Damasonium Dicr.
Digitalis pastoris. avic.

Digitalis major lutea s. pallida, parvo flore. *Bauh. pin.* 224. *ut 1. ad latere minore multo. item 4. aliq. quadratibus longior.*

Digitalis lutea, minore flore. *Moris. hist.* 2. p. 479. f. 5. t. 8. f. 5.

Habitat in Gallia, Italiae sabulosis. ♀

+ ferruginea.
Digitalis ad.

3. *DIGITALIS* calycinis foliolis ovatis obtusis, corolla labio inferiore longitudine floris.

Digitalis foliolis calycinis ovatis obtusis, corollis villosis: labio longissimo. *Buttn. cunon.* 226.

Digitalis foliolis calycinis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 292.

Digitalis angustifolia, flore ferrugineo. *Bauh. pin.* 244. *Riv. mon.* 98. *ut 1. ad latere minore multo. item 4. aliq. quadratibus longior.*

Digitalis latifolia, flore ferrugineo. *Moris. hist.* 2. p. 478. f. 5. t. 8. f. 2. 3.

Digitalis lutea non ramosa, Icorzoneræ folio. *Buxb. cent.* 5. p. 25. t. 49.

Habitat in Italia, Constantinopoli. ♀

digitalis ad. canariensis.

4. *DIGITALIS* calycinis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso.

Gesneria foliis lanceolatis serratis, pedunculo terminali laxe spicato. *Hort. cliff.* 318.

Digitalis acanthoides canariensis frutescens, flore aureo.

Comm. hort. 2. p. 105. t. 53.

Digitali affinis canariensis, solidaginis acutis foliis leviter pilosis, flore aureo cucullato. *Pluk. alm.* 400. t. 325. f. 2.

Habitat in Canariis. ♂

Digitalis latifolia fl. ferruginea. fl. purpurea. caule vix 1. longior. ut 4. lat. long.

Catalpa *ad* 213.

Catalpa.

Kakuyu *Japon.*

Kawara *fibriginea.*

1. *BIGNONIA* foliis simplicibus cordatis, caule erecto, floribus diandris. *Plumice* 57.

Bignonia foliis simplicibus cordatis. *Hort. cliff.* 317. *Roy. lugdb.* 289.

Bigno-

Saxa. Rabea. *Bignonia* arbor ampli bunt foliis, quiete ovate, latiori, dentato.

leuiora *arbo-* *Bignonia scandens*, foliis citiori, altiori edobore. *Rabea-*

Scandens *opaca.* *Bignonia scandens*, rubens et violacea. *Rabea?* *Ligustrum*

Scandens *Leptophloeum* *lanceolatum* *lanceolatum*. *Rabea* *lanceolata*.

Scandens *lanceolata* *lanceolata* *lanceolata*. *Rabea* *lanceolata*.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 62

Habitat in America calidore, solant ex. yper aice ^{ventus} coniv. =

An sequentis sola varietas 24-3 pd.. cetera circ. sicut
Rami ipsius vnde sibi subtili pubelle folia sua rugosa pectinata ovalia sunt 3 nervis 20 long. lant.
in petiolis dist. breviter. spica for. enervata pedunculo longo. 8 gono ciliis. al folia long.

2. LANTANA foliis oppositis, caule ierimi, spicis ob- annua
longis. Hort. ups. 380. Cas

Periclymenum rectum humilius, salviafolio rugosiore,
flore purpureo, fructu oblongo esc lento purpureo.

- B.** *Viburnum americanum odoratum*, folio parvo orbiculato, floribus & baccis folio interceptis. *Pluk. alm. 386. t. 114. f. 5. Herm. par. 384*

Habitat in America calidore. ○

3. LANTANA foliis oppositis, caule incerti ramoso, flo-^s Camara, viva. ~~Brof mag. b.~~
ribus capitato-umbellatis. ^{2 Camara metella fol. Plumbago diffusa.} Zematoitum foli' huma.

Lantana foliis oppositis petiolatis, florib. capitatis. *Hort. cliff.* 349. *Rev. lugd. b.* 200.

- Viburnum americanum non spinosum, nelissæ foliis, flo-
ribus coccineis. Plak. alm. 385 t. II f. 1.

~~Viburnum americanum, urticæ foliis, lamii odore, Robribus miniatis. Corolla hort. L. p. 151. t. 78.~~

- B. Periclymenum rectum, urticæ folio hrsuto majore, flo-
re flavo. Sicc. iiii. 162.*

4. LANTANA foliis oppositis, caule aculeato ramoso,
floribus capitato-umbellatis. Lamare pone fl. variegata. Planch.

Lantana foliis oppositis petiolatis, caule aculeato. Hort cliff 498 Hart 380 Rev Judd 300

Myrobatindum viburnifolium spinosum, floribus coccineis. *Vaill.* act. 1732. p. 276.

Viburnum americanum odoratum, uiticæ foliis latioribus spinosum floribus ministris. Blatt. J. 1824.

bus, Ipmolum, horibus miniatis. PLUR. altit. 285. t.
223. f. 5. ^{Ob exaltatiori umbell. intus coecum ante apert. intus} Plan. ^{spurcione strob.}

LANTANA foliis alternis, spicis oblongis.

Salvia barbadensis dicta, spica florū compacteri
Plak. alm. 330 t. 331 f. 2

Periclymenum rectum, salviæ folio rugoso majore oblongo bullato, flora alba fru. l.

longo bullato, nlore albo, fructu longiore. Sloan. jam
163. hist. 2. p. 81. Raj. dendr. 31.
Periglymenum rostratum Salvius. S. 1. Sal.

Periclymenum rectum, lalviæ folio rugoso majore subrotundo bullato. *Sloan. jam. 163. hist. 2. p. 81. i.*

195. f. 1. *Raj. dendr.* 31.
Habitat in Jamaica. b

R. T. A. 6. LAN.

{ Canis artorensis Sabine folio Planar. 29. Spec. et. 3. Ad.
fasciat. dent. 20 petiol. und. folios 8 mm. secund. 2 folios
una petiol. Parc. ~~canina~~ foli. folios minores bellitatis floribus.

{ *Camara arborea* Schlecht. foliis pubescentibus. 2¹. 3¹. ramos sub
totu pubescentibus foliis ovat ante molliori petiolis long. day.

R. f. 3

6 TAN

{ *Cameraria obtusipennella* folia Phoen. 27. sp. n. eti 3. ad
flavat. auct. dent. 20 petiolis und. 1. folia rame. sacculis 4 tubis
vix pubes. *Pachysoma* subv. folia minima hirtella *Pachysoma* *obtusipennella* *Stege*

Cunashiba, No. 86.
~~Hornjoli Preyer~~

monjoke

*{ Camara flor probat mod monjole. artia ad Hippian. and.
fl. caput probat.*

628 DIDYN MIA ANGIOSPERMIA.

*corymbosa.**Camara.*

6. LANTANA foliis alternis, floribus corymbosis + Periclymenum rectum, salviae foliis majoribus oblongis mucronatis subtus villosis alternatim sitis, flore & fructu minoribus. *Sloan. jam. 164. bist. 2. p. 83. t. 194. f. 3. taj. dendr. 30.*

Ulini angustifoliae facie baccifera jamaicensis, foliis superne scabri, subtus villosis alternatim sitis, floribus parvis perpusillis, fructu botryoide monospermo. Pluk. alm. 393. t. 329. f. 5.

Habitat in Jamaica. h

Refertur ex ide Sloanei; De floris structura nulla mihi certudo.

*Oftia africana.**Oftia adans.**p. 199. ad doct. Ad.*

7. LANTANA foliis alternis sessilibus, floribus solitariis. *Hort. cliff. 20. Roy. lugdb. 290. Lantana florib solitariis. Gen. plant. 632. Jasminum africanum, ilicis folio, flore solitario ex alis foliorum proveniente. Comm. rar. 6. t. 6.*

Habitat in Aethiopia. h Rami junc. pubes statibenton. foli. leonanthys in cicutae. fol. alt. et folia petiol. ord. acut. Brunne mellea rugosa Zoutev. dentata. ante angust. foli. recta corolla recta corona canina.

CORNUTIA.

*Cornutia ad. 199**ciliata.*

1. CORNUTIA. Hort. cliff. 219.

Cornutia flore pyramidato, foliis incanis. Plam. gen. 32. Agnanthus viburni folio. Vaill. act. 1722. p. 273.

Habitat in Carbæis, Campechia. h

Rami junc. pubes statibenton. foli. leonanthys in cicutae. fol. alt. et folia petiol. ord. acut. Brunne mellea rugosa Zoutev. dentata. ante angust. foli. recta corolla recta corona canina.

LOESELIA. ad 211.

1. LOESELIA. Roy. lugdb. 299.

Royena foliis acute dentatis & veluti spinosis, flore luteo. Houst. mss.

Habitat in Vera Cruce.

*Species ad Kreidex**Sgatenu. p. 116. biflora.**Kreidex ad. 225*

Elle nomen. gallegae 14 CAPRARIA.

Latin. el Ital. fratrellis capraria. foli. alt. lato punctata,

Capraria foliis alternis, corollis quinquefidis Hort. cliff. 320. Roy. lugdb. 7301.

Capraria curassavica. Herm. parad. 110. t. 110.

Gratiolæ affinis frutescens americana, foliis agerati s. veronicæ erectæ majoris. Comm. hort. 1. p. 79. t. 40.

Lysimachiæ peruvianæ affinis americana procumbens. ononis vernæ frutescentis folio singulari glabro. Pluk. alm. 237. t. 98. f. 4. Cap. 2 bud. 4 buds.

Habitat in Curassao. 2

Conferatur Capraria peruviana, agerati foliis absque pediculis. Fewill. per. 1. p. 764. t. 48.

Veronica Sloan 7. 124.

Phillyrea Bonn. p. 269.

HERENST

326. Roy

Valerianella

cante not

Valerianoid

Raj. supp

Pedicularis

Burm. a

Habitat in

HEBENS

Roy. lug

Habitat in

~~SELAGO.~~ *Silicium igneum et temperantia caput,*
album. Capitulum.

1. SELAGO corymbo multipli.
Selago caule erecto, corymbo terminal. *Hort. cliff.* 321. *Vernia adans*
Roy. lugdb. 300. *284 à S. Vernia Rotan*

Camphorata africana umbellata frutescens. *Comm. bart.*

2. p. 79. t. 40. *Raj. suppl.* 130.
Millefolio affinis maderaspatana, camphoratæ foliis ra-
diatim nascentibus. *Moris. hist.* 3. p. 19. *Raj. suppl.* 219.

Habitat in Æthiopia. *1. h. p. dubia sive Selaginæ folia corymbante distans*
dubia aperte rotundata virens. *2. levis non pubescens ovillata fol. longiora aequaliter puncta. non pubescens*
spuria. collata.

2. SELAGO spicis imbricatis. †
Melampyrum africanum spicatum, foliis angustissimis.
Burm. afric. 115. t. 42. f. 3.
Habitat in Æthiopia. 5
Caulis suffrutex. Folia linearia, alterna. Spica ovato-obca-
longa, obtusa, arete imbricata; bracteis subovatis, mem-
branaceis. Fructificatio hodie ignata.

3. SELAGO racemo simplici. † *dubia.*
Thymelæa foliis angustissimis linearibus, flosculis spi-
catis. *Burm. afr.* 130. t. 47. f. 3.
Thymelæa æthiopica spicata glabri, foliis longioribus
angustis. *Pluk. mant.* 180. t. 45. f. 6.
Valerianoides parva, foliis in cauleraris, spica in sum-
mo caule oblonga ex foliolis & flosculis confertis
composita. *Raj. suppl.* 245.

Habitat in Æthiopia.

Caulis erectus. Folia conferta, linearia. Racemus sim-
plex, terminalis, longissimus, erectus. Corollæ tubus
filiformis, longissimus. Stamina modo 2 intra tubum
corollæ; antheris incumbentibus, linearibus. Fructus
ignotus; hinc genere dubio.

HEBENSTRETTIA. 320

- HEBENSTRETTIA.

1. HEBENSTRETTIA foliis dentatis. *Hort. cliff.* 497. *dentata*. X

326. *Roy. lugdb.* 300.

Valerianella africana, foliis angustis, flore macula rubi-
cante notato. *Comm. hort.* 2. p. 247. t. 109.

Valerianoides flore monopetalo, semine unico oblongo.
Raj. suppl. 245.

Pedicularis foliis angustissimis dentatis, floribus spicatis. ^{alia uerba} aliud genus est
Burm. afric. 114. t. 42. f. 2 *Cal. 2 phryg. Cor. 5 dentat.* corolla lab. sup. cochlear
Habitat in Æthiopia. ^{2 lab. 2 phr. caps. 26m. capite 5 dentat. folia ad oblongam secundum}

2. HEBENSTRETTIA foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 497. *integrifolia*.

Roy. lugdb. 300.

Habitat in Æthiopia.

cheiranthos. *Vaill.* *Comm.*
Capt. Ind. *Vaill.*

ERINUS.

alpinus
aquatum *Bauv.*
210.

1. ERINUS floibus racemosis.

Erinus. Sauv. nonsp. 116.

Ageratum serraum alpinum. Bauh. pin. 221.

Ageratum purpureum. Dalech. hist. 1184.

β. *Ageratum minus saxatile, flore albo. Barr. rar. 23. t. 1192.*

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Monspelii.

africanus

2. ERINUS floribus lateralibus sessilibus, foliis lanceo-latis subdentatis.

*Buchnera foliis obtusis serratis. Hort. cliff. 501. * Roy. lugd. 300.*

Lychnidea villosa, foliis ex alis floriferis, florum petalis cordatis. Burm. afric. 139. t. 50. f. 1.

Euphrasia æthiopica, drabæ foliis, summis oris flosculorum altius divisis. Plak. mant. 73. Raj. suppl. 401.

β. *Buchnera foliis acutis dentatis. Hort. cliff. 501. * Roy. lugd. 300.*

Habitat in Æthiopia.

peruvianus

3. ERINUS foliis lanceolato-ovatis serratis.

Lychnidea veronicae folio, flore coccineo. Few. peruv.

3. p. 25. f. 3.

Habitat in Peru.

laciniatus

4. ERINUS foliis laciniatis.

Lychnidea verbæa tenuifoliæ folio. Few. peruv. 3. p.

35. t. 25.

Habitat in Peru.

BUCHNERA. *ad 211*

americana! 1. BUCHNERA foliis dentatis oppositis.

*Cortusæ f. Verbasco species, caule non ramoso, floribus violaceis. Gron. virg. 74. **

Habitat in Virginia, Canada.

asiatica

2. BUCHNERA foliis integerrimis alternis.

Habitat in Zeylona, China.

Caulis ramis alternis, habitu Euphrasie, obtuse tetragonus. Folia linear-lanceolata, scabra, integerrima, alterna, versus basin opposita. Spicæ longæ floribus alternis remotis. Calyces quinquepartiti, scabri: Tubus corollæ filiformis, calyce duplo longior, cervice incurvato, stamina 4 in cludente; Limbus quinquesfidus, purpureus; laciniis 2 superioribus brevissimis reflexis; tribus reliquis obovatis subæqualibus.

agrestum *old. a pede Rapunculi. Plan. MS. Tom. 4. f. 45.*

BROUARD. 17. Phyt. Brum. ad gal. Radix Rapunculi faria et sapore cuncta St. opp. levella. Radicalia Rapunculi integ. elliptico-aucta radiatum patentia. Rapunculus tuber. vici. et nob. superindra pp. cuncta Flores blit. annul. opp. levella. Cal. tubul. cili. Enges 5 dent. cor. tubo long. et laev. tub. invag. agrest. St. ... bent. ovary prot. styl. bent. caps. ovat. membr. 2 low 2 valv. Receptac. centrale per nunc. glab. nitra. Enome ex Ruchomus sparsus.

DIDYN

BROWALL
179. *

Habitat in An-

LINNÆA f.

4. Hort. cliff.

517. Roy.

183. Sauv.

Serpillifolia. I.

Campanula se-

up. 1720.

Nummularia

2. p. 346.

Habitat in Su-

tiguis, mus-

SIBTHORI

Gen. nov.

Chrysospleniu-

mi spuria

angl. 3. p.

Habitat in C-

ribus.

SIBTHOR

dunculis f.

Chrysosplenii

talo. Shaw

Habitat in A-

SIBTHOR

lis geminis

Planta. Plu-

Habitat

LIMOSEI

helv. 629

Limosella a-

Plantagine

Plautagine

P. 605. J.

Nominis

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

631

BROWALLIA.

Browallia ad. 211.

1. BROWALLIA. Hort. cliff. 318. t. 17. Hort. upf. americana.

179. *

Habitat in America australi. ☽

LINNÆA.

Linnæa ad. 157.

1. LINNÆA floribus geminatis. Fl. lapp. 250. t. 12. f. borealis.

4. Hort. cliff. 320. Fl. suec. 522. t. 1. Mat. med.

517. Roy. lugdb. 236. Hall. helv. 608. Segu. veron.

183. Sauv. meth. 137.

Serpillifolia. Buxb. act. 2. p. 346. t. 21.

Campanula serpillifolia. Baub. pin. 93. prodr. 35. Act.

upf. 1720. p. 96. t. 1.

Nummularia norvegica, flore purpureo. Kyll. act. dan.

2. p. 346. f. C. 3. nublet.

Habitat in Sueciæ, Sibiria, Helvetiæ, Canadæ sylvis an-

tiquis, muscosis, acerosis, sterilibus, umbrosis. ♂

SIBTHORPIA. ad. 211.

1. SIBTHORPIA foliis reniformi-subpeltatis crenatis. europæa.

Gen. nov. 1099.

Chrysosplenium cornubiense. Pet. herb. t. 6. f. 11.

Altini spuria pusilla repens, foliis saxifragæ aureæ. Raj.

angl. 3. p. 352. Pluk. atm. 23. t. 7. f. 6.

Habitat in Cornubiæ, Devoniæ, Lusitaniæ udis agge-

ribus.

2. SIBTHORPIA foliis orbiculatis integris crenatis, pe- africana.

dunculis solitariis. Gen. nov. 1099.

Chrysosplenii foliis planta aquatica, flore flavo pentape-

talo. Shaw. afric. 149. f. 149.

Habitat in Africa.

3. SIBTHORPIA foliis reniformibus crenatis, peduncu- peregrina.

lis geminis. Gen. nov. 1099.

Planta. Pluk. phyt. 257. f. 5.

Habitat - - - -

LIMOSELLA.

Limosella ad 210

1. LIMOSELLA. Fl. lapp. 249. Fl. suec. 521. Hall. aquatica.

helv. 629. Dalib. paris. 193.

Limosella annua. Lind. als. 156. t. 5.

Plantaginella. Hall. jen. 23. t. 6. f. 2.

Plantaginella palustris. Baub. pin. 190. Moris. hist. 3.

p. 605. f. 15. t. 2. f. 1

R r 4

Sper

Motuinae. aegre. Limosella. ? Campana. dupl. 52. 170. f. 4. (Y. Campana. 4. L. n. 419. Kruer)

Spergula perpusilla, lanceolatis foliis. *Loef. pruss.* 261.
t. 81.

Alpine palustris repens, foliis lanceolatis. *Pluk. alm.* 20.
t. 74. f. 4.

Alpine palustris exigua, foliis lanceolatis. *Menz. pug.*
2. t. 7. f. 6.

Habitat in Europæ septentrionalis inundatis. ◎

ÆGINETIA.

Phelippeau ad. 406.

1. ÆGINETIA.

Tsiem-cumulu. Rheed. mal. II. p. 97. t. 47.

Habitat in Malabaria.

Folia nulla Caules simplicissimi, teretes, stricti venis
tribus, uniflori. *Flos ex amixandus*
Red. tutuosa parietica grandis alt. pro floribus uti orobanche.
flor. pluvialis 12. ex radice facturam que vicem probat caulis.
longe pedunculata. Phelippeau spec. alt.

obolaria ad 209

virginica.

1. OBOLARIA.

Hort. cliff. 323. *Gron. virg.* 74.
Orobanche virginiana, radice coralloide summo caule
foliis subrotundis. *Moris. hist.* 3. p. 504. f. 12. t. 16.

f. 23. *Pluk. alm.* 273. t. 209. f. 6. *Raj. suppl.* 595.

Habitat in Virginia.

OROBANCHE.

Orobanche ad. 207.

1. OROBANCHE

caule simplicissimo lœvi, staminibus
exsertis.

Orobanche caule simplici cœruleo, bracteis brevibus.
Sauv. monsp. 4.

Orobanche majore flore. *Baub. pin.* 88. *Moris. hist.*
3. f. 12. t. 16. f. 2.

Orobanche magna purpurea monspessulana. *Baub. hist.* 2.
p. 782.

Habitat Monspelii.

Orobanche ad.

Cynomorion. Ibin

Leonica hirsut

ante botan. Coss. 16. 6.

deus datus de Abhugh

quasi famam affervit.

Ialium. Buer

2. OROBANCHE

caule simplicissimo pubescente, stami-
nibus inclusis.

Orobanche caule simplicissimo. *Hort. cliff.* 321. *Fl. suec.*
519. *Roy. lugdb.* 299. *Dalib. paris.* 190. *Gart. gelr.*
368.

Orobanche caule simplici, bracteis longioribus. *Sauv.*
monsp. 5.

Orobanche major garyophyllum olens. *Baub. pin.* 87.

Orobanche 1. *Clus. hist.* 1. p. 270.

Rapum genistæ. *Lob. ic.* 2. p. 89.

Habitat in Europæ agris, pratis siccis.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 633

3. OROBANCHE caule ramoso, corollis quinquefidis. *ramosa.*
 Orobanche caule ramoso. *Hort. cliff. 321. Roy. lugdb.* *Orobanche ad 207*
 299. *Hall. helv. 610. Dalib. paris. 191. Gort. gelr.*
 369.
 Orobanche ramosa. *Baub. pin. 88.*
 Orobanche. *Cam. epit. 311.*
Habitat in Europæ fccis.
4. OROBANCHE caule ramoso, corollis quadridentatis. *virginiana.*
 Orobanche caule ramoso, floribus distantibus. *Gron. virg.*
 168.
 Orobanche minor virginiana lignosior, per totum cau-
 lem floribus minoribus onusta. *Moris. hist. 3. p. 502.*
 f. 12. t. 16. f. 9. *Raj. suppl. 595.*
Habitat in Virginia.
5. OROBANCHE caule unifloro. *uniflora. a fallas.*
 Orobanche aut Helleborine affinis marilandica, caule
 nudo, unico in summitate flore. *Raj. suppl. 595.*
 Dentariæ s. Anblato cordi affinis, flore pallide cæruleo.
Gron. virg. 70.
 Gentiana minor aurea, flore simplici ampio deflexo pal-
 lide flavescente. *Pluk. mant. 89. t. 348. f. 3.*
 Aphyllo. *Mitch. 25.*
Habitat in Virginia.

DODARTIA.

Dodartia ad 211
orientalis.

1. DODARTIA foliis linearibus integerrimis glabris.
Dodartia Hort. cliff. 326. Roy. lugdb. 297.
Dodartia orientalis, flore purpurascente. Tournef. cor.
 47. *itin. 3. p. 208. t. 208.*
Habitat in monte Ararat, Tataria. 2
2. DODARTIA foliis ovatis serratis villosis. *indica.*
Habitat in India,
 Caules teretiusculi, villosi, subramosi. Folia ovata, pe-
 tiolata, obtuse serrata, villosa, pollicis extimo latiora.
 Racemus terminalis Foliis minoribus. Flores oppositi,
 secundi, subsessiles. Calyx obtusus, villosus. Corolla
 flava, labio exteriore recto brevi.

LIPPIA.

Lippia ad 198
americana.

1. LIPPIA.
Habitat in Vera Cruce. 5
 Frutex Caulibus teretibus, pallidis, ad genicula com-
 pressis. Folia lanceolato-ovata, extra medium serrata,
 petio-

R r 5

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 635

Ruellia capsulis teretibus. *Dill. elth.* 328. *t.* 248. *f.* 320.
Habitat in Barbados.

3. **RUELLIA** foliis petiolatis, pedunculis dichotomis paniculata.
niculatis.

Ruellia pedunculis multifloris dichotomis folio longioribus. *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 292.

Speculum veneris majus impatiens. Sloan. jam. 59. *bifl.*
i. p. 158. t. 100. f. 2. Raj. suppl. 389.

Habitat in Jamaica. 2

4. **RUELLIA** foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. tuberosa.

Ruellia capsulis angulosis. *Dill. elth.* 328.

Ruellia humilis, flore cæruleo, asphodeli radice. Plum.
gen. 12.

Gentianella flore cæruleo, integro vasculo seminali ex
humidi contactu impatiente. Sloan. jam. 52. *bifl.* i.

p. 149. t. 95. f. 1. Raj. suppl. 370.

Habitat in Jamaica. 2

5. **RUELLIA** floribus geminis.

Ruellia minore folio, floribus gemellis. Dill. elth. 331.

Habitat in Carolina.

6. **RUELLIA** foliis subcrenatis lanceolato-ovatis, capi-

tulatis ovatis foliosis hispidis.

Aehatoda luzanensis, spica plana. Pet. gaz. t. 73. *f. 6.*?

Habitat in India. Osbeck. 2

Radix lignosa, repens. Caules digitales, simplicissimi, ar-

ticulati, teretiusculi. Folia lanceolato-ovata, subpetio-

lata, pilis adpersa, margine reflexo undulato crispa.

crenata. Capitula ad genicula lateralia, solitaria, ova-

ta, imbricata. Foliis ovatis, acuminatis, piloso-scabris,

intrà quæ flores Calyce 5-partito hirsuto linearis. Co-

rolla flava. Stamina. 4.

7. **RUELLIA** foliis oblongis integerrimis, floribus soli-

ringens. tariis sessilibus, caule procumbente. Fl. zeyl. 234. *

Upudali. Rheed. mal. 9. *p. 125. t. 64.* *muñoz. 2pm. ruini agoni opp.*

Habitat in India. folijs confor longipet. fls. abz. en abz. opp. subd. Solani

en sp. subaq. cal. 5pm. cap. ad abz. mucrones curv. in culm. abz.

8. **RUELLIA** foliis mucronato-ferratis, caule repente, antipoda.

floribus subspicatis terminalibus quinis ternisve. *Fl.*

zeyl. 235. *

Gentianella utriusque Indiæ impatiens, foliis agerati Snop-

gras barbadensis. Pluk. mant. 167. *t. 186. f. 2.*

Peetjanga pulpani. Rheed. mal. 9. *p. 115. t. 59.*

Habitat in Indiis. ○ ypi in adz. aransz.

fl. sp. tenuis abz. pulpani. bali flava. st. 4. cal. 4pm.

cap. pulpp.

Viten. ad. 200

VITEX.

- + • Agnus Ca- 1. VITEX foliis digitatis, spicis verticillatis.
stus. Vitex. Cam. epit. 105. Hort. cliff. 327. Roy. lugdb.
Bengal. arab. 201. Gron. virg. 169. Mat. med. 319.
Fayros quia conatus capillaris Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis.
Nyss. Dist. in vieney. 705 Baub. pin. 475.
Viten. Reg. Dab. gen. 3. Vitex latiore folio. Baub. pin. 475.
Spes. mag. Semina Vitex folio ferrato. Baub. hist. 1. p. 205.
Habitat in Siciliæ et Neapolis paludosis. 5
- Viten. ad 2. VITEX foliis ternatis quinatisque, paniculis dichoto-
mis.
• trifolia. Vitex trifolia minor indica. Pluk. alm. 390. t. 206. f.
Caranofi. h.m. 5. Fl. zeyl. 413.
Piperi similis, fructus striatus, femina. Baub. pin. 412.
Caranofi. Rheed. mal. 2. p. 13. t. 10. Raj. hist. 1575.
Habitat in India.
Foliola ovata, acuta, integerrima, subtilis tomentosa.
- Viten. ad* 3. VITEX foliis quinatis ternatisque serratis, floribus ra-
cemoso-paniculatis.
Negundo. imp. Bemnosi. h.m. Vitex trifolia minor indica ferrata. Pluk. alm. 390. Fl.
haemna. Symp. zeyl. 414. Pspri.
Negundo arbor mas. Baub. hist. 1. p. 189.
Bemnosi. Rheed. mal. 2. p. 15. t. 11. Raj. hist. 1575.
Habitat in India. 5
Foliola 3. s. 5, ovato-lanceolata, sinuato-serrata, subtilis
nuda venosa.
Viten. ad 4. VITEX foliis pinnatis, paniculis trichotomis.
agneta adans. agnethla. Pistacio-vitex. Fl. zeyl. 415. *
Habitat in Zeylona. 5

Bontia. ad 199.

BONTIA.

• daphnoides. 1. BONTIA.

- Bontia arborescens, thymelææ facie. Plum. gen. 32.
Bontia laureolæ facie. Dill. elth. 57. t. 49. f. 57.
Olea sylvestris barbadensis, folio angusto pingui levi-
ter crenato. Pluk. alm. 269. t. 209. f. 3. Raj. dendr. 47.
Habitat in Barbados. 5

Columnea. ad 21.

COLUMNEA.

Scandens.

1. COLUMNEA.

Columnea scandens, phœnicio flore, fructu albo. Plum.
gen. 28.

2. Columnea scandens, flore lutescente, fructu albo. Plum.
gen. 28. Ha-

Habitat in G
Caulis, Folia
tiolata.

ACANTH
326. Hort.
304. Sauv.

Acanthus sati
Carduus Aca
Habitat in Ita

ACANTH
326. Roy.
Acanthus acu

Acanthus ma
t. 94. f. 1
Frutex indicu

nata brevi
Carduus aqua
6. n. 16.
Paina schylli

Habitat in I

ACANTH
mibus, cal
Adhatoda m
villofis. P

Habitat in I

MELIAN
Hort. cliff
Melianthus

Habitat in

MELIAN
cliff. 492
Melianthus

Habitat in

Habitat in Gallia æquinoctiali.

Caulis, Folia, Corollæ villosa. Folia ovata, serrata, petiolata.

ACANTHUS.

1. ACANTHUS foliis sinuatis inermibus. Hort. cliff. mollis. • *Roy. Lubb.*
 326. Hort. upf. 181. Mat. med. 318. Roy. lugdb. *acanthus*. *math. cord.*
 304. Sauv. monsp. 278.
Acanthus sativus f. *mollis virgili*. Baub. pin. 383. " *épnáxanta* } *distr.*
Carduus Acanthus f. *Brâica ursi*. Baub. hist. 3. p. 75.
Habitat in Italiæ, Siciliæ humentibus, duris. 4

2. ACANTHUS foliis pinnatifidis spinosis. Hort. cliff. *spinosa*.
 326. Roy. lugdb. 304. *acanthus ad*
Acanthus aculeatus. Baub. pin. 383.
Acanthus sylvestris. Dod. pempt. 719.
Habitat in Italiæ humentibus. 4

3. ACANTHUS caule fruticoso aculeato. *fol. opp. agrifolii*.
Acanthus malabaricus, *agrifolii* folio. Pet. fcc. 10. gaz. *ilicifolius*.
 t. 94. f. 15. *Dilivaria* *Camell*
Frutex indicus spinosus, foliis agrifolii, siliqua gemi-
 nata brevi. Raj. hist. 1766. Pluk. phyt. 261. f. 4.
Carduus aquaticus f. *indorum* *Dilivaria*. Camell. luz.
 6. n. 16. *fl. tollit-natu* *opp. agrifolii* *anill.* *su variae vagia*.
Paina schylli. Rheed. mal. 2. p. 93. t. 48. *opp. 261. 262.* *aglytalis* *pet. mus. dr.*
Habitat in India. 4 *fol. tute tenui subt. venen. cibis* *cam. orn. cul. rong.*

4. ACANTHUS foliis quaternis obsolete dentatis iner- *maderaspae*
 mibus, calycibus ciliatis. *tensis*.
Adhatoda maderaspatensis, calyce barbato, foliis subtus
 villosis. Pet. mus. 23.
Habitat in India.

MELIANTHUS.

1. MELIANTHUS stipulis solitariis petiolo adnatis. *major.*
Hort. cliff. 492. *Hort. ups.* 181. *Roy. lugdb.* 402.
Melianthus africanus. *Herm. lugdb.* 414. t. 415.
Habitat in Æthiopiæ succulentis. 2

melianthus. ad

2. MELIANTHUS stipulis geminis distinctis. *Hort. minor.*
cliff. 492. *Roy. lugdb.* 402.
Melianthus africanus minor foetidus. *Comm. rar.* 4. t. 4.
Habitat in Æthiopia. 2 sp. ~~sp. moll.~~ 1. agn. flw.

Class

chouan. Inde { *et non en B. jassier. Si quelques plantes croisées Inde que adhérant*
americ { *ne précipitante fructu cochinilles.*

640 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

otour. Inde. { *Cortex Inde en. ne précipitante fructu cochinilles.*
or

Classis XV.

TETRADYNAMIA.

Myagrum. div. l. 4. c. 112. folia luteo 2. cibolati
metamorphon quibus. { *foli. rubra pallida. Collo cimile. ex sanguine oleum*
quae creante SILICULOSA.
nutritus ad *oleum ex aperiatis culti lindellianum*
liniendum virga pro fructu. *oleum ex aperiatis culti lindellianum*

MYAGRUM.

Crambe *orientalis*
ad.

Rapistrum *adans.*

Rapistrum *alp.*

1. MYAGRUM siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis. Hort. upf. 182. *

Crambe foliis lanceolatis dentato-sinuatis. Hort. cliff.

340. Roy. lugdb. 329. Gort. gelr. 404.

Rapistrum monospermum. Baub. pin. 95. prodr. 37.

t. 37. Mapp. alsat. 266. t. 266.

Habitat in Alsatia. ☀

Crambe *orientale*

2. MYAGRUM siliculis fulcatis lăvibus, foliis oblongis dentato-sinuatis. Hort. upf. 182. *

Rapistrum orientale, folio raphani, capsulis rugosis. Bærb.

lugdb. 2. p. 2. Rapistrum orientale varietate ~~varietate~~ *luteum*

Habitat in Oriente. ☀

Crambe *rugosum*

3. MYAGRUM siliculis fulcatis pilosis rugosis, foliis oblongis obtusis dentatis. Hort. upf. 103. *

Habitat in Europa australi. ☀

Crambe *hispanicum*

4. MYAGRUM siliculis lăvibus subtorosis, foliis ly-

ratis.

Sinapi hispanicum minus, raphani folio. Tournef. inst.

227?

Habitat in Hispania. ☀

Caulis pilis raris reflexis scaber. Racemi virgati, longi.

Folia lyrata, dentata, petiolata, oblonga. Siliculae cy-

lindricæ, lăves, nec fulcatæ rugosæ aut striatae; con-

stantes Corpore oblongo, pedicellato, cylindrico, sterili, cui

Silicula ovata insidet collo angustiore: articulo inferiori

biloculari inani, superiore monospermo. Corollæ luteæ.

Bricour *perfoliatum*

5. MYAGRUM siliculis cordatis subsessilibus foliis, am-

plexicaulibus. Hort. upf. 182. * Hort. cliff. 328. Roy.

lugdb. 330. Sauv. monsp. 77.

Myagrum monospermum latifolium. Baub. pin. 109.

prodr. 52. t. 51. Moris. hist. 2. p. 267. f. 3. t. 21. f.

antepenult. Bricouris cordata. Baub. Eystam

Habitat inter Galliæ segetes. ☀

Bricour *gall.*

Bricour *alp.*

Siliculae

ANASTA

Roy. lug.