



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

1. Erysimum pinnatifidum L. P. Varietate 2. siliquosa novi hujus plantae omnes praesertim.
 1. angustifolium. 2. pinnatum. 3. minima siliquae ex his brevioribus longioribus. 4. pallidum.
 5. orientalis foliis lanceolatis longioribus. 6. majorum siliquae ut 2. sed. 5 à 6 pelluc. longior. 7. 22.
 Sitymbium (Lestalius Lin. aut 18) foliis pinnatis latoe ante disti, caule retrospicere bipinnis —

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 661

Alliaria. Bauh. pin. 110. Fuchs. hist. 104. Cam. epit. 140.
 589.

Habitat in Europæ sepibus, cultis, umbrosis. & ad alii cunivastationem.

4. ERYSIMUM foliis integris lanceolatis. Fl. lapp. 263. cheirantho.
Hort. cliff. 337. Fl. suec. 555. Roy. lugdb. 342. des. Rein. ad
Dalib. paris. 202. ~~Leucom~~ siliqua. 7. 418 +
Turritis foliis integris lanceolatis. Guett. stamp. 2. p. 165. ~~Cordigera~~ +
Myagrum siliqua longa. Bauh. pin. 109.
Camelina, Myagrum alterum thlaspi effigie. Lob. ic. 225.
Habitat ubique in Europæ arvis. ○
Habitus simillimus Cheirantho Erysimoide præter flores
minores & siliquas magis patulas. Stigmata in hac par-
va vix divisa, in sequenti quasi ex nodis duobus diva-
ricatis constricta.

CHEIRANTHUS.

1. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis dentatis, caule re- erysimoides. +
cto, siliquis tetragonis. Rein. ad.
Erysimum foliis integris lanceolatis margine repando- ~~Cordyphella~~
dentatis. Hort. ups. 192.
Leucojum luteum sylvestre angustifolium. Bauh. pin.
202. ~~Leucom~~ siliqua non levata siliqua quadrangularis. 7.
Leucojum sylvestre. Clas. hist. 1. p. 299. Bauh. hist.
2. p. 873.
Habitat in Hungaria, Gallia. 3
2. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris. Cheiri. arab. ~~Kiri. gal.~~
Hort. cliff. 334. Hort. ups. 187. Mat. med. 335. ~~Lermon~~ Brunf. ad
Roy. lugdb. 337. Guett. stamp. 2. p. 156. Dalib. ~~Phoxlor.~~ Thysbe gallica
paris. 197. Gort. gelr. 382. cat. ruber eret - colla lata. ~~Thysbe gallica~~
Leucojum luteum vulgare. Bauh. pin. 202. ~~Leucom~~ siliqua.
Leucojum luteum. Dod. pempt. 160. ~~Leucom~~ siliqua 2-lobata 2-lobata 2-lobata 2-lobata
3. Leucojum luteum, magna flore. Bauh. pin. 202. Ravenelle. gall
4. Leucojum luteum, ferrato folio, flore grandiore. Bauh.
pin. 202. prodr. 102. ~~florem rauulans utd. Indigofera~~
5. Leucojum luteum, pleno flore, majus. Bauh. pin. 202.
6. Leucojum, pleno flore, minus. Bauh. pin. 202.
Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Hispania muris,
tectis. 3. 2. 5.
3. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis retu- chins. - hesperis ad.
sis, siliquis apice subulatis. Hort. ups. 187.
Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis dentatis.
Hort. cliff. 335. n. 3. Roy. lugdb. 337. n. 3.
~~Leucom~~ chia sanat. Leucom siliqua fl. pavo. 7. Hesperis
T t 3

Lithoselinum. C. Leu codum squalidum Rhyni folio hirsutum coriaceum opacum. C. B. S. 201.

Leucorium criticum primum incanum C. B. S. 201.

glaucidae. Creticum

662

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Hesperis siliquis hirsutis, flore parvo rubello. Dill. elth. 180. t. 147. f. 178.

Leucojum thlaspeos facie, flore albo. Herm. par. 192. t. 193.

Habitat in Chio. ☽

Leucorium ad
incanum
~~L~~ *Leucorium gal-* ~~Dod.~~ *matth.*
~~Roxii. Swart.~~

4. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. Hort. upf. 187. Hort. cliff. 334.

Leucojum incano folio hortense. Baub. pin. 200. n. 1. 2. 4. 5. 6. 7. ~~Leucorium angustifolium~~ ~~Leucorium maritimum~~ ~~Leucorium angustifolium~~ ~~Leucorium maritimum~~

Viola alba & purpurea. Hob. ic. 329.

Habitat in Hispaniae maritimis. 2. 5.

Leucorium ad
annuum.
~~L~~ *alsiosa. Ray*

5. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo.

Leucojum incanum minus. Baub. pin. 200.

Habitat in Europæ australis maritimis. ☽

Forte sola varietas antecedentis?

Leucorium ad
fruticosus.
~~L~~ *Leucorium ad*
~~angustifolium~~

6. CHEIRANTHUS foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus petalis undatis, caule suffruticoso. Læfl. Leucojum maritimum angustifolium. Baub. pin. 201. Leucojum minus, breviori folio, obsoleto flore. Barr. ic. 99. n. 2. *Leucorium marit. angustif. incanum* 2.

Leucojum minus, lavendulæ folio, obsoleto flore. Bocc. mus. 148. t. III.

Habitat in Hispania, Italia, Monspelii. 5.

trilobus.

7. CHEIRANTHUS foliis dentatis obtusis, calycibus laevibus, siliquis nodosis mucronatis.

Leucojum maritimum minimum hispanicum vernum, foliis erucæ. Tournef. inst. 221?

Leucojum maritimum minimum. Baub. pin. Burs. XI. 28.

Habitat in Hispania & prope insulas Stœchadum. ☽
Caules ramosi, patuli, spithamei, incani. Folia lanceolata, obtusa, unico vel duobus utrinque dentibus profundioribus. Calyces non pilosi. Corolla purpurea, majuscula. Siliquæ lineares, teretiusculæ, futuris carinatæ, lateribus torulis nodosæ, apice longo subulato acuminatæ.

Iacerius.

8. CHEIRANTHUS foliis lacero-dentatis acuminatis, calycibus pilosis, siliquis nodosis mucronatis.

Leu-

Hesperis hispida, florum purpureo vario, foliis aplo, raro laverandulæ
foliis non communis curvis divedit. Dansk ind. alt. jaunciat. Chelamaria heile

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 663

Leucojum lusitanicum purpureum, foliis eleganter dentatis. Herm. parad. 193. t. 193.

Habitat in Lusitania. ☽

9. CHEIRANTHUS siliquarum apicibus tridentatis. *Leucorium ad tricuspidatus*.
Hort. cliff. 335. Roy. lugdb. 338.
Leucojum marinum. Cam. hort. 87. t. 24. *Moris hist.*
2. p. 242. f. 3. t. 8. f. 13. *Leucorium marinum latifolium tricuspidatum*.
Habitat in Europæ australis maritimis? ☽

HESPERIS. *Min.*

1. HESPERIS caule hispido ramoso patente. Hort. upf. 187. *triflisis*. • 418
Hesperis caule hispido procumbente. Hort. cliff. 335.

Roy. lugdb. 338.

Hesperis montana pallida odoratissima. Baub. pin. 202.

Hesperis pannonica. Com. hort. t. 18.

Habitat in Hungaria. ♂

2. HESPERIS caule simplici erecto, foliis ovato-lanceo-matronalis. • 1^a vesp.
latis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. Hort. *hypnis. Min*. cliff. 188. Roy. lugdb. 338. Dalib. paris. 197.

Hesperis hortensis. Baub. pin. 202.

Viola matronalis. Dod. pempt. 161.

Habitat in Italia. ♂ *2nd. fol. integr. cal. longus rectus lob. rotund. stictus. 2. auriculis basi*

ovario oblongo. foliis velutina. loba erect. gland. 2. haemoph.

3. HESPERIS caule simplici, foliis lanceolatis dentato-sibirica.
ternatis, petalis obtusissimis integris.

Habitat in Sibiria. ♀

Habitus omnibus partibus H. matronalis, ut facile pro varietate haberem; Differt vero Caule duplo altiore; Corollis purpureis nec albidis; Ungvibus petalorum calyce duplo longioribus; Petalorum bracteis obtusis vix ac ne vix emarginatis, cum praecedentis emarginatae ungue intermedio parvo prominulo. Folia longiora, angustiora, magis serrata. Cæterum Sibiria producit varias plantas majores: Ononidem, Polemonium, Serratulam.

4. HESPERIS caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis ferratis scabris, siliquis sessilibus. *africana*. ? *Hesperis*.

Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis saepius dentatis. Hort. cliff. 335. Roy. lugdb. 338.

Hesperis africana, hieracii folio hirsuto, flore minimo purpurascente. Niss. act.

Hesperis sylvestris, parvo flore. Baub. pin. 202. prodr.

103. Burs.

Habitat in Africa. ☽

T t 4

5. HESPE-

664 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

provincialis. 5. HESPERIS caule ramoso diffuso, siliquis teretibus:
Hort. upf. 188.

? *cheiranthus* 4
mantitanus 441.

Cheiranthes foliis lanceolato-linearibus acutis glabris un-
 trinque dentatis. *Hort. cliff.* 331. *Roy. lugdb.* 337.
Leucojum minus, lavendulæ folio, obsoleto flore, an-
 gustifolium. *Bocc. mus. 2. p. 148. t. 111. Barr. ic 803.*
Habitat in Galloprovincia. 2

? *repanda*? ad.
dentata.
Lochneria heit
Sympetrum g.
Brasilicum son.
hystrat p. 440.

6. HESPERIS foliis dentato-pinnatifidis, caule lævi.
Hesperis foliis multifidis. *Roy. lugdb.* 338.
Hesperis flore albo minimo, siliqua longa, folio profun-
 de dentato. *Dill. elth.* 179. *t. 148. f. 177.*

Habitat in Sicilia. ◎

7. HESPERIS caule erecto ramoso, foliis cordatis am-
 plexicaulibus serratis villosis.

Turritis annua verna, flore purpurascente. *Tournef. inst.*
 224.

Leucojum minus rotundifolium, flore purpureo. *Barr.*
ic. 876.

Leucojum maritimum latifolium. *Moris. hist. 2. p.*
241. f. 3. t. 8. f. 5.

Leucojum marinum alterum latifolium purpuro-viola-
ceum. *Lob. ic. 333.*

Leucojum maritimum latifolium. *Baub. pin. 201.*
Rapistrum floribus leucoji marini. *Baub. pin. 95. prodr.*

37. *Burs. IV:* 47.

Habitat in Galloprovinciæ maritimis.

Euonymus ad. *Bartsch* 5. p. 649. ARABIS.

1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *Hort. cliff.*
 335.

a. *Arabis* foliis amplexicaulibus dentatis, caule erecto sim-
 pli. *Roy. lugdb.* 338. *Hall. helv.* 561.

Arabis caule simpli, foliis ovatis utrinque dentatis. *Fl.*
lapp. 257. Lenium venum 2. *alb. major. et minor.* 2.

Draba alba siliquosa repens. *Baub. pin.* 109.

Draba 2, succulento folio. *Clus. hist. 2. p. 125.*

{ 3. *Draba* foliis amplexicaulibus dentatis, caule diffuso ra-
 moso. *Roy. lugdb.* 339.

Draba alba siliquosa. *Baub. pin.* 109.

Draba 2. *Clus. hist. 2. p. 24.*

Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis.

Mire varians ex loco planta. a. brevis erecta alpina; b
altera, inferne procumbens magna; hinc facie diver-
stissima. 2. 1 ad 2 p.

majus... sic ut. 1. apud plan. 2. m. ur. p. 2. stellat. 3. 2. ARA-
 fol. cuncta lata. 4. apud syriac. dentata. 5. non altera.
 cal. erig. longe corynus v. d. 6. v. d. - flavescens. foliis 2 mag-
 gali in fructu entrap. v. d. *Leniori. cinerea* v. d. 7. sp. ex
 cor. p. t. longa petala aperte utiq. effla-
 g. 8. 4. auct. secunda longe quam 2 major. decolor. pedulis in
 fructu foliis calatis.
 9. stell. bractea. *Stroma hermaphro-*
ditum 10. fl. 11. pedatis abq. vel. foliis v. d. 12. 13. 14.

*arabis. Lef. Acad. 12. p. 443.
helv. in D. nobis.*

3 *Betulifolia* •
Zument ad 418.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 665

2. ARABIS caule nudo. *Amoen. acad. 358. t. 4. f. 20.* * *grandiflora.*
Habitat in Sibiria. 2.
3. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Vir. thaliana.* • *Zument ad.*
cliff. 64. Fl. suec. 567. Roy. lugdb. 339. Dalib. paris. •
200. Zument only ramosa. 2.
Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exor-
tum ramorum solitariis. *Hort. cliff. 339.*
Bursæ pastoris similis siliquosa major. *Baub. pin.*
108.
Pilosella siliquosa minor. *Thal. harc. 84. t. 7. f. D.*
Habitat in Europæ septentrionalioris sabulosis. ○
4. ARABIS foliis glabris radicalibus lyratis: caulinis li- *lyrata.*
nearibus.
Cheiranthus caule filiformi lævi, foliis lanceolatis: infi-
mis incisis. *Gron. virg. 76.*
Habitat in Canada. D. Kalm. ○
Statura & habitus A. thalianæ, præter quod folia radi-
alia lyrata, glabra, & flores majores.
5. ARABIS foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris. *canadensis?* *Zument ad.*
Eruca virginiana, bellidis majoris folio. *Pluk. alm. 136.*
t. 86. f. 8.
Turritis foliis lanceolatis dentatis: radicalibus maximis,
siliquis compressis sulcati. *Gron. virg. 77?*
Planta erecta, pedalis bipedalis, lævis. Folia lato-lanceo-
lata, 4 vel 5 denticulis crassis remotis serrata utrinque.
Racemus terminalis nudus, & ex summis alis due
vel tres laterales racemi.
6. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis ancipitibus li- *pendula.*
nearibus, calycibus subpilosis. *Hort. upf. 191.* *
Turritis latifolia hispida, siliquis pendulis. *Amm. ruth.*
58.
Habitat in Sibiria. ○
7. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis pla- *Turritis lob.*
nis linearibus, calycibus subrugosis. *Hort. upf. 192.*
Turritis caule simplici, foliis lanceolatis subdentatis gla-
bris. *Sauv. monsp. 73. Zument lob.*
Turritis perraro ramifera, foliis lanceolatis obscure den-
tatis. *Guett. stamp. 2. p. 162. Dalib. paris. 202.*
Leucojum hesperidis folio. *Tournef. inst. 221.*
Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliqua. *Bocc.*
muf. 2. p. 81. t. 72.

Brassica sylvestris albido non ramosa. C. B. S. 812
foliis aplois angustiatis flor. uti 1. exaptis quod calix non
auriculatus exgladula & que 2. oratay omnis tendit
filos. plana. flor. long. ex sing. foliis et ala.

T t. 5

Tur

Turrita major, platea. Clus. hist. 2. p. 126.
Habitat in Helvetia, Hungaria, Gallia, Sicilia. ♂

TURRITIS.

- TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. Hort. cliff. 339. Fl. suec. 544. Roy. lugdb. 339. Hall. helv. 560. Dalib. paris. 203.
 Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. Baub. pin. 112.
Habitat in Europæ pascuis siccis apricis.

TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. Hort. cliff. 339. Fl. suec. 545. Roy. lugdb. 339. Dalib. paris. 62. Turritis minima. Bst myr.
 Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba. Baub. pin. 101. prodr. 42. t. 42.
Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Angliæ pascuis sylvaticis.

BRASSICA.

- Rapa. ad Rappium sive
• Rapa. sive 4. BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa
Rapum sive carosa. Hort. cliff. 339. Hort. ups 190. Mat. med.
Rapulum. horat 329. Roy. lugd. 344.
Rapa sive L. 18 c. 13. tenuior non rotunda et non pendula
yoggya. hirsuta. dicotyledonaria non rufa sed nigra et non alba. ab initio
yoggya. Sibyr. ampliata in aduncuenda vidi folia excedere
Rape gall. en Jussia hirsutae colitur. Saresic vegeta. ut a praeconduca
Tin rep. angl. Lolia Baccobry. raphum probeat celtata. Et fennserpentis
radix. by care. quodammodo prode campum
hirsuta pendula quatuor. Hedysarum. De radice longata Raphum med.

Rapum americanum f. *triflorum* B. & S. in go. — *Rapis magnis* lacinias adulis *lyrpedum* longa *crassitardine* ciborum
pugnorum: *Species* (vel inter cognatas) alia *Violaceum* ex *Pattinace*, alia
annuum et ex dono, alia *decidua* album ciborum aequante.

- Rapa sylvestris. Raj. hist. 800.

Rapa sativa rotunda. Baub. pin. 89.

Rapum. Cam. epit. 218.

β. Rapa sativa oblonga f. femina. Baub. pin. 89. +
Rape. Rauw
Bauern
Zone } Japan.

Habitat in arvis Angliæ, Belgii. ♂

5. BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. Hort. oleracea. cliff. 338. Hort. upf. 189. Mat. med. 327. Roy. lugdb. Brassica ad
Brassica Brunf.

343. Brassica maritima arborea f. procerior ramosa. Moris. sylvestris, ~~crantz. Bot. gen.~~
hist 2. p. 208. Raj. hist. 796. Kantots } Japan.
Satsuma Kusa } Japan.

β. Brassica alba vel viridis. Baub. pin. III.

γ. Brassica capitata rubra. Baub. pin. III.

δ. Brassica capitata alba. Baub. pin. III. ~~capit. alte laciniata. Blatt.
capit. virid. Rüttiana. Blatt.~~ rubra. Capitatum.
capitata. Capitum Kraut. Rauw

ε. Brassica alba crispa. Baub. pin. III. fabauda. Sabellina. Blatt.

Brassica undulata. Renealm. spec. 113.

ζ. Brassica laciniata rubra. Baub. hist. 2. p. 832. laciniata.

η. Brassica angusto apii folio. Baub. pin. 112. selenisia. Tab. scapiana

ι. Brassica fimbriata. Baub. pin. 112. fabellica. do.

Brassica fabellica. Renealm. spec. 134. t. 133.

λ. Brassica cauliflora. Baub. pin. III. Renealm. spec. 131 botrytis. ~~cauliflori. Rauw.
Pompeiana. galb.
Spica.~~ Napobrassi. Dorsen
ca. Dorschen

t. 133. Cam. epit. 253.

κ. Brassica radice napiformi. Tournef. inst. 219. gongylodes. Chrysanthemum. gun

Napo-Brassica. Baub. pin. III. prodr. 54. ~~radix carotaedulis.~~ Rapini.

λ. Brassica gongylodes. Baub. pin. III.

Brassica cauloRapa. Baub. hist. 2. p. 829. Brassica asperaginis crisp. c. P. III. Epiphyllum.

Caulo-Rapum. Cam. epit. 251.

Habitat in maritimis Angliæ. ♂

6. BRASSICA foliis lanceolato-ovatis glabris indivisis violacea. +

dentatis. Hort. upf. 191.

Habitat in China. ♂

* Erucæ siliquis stylo ensiformi.

7. BRASSICA foliis dentato pinnatifidis, caule hispido, Erucastrum. +

siliquis lævibus.

Sisymbrium foliis pinnato-dentatis. Hort. cliff. 337.

Roy. lugdb. 341. Dalib. paris. 205. sub Sisymbrio.

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. Baub. pin.

98. ~~eruca. matt.~~ 531.

Eruca sativa. Fucks. hist. 262.

Habitat in Europæ australioris ruderatis. ○ Eruca. ad. 418

8. BRASSICA foliis lyratis, caule hirsuto, foliis glabris. +

Hort. upf. 190. Mat. med. 330. Eruca. ad. 418

Sisymbrium foliis pinnatifidis: laciniis exterioribus ma-

inibus caule hirsuto. Hort. cliff. 337. Rucula. Rucula
Eruca - caule
Eruca - rucula.

Eruca. ad. +
Eruca. ^{Mary} ad. 418
Rucula. Reg
Eruca - card.
Eruca sativa. Dene.
 anuga. Hipp
 oreaga. Hipp
 aspera. Poen
 Ethrericia. aegyp
 Lervia. arab.

Eruca latifolia alba. Baub. pin. 98.

Sinapi alterum genus. Fuchs. hist. 539.

Habitat in Helvetia. ♂

? Envia ad.

Vesicaria.

9. BRASSICA foliis dentato-pinnatifidis, siliquis hispidis
tectis calyce tumido.
Brassica foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis retrorsum
hispidis. Hort. upf. 191.
Eruca chaleensis, caulis & siliquis hirsutis. Moris.
hist. 2. p. 228.
Habitat in Hispania. Læfling. ☽
Radix fusiformis. Folia lanceolata, pinnatifido-dentata,
supra glabra. Caulis pilosus, ramosus. Racemi erecti,
terminales. Corollæ flavæ venis saturationibus. Ca-
lyx floris cylindricus, in fructu vero ventricosus infla-
tus persistens evadit. Siliquæ venter calyce non longior
pistillum remanens lanceolatum. Differt itaque ab eruca
calyce, sub fructu, inflato vesicario, Foliis non lyratis sed
lanceolatis; Siliquis hispidis retrorsum nec glabris;
Calycibus persistentibus ad maturitatem fructus nec
deciduis

~~Sinopiad~~

arvensis.

Lampraea.

Nicotiana
neglecta. Tom. 3022
Euthem. Negri.

Sinapis alba. Ht:

2. SINAPIS filiquis hispidis: rostro obliquo longissimo.
Hort. cliff. 338. *Hort. ups.* 191. *Roy. lugdb.* 343.
Dalib. paris. 200.

Sinapi apii folio. Bauh. pin. 99.

Sinapi sativum alterum. Dod. pempt. 707.

Habitat in agris Belgii, Angliae, Galliae. ⊙

Sinapis nigra.

6¹υηπι

mentare
S. 100. 3

Sawed fall

3. SINAPIS siliquis glabris tetragonis. Hort. cliff. 333.
Fl. suec. 549. Mat. med. 326. Roy. lugdb. 343. Da-
lib. paris. 199.

Sinapi rapi folio. Baub. pin. 99.

Habitat in aggeribus ruderatis Europæ septentrionalis. ◉

Braueria ^{a)} juncea.

Sasani. Indon. & A. qq.

4. SINAPIS ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis
integerrimis. *Hort. upf.* 191. *

Si-

Sinapis hirsutula Koenig. annals p. 4826.

Tiến mas. Chiết s. Siêu hóa phản ứng. Nardin quadam
inter *Raphani* aeris.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 669

Sinapi indicum maximum, lactucæ folio. Herm. par. *Cochlearia* *Syn. Notant.*
230. t. 230.
Urb. in Asia. ♂

Habitat in Asia. ◎

5. SINAPIS foliis duplicato-pinnatis: laciniis linearibus. *bifurcata*.
Hort. cliff. 338. *Roy. lugdb.* 343. *Pedro*

Sinapi hispanicum, nasturtii folio. Tournef. inst. 227.

Habitat in Hispania. ♂ 2 sp. pl. 15 mm. flor. 15 mm. fruct. 15 mm. Environ 1 pinn. ultimo obt. 3rd & ult.
alt. Cauda v. 30 mm. pleurae pectinatae. Dorsum nigro-
piceo nudo 7 fl. lato. flavi reticulae raro long. & raro. Cal. cib. erub. emarginat.
Nigro- & cib. nigro longo lato. tenui-globos. ab 2 g. grana nigra. Roraceae?
Roraceae? **RAPHANUS**

RAPHANUS.

RAPHANUS siliquis teretibus torosif bilocularibus. *sativus*

Raphanus minor oblongus. Bayb. pin. 96.

Raphanus minor oblongus. Baub. pin. 95.
Raphanus major orbicularis s. rotundus. Baub. pin. 96. *Radiata*. *rotundata*.

Raphanus niger. Bauh. pin. 96.

Habitat. - - - - ♂.

2. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis lœvibus u-^{Raphani}
nilocularibus Hart. cliff. 340 El Suec. 568 Roy. lug. db. strum. } ad. +

344. Hall. helv. 555. Dalib. paris. 198. Sauv. monsp. armeniacia Rab.

285.

Rapistrum flore albo, siliqua articulata. Baub. pin.

Rapistrum flore albo striato. B

Habitat inter segetes Europæ.

RAPHANUS filiquis

Raphanus foliis pinnatis: pinnis confluentibus, siliquis
triangularibus, apiculae unilocularibus. *Craspedophyllum*

teretibus articulat*U*bitat in Sibiria.

Habitat in Sibiria.
Habitus Erucæ; planta pygmæa. Caules maxima ex par-
te nudi. Folia radicalia et caulina pinnatifida, linea-
ria. Corollæ magnæ, flavæ. Legumina teretia, pedi-
cellata, moniliformia, uti caulis villosa, rostro oblon-
go: Figura Cardamines alpinæ insipidæ. Col. ecphr.

BUÑIAS

BUNIAS siliquis bicornibus divaricatis basi spinosis *cornuta*.

i. BUNIAS filiculis bicornibus
Habitat in Sibirio. D. Gracilis.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.
*Planta maxime singularis. Silicula transversim ovalis,
utrinque desinens in cornu s. spicam longissimam vali-
dissimam, ut referat silicula duo cornua in medio sili-
culæ spine parvæ & undique directæ.*

cornuta.
Bicornis.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

4. Gen. } polytrichum
Cakile ad villy. aneep. ang. 15 June flv. 670

~~I. *Erucago*~~. *BUNIAS* siliculis tetragonis: angulis bicristatis.
— *salviae* antrosum sinnatis. *Hert* upf. 182.

Bunias foliis antrorsum sinuatis. Hort. upj. 182. Sauv.
Bunias. Hort. cliff. 340. Roy. lugdb. 344.
Erucago monspeliaca, siliqua quadrangula echinata
Bauh. pin. 99. prodr 41. filii 41. 526.
Habitat Monspelii in agris humidiusculis. ⓠ 2^o j. 3.

BUNIAS filiculis ovatis gibbis verrucosis.
Bunias foliis retrorsum sinuatis. Hort. ups. 186.
Crambe foliis pinnato-hastatis. Roy. lugdb. 330.
Crambe orientalis, dentis leonis folio, erucaginis facie.
Tournef. cor. 14.

~~oacus~~ ~~sterile~~ ~~tuberosa~~ ~~cycle~~ ~~intato~~ ~~caerulea~~ ~~cyanea~~ ~~varia~~

• Cakile. ^{Sauv.} 4. BUNIAS siliculis ovatis lævibus ancipitibus.
4. Gen. Cakile ad. Crambe foliis succulentis linearibus pinnato-dentatis.
Cakile ad. Sauv. monsp. 280.
Raphanus siliquis ovatis angulatis monospermis. Hort.
cliff. 340. Fl. succ. 569. Roy. lugdb. 344. Gron. virg.
170. Sauv. monsp. 285.

Eruca maritima italica, siliqua hastæ cuspidi simili. Bauh.
pin. 99. maritima angustior folio. Cor. Pet. 49.
Cakile serapionis. Lob. ic. 223.
Habitat in Europæ, Africæ, America maritimis.
1^o typus. fol. angustiora et crassiora quam 2^o participante pda. tota levius levata
fl. paucis. calice viridi. glandulae 4. Drusas. foliis. leuis angust. 2 articulis
stylos planus longus.

Isatis. ad *Hypolepis plana longa.* **ISATIS.**

tinctoria. 1. ISATIS foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis,
ibatu. diou. siliculis oblongis. *Fl. suec.* 543. *Dalib. paris.* 205.
glaucum { coet.
quadrum
nil. aric
s. aric
2. annu. otrin

Isatis. *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugd* 330.
Isatis sylvestris f. angustifolia. *Baub. pin.* 113.
Isatis sylvestris. *Fuchs. hist.* 330.
B Isatis sativa f. latifolia. *Baub. pin.* 113.

indium - officin 3. *Isatis sativa* s. *latifolia*. *Bauh. pin.* 113.
Pastellus Linnei *Habitat ad littora maris Balthici & oceanii Europae.* ♂
angion *long. epigea*
Portug. lusitanica. 2. *Isatis* foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, pe-
Vat. ad. dunculis subtomentosis.

*Egne. gne
zyvn* Isatis sylvestris minor lusitanica. Herm. lugdb. 678.
Isatis orientalis maritima canescens. Tournef. cor. 14.
Buxb. cent. I. p. 4. t. 5.
Habitat in Hispania & Oriente. ☽
Vix a precedente sufficienter distincta, sed annua et

ARMENIA.

3. ISATIS foliis integerrimis cordatis postice obtusis, siliculis cordatis.

ad. angio. botanica.

{ *Enneago* *aegyptia* *fructu* ^{imprimit} *lato* *h. N. S.* . *A. lutei* *petiolaris*
3 *Cat.* *cal.* *color.* *flavus* ^{luteus} *gratus* *c. lutea* *l. ped.* } *Nupharinum* *Brasiade* 2^a *Lin.*
Hyper ^{luteus} *luteus*
Borchor *g. pubescens* *l. luteo*
procad. *cal.* *luteus* *petiolaris* - *lato*, *callo* *prolata* *subpetiolaris*
4. p. 640. *folia*.

Tetradynamia. An. magno. 34. ♂ ped. red. fib. altissimis. rizoma. rotundatum. rotundatum. foliis. 4 ad 5 digitis
plicatis. lacinia. floreta simplici. pubescens. ad extremum flor. primula et
fl. proteraria. alti. 4 pet. Stamen 6. perianthium. Siliq. cyl. hyal.

- Institute for Botanical Documentation

mu. 3400. • icosandra. 3. CLEOME floribus icosi-tetrandris, foliis quinatis. Fl. zeyl. 240. *

micaumba ad Sinapistrum zeylanicum pentaphyllum viscosum, flore flavo. Burm. zeyl. 215. t. 99.
Habitat in Zeylona. ○ ^{1/2 pd. caulis rhab. lignif. v. fol. 5 cm. flavi pudi solitariae Silv. erat. oblongi triat.}

micaumba viscose ad 4. CLEOME floribus dodecandris, foliis quinatis ternatisque. Fl. zeyl. 241. *

micaumba viscose ad Sinapistrum zeylanicum triphyllum & pentaphyllum viscosum, flore flavo. Mart. cent. 25. t. 25.
Aria-veela. Rheed. mal. 9. p. 41. t. 23.
Habitat in Zeylona, Malabaria. ○ ^{4 pd. fl. 1/2 annu}

Mosambe. guineensis 4 pd. lat. 350. crassa cyl. am. in dr. Denizianis. fl. planata 3 Aug
micaumba angol mangi 10. 5. CLEOME floribus dodecandris, foliis ternatis. Fl. zeyl. 242. * ^{fl. solit. analis / peralti pallida caerulea}

fol. flor. • dodecandra. Sinapistrum triphyllum pumilum glabrum, flosculo purpureo, siliqua membranacea. Burm. zeyl. 216. t. 100. f. 1
Sinapistrum indicum triphyllum, flore carneo, non spinosum. Sloan. jam. 80. hist. I. p. 194. t. 124. f. 1.
Habitat in Indiis. ○ ^{4 pd. 2 1/2 pd. fol. inter. dig. Rot. 5 m}

ornithopodioides. 6. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis ovali-lanceolatis.

Micambe ad Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, siliquis teretibus tores. Hort. cliff. 341. * Hort. apf. 194 Roy. lugdb. 340.

micaumba violacea ad Sinapistrum orientale triphyllum, ornithopodii siliquis T. Dill. elth. 359. t. 266. f. 345. Buxb. cent. I p. 6. t. 9. f. 2.
Habitat circa Peram in agris. ○

7. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis solitariisque: foliolis linear-lanceolatis.

micaumba monophylla Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, siliqui subulatis. Hort. cliff. 341. Roy. lugdb. 340,
micaumba ad Trifolium siliquosum, flore violaceo, lusitanicum. Barr. ic. 866. Singap. ^{lat. 2 pd. fl. rubra Regia condensata}

8. CLEOME floribus ⁵ hexandris, foliis simplicibus ovato-lanceolatis. Fl. zeyl. 243. *

micaumba ad Sinapistrum zeylanicum viscosum, folio solitario, flore flavo, siliqua tenui. Burm. zeyl. 217. t. 100. f. 2.
Tsieru-veela. Rheed. mal. 9. p. 63. t. 34.
Habitat in India. ○ ^{per singl. foli. infundib. longit. 10 cm. Clas}

Damastea Kotsch. 1866. f. 142. Strophiole
fl. spicat.
6 cm. strobil. ind. 5 cm. flor. cana minima angustissim. lumb.
Mosambe.

6th June. Report, in Dr. S. Wright's file comes under arrangements. humble.

Cupu veela. t. m. 9. p. 618. Rani guela. Braun. Sinanikum Indic. diphyllum
Utegny ad alat ex uno petiole tricus. Pluk. 2. 119. f. 7.

~~MONADELPHIA PENTANDRIA.~~

673

nicamb. D. Bonpland. Trop. Guiana. 1825. and specimen.
foliis inferioribus foliolis simplicibus. foliis terminali rami longe proietis.
electro. 4 p. 6. Classis XVI. art. 6. 1825. Linnæus

erecta g. Malaya

Cupu veela. Malab.
Rani guela. Braun
micaamba.
deserticola.
ws

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

WALTHERIA. ad 389

1. WALTHERIA foliis planis ferrato dentatis.

americana.

Waltheria foliis cordato-ovatis serratis. *Hort. cliff.*

342. *Roy. lugdb.* 348.

Monosperm-Althea arborescens villosa, folio majore.

Isnard. act. 1721. p. 362. t. 14.

Althæa similis americana, flore luteo. *Herm. lugdb.*

2. p. 267. *

Betonica arborescens, foliis amplioribus. *Pluk. alm.* 67.

t. 150. f. 6.

Althæa americana pumila, flore luteo spicato. *Breyn.*

cent. - - t. 57.

Habitat in Bahama, Barbiches, Surinamo. 53. 24. p. 5.

2. WALTHERIA foliis ovatis serratis undulatis. *Roy. indica.*

lugdb. 348. n. 1. *Fl. zeyl.* 244. * *Hort. cliff.* 343.

Melochia foliis oblongis obtusis serratis tomentosis, flo-

ribus confertis. *Hort. cliff.* 343.

Betonica arborescens maderaspatana villosa, foliis pro-

funde venosis. *Pluk. alm.* 67. t. 50. f. 5.

Habitat in India. 52. 2nd. fol. autina minor et albitexta quam pars

foliis petiolis griseis prope glandula petiolis foliis longioribus

HERMANNIA. ad 389.

1. HERMANNIA foliis ovatis plicatis crenatis tomentosis. *althæafolia.*

Hort. cliff. 343. *Roy. lugdb.* 347.

Hermannia capensis, althææ folio. *Pet. gaz.* 53. t. 34.

f. 2.

Ketmia africana frutescens, foliis mollibus & incanis.

Comm. hort. 2. p. 151. t. 79.

Habitat in Æthiopia. 5

Pedunculi ex axillis foliorum, saepius terni, apice flores in singulo duos, sub foliolis tribus lanceolatis proferentes.

2. HERMANNIA foliis obovatis acute-incisis, pedunculis grossulariformis. *bifloris.* *Roy. lugdb.* 347.

U u

Kut-

674 MONADELPHIA PENTANDRIA.

Ketmia africana vesicaria, uvæ crispæ foliis. Comm. rar.

7. t. 7.

Habitat in Æthiopia. 5

X *alnifolia.*

3. HERMANNIA foliis cuneiformibus plicatis crenato-emarginatis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

Ketmia africana vesicaria fruticans & erecta, alni foliis latioribus & majoribus. Comm. hort. 2. p. 155. t. 78.

Habitat in Æthiopia. 5

Hystopifolia. 4. HERMANNIA foliis lanceolatis obtusis ferratis. *Hort. cliff.* 342. *Hort. upf.* 195. *Roy. lugdb.* 347.

Althæa africana frutescens, floribus aureis cochleatis pendulis minoribus. Volk. norib. 24. t. 24.

Habitat in Æthiopia. 5

• *lavendulifolia.* 5. HERMANNIA foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

Hermannia frutescens, folio lavendulæ latiore & obtuso, flore parvo aureo. Boerb. lugdb. 1. p. 273.

Habitat in Æthiopia. 5

~~Melochia~~ *trifoliata.* 6. HERMANNIA foliis ternatis sessilibus. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

Hermannia frutescens, folio oblongo molli cordato hirsuto. Boerb. lugdb. 1. p. 273.

Habitat in Æthiopia. 5

pinnata. 7. HERMANNIA foliis pinnatifidis linearibus. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 348.

Makernia Lin. gen. 1255. s. nat. p. 227. Hermannia frutescens, folio multiido tenui, caule rubro. *Boerb. lugdb.* 1. p. 273.

Cistoides frutex æthiopicus, parvis coronopi foliis, ad nodos caulem radiatim ambientibus. Pluk. mant. 50. t. 46. f. 3

Habitat in Æthiopia. 5

MELOCHIA. ad 389

• *pyramidalis.* 1. MELOCHIA floribus solitariis, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis acutis. *Hort. cliff.* 343. *Fl. zeyh.* 245.

Althæa brasiliensis frutescens, incarnato flore, fagopyri semine. Pluk. alm. 25. t. 131. f. 3.

Habitat in Brasilia. 2

depressa. 2. MELOCHIA floribus solitariis, capsulis depresso-pentagonis: angulis obtusis. *Roy. lugdb.* 348.

Zerchanay. p. 529. R. 74.

*Ganjah. Angst. 5. folii cochleari fol. 2. leti in bala
fl. alba unile ad-fultas qd. g. capul baccata 5. lvs.*

Abu.

GERANIUM.

- ~~Petangerium ad~~ ^{Anomalous} ~~gerreta ad cal. rph. com. 388~~ * Staminibus 7 fertilibus.
- + ^{triste. 388} 1. GERANIUM calycibus monophyllis: tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda. Hort. cliff. 344. Hort. upf. 197. Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda, foliis lobatis. Roy. lugdb. 352. Geranium africanum noctu olens tuberosum, vitis foliis hirsutis. Comm. hort. 2. p. 123. t. 62. B. Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis sessilibus, radice subrotunda, foliis pinnatifidis. Roy. lugdb. 352. Geranium triste. Corn. canad. 109. t. 110. γ. Geranium noctu olens æthiopicum, radice tuberosa, foliis myrrhidis latioribus & angustioribus. Breyn. cent. 126. t. 58. Habitat in Æthiopia & forte in India. 2.
- ~~gerreta ad. 388~~ ^{fulgidum.} 2. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis tripartitis incisis: intermedia majore, pedunculis umbelliferis geminis, caule carnosof. Vir. cliff. 67. Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 353. Geranium africanum, folio alceæ, flore coccineo fulgidissimo. Dill. elth. 156. t. 130. f. 137. Geranium surinamense, chelidonii folio, flore coccineo, petalis æqualibus. Till. pis. 68. t. 26. Habitat in Æthiopia. 3.
- ~~gerreta ad inquinans.~~ 3. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculato-reniformibus tomentosis crenatis integriusculis. Hort. upf. 195. Geranium calycibus monophyllis, foliis florentibus erectis, foliis subcordatis. Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 353. Geranium africanum arborescens, malvæ folio pingui, flore coccineo. Dill. elth. 151. t. 125. f. 151. 152. Geranium africanum arborescens, malvæ folio piano lucido, flore elegantissimo kermesino. Mart. cent. 3. f. 3. Habitat in Africa. 4.
- ~~Petangerium ad 388~~ ^{papilionaceum.} Folia digitis tacta inquinant colore ferrugineo.
4. GERANIUM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis: vexillo dipetalo maximo, foliis angulatis. Hort. cliff. 345. Hort. upf. 197. Roy. lugdb. 353. Ger-

Geranium africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato. *Dill. elth.* 154. t. 128. f. 155.

Geranium africanum arborescens, malvæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conspicuis. *Mart. cent.* 15. t. 15.

Habitat in Africa. 5

Pelargia ad 388

5. *GERANIUM* calycibus monophyllis, corollis papi- myrrifoliis. X
lionaceis, vexillo dipetalo, foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353.

Geranium africanum, coriandri folio, floribus incarna-
tis, majus. *Herm. lugdb.* 279. t. 280.

6. *Geranium africanum* tuberosum, anemones folio, in-
carnato flore. *Herm. par.* 178. t. 178.

Geranium africanum, myrrhidis folio, flore albicante,
radice rapacea. *Comm. hort.* 2. p. 125. t. 63.

Habitat in Africa. 6

7. *GERANIUM* calycibus monophyllis, foliis pinnatis: pinnatum. Gerota
foliolis ovatis. Geraniaceae, ex qua parte 2. subd. exata maxima

Geranium africanum, astragali folio. *Comm. præl.* 53. t. 53.

Habitat in Africa. 7. Rad. tuberosa. 12 ped. circ. 20 mai. flor. dracon.

8. *GERANIUM* calycibus monophyllis, foliis cucullatis. *Comm. præl.* 53. t. 53.

Geranium africanum arborescens, foliis cucullatis an-

gulosis. *Dill. elth.* 155. t. 129. f. 156.

Geranium africanum arborescens, ibisci folio rotundō,
carlinæ odore. *Herm. lugdb.* 274. t. 275.

Geranium africanum arborescens, ibisci folio anguloſo,
floribus amplis purpureis. *Mart. cent.* 28. t. 28.

Habitat in Africa.

9. *GERANIUM* calycibus monophyllis, caule carnosum gibbosum. •
gibbosum, foliis subpinnatis.

Geranium calycibus monophyllis geniculis nodoso, fo-
liis duplicato pinnatifidis. *Hort. upf.* 345. *Roy. lugdb.* 354.

Geranium africanum carnosum, petalis angustis albi-
cantibus. *Dill. elth.* 153. t. 127. f. 154.

Geranium calycibus monophyllis, caule carnosum nodo-
so: internodiis filiformibus, foliis lobato-pinnatifidis.
Roy. lugdb. 354.

Geranium africanum noctu olens tuberosum & nodo-
sum, aquilegiæ foliis. *Herm. lugdb.* 284. t. 285.

Stiss. bot. III. t. III.

Habitat in Africa.

- *peltatum.* 9. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis quinquelobis integerrimis glabris peltatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 352.
Geranium africanum, foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agriæ maculatis splendentibus & acetosæ sapore. *Comm. præl.* 52. t. 2.
Habitat in Africa. 5
- *acetosum.* 10. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis glabris subovatis carnosis crenatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 352.
Geranium africanum frutescens, folio crasso & glauco, acetosæ sapore. *Comm. præl.* 54. t. 4.
Habitat in Africa. 5
- *Zonata.* 11. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato orbiculatis incisis zona notatis. *Hort. ups.* 196.
Geranium africanum arborescens, alchemillæ hirsuto folio, floribus rubicundis. *Comm. præl.* 51. t. 1.
Habitat in Africa. 5
- *vitisolum.* 12. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis adscendentibus lobatis pubescentibus. *Hort. ups.* 196.
Geranium africanum arborescens, vitis folio, odore melissæ. *Dill. elth.* 152. t. 126. f. 153.
Habitat in Africa.
- *capitatum.* 13. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis. *Hort. ups.* 196.
Geranium calycibus monophyllis, floribus capitatis, foliis cordatis lobatis crenatis pilosis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353.
Geranium africanum frutescens, malvæ folio laciniato odorato. *Herm. lugdb.* 277. t. 278.
Geranium americanum arborescens, vitis folio, odore melissæ. *Dill. elth.* 152. t. 126. f. 153.
Habitat in Africa.
- *alchimilloides.* 14. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculatis palmatis incisis pilosis, caule herbaceo. *Vir. cliff.* 345. *Hort. ups.* 197. * *Roy. lugdb.* 354.
Geranium calycibus monopbyllis longissimis sessilibus, fructu assurgente, foliis palmatis crenatis. *Hort. cliff.* 345.
Geranium africanum, alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis. *Herm. lugdb.* 282. t. 283. *Stiss. bot.* 107. t. 107.
Habitat in Africa.

15. GERANIUM calycibus monophyllis, caule carno- *odoratissimum.*
so brevissimo, ramis longis, foliis cordatis. *Hort. cliff.*

345. *Roy. lugdb.* 354.

Geranium africanum humile, folio fragrantissimo mol-
li. *Dill. elib.* 157. t. 131. f. 138.

Habitat in Africa. 2

16. GERANIUM calycibus monophyllis, pedunculis *grossularioides.*
multifloris, foliis cordatis subrotundis lobatis crenatis.

Geranium pedunculis bifloris, foliis cordatis incisis gla-
bris, caulis filiformibus procumbentibus. *Roy. lugdb.*

351.

Geranium africanum, uvæ crispæ folio, calycibus pro-
cumbentibus, floribus exiguis rubellis. *Herm. lugdb.*
287. t. 289.

Habitat in Africa.

Caules filiformes, procumbentes. Folia cordata, glabra, in-
cisa. Pedunculi biflori cum calycibus monophyllis.

17. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis oblongis integris tripartitisque, pedunculis radicalibus. *auritum.* X

Geranium africanum, foliis plerumque auritis, floribus
ex rubro purpurascenscentibus. *Comm. hort.* 2. p. 121.
t. 61.

Habitat in Africa. 2

18. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato-ovatis crenatis petiolo brevioribus, caule herbaceo. *glaucophyllum.*

Roy. lugdb. 354. *genus memphytor althaea fol glauco. lipp.*

Geranium ægyptium glaucophyllum, rostris longissimis
plumosis. *Dill. elib.* 150. t. 124. f. 150.

Habitat in Ægypto. 2

19. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis ovatis *althæoides.*
sinuatis crenatis, caule filiformi. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 354.

Geranium, folio althææ, africanum, odore melissæ. *Baerb.*
lugdb. 1. p. 263.

Habitat in Africa. 2

20. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis ovatis *betulinum.*
inæqualiter serratis planis.

Geranium frutescens, folio lato dentato, flore magno
rubente. *Burm. afric.* 92. t. 33. f. 1.

Geranium frutescens, folio subrotundo dentato, flore pur-
pureo. *Burm. afric.* 93. t. 33. f. 2.

Habitat in Africa. 5

Gentianum ad. 388

* Staminibus quinque fertilibus.

- cicutarium. 21. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis. *Hort. cliff.* 334. *Fl. suec.* 579. *Mat. med.* 337. *Roy. lugdb.* 352. *Hall. helv.* 369. *Dalib. paris.* 208. *Geranium, cicutæ folio, minus & supinum.* *Baub. pin.* 319. *Geranium supinum.* *Doct. pempt.* 63.
 - moschatum. 22. *Geranium, cicutæ folio, moschatum.* *Baub. pin.* 319. *Habitat in Europæ sterilibus cultis.* ○ *ymy.*
 - malacoides. 22. *Geranium pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis.* *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 352. *Sauv. monsp.* 154. *Geranium folio althææ.* *Baub. pin.* 318. *Geranium malacoides.* *Lob. ic.* 662. *Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis hirsutis crenato-incisis obtusis, caulis procumbentibus.* *Roy. lugdb.* 391. *Habitat in Italiæ G. narbonensis, Angliæ maritimis.* ○
 - gruinum. 23. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis acutis sinuatis
 - myrridea*
s. Meintzky da Olin *Geranium pedunculis multifloris pentandris.* *Hort. cliff.* 498. *Geranium pedunculis bifloris pentandris, radice annua.* *Vir. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 352. *Geranium acu longissima.* *Baub. pin.* 319. *prodr.* 138. *Geranium speciosum annum, longissimis rostris, creticum.* *Baub. hist.* 3. p. 479. *Habitat in Creta.* ○
 - Docet Fructificatio & habitus tres ultimas plantas ab initio unam suisse, ortas procul dubio ex miscela diversarum, ut pro eadem haberri possent; at vero posse etiam distingvi distinctas arbitrarium videtur.*
 - * *Staminibus decem fertilibus.*
 - tuberosum 24. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciinis linearibus subdivisis obtusis. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. *Geranium tuberosum majus.* *Baub. pin.* 318. *Habitat in Anglia?* 2
 - macrorrhizum. 25. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus inflatis, pitillo longissimo. *Hort. cliff.* 343. * *Roy. lugdb.* 350. *Geranium batrachoides odoratum.* *Baub. pin.* 318. *Habitat - - - 2. 1. p. 2. pl. 2. 15 mai fl. 15 26 GE-*