



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Geranium batrachioides montanum nostris, Lap. Dactyloides.
 1. Cuius de 28. Sylvaticum dicitur. 1. folia radice laciniis obtusis, longis. 2. lobis.
 2. Radice caulis in rami folia radiata bipinnatis.

MONADELPHIA DECANDRIA.

guineum. ad 383 +
 phœum. • 43

26. GERANIUM pedunculis bifloris foliisque alternis, calycibus subaristatis, caule erecto.

Geranium pedunculis bifloris alternatim cauli integro superne nudiusculo insidentibus. Hort. cliff. 343. *

Hort. ups. 198. Roy. lugdb. 350.

Geranium montanum fulcum. Baub. pin. 318.

β. Geranium batrachioides hirsutum, flore atro-rubente.

Baub. pin. 318.

Geranium 1, pullo flore. Clus. hist. 2. p. 99.

Habitat in Alpibus Pannonicis, Helveticis, Styriacis. 2

27. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis caulinis trilobis integris ferratis: summis subsessilibus Hort. cliff. 343. Roy. lugdb. 350. nodosum.

Geranium nodosum. Baub. pin. 318.

Habitat in Delphinatu.

28. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis peltatis inciso-ferratis, caule erecto. Fl. sapp. 266. Fl. suec. 572. Sylvaticum. Batrachium Zab

Hort. ups. 344. Roy. lugdb. 351.

Geranium batrachioides, folio aconiti. Baub. pin. 317.

Geranium 2 batrachioides minus. Clus. hist. 2. p. 99.

Habitat in Europæ borealis sylvis.

29. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. Hort. cliff. 344. Fl. suec. 573. Roy. lugdb. 350. Hall. helv. 367. pratense.

Geranium batrachioides, Gratia dei germanorum. Baub. pin. 318.

Geranium 3 batrachioides majus. Clus. hist. 2. p. 100.

Habitat in Europæ borealis pratis. 2

30. GERANIUM pedunculis bifloris, caule dichotomo erecto, foliis quinquepartitis incisifolius: summis sessilibus. Gron. virg. 78. maculatum.

Geranium batrachioides americanum maculatum, floribus obsolete cæruleis. Dill. elth. 158. t. 132. f. 159.

Habitat in Carolina, Virginia, Sibiria. 2

31. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilosis decem-angulatis. Robertianum.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-tripartitis, lobis pinnatifidis, calycibus hirsutis. Hort. cliff. 344. Fl. suec. 578. Mat. med. 336. Dalib. paris. 207. Roy. lugdb. 351.

Geranium robertianum primum. Baub. pin. 319.

Cal. sphæricæ caducæ U u 5 Ge
 Cor. 5 pet. aeq. unguiculæ
 Stam. 5 erecta subulphæ dactylicis 5. corollæ alb. aut rubr. capentibus.
 Stylis 1. 4. long. 4. Libris. lateribus utriusque.
 Capsula longiora 3 pericarpium.

ANDRIA.
 tilibus.
 oris, calycibus pe
 s pinnatis incisib
 79. Mat. med. 33
 Dalib. paris. 20
 num. Baub. pin. 31
 m. Baub. pin. 31
 oris, calycibus pe
 s cordatis sublobat
 Sauv. monsp. 154
 318
 ovatis hirsutis cre
 cumbentibus. Roy.
 ngliæ maritimis. O
 oris, calycibus pen
 s pinnatis acutis fi
 tandris. Hort. cliff.
 ndrīs, radice annua.
 n. 319. prodr. 138.
 ssumis rostris, creti
 ultimas plantas ab
 ubio ex miscela di
 tent; at vero posse et
 m videtur.
 ilibus.
 s, foliis multiparti
 obtusis. Hort. cliff.
 pin. 318.
 calycibus inflatis
 Roy. lugdb. 350.
 Baub. pin. 318.
 GE

Geranium 3. Fuchs. hist. 206.

Habitat in Europæ borealis rupibus, ^{Vallis, alata}
Calyx pilosus, decem carinatus, ex foliolis 1. 3. exterio-
ribus tricarinatis, 2. 5. uncarinatis, 4. bicarinato.
Petala integra.

• *Didym.*

υγροβχοπελον. Thal
hygroscopelon.

32. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pyra-
midatis angulatis rugosis, foliis quinquelobis rotun-
datis. It. gotl. 228. * Fl. suec. 574. Dalib. paris. 208.
Sauv. monsp. 207.

Geranium lucidum saxatile. Baub. pin. 318.

Geranium saxatile. Thal. herc. 44. t. 5.

Geranium rotundifolium saxatile montanum. Col. ecphr.
I. p. 138. t. 137.

Habitat in Europæ rupibus umbrosis. ☉

geranioidy ad 348
• *multe.*

33. GERANIUM pedunculis bifloris folisque rameis
alternis, caule ramoso diffuso, calycibus muticis.
Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-mul-
tifidis rotundatis; laciniis obtusiusculis, capsulis hirtis.
Fl. suec. 577. Dalib. paris. 206.

Geranium pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus
semiquinquefidis mollibus & latissimis. Hall. helv.
366. * Sauv. monsp. 207.

Geranium columbinum minus, majori flore & foliis bi-
fidis. Magn. monsp.

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpu-
reis. Vaill. paris. 79. t. 15. f. 3.

Habitat in Europa ad plateas. ☉

geranioidy ad

• *carolinia-*
num.

34. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus aristatis,
foliis multifidis, pericarpis hirtulis. Roy. lugdb. 351.
Gron. virg. 78.

Geranium columbinum carolinum, capsulis nigris hirsu-
tis. Dill. elth. 162. t. 135. f. 162.

Habitat in Carolina, Virginia. ☉ *1781. cult.*

geranioidy ad
+ *columbinum.*

• *columbinum.*

35. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepar-
tito-multifidis angulatis; laciniis acutis, capsulis glabris,
calycibus aristatis. Fl. suec. 576. Dalib. paris. 207.

Geranium columbinum, foliis dissectis, pediculis flo-
rum longissimis. Vaill. paris. 79. t. 15. f. 4.

Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculo lon-
gissimo, caule prostrato. Hall. helv. 367.

Habitat in Gallia, Helvetia, Germania.

36. GE

MONADELPHIA POLYANDRIA. 683

geranioides ad. 388

36. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incis.

rotundifolia

Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. Hort. cliff. 344. Fl. suec. 575. Roy. lugdb. 351. Hall. helv. 365. Dalib. paris. 206.

*gerani
Syl. columbinum. Dod.
Paganinum. Cam*

Geranium folio malvæ rotundo. Baub. pin. 318.

Geranium alterum. Fuchs. hist. 205.

Geranium columbinum majus, flore minore cæruleo.

Vaill. paris. 79. t. 15. f. 1.

Habitat in Europæ cultis. ☉

*geranioides ad.
sibiricum.*

37. GERANIUM pedunculis subunifloris, foliis quinquepartitis acutis: foliolis pinnatifidis.

Habitat in Sibiria.

Caules pedales diffusi, divaricati. Folia quinquepartita: lobis pinnatifidis. Pedunculus e singula bifurcatura. Caulis longus, uniflorus, in medio geniculatus bracteis 2. oppositis subulatis. Corolla alba striis purpureis petalis vix emarginatis. Calyx 5-phyllus, aristatus. Capsula subvillosa.

38. GERANIUM pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis.

*? geranioides ad.
sanguinum. +
Sanguinaria. Roy*

Geranium pedunculis simplicibus unifloris. Hort. cliff. 343. Fl. suec. 571. Roy. lugdb. 350. Hall. helv. 365. Dalib. paris. 206.

Geranium sanguineum, maximo flore. Baub. pin. 318.

Geranium VII hæmatodes. Clus. hist. 2. p. 202.

β. Geranium hæmatodes lancastriense, flore eleganter striato.

Dill. elth. 163. t. 136. f. 163.

Habitat in Europæ pratis siccis umbrosis. ♀

39. GERANIUM pedunculis simplicibus unifloris, foliis tripartito-multifidis linearibus, caule arboreo.

grandiflorum

Geranium frutescens incanum, flore magno luteo dentato. Burm. afric. 88. t. 34. f. 1.

Habitat in Æthiopia. ♀

POLYANDRIA.

SIDA.

abutilum

1. SIDA foliis cordato-ovatis serratis, stipulis setaceis, axillis subspinosis. Hort. upf. 199. Fl. zeyl. 254. * Roy. lugdb. 349.

spinosa. 398

Sida

Kata unen. h. m. 107. 54. 3 ad 4 ped. fol. cordata imd. longipetala
fl. abutili. / det. an. l. longipetala. Capsulae 8 ad 10. l. 1/2. 2 com.

684 MONADELPHIA POLYANDRIA.

^{malva} Sida foliis cordato-ovatis ferratis, capsulis quinis bicu-
spidatis. Hort. cliff. 346.

Alcea, carpini folio, americana frutescens, flosculis lu-
teis, semine duplici rostro. Comm. hort. 1. p. 3. t. 2.

Althæa carpini folio, flosculis luteis. Bocc. sic. 11. t. 2.

Althæa virginiana bidens, pimpinellæ majoris acutiore
folio, flosculis minimis luteis. Pluk. alm. 25. t. 9. f. 6.

β. Malvinda bicornis, sangvisorbæ folio villosa & glabro.
Dill. elth. 214. t. 171. f. 210.

Althæa rostrata cormandelienfis, pimpinellæ majoris
folio subrotundo, semine bicorni. Pluk. alm. 26. t.
9. f. 3.

Habitat in India utraque. ☉

rhombifolia.
abutilon. ad

2. SIDA foliis lanceolato-rhomboidibus ferratis. Vir. cliff.
Hort. cliff. 346. Hort. ups. 109. Fl. zeyl. 252. *

Malvinda unicornis, folio rhomboide, perennis. Dill.
elth. 216. t. 172. f. 212.

β. Althæa carpini folio, flosculis luteis. Bocc. sic. 11. t. 6.

Alcea pernambucana, carpini folio, flosculis minimis.
Moris. hist. 2. p. 528. f. 5. t. 19. f. ult. mal.

Habitat in India utraque. ☉

alnifolia.
abutilon. ad.

3. SIDA foliis orbiculatis plicatis ferratis. Hort. cliff. 346.
Hort. ups. 200. Fl. zeyl. 253. *, Roy. lugdb. 349.

Malvinda steilata alnifolia. Dill. elth. 215. t. 172. f.
211.

β. Althæa indica, latiori folio cordiformi ad summum si-
nuato. Pluk. alm. 26. t. 9. f. 2.

Habitat in India. ☉

cordifolia.
abutilon. ad

4. SIDA foliis cordatis subangulatis ferratis villosis.
Malva bicornis, ballotes folio molli. Dill. elth. 211.
t. 171. f. 209.

Althæa maderaspathana, subrotundo folio molli & hir-
suto, multipilis. Pluk. alm. 25. t. 131. f. 2.

Habitat in India. ☉

Radix annua. Calyx simplex. Seminum rostra deciden-
te corolla, in fasciculum longitudine calycis prominen-
tia. Calyx pilosus.

peripterifolia
abutilon. ad.

5. SIDA foliis cordato-lanceolatis integerrimis. Fl. zeyl.
251.

Sida foliis ovato-lanceolatis, caule paniculato. Roy.
lugdb. 349.

Habitat in India. ☉

Oroni. al
2. 2. 2. 2.
abutili. /
MC
Abutilon
elth. 4.
Alcea ori
Pluk.
Habitat
6. SIDA fo
rimis.
Abutilon
Habitat in
7. SIDA fo
Roy. lu
Gron.
Althæa th
Althæa al
Abutilon
Alcea aff
mollibu
phyt. 1
Habitat
8. SIDA fo
pericarp
Abutilon
Dill. e
Abutilon
capsulis
t. 29.
Habitat in
9. SIDA fo
bus pa
Sida foli
rioribu
Sida foli
Abutilon
t. 2. f
Sida foli
haltatis
ups. 1
Habitat
10. SIDA
Linn.
Malva c
fermi

Malva aspera major aquatica ex hortensium rosarum genere, flore minore luteo, semine aculeato. Sloan. jam. 96. hist. 1. p. 217. Raj. suppl. 320. Habitat in Caribæis, locis paludosis. &

NAPÆA.

Napæa ad 398

• hermaphro- dita.

1. NAPÆA pedunculis nudis lævibus, foliis glabris, floribus hermaphroditis. Gen. nov. 1089. *

Sida foliis palmatis: laciniis lanceolato attenuatis. Hort. cliff. 348. Hort. ups. 198. Roy. lugdb. 348.

Malva virginiana, ricini folio. Herm. lugdb. 22. t. 23. Habitat in Virginia. & 6 p. fol. lobata.

• dioica. *Napæa ad*

2. NAPÆA pedunculis involucratis angulatis, foliis scabris, floribus dioicis. Gen. nov. 1089. *

Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, mas. Ekret. pict. 8. f. distincta.

Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, femina. Ekret. pict. 7. f. 1.

Althæa magna aceris folio, cortice cannabino, floribus parvis, femina rotatim in summitate caulium, singula singulis cuticulis rostratis cooperta ferens. Banist. 1928. *fol. feminis minus petalis obtusis. Stam 10 glan.*

Habitat in Virginia. & 6 p. fol. palmatis. *fol. profunde dissecto. Flores femina gaudent etiam staminibus, at anthera minima, effæta & steriles sunt. & ut hinc dicitur.*

ALTHÆA.

althæa ad 400.

• officinalis

†

althæa officinalis

malvaicus aug

malva gen

aritalthæa. quibus

1. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. Hort. cliff. 348. Hort. ups. 204. Mat. med. 338. Roy. lugdb. 357.

Dalib. paris. 210. Gort. gelr. 410.

Althæa dioscoridis & plinii. Bauh. pin. 315.

Althæa. Fuchs. hist. 15. Cam. epit. 667.

β. Althæa laciniato folio. Bauh. pin. 316.

Habitat in Hollandiæ, Angliæ, Galliæ, Sibiria sub- humidis. &

† • cannabina.

althæa ad

ποδόχορδος.

2. ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, caule fruticoso. Hort. ups. 205. Sauv. monsp. 200.

Althæa foliis compositis scabris. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 357.

Alcea cannabina. Bauh. pin. 316.

Alcea fruticosa, cannabino folio. Clas. hist. 2. p. 25.

Habitat in Hungaria, Italia, G. Narbonensi. h

3. AL

arbor scabra Moan. est matrona dgl castitudo

MONADELPHIA POLYANDRIA: 637

3. ALTHÆA foliis trifidis piloso-hispidis. Hort. cliff. hirsuta, 349. Roy. lugdb. 357. Dalib. paris. 210. Sauv. monsp. 200.

Alcea hirsuta. Bauh. pin. 317. *Alcea hirsuta pilosa ad collum prope yaris.*

Alcea hirsuta minima, flore caesio, hispanica. Barr. ic. 1169.

Alcea villosa. Dalech. hist. 594. *Alcea villosa cal. 2 lobes utiq. 1/2 lobis.*

Habitat in Gallia, Italia, Hispania. *Alcea villosa in Gallia, Italia, Hispania.*

ALCEA.

1. ALCEA foliis sinuato angulosis. Hort. cliff. 348. rosea. 400. Hort. ups. 204. Mat. med. 340. Roy. lugdb. 357. *Althæa ad Malva rosea.*

Malva rosea, folio subrotundo. Bauh. pin. 315.

Malva hortensis. Dod. permt. 652.

Habitat - - - - - ♂

2. ALCEA foliis palmatis. Hort. cliff. 348. Hort. ups. ficifolia. 204. Roy. lugdb. 357.

Malva rosea, folio ficus. Bauh. pin. 315.

Malva rosea simplex peregrina. Tabern. hist. 315.

Habitat - - - - - ♂

Vix sufficienter a precedente distincta.

MALVA.

* Foliis indivisis. *Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.*

1. MALVA foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus lateralibus congestis, caule fruticosa. Fl. zeyl. 255. * *Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.*

Malva foliis cordatis crenatis villosis. Hort. cliff. 347. Roy. lugdb. 357.

Althæa orientalis bidens, subrotundis foliis, floribus parvis luteis. Pluk. amalth. 11. t. 356. f. 1?

Habitat in India. *Althæa orientalis bidens, subrotundis foliis, floribus parvis luteis.*

Caulis frutescens, tomentosus. Folia sine lobis cordata, tomentosa. Calyx inferior triphyllus. Seminum rostra, deciduo flore, brevissima, angulos fructus retusi constituentia.

Confer. Althæa indica, abutili subrotundo folio, flore luteo spicato. Pluk. phyt. 74. f. 6.

2. MALVA foliis ovato-oblongis acute ferratis, capsulis coromandelicis. Hort. cliff. 346. Hort. ups. 201. *Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.*

Althæa coromandeliana, angustis prælongis foliis, semine bicorni. Pluk. mant. 10. t. 334. f. 2.

Habitat in America? *Althæa coromandeliana, angustis prælongis foliis, semine bicorni.*

3. MALVA foliis cordatis crenatis, floribus lateralibus solitariis terminalibus spicatis. Roy. lugdb. 359. *Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.*

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

Malva annua abutili folio, fl. luteo, peltatis, lobis, hirsutis, et crassibus humis.

688 MONADELPHIA POLYANDRIA.

Althæa americana pumila, flore luteo spicato. Breyn.
cent. 124. t. 57.
Habitat in America. ☉

* *Foliis angulatis.*

• peruviana.
malva ad

4. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis
secundis axillaribus.

Habitat in Peru. D. Jussieu. ☉

Caulis erectus, tripedalis, pilis rarioribus sæpius geminis.
Folia septemlobata, plicata, glabra, venosa, acute serrata;
petiolis longitudine folii. Stipulæ ovato-lanceolatae.
Pedunculus axillaris, nudus, longus. Spica secunda, sursum
versa, recurvata ante florescentiam. Corollæ parvæ
purpureæ. Semina 10, supra exasperata dentibus
alternis plurimis.

• bryonifolia.

5. MALVA foliis palmatis scabris, caule tomentoso fruticoso,
pedunculis multifloris. Roy. lugdb. 356.

Althæa frutescens, bryoniæ folio. Bank. pin. 316. pr. 138.

Althæa profunde serrato s. dentato folio. Bauh. hist.

2. p. 955.

Habitat in Hispania. ☉

Planta belle echinata per discum foliorum.

• capensis.
malva ad

6. MALVA foliis subcordatis laciniatis glabris, caule atrobore
frescente. Hort. cliff. 347. Hort. ups. 201.

Malva capensis frutescens, grossulariæ folio minori glabro.
Dill. elth. 208. t. 169. f. 206.

β. Malva capensis frutescens, grossulariæ folio majore hirsuto.
Dill. elth. 209. t. 169. f. 207.

γ. Malva africana frutescens, flore rubro. Comm. hort. 2. p. 171. t. 86.

Malva africana frutescens, flore parvo carneo unguiculis
atrorubentibus. Pluk. amalth. 140. t. 431. f. 5.

Habitat in Æthiopia. ☉

• caroliniana.
malva ad

7. MALVA caule repente, foliis multifidis. Hort. cliff. 347.
Hort. ups. 201. *Abutilon repens*, alceæ foliis, flore helvulo. Dill. elth.

5. t. 4. f. 4.

Abutilon carolinianum repens, alceæ foliis, gilvo flore.

Mart. cent. 34. t. 34.

Habitat in Carolina. ☉

• rotundifolia.
malva ad

8. MALVA caule repente, foliis cordato-orbiculatis obsolete
quinguelobis. Hort. cliff. 347. Fl. suec. 580. Mat.

Mat. med. 339. Roy. lugdb. 356. Hall. belv. 363. Gron. *Malva. fructif. Roy. matt*
virg. 79. Dalib. paris. 209. *parady. Diru.*

Malva sylvestris, folio ~~sub~~rotundo. *flore minore albo pollycuto / cameo.* Baub. pin. 314. *Susana*

Malva sylvestris pumila. Fuchs. hist. 508. *Schurshen Kloubel*

Habitat in Europæ ruderatis, viis, plateis. *2. Et ped. repens.*

9. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, sylvestris. •
pedunculis petiolisque pilosis. *calice calice 1. ad 2. longior*

Malva caule erecto, foliis multipartitis. Hort. cliff. 347. *malva. ad +*

Fl. suec. 581. Roy. lugdb. 356. Hall. belv. 362. Dalib. *malva. matt*

Malva sylvestris, folio sinuato. Baub. pin. 314. *malva Xn Diru.*

Malva sylvestris recta. Cord. hist. 114. *ut. creta.*

Habitat in Europæ campestribus. *2. 2 ped. t. 1. 1. stellatis hista.*

10. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtu- *mauritanica.*
tis, pedunculis petiolisque glabris. *+*

Malva hederaceo folio. Baub. pin. 315. Hort. upf. 200.

Malva major tertia. Dalech. hist. 586.

β. Malva folio ficus altera. Baub. pin. 315. prodr. 137.
Habitat in Italia, Lusitania, Hispania. ⊙

11. MALVA caule erecto, foliis semiorbiculatis crena- *hispanica.*
tis, calyce exteriori diphyllo. Læfl.

Malva rotundifolia glabra ex hispania, flore amplo ru-
bello. Pluk. alm. 238. t. 44. f. 3.

Habitat in Hispania.

12. MALVA caule erecto, foliis angulatis, floribus axil- *verticillata.* • *+*
laribus glomeratis. Vir. cliff. 356. Hort. cliff. 502. *alt. rose. 944*

Hort. upf. 200. Roy. lugdb. 356. *malva. ad*

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis al-
bis pentaphyllis verticillatim genicula ambientibus.

Moris. hist. 2. p. 521. Raj. hist. 598.

β. Malva foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glo- *crispa.*
meratis. Hort. cliff. 347. Hort. upf. 200.

Malva foliis crispis. Baub. pin. 315.

Malva crispa. Dod. pempt. 653.

Habitat α in China, Syria. ⊙

13. MALVA caule erecto, foliis multipartitis scabriuscu- *Alcea. Annot. Roy. fuchs. ma*
lis. Hort. cliff. 347. Fl. suec. 582. Roy. lugdb. 356. *ad. and. ion.*

Hall. belv. 363. Dalib. paris. 209. *malva ad +*

Alcea vulgaris major. Baub. pin. 316.

Alcea vulgaris. Clus. hist. 2. p. 25.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia. &

• moschata.
malva ad

14. MALVA foliis radicalibus reniformibus incis, cau-
linis quinquepartitis pinnato-multifidis. Hort. ups. 202.
Malva montana f. Alcea rotundifolia laciniata. Col.
ecphr. 1. p. 148. t. 147.
Alcea folio rotundo laciniato. Bauh. pin. 316.
Habitat in Italia, Gallia. 4

ægyptia.
Cubay. arab
Chabazi
Cobes. Caener.

15. MALVA foliis palmatis dentatis, corollis calyce mi-
noribus. malva syndea. C.B. 315.
Alcea ægyptia, geranii folio. Lipp. ægypt. mss.
Habitat in Ægypto.

Habitus antecedentis sed tenerior. Caules filiformes, de-
biliores, scabri. Folia radicalia quinqueloba subdenta-
ta obtusa; superiora tripartita linearia dentata. Flo-
res axillares solitarii, pedunculis longitudinis petiolo-
rum. Calyx exterior setis 3; interior latus, semiquin-
quesidus, acutus, Corollæ cerulescentes.

LAVATERA.

* Caule fruticoso.

Lavatera ad 400.
• arborea.

1. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangula-
ribus tomentosis plicatis, pedunculis confertis uniflo-
ris axillaribus. Hort. ups. 202.
Lavatera foliis septemangularibus obtusis plicatis villo-
sis, caule fruticoso, floribus ad alas confertis. Hort.
cliff. 348. Roy. lugdb. 355.
Malva arborea veneta dicta, parvo flore. Bauh. pin. 315.
Malva arborefcens. Dod. pempt. 653.
Habitat inter Pifas & Liburnum. 3

ana dendromalache gal.
Lava
mexunge p. 858

• micans
Lavatera ad

2. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangulari-
bus acutis crenatis plicatis tomentosis, racemis termi-
nalibus. Roy. lugdb. 356.
Malva foliis mollibus undulatis: in margine superius
micis sulphureis ad solem splendentibus donatis. Moris.
hist. 1. p. 523. f. 5. t. 17. f. 9.
Malva hispanica. Moris. præl. 285.
Habitat in Hispania, Lusitania. 5

• olbia:
Lavatera ad
althoa puton

3. LAVATERA caule fruticoso, foliis quinquelobo-ha-
statis. Hort. ups. 202.
Lavatera foliis quinquangularibus acutis crenatis: laci-
nia media productiore. Hort. cliff. 348. Roy. lugdb.
355.
Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore. Bauh. pin.
316.

Althæa

althæa myrica folis auricatis. P. Brod. 1734.
Semper vivit. 2 ped. alba lanuginosa, caulis rot. folia Myrica palmata
5. lacin. diaga. nervosa lanugine sabayna, subt. canaliculata. fl. purpureo carulei.
Capitulum florarum placentum cum althæa simile continet.

MONADELPHIA POLYANDRIA. 691

Althæa arborea olbia in galloprovincia. Lob. ic. 653.
Habitat in Olbia insula Galloprovinciæ. †

4. LAVATERA caule fruticoso, foliis subcordatis sub triloba. trilobis rotundatis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis unifloris.

Lavatera foliis subcordatis emarginatis obsolete trilobis crenatis petiolo brevioribus, stipulis cordatis. Roy. lugdb. 355.

Malva foliis subcordatis trilobis obtusis ferratis villosis. Hort. cliff. 347.

Althæa frutescens, folio rotundiore incano. Baub. pin. 316.

Althæa fruticans hispanica, aceris monspessulani incanis foliis, grandiflora saponem spirans. Pluk. alm. 24 t. 8. f. 3.

Althæa frutex 1. Clus. hist. 2. p. 24.

Habitat in Hispania. †

Planta tomentosa: tota pilis minimis glutiniferis; eisque immixtis aliis pilis majoribus apice stellatis. Pedunculi tres pluresve ex alis petiolorum, uniflori. Flos magnus, pallide purpurascens.

5. LAVATERA caule fruticoso, foliis septemangulibus tomentosis plicatis, racemis terminalibus. *lusitanica. Roy. lugdb. 355.*

Althæa frutescens lusitanica, folio ampliore minus incano. Tournef. inst. 97.

Habitat in Lusitania. †

* *Caule herbaceo.*

6. LAVATERA caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incis. *thuringiaca. Hort. ups. 203.*

Lavatera foliis inferioribus cordato-subrotundis, superioribus lobatis crenatis, calycibus utrinque incis, caule herbaceo. Roy. lugdb. 355.

Althæa thuringiaca. Cam. hort. 12. t. 6.

Althæa thuringiaca grandiflora. Dill. elth. 9. t. 8. f. 8.

Althæa flore majore. Baub. pin. 316.

Habitat in Pannonia, Thuringia, Tataria ad sepes. †

7. LAVATERA caule erecto, ramis inferioribus diffusis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *cretica. Hort. ups. 202. **

Malva cretica annua, flore parvo ad alas umbellato. Tournef. cor. 2.

Habitat in Creta. ☉

dicta Kad/ura } *Zapom 24. fl. Katinica / ymn. seu. f. abae erbas. fl. solit. anell. longi peduncul. cal. caduus. p. 476*
S. Uana Kad/ura } *Koayh. fructus malaenidif. en bacis 30 ad 40 in capitul. glob. inod. calda comp. hinc. p. 477*
S. Oreni Kad/ura } *fructus malaenidif. rubentis / apere fatui. sing. bacis / aiino p. 478*
Malacoides } *Sam. 2. renif. cortic. Spirit. et malaenidif. calum. en hinc est. usar. p. 535*

MONADELPHIA POLYANDRIA.

5500. wimestris.
Lavatera ad
400

8. LAVATERA foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. Hort.

ups. 203. fl. et fruct. Actae
 Lavatera foliis trilobis: lacinia media productiore, caule herbaceo. Hort. cliff. 348.

Lavatera foliis ovato-lanceolatis: inferne angulatis, pedunculis unifloris, caule herbaceo. Roy. lugdb. 355. Sauv. monsp. 101.

Malva folio vario. Bauh. pin. 315, prodr. 137. t. 137.

β. Lavatera foliis subcordatis obtusis angulatis ferratis, caule herbaceo. Roy. lugdb. 355. Habitat in Syria, Hispania, G. Narbonensi.

MALOPE.

Malacoides.
Tom. 2. 25.
malacoides ad
400

1. MALOPE foliis ovatis crenatis glabris. Hort. cliff. 347. Hort. ups. 206. Roy. lugdb. 357.

Malva betonicae folio. Moris. hist. 2. p. 522. f. 5. t. 17. f. 11. Bocc. sic. 15. t. 8. f. 2.

Alcea betonicae folio, flore purpureo-violaceo. Barr. ic. 1189. Habitat in Hetruriae pratis.

URENA.

lobata.
Urena ad
400

1. URENA foliis angulatis. Hort. cliff. 348. Hort. ups. 200. Fl. zeyl. 256. Roy. lugdb. 358.

Urena finica, xanthii facie. Dill. elth. 340. t. 319. f. 412.

Trifolio adfinis indiae orientalis, xanthii facie. Breyn. cent. 82. t. 35. Habitat in China. ♪

sinuata.

2. URENA foliis sinuato multifidis villosis. Fl. zeyl. 257. Alcea indica frutescens, foliis in lacinias varie dissectis. Pluk. alm. 15. t. 74. f. 1.

Malvinda foliis inferioribus multifidis, superioribus incisifis, flore solitario. Burm. zeyl. 150. t. 69. f. 2. Habitat in India. ♪

procumbens.

3. URENA foliis hastato-subcordatis indivisis serratis, caule procumbente.

Habitat in Chinae monticulis. Osbeck. ♪
 Caulis frutescens, procumbens, repens, ramosissimus. Folia magnitudine origani, subcordata, integra nec lobata, levia, argute serrata. Flores foliis majores sunt.

1. GOS-

Gossypium xylon semen proutaustriam. semine viriditate. liquor stramo? Cotton de diam.

MONADELPHIA POLYANDRIA. 693

GOSSYPIUM.

Gossypium ad

- 1. GOSSYPIUM foliis quinquelobis, caule herbaceo. Hort. ups. 203. Mat. med. 341. Gossypium caule decumbente. Hort. cliff. 350. Roy. lugdb. 359. Gossypium frutescens, semine albo. Baub. pin. 430. Gossypium. Cam. epit. 203. Habitat in America. ☉

aminia Anzil
Bombax? baccaris.
algodon. ind. legit
herbaceum. ...
Coto. } Serapium
Bombax officin.
ξύλου } Rhizoph
επιπόροου
xylon. galifalke Matthe
Gossypium. Matthe. Dod.
Eriophorum
Gossypium. Plin.
barbadense.

- 2. GOSSYPIUM foliis trilobis integerrimis. Hort. ups. 204. Gossypium frutescens annuum, folio trilobo, barbadosense. Pluk. alm. 172. t. 188. f. 1. Habitat in Barbados. ♂. ♀

Gossypium ad

- 3. GOSSYPIUM foliis palmatis: lobis lanceolatis, caule fruticoso. Gossypium caule erecto. Hort. cliff. 350. Roy. lugdb. 359. Gossypium arboreum, caule lævi. Baub. pin. 430. Gossypium herbaceum f. Xylon maderaspatense, rubicundo flore, pentaphylleum. Pluk. alm. 172. t. 188. f. 3. Cudupariti. Rheed. mal. 1. p. 55. t. 31.

Gossypium ad
arboreum.
sotum, Barbatis
Bombax
Gossypium } ab.
Bombax
Gossypium Syriac. Paly
Carpas. Cal.

Habitat in India arenosis.

HIBISCUS.

- 1. HIBISCUS foliis ovatis acuminatis serratis, caule simplicissimo, petiolis floriferis. Hort ups. 205. Hibiscus foliis ovatis crenatis: angulis lateralibus obsoletis. Hort. cliff. 349. Gron. virg. 79. Roy. lugdb. 358. Alcea rosea peregrina, forte Rosa moscheutos plinii. Corn. canad. 144. t. 145. Moris. hist. 2. p. 532. f. 5. t. 19. f. 6. Habitat in Canada, Virginia. ♀

Moscheutos. Plin. Galen.
Retunia ad
399.

- 2. HIBISCUS caule herbaceo simplicissimo, foliis ovatis subtrilobis subtus tomentosis, floribus axillaribus. Althæa palustris. Baub. pin. 316. (ex horto C. B. Burserus). Althæa hortensis f. peregrina. Dod. pempt. 655. Habitat in Virginia. Gronov. Canada Kalm. ♀

? Retunia ad.
palustris.
mianchuria. hier

Habitus H. Moscheutos. Caules sesquipedales, non ramosi, annui. Folia lato-ovata, obtuse serrata, trinervis, acuminata, subtus tomentosa. Pedunculi ex axillis.

X x 3

Gossypium. h. m. 10 2-1. f. cadata dent. abutili. cal. 5. f. 7. entium 5 ad 7 fl.
fl. h. m. 10 2-1. f. cadata dent. abutili. cal. 5. f. 7. entium 5 ad 7 fl.

lis foliorum superiorum solitarii, petiolo longiores, uniflori, non e petiolo enati, geniculati. Flos maximus.

Bupariti ad

2. Gen. • populneus.

Bupariti hum

• Bava laut. Ruyph

3. HIBISCUS foliis cordatis integerrimis. Fl. zeyl. 258. * Alcea malabariensis, abutili folio, flore majore ex albo flavescente. Raj. hist. 1069.

Bupariti. Rheed. mal. 1. p. 51. t. 29.

Habitat in India. • Novella. ~~Damm~~ Ruyph 27. 74.

Calyx exterior, in hac & sequente, monophyllus, decedentatus.

Conferatur Ketmia amplissimo tiliæ folio subtus argenteo. Catesb. car. 2. p. 90. t. 90.

Sariti ad

2. Gen. • tiliacens.

Sariti. Mal. ad.

• Tali-pariti. L. m

Krandinder Sylvestris

4. HIBISCUS foliis cordato-subrotundis acuminatis crenatis, caule arboreo. Roy. lugdb. 532. Fl. zeyl. 259. *

Alcea malabarica, abutili folio, flore minore ex albo flavescente exterius aspero. Raj. hist. 1070.

Pariti f. Tali-pariti. Rheed. mal. 1. p. 53. t. 30.

Habitat in India. • ~~de Sylvestris~~ Krandinder, Ruyph. 27. 75. Novella Damm Bava.

Rosa sinensis.

Scheru-pariti hum

5. HIBISCUS foliis ovatis acuminatis ferratis glabris, caule arboreo. Fl. zeyl. 260. *

Alcea javanica arborefcens, flore pleno rubicundo.

Breyn. cent. 121. t. 56.

Scheru-pariti. Rheed. mal. 2. p. 25. t. 16.

Habitat in India. •

hirtus.

Bak meistar adau

• Bak meistar. Ruff. Rottb.

6. HIBISCUS foliis lanceolato-ovatis acuminatis ferratis, ramis scabris, caule herbaceo.

Habitat in India.

Planta parva. Caulis & præsertim Pedunculi, nec non Folia et Calyces subtus pilis rigidiusculis hirta: Folia lato-lanceolata, argute serrata. Corolla purpurea.

Ketmiarav. 399.

• mutabilis.

Sujo. Japon

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

• Hina-pariti

7. HIBISCUS foliis cordato-quinquangularibus obsolete ferratis, caule arboreo. Hort. ups. 205. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb 358.

Althæa arborea Rosa sinensis. Moris. hist. 2. p. 530. f. 5. t. 18. f. 2. vng. a m. d. f. 2. vng. a m. d. f. 2. vng. a m. d.

Rosa sinensis. Ferr. flor. 493. t. 497. Mer. sur: 31. t. 31. Ornga raia. Ruyph 2. 6. fl. pleno.

Hina-pariti. Rheed. mal. 6. p. 66. t. 38. 39. 40. 41.

Habitat in India. • H. Althæa. L. m. t. 38. 39. 40. 41.

HIBISCUS foliis cordatis crenatis: angulis lateralibus extimis parvis, caule arboreo. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 358.

Malvavifcus ad

Mal-

Ketmia amplifolia cordiformi; flore varia. Plum.
ly ament. fortune cochi bayz fona bay et roulme de dancave
forcee un baton. ce baton pnd seu en pndestun; et pnd lame des pndestun
laca **MONADELPHIA POLYANDRIA.** 695

Maho: pndestun.
Kedra
Pndestun

Malvaviscus arboreus, flore miniato clauso. Dill.
elth. 210. t. 170. f. 208.

Alcea indica arborea, folio molli, flore amplo eleganter coccineo. Pluk. alm. 14. t. 257. f. 1.
Habitat in Mexico. h

9. **HIBISCUS** foliis ovato-lanceolatis: superne inciso-ser-ratis, caule arboreo. *Hort. cliff. 350. Hort. nps. 205.*

Alcea arboreus syriaca. Bauh. pin. 316.

Alcea arboreus. Cam. hort. t. 3. 4.

Habitat in Syria. h

Ketmia ad

Syriacus.

Ketmia. Synn. quibet.
Sapela Baum Bauh.

10. **HIBISCUS** foliis quinquefido-palmatis, caule aculeato. *Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 359. Fl. zeyl. 269.**

Ketmia zeylanica, fici folio, perianthio oblongo integro.

Dill. elth. 190. t. 157. f. 190.

Habitat in Zeylona.

Ketmia ad

Balah
Ketmia ad

11. **HIBISCUS** foliis ferratis: inferioribus ovatis indivisis; superioribus tripartitis, caule aculeato.

Hibiscus inermis, foliis ferratis: inferioribus ovatis integris; superioribus trilobis. Hort. cliff. 350. Fl. zeyl. 262. Roy. lugdb. 359.

Althæa indica, gossypii folio, acetosæ sapore. Raj. hist. 1900.

Alcea acetosa indica mitis, foliis superioribus gossypii in modum tripartito-divisis. Pluk. alm. 15. t. 6. f. 2.

β. **Hibiscus** inermis, foliis ferratis: infimis indivisis; mediis tripartitis; summis quinquepartitis. *Roy. lugdb. 359.*

Alcea indica, magno flore. Bauh. pin. 317.

Alcea americana. Clus. hist. 2. p. 26.

γ. **Hibiscus** foliis palmato-digitatis quinquepartitis: laciniis lanceolatis, caule aculeato. *Fl. zeyl. 264.*

Alcea spinosa maderasp. saporis acidi, foliis profunde laciniatis cannabis in modum pentaphyllea. Pluk. alm. 15. t. 5. f. 4.

Narinam-poulli. Rheed. mal. 6. p. 75. t. 44.

δ. **Alcea** benghalensis spinosissima, acetosæ sapore, flore luteo pallido: umbone purpurascente. *Comm. hort. 1. p. 35. t. 18.*

Ketmia indica, foliis digitatis, flore magno sulphureo: umbone atro-purpureo, petiolis spinosis. Ebret. t. 6. f. 1.

Habitat in India, ☉

γ. *A reliquis diversa foliis magis palmatis; at Color florum, Aculei*

X x 4

Indra viti Alea amplior. Comm. hort. 100.
Libi indigi. arab
Bamia. Piaty.

696 MONADELPHIA POLYANDRIA.

Aculei erecti, Locus, Sapor & omnia indicant has vel loco, vel hybrido partu degenerasse.

Surattensis. 12. HIBISCUS recurvato-aculeata, foliis trilobis, calycibus exterioribus appendiculatis, stipulis semicordatis. *Habitat in India.*

Habitus & statura antecedentis. Folia inferiora ovato-subtriloba, acuta, serrata: superiora hastato-triloba, latiora fere quam longa. Aculei recurvi & pili recti sparsi per caulem, ramos, petiolos, pedunculos. Stipulae dimidiato-cordatae s. parva stipularum cordata. Calyx pilis strigosus: exterior valde singularis, cujus radii in medio extrorsum aucti foliolo parvo ovato.

• *Manihot.* 13. HIBISCUS foliis palmato-digitatis septempartitis. *Hort. cliff. 350. Hort. ups. 206. Roy. lugdb. 358. Ketmia folio manihot serrato, flore amplo sulphureo. Dill. elth. 189. t. 156. f. 189.*

Kibatrisso Japon

Alcea finica, manihot stellato folio, capsula longa pilosa pyramidata quinquefariam divisa. Pluk. amalth. 7. p. 355. f. 2. Habitat in Indiis. b

Damia ad
 • *Abelmoschus* 14. HIBISCUS foliis subpeltato-cordatis septemangulibus ferratis hispida. *Hort. cliff. 349. Hort. ups. 206. Fl. zeyl. 261. * Mat. med. 342. Roy. lugdb. 358.*

Abelmoschus. Sic

Alcea hirsuta, flore flavo, semine moschato. Marcgr. bras. 45. t. 45. Alcea aegyptiaca villosa. Bauh. pin. 317. edre havi mosch. Flos moschatus. Mer. surin. 42. t. 42.

ampliata
Aug. et 7 hi flos et fult.

Cattu-gasturi. Rheed. mal. 2. p. 71. t. 38. Habitat in Indiis.

• *esculentus.* 15. HIBISCUS foliis quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus.

Quingambo. Lugit Mayr 31
Quillobo. angol.
Kiambo. galea. Tab.
Kamelon. Kaim. Bramo
manihot f. 37.

Alcea americana annua, flore albo (flavo potius) maximo, fructu pyramidali sulcato. Comm. hort. 1. p. 37. t. 19. Raj. suppl. 518.

Alcea maxima, malvae roseae folio, fructu decagono recto crassiore brevior esculento, Sloan. jam. 98. hist. 1. p. 223. t. 133. f. 3. Habitat in Indiis.

• *vitifolius.* 16. HIBISCUS foliis quinquangulibus acutis ferratis, caule inermi, floribus pendulis. *Fl. zeyl. 265. **

Trionum. theph
Bamia. alp
Libi indigi. arab
Katou-bela manihot
Sabbaritta. 76.

Althaea indica, vitis folio, flore amplo flavo pendente. Herm. lugdb. 26. t. 28.

Katou-

Nov. gen. Ketmia Trium.
 fl. violacei calix duplex Ketmia. Stam. juncta columnam partem
 stigmata 5. glob.
 cap.
 sum lanata g. gypsi.
 MONADELPHIA POLYANDRIA. 697 } Ketmia ad

Katou-Beloeren. Rheed. mal. 6. p. 79. t. 46. } sum Prase
 Habitat in India. ☉

17. HIBISCUS foliis cordato-hastatis, pedunculis alter- zeylonicus.
 nis unifloris geniculatis. Fl. zeyl. 266. *
 Habitat in Zeylona. ☉

18. HIBISCUS foliis inferioribus cordatis acuminatis fer- virginicus.
 ratis; superioribus hastatis. Gron. virg. 171.
 Alcea maderaspatana, trilobis f. hastatis foliis glabris, pe-
 ricarpio tantummodo villosa. Pluk. alm. 15. t. 127.
 f. 2. forte?
 Habitat in Virginia paludosis salsis.
 Caulis viridis, erectus, angustior. Folia caulina corda-
 to-oblonga, demum hastata, viridia, subtomentosa, tri-
 nervia, tenuissime serrata. Pedunculi uniflori: ex alis
 solitarii, in summitate subracemosi, nudi.

19. HIBISCUS foliis inferioribus cordatis angulatis, su- Pentacarpos. Laff. ad.
 perioribus subhastatis, floribus subnutantibus, pistillo
 cernuo.

Hibiscus foliis cordatis angulatis ferratis, stipulis fetace-
 is divaricatis. Hort. cliff. 350. Roy. lugdb. 359.

Ketmia palustris minor, folio angusto, flore parvo pur-
 purascente, fructu depresso pentagono. Zannich. venet.

155. t. 91.
 Habitat in paludosis Venetiæ. 2

Planta antecedenti simillima; sed fructu diversa. Caulis
 tripedalis, angustus. Folia caulina cordato-oblonga;
 superiora hastata, viridia, subtrinervia, subtus tomen-
 tosa, tenuissime serrata. Pedunculi axillares in sum-
 mitate plantæ, solitarii, nudi, petiolo longiores, uniflo-
 ri. Calyx inferior patens, radiis subulatis, vix longitu-
 dine interioris. Corolla patens, dilute rubra, subnu-
 tans. Stamina lutea tota; Anthera saturatius. Stylus
 cernuus cum staminibus, albus; Stigmata 5, capitata,
 incarnata.

20. HIBISCUS foliis tripartitis incis, calycibus inflatis. Trionum.
 Hort. upf. 206.

Trionum. Hort. cliff. 349. Roy. lugdb. 358.

Alcea vesicaria. Bauh. pin. 317.

Alcea peregrina folisequa. Lob. ic 656.

B. Ketmia vesicaria africana. Tournef. inst. 101. absp. p. 101.

Alcea vesicaria capitis b. spei. Moris. præl. 227. hist.

2. p. 533.

Habitat in Italia, Africa. ☉

X x 5

PEN-

Trionum.
 Solisequa Lob.
 Hypocorum. Matth. gen.

Velaga ad 398
phoenicea.

et nomen Quingestis
græc. PENTAPETES.

1. PENTAPETES foliis hastato-lanceolatis ferratis.
Blattaria zeylonica, flore amplo coccineo. *Comm. hort.*
I. p. II. t. 6.

Alcea indica, lucido hastato folio, flore blattariæ phœ-
niceo. *Raj. suppl. 523. Pluk. phyt. t. 255. f. 3.*

Alcea fruticosa pentaphylloidis æmula, floribus amœ-
nissime rubellis, calyce producto. *Pluk. alm. t. 126.*
f. 4. mala.

Habitat in India. *○ Bengahensem Zjeda Ruyph. 2. 100*
Involucrum uniflorum deciduum. Stamina 15. inter
singula tria Filamentum petaloideum lanceolatum, co-
loratum, longitudine corollæ. Cotyledones bipartiti, u-
ti in Convolvulis. Pedunculi biflori.

fuherifolia.
Velaga herum ad 399

2. PENTAPETES foliis ovatis repandis. *Amœn. acad.*
I. p. 407.

Pentapetes. *Fl. zeyl. 250.*
Pterospermadendrum fuheris folio anguloso subtus inca-
no, floribus albis. *Amœn. act. 8. p. 215. t. 14.*
Habitat in India. *† Malaga herum Ruyph. 33*

acerifolia.

3. PENTAPETES foliis cordatis repandis. *Amœn. acad.*
I. p. 407.

Pterospermadendron foliis aceris, flore fructuque ma-
jore. *Amœn. act. 8. p. 216. t. 16. 17.*
Habitat in India.

Stewartia ad 398
Malacodendron.

STEWARTIA.

1. STEWARTIA. *Act. upf. 1741. p. 79. t. 2. Catesb.*
car. 3. p. 13. t. 13.

Malacodendron. *Mitch. gen. 16.*
Habitat in Virginia. *†*
Folia Cerasi, acutissime serrata, subtus villosa.

Tsubakki ad 399
Camellia

CAMELLIA.

1. CAMELLIA.

Tsubakki montanus s. sylvestris, flore roseo simplici.
Kempf. amœn. 850. t. 851.

Tsubakki hortensis, flore pleno maximo rosæ hortensis.
Kempf. amœn. 852.

Habitat in Japonia, China. *† fructu 15 ped. lign. dur.*
Cortex tenuis carnis. aquellus glaucus badius, fanni alt. dunt.
fol. thia et cunctis partibus tuis. rigidiora. concava dentata lucida
flor. 1 ad 2 axillis tuberculis magni ketonice rubentes valde
Cal. imbricat. (quoniam 20 circum. orbicul. concav. peltatis herbis)
4 circum. ad circum.
Cor. bicuspidata. 6 ad 7. peltatis ketonice simili basi connatis unguis
Stam. cylindrica tamen alia baccata. incurvata. in medio. quæ 100 peltatis

absque velle capt. 5 longi
5. peltatis ex Kœmpfero.
et cylindricis. nam
culta rana fructum et peltatis
insertum.

ovariis glab. / styl. rubra tamen longit. stigma cuspidat. in lobum herbis
caps. pyrisiformi 3 circa 1 peltatis dunt 3 lobis 3 lobis vobis
sem. 1. long. 1. ovum avallanue sty. elongat. rugos. rufum comper
alba magnitudine capiti. 3. 3. thea et vobis

Clas-

Diadelphie pro pumila flore spectabilis fuit a pyreneo. Pittacoe
magnitudo ind. 3. nullo alio qdlibet. fol. ejus theca adhaerens pro conilinda
sordis gubna. Duetur flos femine crule et pro Lavre capillone Kaempf. }
DIADELPHIA HEXANDRIA. am. ch. p. 699 853

Sapangua. Japon
ejusmodi 22
nominantur in
Kaempfer.

Classis XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FUMARIA.

* *Corollis bicalcaratis.*

1. **FUMARIA** scapo nudo. Hort. cliff. 351. * Gron. Cucullaria. Juss. folio
virg. 171. Roy. lugdb. 393. *fl. parvitate flavo virg. squam. bicullata. Marchant 1733*
Fumaria tuberosa insipida. Corn. canab. 127. *fl. fr.*

Bicuculla. March 431
Cucullaria ad.
Capitulum
fl. fr.

Fumaria filiquosa, radice grumosa, flore bicorporeo ad
labia conjuncto, virginiana. Pluk. alm. 162. t. 90. f.
3. Raj. suppl. 475. *ca. b. j. ull. filamenta 4 distincta. vidi 6. fl. in Monte albid.*

Cucullaria. Juss. act. paris. 1743. Linn. evrat. cu. Bicucullata. Marchant

Habitat in Virginia, Canada. 2
Radix tuberosa. Folium radicale tricompositum. Scapus
nudus, Racemo simplici; bractea vix ulla; Nectarium
duplex corollam basi bicornem efficiens.

fl. 1. caule nudo.
fl. tenuiora.

2. **FUMARIA** floribus postice bilobis, caule folioso. *specabilis. Capitulum*
Habitat in Sibiria. D. Demidoff.

Planta eximia floribus speciosissimis, maximis. Habitus
Fumariae bulbosae, sed majora omnia. Rami ex alis ra-
riores. Caulis erectus. Racemus absque bracteis. Co-
rollae magnitudine extimi articuli pollicis, pone in du-
os lobos aequales, rotundatos divisae.

Bicuculla ad 431
specabilis. Capitulum

* *Corollis unicalcaratis.*

3. **FUMARIA** caule simplici, bracteis longitudine flo-
rum. *bulbosa. Capitulum*

Fumaria caule simplicissimo diphylo, floribus calyce de-
stitutis. Hort. cliff. 351. Vir. cliff. 70. Fl. suec. 585.
Mat. med. 344. Roy. lugdb. 394.

Capitulum
bulbosa. Capitulum
Capitulum. Cor.
Capitulum. Thal.
Capitulum. Pouch.

a. Fumaria bulbosa, radice cava, major. Baub. pin. 142. cava.
Pistolochia. Fuchs. hist. 91.

b. Fumaria bulbosa, radice non cava, minor. Baub. pin. intermedia.

gamma. Fumaria bulbosa, radice non cava, major. Baub. pin. solida.

capitulum

Habitat in Europae nemoribus & umbrosis. 2
Conjungunt has plantas specie: Radix carnosae, simplex;

Gem-
Linn. bulbosa major radice cava, flore carules } *Nonigi japon*
Kaempf. a. v. p. 909.

Fumaria bractea? disticta? Ruller. diversa spec. }
Latvia D. Zitel

Gemmæ radicales duæ, trivalves; Caulis simplex, subangulatus, unico ramo; Foliorum structura decomposita; Racemus bracteis immixtus, terminalis, solitarius; Corolla, Calyx minimus, Semina, Stamina Siliquæ structura; Tempus verum. Species reliquæ propriis notis distinctissimæ.

Capnoidy. Corn. ad. 431

+

• Stempervirens.

Capnoidy. Corn. 425.

4. FUMARIA filiquis linearibus paniculatis, caule erecto.

Hort. ups. 207.

Fumaria caule erecto ramoso, filiquis filiformibus corymbosis. Hort. cliff. 352. Roy. lugdb. 394.

Fumaria filiquosa sempervirens. Corn. canad. 57. t. 57.

Moris. hist. 2. p. 259. f. 3. t. 12. f. 1.

Habitat in Canada, Virginia. ☉

Capnoidy. ad. capnoides.

+

~~Capnoides~~

Corydalis. Cast. Corn.

5. FUMARIA filiquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis.

Fumaria caule ramoso diffuso, filiquis oblongis, radice perenni. Hort. cliff. 352. Roy. lugdb. 394.

Fumaria lutea. Bauh. pin. 143.

Fumaria lutea montana. Dalech. hist. 1294.

Fumaria tingitana, radice fibrosa, perennis, flore ex albo flavescente, filiquis curtis. Pluk. alm. 262. t. 90. f. 2.

Habitat in Gallia, Italia, Mauritania. ☉

Capnoides. enneaphylla. 6.

6. FUMARIA foliis triternatis: foliolis cordatis.

Fumaria hispanica saxatilis, foliis amplioribus cordiformibus, semine compresso. Tournef. inst. 422.

Fumaria henneaphyllos hispanica saxatilis. Bocc. mus. 2. p. 83. t. 73. Raj. suppl. 475. Barr. ic. 42.

Fumaria radice fibrosa, foliis ad petiolum sinuatis crassioribus. Pluk. alm. 162.

Habitat in Hispaniæ, Siciliæ saxosis.

Fumaria. ad. 431

+

Fumaria. Diosc.

Fumaria. Diosc.

καπνός Diosc.

Capnos

7. FUMARIA pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso,

Fumaria pericarpis monospermis. Hort. cliff. 252. Fl. suec. 584. Mat. med. 343. Roy. lugdb. 394. Hall. helv. 605.

Fumaria officinarum & dioscoridis. Bauh. pin. 143.

Fumaria. Fuchs. hist. 338. Cam. epit. 890.

Habitat in Europæ agris, cultis. ☉

Fumaria. spicata.

8. FUMARIA pericarpis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. Sauv. monsp. 263.

Fumaria minor tenuifolia. Bauh. pin. 143. Segu. ver. 2. p. III.

Fuma-