



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

*Fumaria minor foliis oblongis capillatis C.B.P. 143 } Selterays.
indica.*

DIADELPHIA HEXANDRIA, 701

Fumaria tenuifolia erecta hispanica purpurea. Barr. ic. 41.

Fumaria minor tenuifolia præcox, semine lini. Moris.

hist. 2. p. 262. f. 3. t. 12. f. 13.

Capnos tenuifolia. Clus. hist. 2. p. 208.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Veronæ ad agros, vias.

Varietates, qui statuatur hanc cum sequente esse Fumariæ officinalis vix erret, dictitante fructu. An hybrida?

Spica ex flosculis arcte congestis est.

9. FUMARIA pericarpis monospermis racemosis, foliis *capreolata. Fumaria.* scandentibus subcirrhosis.

Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens.

Bauh. pin. 143.

Fumaria major scandens, flore pallidior. Raj. hist. 405.

Habitat in G. Narbonensi. Anglia. ☉

Pedunculi partiales recurvati sunt, & Foliola extrema in cirrhos transeunt.

10. FUMARIA filiquis linearibus, foliis cirrhiferis. *claviculata.*

Fumaria foliis cirrhiferis, floribus spicatis. Hort. cliff. Splith. Lob.

*351. * Roy. lugdb. 394. Gort. gelr. 413.*

Fumaria claviculis donata. Bauh. pin. 143. Moris. hist.

2. p. 266. f. 3. t. 12. f. 3.

Fumaria alba latifolia. Raj. angl. 3. p. 335.

Habitat in Angliæ locis uliginosis saxosis.

11. FUMARIA filiquis globosis inflatis. *Hort. ups. 207. vesicaria. Cisticapnos.*

Fumaria foliis cirrhiferis, filiquis ovatis inflatis pendulis. Hort. cliff. 351. Roy. lugdb. 394.

Fumaria alba vesicaria, capreolis donata, sub exitum autumnii florens, æthiopica. Pluk. alm. 400. t. 355. f. 3.

Cysticapnos africana scandens. Boerb. lugdb. 1. p. 310. t. 310.

Habitat in Æthiopia. ☉

OCTANDRIA.

POLYGALA.

* *Cristati (flores appendice penicelliformi.)*

1. POLYGALA floribus cristatis spicatis, caule herbaceo *incarnata.* ramoso erecto, foliis alternis subulatis.

Polygala marilandica, foliis tenuissimis, spica parva compacta in summo caule flosculis carnis. Raj. suppl. 639.

Habitat in Virginia, Canada. ☉

Cauli spithameus, pedalis, erectus, filiformis, angulatus. Rami communiter tres, in alis summis, longi, angusti. Folia subulata, plana, acutissima, remota, sæpius vix in caule acto.

Recte vixit claudi. h. m. 92. 61. 3 ped. in antheris, rami cyl. alt. fl. alt. Bruni maj.
ludo fl. 1. dlt. anther. tuberculis purp. lineatis. Calyx 2 fl. 2. minoris gyp.
Stam. 5. 3. 2. petal. corollae innatae 2 ad 3. foveolae cristatae. inverte. flammulae. h. gyp. flamm.
liberulina pap. Anceif. 702

DIADELPHIA OCTANDRIA.

octo. Spicæ terminales, solitariae, oblongae, vividissime incarnatae; Corollae, quam alae calycinae triplo longiores, instructae Penicillo multifido, dilatato, incarnato, uti corollae erecto.

Polygala ad. 358
vulgaris.
amarilla. Casalp. 4. p. 230
gentiana in fol. horta. alina
Thasion anguill.
ovithaenium m. Hoffm.
Polygalon. Nag.
Polygala gal. 2d.
onobrychis. Dier. lob.
ambrosia. fl. 2d.
cruis fl. gyp. col.

2. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Amen. acad. 2. p. 136.*
Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffusis herbaceis. Vir. cliff. 70. Hort. cliff. 352. Fl. suec. 586. Roy. lugdb. 393.
Polygala major. Bauh. pin. 215.
Polygala vulgaris major. Clus. hist. 1. p. 324. Vaill. paris. 161. t. 32. f. 1.
β. *Polygala vulgaris. Bauh. pin. 215.*
Polygala foliis imis subrotundis, superioribus angustis acutis. Hall. helv. 606.
γ. *Polygala minor, foliis circa radicem rotundiusculis. Vaill. paris. 161. t. 32. f. 2.*
Habitat in Europæ pratis, & pascuis siccis. ♀
monspeliaca. 3. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Sauv. monsp. 53.*
Polygala annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti carneis lineis virgatis. Magn. monsp. 208.
Polygala vulgaris coloris obsoleti, foliis angustissimis. Bauh. hist. 3. p. 338. Raj. hist. 1336.
Habitat Monspeli in collibus sterilibus. ☉
sibirica. 4. POLYGALA floribus cristatis, racemo laterali nudo, caulibus herbaceis, foliis lanceolatis.
Habitat in Sibiria. D. Gmelin.
Habitus antecedentis. Folia inferiora ovata, superiora lanceolata. Racemus unus (raro duo), lateralis, laxus, absque bracteis, ad exortum pedicellorum partialium.
bracteolata. 5. POLYGALA floribus cristatis, racemo laterali, bracteolis triphyllis, foliis lanceolatis, caule suffruticoso.
Polygala floribus cristatis racemosis, carina cristis longiore, caule suffruticoso, foliis lineari-lanceolatis. Amen. acad. 2. p. 137.
Polygala africana glabra, florum galea binis cristis fimbriatis ornata, ex involucro magno dipetalo erumpente. Pluk. alm. 300. t. 53. f. 2.
Polygala frutescens angustifolia ramosa, floribus in summitate velut umbellatis. Raj. suppl. 640.

Polygala
ore, ca
acad.
Polygala
Polygala
reo. B
Polygala
frutico
2. p. 1
Polygala
Burm.
Habitat
POLY
suffruti
Amen
Polygala
te purp
Polygala
Burm.
Habitat
POLY
frutico
2. p.
Polygala
cliff.
Polygala
reis
Polygala
gno to
Polygala
reo
Habitat
POLY
caule
2. p.
Penæ
Habitat
POLY
boreo
ovatis
Polygal

Hunt Institute for Botanical Documentation

DIADELPHIA OCTANDRIA. 703

6. Polygala floribus cristatis racemosis: carina cristis brevior, caule suffruticoso, foliis lineari-subulatis. *Amœn. acad. 2. p. 137.*

Polygala foliis lineari-subulatis. Hort. cliff. 353.

Polygala frutescens, foliis linearibus, flore majore purpureo. Burm. afric. 202. t. 73. f.

7. Polygala floribus cristatis racemosis, caule erecto suffruticoso simplicissimo, foliis subulatis. *Amœn. acad. 2. p. 137.*

Polygala foliis linearibus acutis, flore purpureo minore. Burm. afric. 203. t. 73. f. 3.

Habitat Æthiopia. h

6. POLYGALA floribus cristatis alternis, caule erecto *scabra*, suffruticoso ramoso, foliis linearibus obtusis *scabris*. *Amœn. acad. 2. p. 138.*

Polygala æthiopica, angustis hirsutis foliis, flore obsolete purpureo. Pluk. mant. 153. t. 404. f. 6.

Polygala folio lineari-obtusio, flore albente minimo. Burm. afric. 204. t. 73. f. 4.

Habitat in Æthiopia. h

7. POLYGALA floribus cristatis carina lunulata, caule *myrtifolia*. X fruticoso, foliis lævibus oblongis obtusis. *Amœn. acad. 2. p. 138.*

Polygala foliis lanceolatis obtusis, caule frutescente. Hort. cliff. 353.

Polygala arborea myrtifolia, floribus albis: intus purpureis. Com. hort. 1. p. 87. t. 46. Raj. suppl. 640.

Polygala arborea, myrtilli subrotundis foliis, fructu magno torquili. Pluk. mant. 153. t. 437. f. 4.

Polygala frutescens, foliis oblongis glabris, flore purpureo. Burm. afric. 202. t. 73. f. 1.

Habitat in Æthiopia. h 3 p. 15 april. fl. f. l. Riv. alt. put. h

* *Imberbes (flores absque penicillo carinati) frutescentes.*

Penœa ad 356.

8. POLYGALA floribus imberbibus lateralibus solitariis, *Penœa*. caule arboreo, foliis obtusis petiolatis. *Amœn. acad. 2. p. 140.*

Penœa arborecens, buxi folio aspero. Plum. spec. 22. Habitat in America meridionali h

9. POLYGALA floribus imberbibus racemosis, caule *diversifolia*. arboreo, foliis senioribus oblongo-ovatis, recentibus subovatis. *Amœn. acad. 140.*

Polygala foliis ramorum proveciorum oblongo-ovatis,

tis, tenellorum subovatis, caule arboreo. *Hort. cliff.*
353. *

Habitat in America calidiore. h

chinesis. 10. POLYGALA floribus imberbibus spicatis axillaribus,
caulibus suffruticosis, foliis ovalibus.

Habitat in India. h

Caules pedales, decumbentes, lignosi, non glabri. Fo-
lia ovalia, integerrima, magnitudine extimi pollicis,
subpetiolata, nuda, obtusa cum mucrone. Rami late-
rales, rarissimi. Spicæ laterales, foliis saepe longiores,
virides.

Senega
ad. 358

• *Chamaebu-*

xus. gum

Pseudo-chamaebuxus. Eysen.

Polygaloides. Haller
Herb. p. 607.

spinosa.

II. POLYGALA floribus imberbibus sparsis: carina a-
pice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. A-

Chamaebuxus flore coluteæ. Bauh. pin. 471.

Anonymos flore coluteæ. Clus. hist. 1. p. 105.

Habitat in Austria, Helvetiæ, Alsatia montanis. h

12. POLYGALA floribus imberbibus lateralibus, caule
arboreo spinoso, foliis ovalibus mucronatis. *Amœn.*
*acad. 2. p. 141. **

Habitat in Æthiopia. h

Heisteria.

13. POLYGALA floribus imberbibus lateralibus, caule
arborescente, foliis triquetris mucronatis.

Polygala astragaloides frutescens. Breyn. prodr. 2. p. 85.

Suffrutex ericæformis, flore rubro elegantissimo. Seb.
thes. 2. p. 63. t. 62. f. 8.

Thymbra capensis, nepetæ theophrasti foliis aculeatis,
flore parvo purpureo. Pluk. alm. 366. t. 229. f. 5.

*Heisteria. Hort. cliff. 352. * Roy. lugdb. 393.*

Habitat in Æthiopia. h

* *Imberbes herbacæ, caule simplicissimo.*

K.
Senega.

14. POLYGALA floribus imberbibus spicatis, caule ere-
cto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis. A-
mœn. acad. 2. p. 139.

Polygala caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis
alternis integerrimis, racemo terminali erecto. Gron.
*virg. 80. * Mat. med. 345.*

Plantula marilandica, caule non ramoso, spica in fasti-
gio singulari e flosculis albis composita. Raj. suppl.
640.

Habitat in Virginia, Pensylvania, Marilandia, &

15. POLYGALA floribus imberbibus oblongo-capitatis, *lutea*, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis acutis, *Amœn. acad. 2. p. 140.*

Polygala f. Flos Ambervalis floribus luteis in capitulum oblongum congestis. *Pluk. alm. 301. Raj. suppl. 639.*

Polygala virginiana, flore luteo capitato. *Pet. sicc. 58. Habitat in Virginia.* ☉

16. POLYGALA floribus imberbibus globoso-capitatis, *viridescens*, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis obtusiusculis. *Amœn. acad. 2. p. 140.*

Polygala foliis lanceolatis alternis, caule simplicissimo, corymbo terminali capitato. *Gron. virg. 80? 2 2 Habitat in Virginia.* ☉

Caulis spithameus f. pedalis, angulatus, absque ramis, erectus. Folia alterna, linearia f. lineari-lanceolata, levia, integerrima. Capitulum terminale, subglobosum, ex albo viride, cum obsolete rubri mixtura in alis floribus.

17. POLYGALA floribus imberbibus, caule herbaceo *triflora*, erecto, foliis linearibus alternis, pedunculis subtrifloris. *Fl. zeyl. 269.*

Habitat in Zeylona. ☉

18. POLYGALA floribus imberbibus, pedunculis multi-*glaucoides* floris lateralibus, caulibus diffusis herbaceis, foliis acutis. *Fl. zeyl. 270. **

Habitat in Zeylona. ☿

* *Imberbes herbaceæ ramosæ.*

19. POLYGALA floribus imberbibus, capsulis ciliato-ciliatis, dentatis, caule herbaceo erecto. *Fl. zeyl. 268.*

Habitat in India. ☉

Variat *Foliis cordatis, Caulibus semipedalibus, ramosis.*

20. POLYGALA floribus imberbibus, pedunculis squar-*sanguinea* rosis, caule herbaceo ramoso erecto.

Habitat in Virginia Kalm. ☉

Caulis spithameus f. pedalis, firmus, angulatus, ramosus, erectus, ramis caule altioribus. Folia alterna, angusto-lanceolata. Spicæ terminales, laxæ, sanguineæ, ovate, decidunt enim flosculi inferiores maturi, dum novelli accrescunt unde, Pedunculus lacernus f. squarrosus.

verticillata. 21. POLYGALA floribus imberbibus, spicis floribus remotis, foliis linearibus verticillatis, caule herbaceo ramofo.

Polygala caulibus filiformibus, foliis linearibus alternis, pedunculis spicatis. Gron. virg. 172.

Polygala foliis imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo filiformi ramofo, foliis linearibus. Amœn. acad. 2. p. 159.

Polygala mariana quadrifolia minor, spica parva albicante. Pluk. mant. 153. t. 438. f. 4.

Polygala quadrifolia minima marilandica, spicis florum parvis albentibus. Raj. suppl. 639.

Habitat in Virginia. ☉

Folia sæpius quina ad genicula, interdum alterna. Spicæ albæ, angustissimæ flosculis remotis.

cruciata.

22. POLYGALA floribus imberbibus, foliis quaternis. Amœn. acad. 2. p. 138.

Polygala foliis quaternis. Gron. virg. 80.

Polygala quadrifolia f. cruciata, floribus ex viridi rubentibus in globum compactis. Pluk. alm. 301.

Habitat in Virginia.

DECANDRIA.

Mouricou ad. 326.

Est nana. Rubra

ERYTHRINA.

herbacea.

1. ERYTHRINA foliis ternatis, caule simplicissimo infermi. Hort. cliff. 354. Roy. lugdb. 373.

gelala-itti. Rumph. 2. 77. Coral carolinensis, hastato folio. Dill. elth. 107. t. 90. f. 106.

Corallo dendron humile, spica florum longissima, radice crassissima. Catesb. car. 49. t. 49.

Habitat in Carolina, Missipi. 4

X corallo dendron.

Mouricou ad

occidentalis

2. ERYTHRINA foliis ternatis, caule arboreo aculeato. Hort. cliff. 354. Hort. upf. 207. Fl. zeyl. 275. Roy. lugdb. 373.

Ceratia f. Siliqua sylvestris spinosa arbor indica. Baub. pin. 402.

Coral arbor americana. Comm. hort. 1. p. 211. t. 108.

Mouricou ad

orientalis.

β. Mouricou. Rheed. mal. 6. p. 13. t. 7.

Habitat in Indiis. 5

Est quedam differentia inter occidentalem & orientalem, sed vix videtur sufficiens pro specie distincta; aule enim in orientali nigricantes sunt.

gelala. Rumph. 2. 76.

flor. spic. anthe

fructus hinc in quin 1. semina crassa.

Zuinavortiba Prop. magn. 136. arb. 15 ped. spicata. fl. antheris adu. foliis canalicul. Celig. nodosa ad 6 ped. long. semina. miniat. phoscolor magis. hilo nigro antheris. Rami dicitur a terre in situ fuisse. p. 136.

3. ERY

DIADELPHIA DECANDRIA.

707

Piscipula. ad 326.

3. ERYTHRINA foliis pinnatis, leguminibus membranceo-tetragonis. †

Coral arbor polyphylla non spinosa, fraxini folio, siliqualis foliaceis exstantibus rotæ molendinariæ fluviatilis aucta. *Sloan. jam. 143. hist. 2. p. 39. t. 176. f. 45. Raj. dendr. 108.*

Habitat in America calidiore. †

SECURIDACA.

Ecastophyllum Brown ad 320.

1. SECURIDACA.

Sparteum scandens, citri foliis, floribus albis ad nodos confertim nascentibus. *Plum. Spec. 19.*

Habitat in America meridionali. † *12 ped. in arenis ripæ maritimæ*

BORBONIA.

Uromyrsauri.

1. BORBONIA foliis lanceolatis trinerviis integerrimis. *trinervia.*

Borbonia foliis lanceolatis acuminatis trinerviis. *Hort. cliff. 494.*

Frutex æthiopicus, rusci angusto & minore folio. *Pluk. alm. 158. t. 414. f. 1.*

Habitat in Æthiopia. †

2. BORBONIA foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. *lanceolata.*

Frutex æthiopicus, rusci angusto & minore folio. *Pluk. alm. 158. t. 297. f. 4.*

Genista africana frutescens, rusci nervosis foliis. *Raj. dendr. 107.*

Habitat in Æthiopia. †

3. BORBONIA foliis cordatis multinerviis integerrimis. *cordata.*

Borbonia foliis cordatis acuminatis integerrimis multinerviis. *Hort. cliff. 494. Roy. lugdb. 372.*

Sparteum africanum frutescens, ruscifolio caulem amplexante. *Comm. hort. 2. p. 195. t. 18. Raj. dendr. 107.*

Genista africana frutescens, rusci foliis nervosis, flore luteo. *Seb. thes. 1. p. 38. t. 24. f. 3.*

Frutex æthiopicus, foliis rusci, floribus papilionaceis sericea lanugine fusca villosis. *Pluk. alm. 159. t. 297. f. 3.*

Habitat in Æthiopia. †

4. BORBONIA foliis ovatis tomentosis. *tomentosa.*

Genista africana tomentosa, folio cochleariformi, flore luteo. *Seb. thes. 1. p. 38. t. 24. f. 1.*

Genista africana arborescens, folio argentea lanugine vestito. *Seb. thes. 1. p. 38. t. 24. f. 2.*

Habitat in Æthiopia. †

Y y 2

5. BOR-

CANDRIA.

multinerviis crenatis
foliis rusci majori
uk. alm. 159.
foliis rusci. Breyer.

M.
cibus.
teretibus apice floribus
356. Hort. ups.
sp. 60.
s. lenti similibus. Bauh.
m. spec. 34. t. 33.
lia, Sicilia, Turcia.
angulatis, foliis oppo-

n montanum triphyllum
4.
b. hist. 1. p. 399.

racemis lateralibus,
356. Roy. lugdb.

am, semine reni firmo

en. spec. 35. t. 33.
Bauh. pin. 396.
hist. 1. p. 103.

patentibus, foliis ovatis
us, flore luteo. Bauh.

Bauh. hist. 1. p. 4.
us secundum, flore

us tertium hirsutum
1. p. 106.
nensi. h

apalathus albicans tunc citro. B. Pin. 392.
Lignum rosei odoris in Brasilia. Lami. Ind. ovid.

Rhodium lignum. Cond.
Bri. de yosa
agalochuum
xylaba
Rhodidium
Cytisus ad

Fig. 368

Sanguinaria. Linn.

DIADELPHIA DECANDRIA.

709

apalathus rubrus. B. Pin. 392.
Lignum totum rubrum in Brasilia. Lami. Ind. ovid.

* Foliis ternis.

5. SPARTIUM foliis solitariis ternatisque, ramis sexan-
gularibus apice floriferis.

Spartium orientale, filiqua compressa glabra & annula-
ta. Tournef. cor. 44.

Habitat in Oriente. h

Anguli tres decurrunt per ramos a singulo folio.

6. SPARTIUM foliis ternatis: foliolis involutis, cauli-
bus inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris.

Cytisus ramis humifusis albidis, floribus capitatis termi-
nalibus, foliolis ovalibus glabris aggestis. Sauv. monsp.

190

Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis. Bauh.
pin. 390. Guett. stamp. 2. p. 417.

Cytisus montis calcaris. Bauh. hist. 1. p. 370.

Cytisus II. Clus. hist. 1. p. 94.

Habitat in Hispania, Gallia australiore. h

Spartium ad. 321.
Spartium ad. 321.

7. SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis iner-
mibus angulatis. Hort. cliff. 356. Fl. suec. 589. Roy.

lugdb. 370. Gort. gelr. 415.

Genista angulosa & scoparia. Bauh. pin. 395.

Genista. Dod. pempt. 761.

Habitat in Europæ australioris arenosis. h

8. SPARTIUM foliis ternatis, ramis angulatis spinosis.
Hort. cliff. 356. Hort. ups. 208. Roy. lugdb. 370.

Sauv. monsp. 191.

Acacia trifolia. Bauh. pin. 392.

Aspalathus secunda trifolia. Bauh. hist. 1. p. 375.

Habitat in Europæ australis asperis maritimis. h

Scoparium.
Genista
Spartium
Cytisus

Cytisus ad. 321 +
Genista
Cytisus

Aspalathus
Aspalathus
Cytisus

Aspalathus
Aspalathus
Cytisus

Aspalathus
Aspalathus
Cytisus

Aspalathus
Aspalathus
Cytisus

GENISTA.

* Inermes.

1. GENISTA foliis ternatis. Hort. cliff. 355. Mat. med. canariense.
347. Roy. lugdb. 371.

Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis villosis. Bauh.
pin. 390.

Cytisus I. Clus. hist. 1. p. 94.

2. Cytisus canariensis sempervirens & incanus. Comm.
hort. 2. p. 103. t. 52.

Cytisus canariensis, flore candido & citrino. Seb. thes.
2. p. 6. t. 4. f. 6. 7.

Genista
Cytisus

Chamaecrista
ad 320

Y y 3

Cy

Cytifus canariensis microphyllus angustifolius profusus incanus. *Pluk. alm.* 128. t. 277. f. 6.

Habitat in Hispania, Canariis. b

Chamaespartium ad. 321.

4. Gen

fagittalis.

2. GENISTA ramis ancipitibus articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 355 *Roy. lugdb.* 371.

chamaespartium
genuellella lob. gen.

Genista herbacea f. Chamaespartium. *Bauh. hist.* 1. p. 393. *Stam. 8. canina sp. in Sepali*

Chamaespartium fagittalis. *Bauh. pin.* 395.

Chamaespartium fagittalis pannonica. *Cam. hort.* t. 13. *Habitat in Germania, Gallia.* z

tridentata.

3. GENISTA ramis triquetris subarticulatis, foliis tricuspatis.

Genistella fruticosa lusitanica latifolia. *Tournef. inst.* 646.

β. Genista fruticosa lusitanica angustifolia. *Tournef. inst.* 646.

Habitat in Lusitania. Læst. b

Præcedenti valde affinis, at majora omnia & articuli ramorum in folium laterale terminati, non integri sed tricuspatis.

Coniisla ad. 321.

tinctoria.

5. Gen

4. GENISTA foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis. *Hort. cliff.* 355 *Fl. suec.* 587. *Mat. med.* 347. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 416.

Lutia
flos tinctoria
conyza
conyza
conyza
conyza

Genista tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.

Genista tinctoria vulgaris. *Clus. hist.* 1. p. 101.

Habitat in Germania, Anglia. b

4. Gen

pilosa.

Chamaespartium ad. 321.

5. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Hort. cliff.* 355. *Fl. suec.* 588. *Roy. lugdb.* 371.

Sibetia

Genista ramosa, foliis hyperici. *Bauh. pin.* 395.

Chamaespartium prima. *Clus. hist.* 1. p. 103.

Habitat in Pannonia, G. Narbonensi, Germania.

* *Spinæ laterales.*

6. Gen

anglica.

Listera ad.

6. GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371.

Lupinus
Lupinus
Lupinus

Genista minor asphaltoides. *Bauh. pin.* 395. *prodr.* 157.

Genistella. *Dod. prompt.* 670.

Habitat in Angliæ ericetis humidiusculis. b

6. G. T

germanica.

Listera ad.

7. GENISTA spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 417.

genistella

Stam. 10. canina 1 adp. nullo libro

Genista spinosa minor germanica. *Bauh. pin.* 395.
 Genistella spinosa. *Riv. tetr.* 260.
Habitat in Germania. †

8. GENISTA spinis decompositis, ramis floriferis inermibus: foliis linearibus pilosis. *hispanica. G. Bauh. Littera ad. 321.*

Genista spinosa minor hispanica villosissima. *Bauh. pin.* 395.

Genistella monspeliaca spinosa. *Bauh. prodr.* 157.

Genistella, montis ventosi, spinosa. *Bauh. hist. 1. p.* 400.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi. †

Vix a precedente sufficienter distincta.

9. GENISTA caule aphylo, spinis decussatis. *Lusitana.*

Genista-spartium spinosum minus. *Bauh. pin.* 394.

Scorpius secundus. *Clus. hist. 1. p. 107. Bauh. hist. 1. p.* 403.

Habitat in Lusitania, Hispania. †

ASPALATHUS.

1. ASPALATHUS foliis confertis subulatis mucronatis glabris, caule villoso, floribus sparsis. *astroites.*

Genista astroites, juniperinis pungentibus foliis, æthiopica, floribus saturate luteis. *Pluk. mant. 88. t. 413.*

Raj. dendr. 104.
Habitat in Æthiopia. †

2. ASPALATHUS foliis confertis subulatis mucronatis hispida, floribus capitatis. *chenopoda, cornuta folia, aday*

Genista africana lutea, floribus hirsutis in capitula lanuginosa conglobatis, foliis corrudæ aculeatis subhirsutis. *Herm. afr. 11.*

Chamælarix l. *Chenopoda monomapatensis. Breyn. cent.* 23. t. 11.

Habitat in Æthiopia. †

3. ASPALATHUS foliis confertis subulatis inermibus glabris brevissimis, floribus alternis. *thymifolia, aday*

Genista minima æthiopica, foliis thymi confertis splendidibus glabris. *Pluk. mant. 88. t. 413. f. 1.*

Habitat in Æthiopia. †

4. ASPALATHUS foliis confertis subulatis inermibus hirsutis, floribus alternis, calycibus linearibus. *ericefolia, ad*

Genista æthiopica non spinosa, foliis ericæ villosis, floribus

Aspalathus ⁷¹² ribus parvis spicatis luteis: calycibus longioribus immerfis. *Pluk. mant.* 88. t. 413. f. 6.
Habitat in Æthiopia. †

W verrucosa, 5. ASPALATHUS foliis confertis subulatis, gemmis verruca tomentosa prominentibus nudis.
Habitat in Æthiopia. †

W retroflexa, 6. ASPALATHUS foliis confertis subulatis glabris minimis, ramis filiformibus reflexis, floribus solitariis terminalibus.
Habitat in Æthiopia. †

W uniflora, 7. ASPALATHUS foliis confertis setaceis inermibus glabris, stipulis acutis persistentibus, floribus solitariis, calycibus ovatis.
Genista æthiopica glabra, longioribus foliis ex uno puncto plurimis, flore major luteo. *Pluk. mant.* 88. t. 413. f. 7.
Habitat in Æthiopia. †

W araneosa, 8. ASPALATHUS foliis confertis setaceis inermibus hispidis, floribus capitatis.
Genista æthiopica, flore flavo, foliolis inflexis & araneosa lanugine fimbriatis: summo ramulo circa flores glomeratis. *Pluk. mant.* 88. t. 414. f. 4. *Seb. thes.* 1. p. 38. t. 23. f. 6.
Habitat in Æthiopia. †

5600. indica, 9. ASPALATHUS foliis quinatis sessilibus.
Genista foliis quinatis sessilibus, pedunculis axillaribus capillaribus unifloris, floribus minimis. *Fl. zeyl.* 271. *
Lotus tenuifolius maderaspatanus, siliqua singulari glabra. *Pluk. alm.* 225. t. 201. f. 2.
Dorycnium indicum, floribus singularibus rubris in pedicellis oblongis, siliquis perexiguis. *Raj. suppl.* 471.

manneli Manelli. *Rheed. mal.* 9. p. 69. t. 37. *quod Dorycnium per*
apalathus *habitat in India.* † *araneosa. fl. 4. 5. crata Dorycnii*
creta. 2. l. 21. p. 11. 12. 13.

fol. lisse
Legum. cant
Aspalathus 10. ASPALATHUS foliis trinis cuneiformibus glabris: lateralibus brevioribus, stipulis obsoletis, floribus congestis. *Barba joni critica linearis folio fl.*
Genista arborea cretica, foliis sempervirentibus. *Zgn. hist.* 99. t. 39. *Monte. Parion. sup. hist.* 42. fol. *Barba joni. pag. 44. Tab. 29.*
Crete. (1754.)
Habitat in Æthiopia. †

tridentata. 11. ASPALATHUS foliis trinis lanceolatis glabris, stipulis tridentatis mucronatis, floribus capitatis.
Habitat in Æthiopia. †

DIADELPHIA DECANDRIA.

12. ASPALATHUS ⁷¹³ foliis trinis linearibus sericeis, sti-
pulis simplicibus mucronatis, floribus sparsis tomen-
tosis. *spica conica terminali 1 pollice*

Cytisus africanus angustifolius, sericea lanugine argen-
tatus, spica lagopoide. *Pluk. mant. 63. ? cytisus afr. Riv f. 264*

Habitat in Æthiopia. *Tab 386. fig. 8*

13. ASPALATHUS foliis trinis subulatis æqualibus, sti-
pulis subrotundis callosis, floribus spicatis glabris. *terminali 1/2 pollicari*

Cytisus trifolius, juniperinis foliis, floribus luteis in
spicam densiorem adactis. *Pluk. mant. 63. t. 345. f. 4. A*

Habitat in Æthiopia. *h. D. Royenus plurimas has A-
chyronias amicissime communicavit.*

AMORPHA.

1. AMORPHA. *Hort. cliff. 353. t. 19. Hort. ups. 208. fruticosa. •
Roy. lugdb. 393.*

Barba jovis americana, pseudo-acaciæ foliis, flosculis
purpureis minimis. *Anglic. hort. II. t. 4.*

Habitat in Carolina. *h*

ÆSCHYNOMENE.

1. ÆSCHYNOMENE caule scabro, leguminum arti-
culis medio scabris. *aspera.*

Æschynomene caule scabro, folio infimo quadripinni.
*Hort. cliff. 365. Hort. ups. 233. Fl. zeyl. 298. * Roy.
lugdb. 384.*

Mimosa non spinosa major zeylanica. *Breyn. cent. 51.
t. 52. Raj. hist. 982.*

Habitat in India. *o*

2. ÆSCHYNOMENE caule hispido foliolis acumina-
tis, leguminum articulis suborbiculatis. *americana,
Roy. lugdb. 384.*

Hedysarum caule hirsuto, mimosæ foliis alatis: pinnis a-
cutis minime gramineis. *Slaan. jama. 74. hist. I. p. 1.*

186. f. 3.

Habitat in Jamaica. *jeu ai coupe la
figue*

3. ÆSCHYNOMENE caule lævi arboreo, leguminum
articulis semicordatis glabris. *arbores.
Roy. lugdb. 384.*

Habitat in *h*

4. ÆSCHYNOMENE caule lævi herbaceo, foliolis ob-
tusis, leguminibus lævibus hinc obtusis torosis. *indica.
Roy. lugdb. 385. Sylvest. Ind. v. 50. p. 114. gajati. Rumph.
47. 24. ad. 328.*

Y y 5

Nell-

gajalia
Neli-tali. Malay.
Nalabi. Braem.

714
DIADELPHIA DEGANDRIA.

Neli-tali. Rheed. mal. 9. p. 31. t. 18.
Habitat in India.

Sesban. alp. 5.
Sesban. ad 327.

ÆSCHYNOMENE leguminibus subæqualibus lævi-
bus.

Galega ægyptiaca, filiquis articulatis. Baub. pin. 352.
Sesban. Alp. ægypt. 81. t. 82.

altissimæ generis act.
plantæ arvi.

Habitat in Ægypti sepibus. D. Hasselquist.
Legumina non articulata, sed lævia & equalia sunt. Ca-
lyces campanulati, æquales, quinquedentati, patentes.

GALEGA.

Galega. ad 322.
officinatis.

1. GALEGA. Hort. cliff. 362. Hort. ups. 208. Mat.
med. 349. Roy. lugdb. 386.

galega. math. Do.
Ruta capriua. Lat.
capriua. vulgo. Lat.
Castrocaro. Ital. & Latinis.
avanese. Ital.

Galega vulgaris. Baub. pin. 352. Moris. hist. 2. p. 91.
f. 2. t. 7. f. 9.

Habitat in Italia, Hispania, Africa, ad margines agro-
rum. & contra venus, Epilepsiam valet

CROTALARIA,

* Foliis simplicibus.

Crotalaria. ad 323
perfoliata.

1. CROTALARIA foliis cordato-ovatis perfoliatis.
Crotalaria perfoliatæ folio. Dill. elth. 122. t. 102. f.
122.

Habitat in Carolina.

Crotalaria. ad
sagittalis.

2. CROTALARIA foliis simplicibus lanceolatis, petio-
lis decurrentibus solitariis. Hort. cliff. 357. * Gron.
virg. 81. Roy. lugdb. 374.

Crotalaria americana, caule alato, foliis pilosis, floribus
in thyrsis luteis. Mart. cent. 43. t. 43.

Crotalaria hirsuta minor americana herbacea, caule ad
summum sagittato. Herm. lugdb. 202. t. 203. Pluk.
alm. 122. t. 269. f. 6.

β. Crotalaria sagittalis glabra, longioribus foliis, america-
na, Pluk. alm. 122. t. 277. f. 2. ^{margin. ss.}
Habitat in Brasilia, Virginia. ^{sp. hirsuta. caule alato}

Crotalaria ad
juncea.

3. CROTALARIA foliis simplicibus lanceolatis petiola-
to-fessilibus, caule striato. Hort. cliff. 357. * Hort.
ups. 210. Roy. lugdb. 374.

Crotalaria benghalensis, foliis genistæ hirsutis. Pluk. alm.
122. t. 169. f. 5.

Habitat in India. ☉

4. CRO-
Kedanga. hira. 62. 27. Machum. Mananga. Pista d'agava. hira
Spinescopum hira. Sucta 10 ped. hira. fl. 14 ad 40 perium
flor 5 ad 10. spidat. anthe. Roy. ups. subact. 4 ad 5 ped. tunc
spec. in Sesban.

*Katon Tandale cotti. h. an. g. 2. 26. Sacoli gayeri. Manu folio ovali aut simpl. Ludov. de
fl. p. luteo. P. 4. C. 4. g. 4.*

DIADELPHIA DECANDRIA. 715 *Crotalaria ad*

4. CROTALARIA foliis simplicibus oblongis cuneiformibus retusis. *retusa.* Fl. zeyl. 276. * *fl. luteo. Cal. 5 pd. fl. p. luteo.*
Crotalaria asiatica, floribus luteis, folio singulari cordiformi. Herm. lugdb. 200. t. 201.
Tandale-Cotti. Rheed. mal. 9. p. 45. t. 25. *Schama gayeri. Manu.*
Habitat in India. *fl. p. luteo. P. 4. C. 4. g. 4.* *Crotalaria ad*

5. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis sessilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris. *triflora.*
Habitat in Asia. D. Royen. *Crotalaria ad*

6. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis villosis, petiolis simplicissimis, ramis teretibus. *villosa.* Hort. cliff. 357.*
Roy. lugdb. 374.
Crotalaria arbor africana, styracis folio molli incano. Pluk. alm. 122. t. 185. f. 2,
Genista arborefcens africana, styracis folio. Herm. lugdb. 170. t. 271.
Habitat in Æthiopia. *h* *Crotalaria ad*

7. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis, stipulis semicordatis, ramis tetragonis. *verrucosa.* Fl. zeyl. 277.*
Crotalaria foliis ovatis, petiolis duplici stipula auctis, ramis tetragonis. Hort. cliff. 357.*
Crotalaria asiatica, folio singulari verrucoso, floribus caeruleis. Herm. lugdb. 199. t. 199. Raj. hist. 1893.
Pee-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 53. t. 29. *Putta gayeri. Manu.*
Habitat in India. *fl. p. luteo. P. 4. C. 4. g. 4.* *Crotalaria ad*

* *foliis compositis.*

8. CROTALARIA foliis ternatis obovatis, floribus lateralibus subracemosis. *latifolia. Syl. vely.*
Crotalaria loti folio, flore parvo variegato. Dill. elth. 121. t. 102. f. 121. *Crata Brasil. p. 112*
Crotalaria trifolia fraticosa, foliis glabris, flore e luteo viridi minore. Sloan. jam. 114. hist. 2. p. 33. t. 176. f. 1. 2. *Erva d'amar. Lugb.*

Habitat in Jamaica. *vix ramis videtur. P. 4. C. 4. g. 4.* *Crotalaria ad*

9. CROTALARIA foliis ternatis ovatis acutis, stipulis semicordatis lunatis. *lunaris.*
Crotalaria foliis ternatis; foliolis sessilibus, petiolis stipula duplici auctis. Hort. cliff. 357.*
Habitat in Africa. *Crotalaria ad*

10. CROTALARIA foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis nullis, leguminibus pedicellatis. Fl. zeyl. 278.*
Crotalaria *laburnifolia.*

Crotalaria asiatica frutescens, ^{foliis} foliis luteis amplis, trifolia.
Herm. lugdb. 196. t. 197. Raj. hist. 1893.
Nella-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 49. t. 27.
Habitat in Asia. *gogeri Anam. Syn.*

incana
Peroni. ad 323

11. CROTALARIA foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis nullis, leguminibus hirsutis.

Crotalaria foliis ternatis, petiolis nudis. Hort. cliff. 358.
* Hort. ups. 210. Roy. lugdb. 375.

Crotalaria trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, floribus spicatis e viridi luteis, fructu pubescente. Sloan. jam. 141. hist. 2. p. 34. t. 179. f. 1. Raj. suppl. 466.
Habitat in Jamaica & Caribæis.

alba
Peroni. ad

12. CROTALARIA foliis ternatis lanceolato-ovatis, caule lævi herbaceo, racemo terminali. Hort. cliff. 499.*
Roy. lugdb. 375.

Anonis caroliniana perennis non spinosa, foliorum marginibus integris, floribus in thyrso candidis. Mart. cent. 44. t. 44.

Habitat in Carolina. 2

anoni
quinquefolia

13. CROTALARIA foliis quinatis ^{legumini} *legumini. retusa.*
Wellia-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28.
Habitat in India. *Syn. sur. inflata. Raj.*
Foliola angusto-lanceolata, obtusa, sepe retusa.

ONONIS.

* Floribus sessilibus.

Peroni
ad 323.

1. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, ramis spinosis.

Ononis floribus subsessilibus solitariis lateralibus, caule spinoso. Hort. cliff. 359. Fl. suec. 623. Mat. med. 357. Roy. lugdb. 375.

Anonis spinosa, flore purpureo. Bauh. pin. 389.
Anonis. Fuchs. hist. 60.

2. Ononis floribus subsessilibus solitariis lateralibus, ramis inermibus. Hort. cliff. 359. Fl. suec. 622. Roy. lugdb. 375.

Anonis spinis carens purpurea. Bauh. pin. 389.

Anonis mitior 1. Clus. hist. 99.

Habitat in aridis Europæ. 2

Hæc lævis 3. est prima æstate, post aculeos & contrahit.
Læf. pruss. 17.

Folia in caule ternata; Floralia vero simplicia. Flores duo propriis pedunculis exeunt simul ex foliorum ala; Rami inferiores spina terminati.

spinosa.
anoni. fuchs.
anoni. math. cod.
anoni. dion.
anoni. theophr.
anoni. croton.
anoni. boiss. ray.
anoni. cod.
1. antiquum
L. n. 474

2. ONONIS caulibus diffusis, ramis erectis, foliis cauli-^{repens.} nis ternatis. *reponit ad 323*

Anonis maritima procumbens, foliis hirsutis pubescentibus. *Pluk. alm. 33. Dill. elth. 29. t. 25. f. 28.*

Habitat in Angliæ littoribus maris. 2

Affinis admodum precedenti, differt caulibus-procumbentibus undique diffusis, & quod minor; Flores ex alis solitarii (quorum non memor) speciem determinabunt. 0 3 pollicar. erui subripit. fl. caucis erecti. Legum. pedic.

3. ONONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus ^{minutissima.} ternatis petiolatisque, stipulis fetaceis. *reponit ad 12 ep*

Anonis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis & stipulis longas fetas exerentibus. *Sauv. monsp. 190.*

Anonis floribus lateralibus sessilibus solitariis, petiolis longissimis. *Roy. lugdb. 375.*

Anonis lutea sylvestris minima. *Col. ecphr. 1. p. 304* *2^e ep* *3^e ep*

Anonis spinosa lutea minor. *Baub. pin. 389.*

Anonis lutea montana non spinosa minima. *Barr. ic.*

1107.

Habitat in Italia, Monspelii. *reponit Cheloni. 4^e ep* *1. n. 479.*

4. ONONIS stipulis floralibus ovatis membranaceis intergerrimis. *Roy. lugdb. 376.* *mitissima.* *reponit ad*

Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. *Dill. elth. 28. t. 24. f. 27.*

Anonis purpurea spicata erecta annua latifolia, filiquis rectis latiformibus. *Moris. hist. 2. p. 169. f. 2. t. 17. f. 4.*

Habitat in Barbados, Lusitania. 0

5. ONONIS spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis. *reponit ad* *alopecuroides* *323*

Anonis floribus spicatis. *Hort. cliff. 358. Roy. lugdb. 376.* *reponit ad*

Anonis ficula alopecuroides. *Tournef. inst. 408.*

Anonis purpurea spicata alopecuroides major. *Boerb. lugdb. 2. p. 33.*

Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania. 0

6. ONONIS stipulis bracteisque acute serratis. *Roy. lugdb. variegata. 376. **

Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia maritima. *Tournef. inst. 409.*

Habitat in Europæ australis maritimis.

* Floribus pedunculatis.

7. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ^{Natrix.} ternatis. *reponit ad* *Plin. 16.*

4 1² p. 1 folii flou roseum subgrasulosa. pinha.

fol. barto.

fol. flouosa simplicis stipula 2. un ipse bifurca petiolus flis annu.

fl. ruppia. buntunda totum apud pedunculo inced. rigido. velat. pinna in dno.

infertum abanata litarum. stilo huiusmodi.

cal. 1 p. 5 p. 1. cal. longis. cor lepat. cordi. ipse melleo apud dno.

utrum 10. 1 ad dno.

ternatis. *Hort. cliff.* 358. * *Roy. lugdb.* 375. *Sauv monsp.* 189.

Anonis viscosa spinis carens lutea major. *Baub. pin.* 389.

Ononis lutea. *Cam. epit.* 445.

Natrix. *Riv. tetr.* 68.

β. Anonis viscosa, spinis carens, lutea minor. *Baub. pin.* 389.

Anonis viscosa minor, flore pendulo. *Baub. prodr.* 156.

γ. Anonis lutea mitis oxitriphylla ad florum petiolos capreolata. *Pluk. alm.* 33. t. 135. f. 5.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, inter segetes. 4

*mononi
viscosa.*

8. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis simplicibus.

Ononis pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis simplicibusque. *Sauv. monsp.* 189?

Anonis lutea viscosa latifolia minor, flore pallido. *Barr. rar.* 840. t. 1239.

Anonis viscosa, spinis carens lutea latifolia annua. *Magn. monsp.* 21?

Habitat Monspelii. ☉

Differt ab O. Natrice foliis simplicibus & radice annua.

2. Gen. *ornithopodioides.* 9. ONONIS pedunculis bifloris filo terminatis. *Roy. lugdb.* 376.

Pallas. ad. ad. Sallas. Anonis filiquis ornithopodii. *Bærh. lugdb.* 2. p. 34.

326. *Botan.*

Fœnum græcum ficulum, filiquis ornithopodii. *Tournef. inst.* 409.

Habitat in Sicilia ad Capo passaro. c. in Syl.

• *tridentata.*

Leponis ad.

10. ONONIS foliis ternatis carnosis sublinearibus tridentatis.

Anonis hispanica frutescens, folio tridentato carnosio. *Tournef. inst.* 408. *Magn. monsp.* 17. t. 17. *Raj. suppl.* 466.

Habitat in Hispania. †

• *fruticosa.*

Leponis ad.

11. ONONIS floribus paniculatis, pedunculis subtrifloris, stipulis vaginalibus, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 358. * *Roy. lugdb.* 376.

Anonis montana præcox purpurea frutescens. *Dodart. act.* 4. p. 249. t. 249.

Anonis purpurea frutescens non spinosa. *Dodart. mem.* 57. t. 57.

Anonis purpurea verna præcox frutescens, flore rubro amplo. *Moris. hist.* 2. p. 170.

Habitat in montibus Delphinatus. †

DIADELPHIA DECANDRIA.

719

Vernonia

- 12. ONONIS pedunculis axillaribus trifloris nudis, foliis ternatis. Hort. cliff. 358. * Roy. lugdb. 376. *rotundifolia*
- Cicer sylvestre latifolium triphyllum. Baub. pin. 347. *Vernonia ad 323*
- Cicer sylvestre tertium. Dod. pempt. 525.
- Cicer sylvestre verius. Lob. ic. 2. p. 73.
- Habitat in Alpibus Helveticis. *Habitat*

ANTHYLLIS.

* Herbaceae.

Vulneraria ad 321.

- 1. ANTHYLLIS herbacea, foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. Hort. upf. 221. * Sauv. monsp. 237. *tetraphylla.*
- Anthyllis foliis quinato-pinnatis inæqualibus, floribus lateralibus. Hort. cliff. 371. Roy. lugdb. 389.
- Lotus pentaphyllos vesicaria. Baub. pin. 332.
- Trifolium halicacabum. Cam. hort. 171. t. 47.
- Habitat in Italia, Sicilia. ☉
- Folium pinnatum tetraphyllum loco pentaphylli, cum foliolum infimum opposito careat. *Vulneraria ad 321.*

- 2. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Vulneraria. 321. I. Gen.*
- Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus: terminali majore. Hort. cliff. 371. Fl. suec. 594. Roy. lugdb. 389. *anthylli. 1. gal. Dod. p. 189. Lagopodium Tab. arthetica. Thob.*
- Lotus affinis Vulneraria pratensis. Baub. pin. 332.
- Lagopodium flore luteo. Tabern. ic. 925.
- β. Vulneraria supina, flore coccineo. Dill. elth. 431. t. 320. f. 413. *Vulneraria. 321. I. Gen.*
- Habitat in pratis Europæ borealioris. 4 *montana. 2. Gen.*

- 3. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis æqualibus, capitulo terminali. *Vulneraria. 321. I. Gen.*
- Vulneraria foliis pinnatis æqualibus: sub umbella palmatis. Hall. helv. 569. Sauv. monsp. 237.
- Astragalus villosus, floribus globosis. Baub. pin. 351.
- Astragalus purpureus. Dalech. hist. 1347.
- Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Galloprovincia. 2

- 4. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulis solitariis. *cornicina.*
- Habitat in Hispania. Læfl. ☉
- Caulis ramosus, spithamæus. Folia pinnata: foliolis 5. f. 7, ovali-lanceolatis, impari paulo majore. Pedunculi axillares, pilosi, longitugine foliorum. Capitula lateralia & terminalia pedunculata ex 10 a 12 floribus, rotunda, pilosa, folio ternato aut pinnato excepta. Calyces subrotundi, inflati.

5. AN-

lotoides.

5. ANTHYLLIS herbacea, foliis tripartitis, calycibus prismaticis fasciculatis longitudine leguminum.

Habitat in Hispania. Læfl. ☉

Planta pilosa, procumbens. Folia caulina ternata, lateralibus basi coadunatis in unum cuneiforme, intermedio subsessili. Stipulæ magnitudine & figura foliorum. Folia floralia ternata, sessilia, absque stipulis. Capitulum ex 5. s. 6. floribus, Calycibus admodum oblongis ratione planta, angustis, prismaticis, parallelis, pilosis. Flores lutei. Legumina cylindrica, longitudine calycis, eoque vestita. Stamen decimum distinctum. Habitus ita antecedentium, ut facies vetat genere distinguere.

Barba jovis ad. 321.

* Fruticose.

2. Gen.

Barba jovis.

6.

- ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis æqualibus, floribus capitatis. Hort. cliff. 371. Hort. upf. 221. Roy. lugdb. 379. Sauv. monsp. 237.

Barba jovis. Bauh. pin. 397.

Barba jovis pulchre lucens. Bauh. hist. 1. p. 385.

Habitat in Helvetia. ☿

• Cytisoides.

7. ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis inæqualibus, calycibus lanatis lateralibus. Anthyllis fruticosa, foliis ternatis: intermedio productiore. Hort. upf. 221.

Cytisus foliis ovatis acutis nitidis, floribus lateralibus. Roy. lugdb. 370.

Cytisus incanus, folio medio longiore. Bauh. pin. 390.

Cytisus VI. Clus. hist. 1. p. 96.

Spartium latifolium, parvo flore. Barr. ic. 1182.

Habitat in Hispania. ☿

• hermannica.

8. ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis sessilibus, calycibus nudis. *Barba jovis græca (Linnæus filio).*

Dorycnium foliis solitariis, floribus ad alas confertis. Hort. cliff. 370. *

Habitat in Græcia. ☿

Calyces in hac vix ventricosi, at Habitus cum precedenti idem.

Erinacea ad. 324.

3. Gen.

Erinacea. ad.

9.

- ANTHYLLIS fruticosa spinosa, foliis simplicibus. Genista-spartium spinosum, foliis lenticulæ, floribus ex cæruleo purpurascens. Bauh. pin. 394.

Erinacea. Clus. hist. 1. p. 107.

Habitat in Hispania. ☿

Tota