



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Tota constat spinis; ad ramorum exortum squama ovata;
Folia oblongo-ovata, tomentosa, ad flores posita sepi-
us terna.

LUPINUS.

1. LUPINUS calycibus alternis inappendiculatis: labio perennis.
superiore emarginato, inferiore integro.

Lupinus calycibus alternis, radice perenni repente. Gron. *Lupinus ad 323*
virg. 172.

Lupinus radice reptatrice perenni. Roy. lugdb. 531.

Lupinus cæruleus minor perennis virginianus repens.
Moris. hist. 2. p. 87. s. 2. t. 7. f. 6.

Habitat in Virginia. ☿

Folia ex foliolis 8, lanceolatis, obtusis, glabris. Racemi
longissimi floribus alternis, sepius 2 ex singulo alterno
puncto, pedicellis propriis insidentibus.

2. LUPINUS calycibus alternis inappendiculatis: labio su-
periore integro, inferiore tridentato. Hort. cliff. 49.

Hort. upf. 209. Mat. med. 350. Roy. lugdb. 366.

Lupinus caule composito. Hort. cliff. 359.

Lupinus sativus, flore albo. Baub. pin. 347. Clus. hist.
2. p. 228.

Lupinus flore albo. Riv. tetr. *fy 211.*

Habitat - - - ☉

3. LUPINUS calycibus femiverticillatis appendiculatis: *varius.*

labio superiore bifido, inferiore subtridentato. Hort. cliff. 499. Hort. upf. 209. Roy. lugdb. 367.

Lupinus sylvestris, flore cæruleo. Baub. pin. 348.

Lupinus sylvestris, flore purpureo, semine rotundo va-
rio. Baub. hist. 2. p. 291.

Habitat Messanæ, Mospelii inter segetes. ☉

4. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio hirsutus.

superiore inferioreque integris. Hort. cliff. 499. Hort. upf. 209. Roy. lugdb. 367.

Lupinus peregrinus major s. villosus cæruleus major.

Baub. pin. 348. prodr. 148. *Lupinus com. Riv. f. 213*

Lupinus exoticus hirsutissimus. Baub. hist. 2. p. 280.

Habitat - - - ☉

5. LUPINUS calycibus alternis appendiculatis: labio su-
periore bipartito, inferiore integro.

Lupinus angustifolius cæruleus elatior. Raj. hist. 908.

Lupinus flore cæruleo minore. Riv. tetr. *fy 214*

Habitat - - - ☉

Z z

6. LU-

Caragana monardi. P. Pin 503. - hisp. flore alodora sed gaudere racemulorum
 Caragana Delilei } Racina pinguis oblonga in uera hisp. flore alodora sed gaudere racemulorum
 Caragana Delilei } Duple aut uera pater illam alodora pater in Cathagine crystalli modo
 Flakvalilica Pankvill. her. } hispida affertur quae Caragana junior. monardi.

DIADELPHIA DECANDRIA.

+ ^{luteo.}
 Lupinus ad. 323.

6. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio superiore bipartito, inferiore tridentato. Hort. cliff. 499. Hort. upf. 209. Roy. lugdb. 367. Sauv. monsp. 215.

Lupinus sylvestris, flore luteo. Baub. pin. 348. Riv. tetr.

Lupinus flore luteo, semine compresso vario. Baub. hist. 2. p. 291.

Habitat in Siciliae arenosis. ☉ 1/2 ped. in Normaniae agris colitur fl. purpurea
 Huic flores subsessiles, bracteis ovatis.
 fl. angusta, v. h. s. s. s.

ROBINIA.

Robinia ad. 323

+ PseudoAcacia.

1. ROBINIA pedunculis racemosis, foliis impari-pinnatis. Hort. upf. 212.

Robinia aculeis geminatis. Hort. cliff. 354. Gron. virg. 82. Roy. lugdb. 372.

Acacia americana, filiquis glabris. Raj. hist. 1719.

Acaciae affinis virginiana spinosa, filiqua membranacea plana. Pluk. alm. 6. p. 73. t. 4.

Habitat in Virginia. 5

Conf. Pseudo-Acacia hispida, floribus roseis. Catesb. car. 3. p. 20. t. 20.

Agatis ad. 326.

26 ROBINIA pedunculis subdivisis, foliis pinnatis, floribus foliolo majoribus.

Galegae affinis malabarica arborecens, filiquis majoribus articulatis. Raj. hist. 1734.

Sesban affinis arbor indiae orientalis. Breyn. prodr. 1. p. 47. Comm. mal. 244.

Agaty. Rheed. mal. 1. p. 95. t. 51.

Habitat in India. 5

Arbor crassa, inermis. Folia pinnata: Foliola obtusa. Flores inter papilionaceos maximi, magnitudine ovi gallinacei. Vexillum ovatum, patens. Alae ovato-oblongae, versus apicem sursum falcatae. Carina alis conformis. Stamina ad basin valde sursum flexa & reflexa. Stamina diadelpa. Stigma obtusum.

Caragana
 Robinia ad.

3. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis abrupte pinnatis. Hort. upf. 212.

Aspalathus arborecens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis. Amm. ruth. 285.

Caragana fibrica. Roy. lugdb. 537.

Habitat in Sibiria. 5 6 ped. fl. annua 1. ped. fl.

fl. confusa 4 ad 6. perian. abrupti. Pseudoacaciae
 racemulorum pater. fl. sicut anille. 1/2 ped. pedicel.
 Cal. 4. ped. 5. dent. pedicel. 2. ped. pedicel.
 Cor. 5. ped. Carina 2. ped. apic. luteo. crumena
 stam. 10. 2 adaliqua 1. ped. 1. ped. 1. ped. 1. ped.
 Ovar. 1. ped. 1. ped. 1. ped. 1. ped.

4. ROBI-

Petit par à gouter. Pater
 Phaeolus hirsutus in uera hisp. flore alodora sed gaudere racemulorum
 Phaeolus hirsutus in uera hisp. flore alodora sed gaudere racemulorum

... el nomen Indicum in garia et flut. Robinia fructu. fructu

DIADLEPIA DECANDRIA. 723

- 4. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis petiolatis. Hort. ups. 212. frutex. 9 apothecis
- Aspalathus frutescens major latifolius, cortice aureo. Amm. ruth. 283. Robinia ad 323
- Habitat in Sibiria, Tataria. h
- 5. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis sessilibus. Hort. ups. 212. pygmaea.
- Aspalathus frutescens minor angustifolius, cortice aureo. Amm. ruth. 282. t. 35.
- Habitat in Sibiria. h
- Vix haec sufficienter, a priori, distincta.

COLUTEA.

- 1. COLUTEA arborea, foliolis obcordatis. Hort. cliff. 365. Hort. ups. 228. Roy. lugdb. 374. Sauv. monsp. 233. arboreescens. +
- Colutea vesicaria. Baub. pin. 396. Colutea. Dod. pempt. 784. Colutea. Theophr. gal. 1024. t. 10.
- 2. Colutea africana, sennae foliis, flore sanguineo. Comm. rar. II. t. II. +
- Habitat in Austria, G. Narbonensi, Italia praecipue ad Vesuvium. h
- 3. COLUTEA fruticosa, foliolis ovato-oblongis. Hort. cliff. 366. Hort. ups. 228. Roy. lugdb. 374. frutescens. +
- Colutea aethiopica, flore purpureo. Breyn. cent. 70. t. 29. +
- Habitat in Aethiopia. 2. h
- 4. COLUTEA herbacea, foliis linearibus. Hort. ups. 266. Roy. lugdb. 374. herbacea. +
- Colutea africana annua, foliolis parvis mucronatis, vesiculis compressis. Comm. hort. 2. p. 87. t. 44. Colutea ad Coluteastrum. hist.
- Habitat in africa. ☉

PHASEOLUS.

* Scandentes.

- 1. PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis. Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis compressis torosis. Roy. lugdb. 367. Hort. ups. 213. Mat. med. 351. Phaseolus vulgaris. Lob. ic. 59. Hort. cliff. 359. Smilax hortensis f. Phaseolus major. Baub. pin. 339. Habitat in India. ☉

Cacomechys 2 2 3
 Phaseolus simplicissimus floru violaceo, siloquib latioribus legumibus fulvo durissimis. Baurin. } anouagou 1.° Sun Koumata - Kaim Poi de Kouma. Baurin
 Phaseolus latine durissimus nigro. Baurin. } anouagou 2.° Sun
 Phaseolus purpureus lamina parva nigro venato. Baurin. cum p. m. m. m. t. d.

OKindigun. Virginia. Phaseolus peregrinus horticola. minor latis albo, multis, nigri. ...
alubia. tunc. Phaseolus peregrinus, minore fructu albo nigra macula insigniti. A. d. 1740.
nigra. nict. ...
Dolichos. ...
Dolichos. ...
724

DIADELPHIA DECANDRIA.

Phaseolus coccineus.
Phaseolus ad. 325
Phaseolus ...
X

2. PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis.
Phaseolus puniceo flore. Cornut. canad. 184.
Phaseolus indicus, flore coccineo s. puniceo. Morif. hist. 2. p. 69.
Habitat - - - - ☉

lunatus.
Soldia adany
à S. Soldia. Botanica.

3. PHASEOLUS caule volubili, leguminibus acinaciformibus sublunatis lævibus.
Phaseolus benghalensis scandens, filiqua acinaciformi, semine ovato compresso striato. Berg. viadr. 99.
Habitat in Benghala. ☉
Foliola lateralium exteriori latere duplo latiora. Flores minimi, virides: alis albis concavis, dein flavescentibus; carina spirali.

inamœnus.

4. PHASEOLUS caule volubili, florum vexillo revolutato, calycibus concolore. *Hort. cliff. 359. **
Habitat in Africa. ☉

fl. p.
farinosus.

5. PHASEOLUS caule volubili, pedunculis subcapitatis, seminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Hort. upf. 214.*
Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso. Niff. act. 1730. p. 577. t. 42.
Phaseolus indicus, hederæ folio anguloso, semine oblongo lanuginoso. Raj. suppl. 348.
Habitat in India.

oscillatus.

6. PHASEOLUS caule volubili, vexillis revolutis patulis, leguminibus linearibus strictis.
Phaseolus radice annua, leguminibus strictis erectis torosis linearibus, caule hirtuto. Roy. lugdb. 367.
Phaseolus flore odorato, vexillo amplo patulo. Dill. elth. 313. t. 234. f. 302.
Habitat in Havana. ☉

helvulus.

7. PHASEOLUS caule volubili, floribus capitatis, calycibus bracteatis, vexillis brevibus, alis expansis maximis.
Phaseolus radice annua, leguminibus erectis linearibus teretibus glabris. Roy. lugdb. 368.
Phaseolus flore helvulo, alis amplis patulis. Dill. elth. 312. t. 233. f. 300.
Habitat in Carolina. ☉

Katjang Cina. Rumph. 1744. Phaseolus aest. min. sem. sphericis albis ...
... hato nigri ...
fol. phasali ...
8. AHA-

Cotyle ...
Sampson ...
... 7 aap.
Phaseolus ...

DIADELPHIA DECANDRIA. 725

8. PHASEOLUS caule volubili, floribus laxe spicatis, alatis, alis longitudine vexilli.

Phaseolus flore purpureo, alis amplis longe protensis. Dill.

eltb. 314. t. 235. f. 303

Habitat - - - - -

9. PHASEOLUS caule volubili, vexillis carinaque spiritaliter convolutis.

Phaseolus radice perenni subrotunda, leguminibus folio longioribus teretiusculis glabris. Roy. lugdb. 367.

Phaseolus indicus, cochleato flore. Tournef. obs. 93. t.

94. Raj. hist. 1890. Zulfet avoy. Curcar. i.e. Ampelora fipm de la nouvelle serie.

Habitat in India.

* erecti.

10. PHASEOLUS caule erecto tereti, floribus capitatis, radiatus, leguminibus cylindricis horizontalibus. Act. stockh.

1742. p. 202. t. 7. f. 2. Hort. upf. 213. Fl. zeyl. 281.

Phaseolus zeylanicus, filiquis radiatim digestis. Dill. elt.

315. t. 235. f. 304.

Habitat in China, Zeylona. ☉

11. PHASEOLUS caule erecto anguloso hispido, leguminibus pendulis hirtis. Hort. cliff. 499. Roy. lugdb.

367. Fl. zeyl. 280.

Phaseolus orthocaulis, Mungo perfarum. Herm. mex.

887. Cadetei. Rayn. 5. t. 180. fl. per. Ray. Ind. 31. t. 1. p. 170.

Habitat in India. ☉

DOLICHOS

1. DOLICHOS leguminibus ovato-acinaciformibus, seminibus ovatis hilo arcuato versus alteram extremitatem. Roy. lugdb. 368. Hort. upf. 214.

Phaseolus ægyptius, nigro semine, Bauh. pin. 341.

Phaseolus niger Lablab. Alp. aegypt. 74. t. 75. Vest. aegypt. 27.

Habitat in Ægypto. ☉

Legumina dorso scabra. Caules ramique teretes, retrorsum scabri. Pedunculi semiverticillati.

2. DOLICHOS leguminibus capitatis subcylindræis: unguiculatus apice recurvo concavo. Hort. upf. 214.

Habitat in Barbados.

3. DOLICHOS leguminibus gladiatis dorso sulcatis, seminibus arillatis. Hort. upf. 360. Sauv. meth. 192.

Habitat in Barbados.

Phaseolus - - - - -

Phaseolus - - - - -

Phaseolus - - - - -

Phaseolus - - - - -

Phaseolus - - - - -

Phaseolus - - - - -

Phaseolus - - - - -

Mater. ely. v. Hondæ
Cognatillo. ely.
? mucrona
Roguar de cog.

Phaseolus ad. 325.
Caracalla. +
Zulfet avoy. Curcar
Saliangoy. grec.

Lampadde. Cana. malai
Max. maffi. ant
maise. ely
S. mangy. Sordan. ant
tun. Vipayan

Lablab. ely. upf
Lap. lab. ely. I. Gen.
Mandaria. Brath
Z. Lablab. ad 325

Canavalia ad 325
macharoblu

Phaseo-
anacath. ely. abw.
ad. 754.
Bairap. ely
Macouua. ely
Macouua. Prop. mangy

Kate Grand in. 8243. fl. 3. uniu. crada. fl. ellipt. uniu. p. 1.
ed. 1817. Syll. bot. Lond. 7. ann. Conavali. Brach. Phacel. p. 1. de lobis

DIADELPHIA DECANDRIA.

726

Baranareca him. 8244. fl. ovata acuta phaceli.
1817. 1. ped. 1. 2. 4. Ca. cara prauary Aug. 92. 135
caud. p. 1. 2. 4. caud. la
in in gaudia.

Phaseolus maximus, filiqua ensiformi nervis insignita &
femine albo membranula incluso. Sloan. hist. 1. p.
177. t. 114. f. 1. 2. 4. Ca. cara prauary Aug. 92. 135

Habitat in Jamaica. fl. Phacel. body p. 1. 2. 4.

Kate Baranareca him. 8245.
fl. ovata acuta
minimus.
fl. p. 1. 2. 4. Ca. cara prauary Aug. 92. 135
caud. p. 1. 2. 4. caud. la
in in gaudia.

4. DOLICHOS le uminibus racemosis compressis tetra-
permis, foliis rhombæis.

Dolichos minimus, floribus luteis. Hort. cliff. 360. t.
21. * Hort. ups. 214.

Phaseolus minimus foetidus, floribus spicatis e viridi lu-
teis, femine macuiato. Sloan. hist. 1. p. 182. f. 115. f. 1.
Habitat in Jamaica.

scarabæoides

5. DOLICHOS caule volubili, foliis ovatis tomentosis,
floribus solitariis, seminibus bicornibus. Fl. zeyl. 282. *

Phaseolus minimus binagaricus, foliis argenteo-villosis,
filiquis torosis brevibus spadicea hirtutie pubescenti-
bus, fructu parvo scarabæoide nigro. Pluk. alm. 290.
t. 52. f. 3.

Habitat in India.

erosus

6. DOLICHOS caule volubili, foliis glabris multangu-
lis, dentatis.

Phaseolus nervicensis, foliis multangulis, tuberosa radice.
Pluk. alm. 292. t. 54. f. 4.

Habitat in America. ☉

trilobus

7. DOLICHOS foliolis lateralibus extrorsum gibbis: in-
termedio trilobo. Hort. cliff. 360. *

Phaseolus maderaspatanus, foliis glabris trilobis, floribus
exiguis, longis petiolis ex eodem puncto geminis. Pluk.
alm. 292. t. 214. f. 3

Habitat in India.

regularis

8. DOLICHOS foliis ovatis obtusis, pedunculis multifloris,
petalis æqualis magnitudinis figuræque. Gorn. virg. 82.

Habitat in Virginia.

lignosus

9. DOLICHOS caule perenni, pedunculis capitatis, legu-
minibus strictis linearibus.

Dolichos caule perenni lignoso. Hort. cliff. 360. t. 20.

Phaseolus indicus perennis, floribus purpurascensibus.
Eichr. carol. 36.

Habitat - - - - -

polystachios

10. DOLICHOS caule perenni, spicis longissimis, pedi-
cellis geminis, leguminibus acuminatis compressis.

Dolichos caule lignoto, pedunculis ex ala plurimis, flo-
ribus

Coode Popon { Phaseolus flore in altitudine p. 1. 2. 4. Ca. cara prauary Aug. 92. 135
ratta manna v. 1. 2. 4. Ca. cara prauary Aug. 92. 135
uno latere compresso, altero gibbo, substantia et carne et
tomento compressa; uniu. p. 1. 2. 4. Ca. cara prauary Aug. 92. 135
hilo albo obtusis. Koenig. ann. p. 826. Et gaudia rubra v. 1. 2. 4.

Poi marbia. { Phaseolus cornu magno variegato. Pann

CANDRIA.

Phaseolus pinguis ... *Pin. 340. 6^{ta} cliv.*

Trifolium pratense ... *hispani.*

DIADELPHIA DECANDRIA. 727

Phaseolus ... *Pin. 342.*

Trifolium ... *Palav. cent.*
Wilongosyr. Virgin.

Habitat in Virginia.

* *Erecti.* *El. phalobus inauleni* ... *vegetation.*

11. **DOLICHOS** caule erecto flexuoso, racemis axilla-
ribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdisper-
mis. *Fl. zeyl. 534. Mat. med. 363.*

Soja. soja. Quasi pipar
Saidja japon
mame. is legum

Phaseolus erectus, siliquis lupini, fructu pisi majoris can-
dido. *Kempf. amoen. 837. t. 838.*

Misb. pisi ... *co. cap. pisi*

Habitat in India.

12. **DOLICHOS** caule perenni laevi, pedunculis biflo-
ris, leguminibus erectis. *Roy. lugdb. 368.*

biflorus.

Habitat in India.

PISUM.

1. **PISUM** stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolis te-
retibus, pedunculis multifloris. *Hort. ups. 215.*

Pis. michot. El. pisi vally ... *varietas minor flavescens*
Pisum ad 330
lativum.

Pisum stipulis crenatis. *Hort. cliff. 369. Mat. med. 352.*

War ... *japan*

Pisum hortense majus. *Baub. pin. 342.*

2. *Pisum* sine cortice duriore. *Baub. pin. 343.*

Hum. humile caule fimo. ... *301 goute.*

3. *Pisum* umbellatum. *Baub. pin. 344.*

umbellatum ... *Buschel arbs*

4. *Pisum* majus quadratum. *Baub. pin. 342.*

quadratum.

Habitat in Europæ agris.

2. **PISUM** petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedun-
culis unifloris. *It. Wgoth. 107. **

arvense. *Pisum*

Pisum pulchrum, folio anguloso. *Baub. hist. 2. p. 297.*

Evilia? ... *Daluh*

Moris. hist. 2. p. 47. f. 2. t. 1. f. 4.

Pisum ... *Pin. 342.*

Habitat inter Europæ segetes.

Pisum ... *ad. 330.*

3. **PISUM** petiolis supra planiusculis, caule angulato, sti-
pulis sagittatis, pedunculis multifloris. *Fl. suec. 608.*

maritimum. ... *El. pisi*

*It. Wgoth. 190. * fl. 627 8. fl. p. 128.*

Clymenum ... *ad. 330.*

Pisum stipulis integerrimis. *Hort. cliff. 368.*

Pisum marinum. *Raj. hist. 892. Fl. lapp. 272.*

Pisum spontaneum perenne repens humile. *Moris. hist.*

Ochrus ... *ad. 330.*

2. p. 47. f. 2. t. 1. f. 5.

Habitat in Europæ borealis littoribus maris arenosis.

Ochrus ... *ad. 330.*

4. **PISUM** petiolis decurrentibus membranaceis diphyl-
lis pedunculis, unifloris. *Hort. cliff. 370. Hort. ups. 215.*

Ochrus ... *ad. 330.*

Ochrus folio integro capreolos emittente. *Baub. pin. 343.*

Evilia ... *ang. Dod*

Ervilia sylvestris. *Dod. pempt. 522.*

Pisum ... *ad. 330.*

Habitat inter segetes Cretæ, Italiae.

Papulus ... *cretanib. Belli*

OROBUS.

Lathyroide. 1. Orobus ad 330.

OROBUS foliis conjugatis subseffilibus, stipulis dentatis. Hort. ups. 220. *Lathyroides erecta, folio ovato acuminato, cæruleis viciæ floribus & siliquis, sibirica. Amm. ruth. 151. t. 7. f. 2.*

Habitat in Sibiria. 2. *2 1/2 ped. erecta. 20 man. flor. cæruleis.*

luteus.

2. OROBUS foliis conjugatis petiolatis, stipulis integris. Orobus caule simplicissimo, foliolis binis ovatis. Hort. cliff. 366. *

Orobus latifolius repens, flore cæruleo, foliis & siliquis hirsutis. Boerb. lugdb. 2. p. 46.

Orobus sylvaticus, foliis circa caulem auriculatis. Buxb. cent 3. p. 22. t. 41.

Habitat in Thracia. 4

luteus.

3. OROBUS foliis pinnatis ovato oblongis, stipulis rotundato-lunatis dentatis, caule simplici.

Habitat in Sioiria 4

Habitus Orobi verni, sed altior, crassior, major. Folia pinnata 4. f. 5. paribus, ovato-oblonga. Stipulæ latae, subrotundo-lunares, dentatæ. Caulis simplex. Racemi axillares, secundi, floribus numerosis majoribus.

Orobus ad.

vernus.

Sanova. ad.

4. OROBUS foliis pinnatis ovatis, stipulis semifagittatis integerrimis, caule simplici.

Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis. Hort. cliff. 366. Fl. suec. 595. Roy. lugdb. 366.

Hall. herb. 602. *Fl. 3 ad 4 ped. anthe. peduncul. ped. long.*

Orobus sylvaticus purpureus vernus, Bauh. pin. 351. Thal. herc. 80. t. 6. *legum. p. 177.*

Habitat in Europæ borealis nemoribus. 4

taberosus.

Orobus ad.

5. OROBUS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semifagittatis integerrimis, caule simplici.

Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis integris. Hort. cliff. 366. Fl. suec. 596. Roy. lugdb. 366.

Astragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris. Bauh. pin. 351.

Astragalus sylvaticus. Thal. herc. 7. t. 1.

Lathyrus angustifolius, radice tuberosa. Loes. pruss. 138. t. 37.

Habitat in Europæ borealis pratis & sylvis. 4

1 1/2 ped. pl. bon. 15 April. fl. bon.

latifolius. ad. Keller. No 419. alpina. Calat. C. B.

6. ORO-

DIADELPHIA DECANDRIA.

729

6. OROBUS foliis quaterno-pinnatis linearibus, stipulis angustifoliis subulatis, caule simplici.

Habitat in Sibiria. 4

Habitus antecedentis, sed Folia linearia, angustissima & pinnata ex 2 oppositionibus, absque cirrho. Racemi floribus paucis luteis.

7. OROBUS caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis. Hort. cliff. 366. Fl. suec. 597. Roy. lugdb. 366. Hall. helv. 603.

Orobus sylvaticus, viciae foliis. Bauh. pin. 352.

Orobus pannonicus 2. Clus. hist. 2. p. 230.

Habitat in Europae borealis montosis. 4

8. OROBUS caule ramoso, foliis trijugis lanceolatis, nervosis. Sauv. monsp. 235. †

Orobus pyrenaicus, foliis nervosis. Tournef. inst. 393.

Orobus pyrenaicus latifolius nervosus. Pluk. phyt. 210. f. 2.

Habitat in Pyrenæis.

LATHYRUS.

* Pedunculis unifloris.

1. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-cordatis.

Lathyrus cirrhis aphyllis. Hort. cliff. 367. Hort. ups. 218. Roy. lugdb. 362. Dalib. paris. 217.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Bauh. pin. 345.

Aphaca. Lob. ic. 2. p. 70.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia inter segetes. ☉

Cirrhus interdum aliquis gerit Foliola conjugata, 2, lanceolata, reliquis Lathyris simillima, at hoc rarissime.

2. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis.

Lathyrus foliis solitariis lentiformibus. Vir. cliff. 74.

Hort. cliff. 366. Roy. lugdb. 263. Dalib. paris. 218.

Lathyrus sylvestris minor. Bauh. pin. 344.

Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari, sine capreolis, nissoli. Magn. hort. 112. t. 112.

Habitat in Gallia. ☉

Cirrhi nulli. Caulis erectus. Stipulae minima subulatae.

3. LATHYRUS pedunculis unifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, radicibus etiam

Z 25

Lathyrus id. 330

amphicarpos

aracho. dy. theoph. son

apax. d. v. theoph. in

apax. d. v. theoph. in

apax. d. v. theoph. in

oro. sylvaticus nostris. Rapp. 4. spud. fl. 12. p. 10. cirrho breviter pinnatis...
Sylvaticus
L. n. 486

oro. av.

oro. ad. 330.

oro. ad. 330.

aphaca ad. 330

nissolia ad. 330.

Lathyrus id. 330

amphicarpos

aracho. dy. theoph. son

apax. d. v. theoph. in

apax. d. v. theoph. in

apax. d. v. theoph. in

etiam sub terra fructificantibus. *Hort. cliff.* 367. *
Hort. ups. 216. *Roy lugdb.* 262. *Sauv. monsp.* 192.
 Viciæ similis supra & infra terram filiquas gerens. *Baub.*
pin. 345.

Arachidna f. Arachoides honorii belli. *Baub. hist.* 2. p.
 323. *Varial juvenis / filiqua ad radicem in alij nobis / in alij iniquitatem / in alij variegation. C.B.*
Habitat in Syria. ☉

• *Cicera, Dod.*

s. arabus, Dod.

Lathyrus ad. 330

4. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis,
 leguminibus ovatis compressis; dorso canaliculatis.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliis
 lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv.*
monsp. 193.

Lathyrus sativus flore purpureo. *Baub, pin.* 344.

Aracus f. Cicera. *Dod. pempt.* 523.

Habitat in Hispania. ☉

Medius inter antecedentem & sequentem magnitudine.
Petioli latere non membranacei. Corollæ rubra. Le-
gumina dorso canaliculata, at non marginibus acutis,
uti antecedens & insequens. Legumen latum, ovali-
oblongum.

Lathyrus

• *sativus, Dod.*

Lathyrus, qd. Dod.

Lathyrus, qd. Dod.

Lathyrus, qd. Dod.

Lathyrus, qd. Dod.

5. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis,
 leguminibus ovatis compressis dorso bmarginatis.
Hort. cliff. 367. *Hort. ups.* 216. *Roy. lugdb.* 363.

Dalib, paris. 216. *Sauv. meth* 193. *

Lathyrus annuus, flore cæruleo, ochri filiqua. *Herm.*
lugdb. 357.

β. Lathyrus sativus, flore fructuque albo. *Baub. pin.* 343.

Lathyrus f. Cicercula. *Dod. pempt.* 522.

Habitat in Hispania, Gallia. ☉

5700. *inconspicuis*

6. LATHYRUS pedunculis unifloris calyce brevioribus,
 cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis.

Lathyrus orientalis, flore vix conspicuo. *Boerb. lugdb.*
 2. p. 42.

Habitat in Oriente. ☉

Planta parva, spithamæa f. pedalis. Caules obsolete tri-
 angulares. Stipulæ subulato-lanceolatae: dente postico
 acuto. Petioli brevissimi, inferiores terminati seta
 subulata, brevissima, superiores in cirrhum filifor-
 mem elongati. Foliola bina, lanceolata, subtus stria-
 ta, acuminata. Calyx minimus & stipulis brevior ex
 alis petiolorum, pedunculo vix manifesto insidens.
 Corolla tam parva et vix calyce longior, pallida.
 Legumen longitudine ferme foliorum, sed latius, gla-
 brum, strictum.

7. LA-

7. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, *setifolius*,
foliolis fetaceo-linearibus. *Lacta adans*
Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis: foliolis
linearibus, stipulis subulatis, caulibus nudis. *Sauv.*
monsp. 193.
Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Baub. hist.* 2.
p. 308.
Lathyrus sylvestris major, angustissimo folio. *Baub.*
pin. 344.
Lathyrus angustissimo f. capillaceo folio. *Baub. prodr.*
148.
Habitat Monspeli.
8. LATHYRUS pedunculis unifloris cirrho terminatis, *angulatus*
cirrhis diphyllis: foliolis linearibus. *Lathyrus*
Lathyrus pedunculis unifloris cirrhosis, foliolis lineari-
bus, feminibus angulatis.
Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis
capillaceis. *Sauv. monsp.* 193.
Lathyrus angustissimo folio, femine anguloso. *Tournef.*
inst. 395.
Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Buxb. cent.* 3.
p. 23. t. 42. f. 2.
Lathyrus angustifolius leptolobus, femine hexaëdro, flo-
re caruleo. *Morif. blas.* 279.
Habitat in Gallia, Hispania, Oriente. ☉
9. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyllis, *bithynicus*
stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 363. *Clymenum ed.*
Lathyrus pedunculis unifloris, petiolis tetraphyllis, sti-
pulis fetaceis, caule ancipiti. *Amœn. acad.* 1. p. 166.
Chymenum bithynicum, siliqua singulari, flore minore.
Boerb. lugdb. 2. p. 43.
Habitat in Italiæ, Bavaræ arvis. 2
Caulis angulati. Cirrhi foliolis 2 parium, lato-lanceola-
tis. Stipulæ valde dentatæ. Flores axillares, solitarii:
calyce longitudine pedunculi, vexillo violaceo, alis al-
bidis. Legumen erectum, compressum, ovato-oblongum
villosum. Semina sena circiter. Media inter Lathy-
ros & vicias.
10. LATHYRUS pedunculis subunifloris, cirrhis poly- *articulatus*
phyllis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 368. *Hort. nps.* *Clymenum ed* 330
217. * *Roy. lugdb.* 363.
Lathyrus, angustissimo folio, americanus variegatus.
Baub. pin. 344.

Clymenum hispanicum, flore vario, filiqua articulata. Tournef. inst. 396.

β. Lathyrus angustifolius humilior. Baub. pin. 344. Habitat in Bætica. ☉

Folia sæpius tetraphylla; inferiores petioli lanceolati aphylli. Stipulæ utrinque mucronatæ.

* Pedunculis bifloris.

• odoratus. Lathyrus ad. 330

11. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. Hort. cliff. 368. Hort. ups. 216. Roy. lugdb. 363.

ficulus.

α. Lathyrus ficulus. Rupp. jen. 210.

Lathyrus distoplatyphyllos hirsutus mollis, magno & peramœno flore odoro. Comm. hort. 2. p. 219. t. 80.

zeylanicus.

β. Lathyrus zeylanicus, odorato flore amœno ex albo & rubro vario. Burm. zeyl. 138.

Habitat α in Sicilia, β in Zeylona. ☉

X • hirsutus.

12. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lineari-lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. Roy. lugdb. 363. Dalib. paris. 216. Sauv. monsp. 113.

Lathyrus angustifolius, filiqua hirsuta. Baub. pin. 344.

Lathyrus filiqua hirsuta. Baub. hist. 2. p. 305.

Habitat inter Angliæ, Galliæ segetes.

tingitanus.

13. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis: foliolis alternis lanceolatis. Roy. lugdb. 263.

Lathyrus tingitanus, filiquis orobi, flore amplo ruberrimo. Moris. hist. 2. p. 55.

Habitat in Mauritania. ☉

• clymenum. Clymenum ad. 330

14. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis dentatis. Hort. cliff. 368. Hort. ups. 217. Roy. lugdb. 364.

Lathyrus vicioides, vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus cæruleis. Moris. hist. 2. p. 56.

Clymenum hispanicum, flore vario, filiqua plana. Tournef. inst. 396.

Habitat in Mauritania. ☉

Lathyrus ad.

* Pedunculis multifloris.

X

15. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. Hort. cliff. 367. Hort. ups. 216. Roy. lugdb. 364. Dalib. paris. 217. Sauv. monsp. 194. Gort. gelr. 421.

avachidna. Chyph. col. avachidna Chyph. l. c. 1. avachidna qnd

chamætolanus. gal. dnd qnd ficutu ficutu

attrogalus. Curva. Rupp.

ovoides. gal. dnd

Paris. Paris. Louis

glendy. dnd lob

makon et makotte au champagne

glend de tam galle

Lathyrus Apio Hab... 16. LA... lis cli... ris. Lathyrus Lathyrus p. Lathyrus Ha... Habit... Cirrh... ci... 17. LA... phy... sue... Lathyrus Lathyrus 523 Habit... 18. LA... phy... Ho... sca... Lathyrus 27 Lathyrus Ba... Habit... 19. LA... lis Lathyrus lis Sa... Lathyrus 2. Hab... 20. L... ph... R...

Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Bauh. pin.* 344.

Apios. Fuchf. hist. 131.

Habitat inter Belgii, Genevæ, Tatariaë segetes. ♀

16. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyll-^{pratensis.} +
lis: foliolis lanceolatis: cirrhis simplicissimis. *Hort. Lathyrus ad.* 330
cliff. 367. *Fl. suec.* 599. *Roy. lugdb.* 364. *Dalib. pa-*
ris. 217.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciæ. *Bauh. pin.* 344.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Bauh. hist.* 2. p. 304. t. 304.

Lathyrus foliis binatis acutis, capreolo non ramoso.

Hall. helv. 597.

Habitat in Europæ pratis. ♀

Cirrhi quidem interdum trifidi sunt, at sæpius simpli-

cissimi.

17. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis di-^{Lathyrus ad} +
phyllis: foliolis ensiformibus. *Hort. cliff.* 367. *Fl. sylvestris.* +
suec. 598. *Dalib. paris.* 216. *mochi Sturij. cas*
Cicadula. Quon

Lathyrus sylvestris major. *Bauh. pin.* 433.

Lathyrus sylvestris. *Clus. hist.* 2. p. 129. *Dod. pempt.*

523.

Habitat in Europæ pratis montosis. ♀

18. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis di-^{Lathyrus}
phyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *latifolius.* •
Hort. cliff. 367. *Hort. upf.* 217. *Fl. suec.* 1139. *It. clymenum. matth*
scan. 251. * *Evoum cordi*
Sturium cas

Lathyrus latifolius. *Bauh. pin.* 344. *Garid. prov.*

271. t. 271.

Lathyrus major latifolius, flore purpureo, speciosior.

Bauh. hist. 2. p. 303.

Habitat in Europæ sepibus. ♀

19. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyll-^{heterophyl-} +
lis tetraphyllisque: foliolis lanceolatis. *It. w-goth* 75. *lus.* +
Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: folio-^{Lathyrus}
lis gramineis trinerviis, internodiis membranaceis.

Sauv. monsp. 193.

Lathyrus major narbonensis angustifolius. *Bauh. hist.*

2. p. 304.

Habitat ad radices montium Europæ. ♀

20. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis poly-^{palustris.} •
phyllis stipulis lanceolatis. *Hort. cliff.* 368. *Fl. suec.* 600. *Clymenum ad.* 330
Roy. lugdb. 364. *Dalib. paris.* 217.

4. 2 ad 3 ped. rami anapitru malati plani. La-

fl. 2 ad 3 ped. rami ad 6. o cirrhis 3 fl.

top. 2. basi condit. intag tri ang plana und.

fl. 4 cirrhis imp. rami callo. long pedunculata

734

DIADELPHIA DECANDRIA.

clymenium pinnatis fl. caeruleis.
Lathyrus foliis pinnatis, pedunculis multifloris. *Fl. lapp.*
221.

Lathyrus palustris, flore orobi nemorensis verni. *Rupp.*
jen 210. t. 1.

Vicia lathyroides f. Lathyrus viciæformis. *Pluk. alm.*
387. t. 71. f. 2.

Habitat in Europæ borealis pascuis paludosis. ♀

pisiformis.
clymenium ad.

21. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis poly-
phyllis, stipulis ovatis: basiacutis. *Hort. ups.* 217.

Habitat in Sibiria. ♀

Planta ut *Pisum crescens*. Caules acute angulati. Petio-
li cirrhosi, sæpe hexaphylli: foliolis ovato-oblongis, a-
cutis. Stipulæ foliis latiores, ovatae, basi acuminatae,
vix angulatae. Pedunculi longitudine foliorum, mul-
tiflori. Flores violacei.

VICIA.

* *Pedunculis elongatis.*

pisiformis.
1. Pisum ad.

1. VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: fo-
liolis ovatis.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrho-
sis, foliolis ovatis: infimis sessilibus. *Hort. cliff.* 369.*
Roy. lugdb. 365.

Pisum sylvestre perenne. *Baub. pin.* 343.

Pisum sylvestre. *Clus. hist.* 2. p. 129.

Habitat in Pannoniæ sylvis. ♀

Vicia ad 31.

dumetorum. 2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis
mucronatis, stipulis subdentatis.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cir-
rhosis: foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. *Fl.*
suec. 604. *Dalib. paris.* 219. *Sauv. monsp.* 234.

Vicia maxima dumetorum. *Baub. pin.* 385.

Vicia sylvatica maxima piso similis. *Baub. hist.* 2. p.

315. *Cruc.*

Vicia sylvatica. *Riv. tetr.* 2. 240.

Habitat in Thuringia, Gallia. ♀

sylvatica.

3 VICIA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, sti-
pulis denticulatis.

Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis. *Fl. lapp.*
270. *Fl. suec.* 603. *Roy. lugdb.* 365. *Sauv. monsp.*
234.

Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, flori-
bus

Vicia summe rotunda, ut supra B. Pin. 345.
 anachy. seu cracca dicitur ab aphasia et vicia potissimum remine
 non cracca summa exquidati rotunda nigra. rotundiora sub
 angulata. 735
 Cracca maj. } Lob. Inull.
 Vicia 16

DIADELPHIA DECANDRIA.

bus albetibus: lineis cæruleis notatis. Pluk. alm. 387. t. 71. f. 1.

Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Galliæ sylvis. 2

4. VICIA pedunculis subsexfloris, foliolis denis ovatis ^{cassubica.} acutis, stipulis integris.

Vicia pedunculis multifloris, caule fruticoso. Hort. cliff. 369. Roy. lugdb. 364.

Vicia multiflora cassubica frutescens, filiqua lentis. Pluk. alm. 387. t. 72. f. 2.

Habitat in Germania.

5. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris.

Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. Hort. cliff. 368. Fl. suec. 605. Roy. lugdb. 364. Dalib. paris. 220. Sauv. monsp. 234.

Vicia sylvestris spicata. Baub. pin. 345.

Vicia multiflora. Baub. pin. 343.

Cracca. Riv. tetr. 254

Habitat in Europæ pratis, agris. 2

6. VICIA pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis inferne denticulatis.

Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis, foliolis linearibus. Sauv. monsp. 235.

Vicia onobrychidis flore. Baub. pin. 345. prodr. 149.

Habitat in Gallia. D. Sauvages. ^{hulm. 425 hult.}

Statura Viciæ Craccæ. Folia pinnata, cirrhosa: foliolis sæpius 14, linearibus, angustissimis: oppositionibus distantibus. Pedunculi axillares, foliis triplo longiores, striati. Floribus 10. s. 12, subsessilibus, remotissimis, Craccæ triplo majoribus, purpureis.

7. VICIA pedunculis multifloris, foliolis oblongis, stipulis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis.

Vicia leguminibus sessilibus binis ternisve subovatis nutantibus, stipulis nullis. Roy. lugdb. 14?

Vicia orientalis, flore suave rubente, filiquis brevissimis. Boerb. lugdb. 2. p. 44?

Habitat in Oriente.

Caulis sulcatus. Cirrhi foliolis 6 paribus, oblongis, vix retusis, acumine terminatis, subvillosis. Stipulæ lanceolatæ, angustissimæ. Pedunculi floribus 5. s. 6, minimis, atropurpureis. Legumina nutantia, compressa, ovato-oblonga, villosa, pentasperma.

Vicia. c. b.
anphus. 1007

biennis.

8. VICIA pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subde-
decaphyllis: foliolis lanceolatis glabris.
Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis
lanceolatis glabris. *Hort. ups. 219. **
Habitat in Sibiria. ♂

Vicia. ad 331
benghalensis.

X

Beniga. a Day.

9. VICIA pedunculis subquinquefloris, foliolis integerri-
mis, stipulis integris, leguminibus erectiusculis.
Vicia pedunculis subquinquefloris longitudine foliorum.
Hort. cliff. 368. Hort. ups. 219. Roy. lugdb. 365.
Vicia benghalensis hirsuta & incana, filiquis pili. *Herm.*
lugdb. 623 t. 625.
Habitat in Benghala. ☉

Vicia. ad

X

fativa.
Evropa. Brunst
Vicia. i. mag. graec.
ortus. mag.
faciov. asiatic. gal
Sapad. attia
Faba. i. t. mag.

* *Floribus axillaribus, subsessilibus.*
10. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis
retusis, stipulis ^{den}notatis.
Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis: foliolis a-
cumine emarginatis, stipulis denticulatis. *Hort. cliff.*
368. Hort. ups. 218. Fl. suec. 601. Roy. lugdb. 365.
Dalib. paris. 218.
Vicia fativa vulgaris, semine nigro. *Baub. pin. 344.*
Vicia fativa alba. *Baub. pin. 344.*
Habitat inter Europæ segetes hodie. ☉

Vicia. ad

X

Lathyroides.

11. VICIA leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris,
foliolis senis: inferioribus obcordatis,
Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm. par.*
242. t. 242.
Vicia montana minima, flosculo purpureo. *Amoen. acad.*
1. p. 167.
Habitat in Scotia, Lusatia. ☉

Vicia. ad

lutea.

Vicia. lutea
345.

12. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis solita-
riis pentaspermis, corollæ vexillis glabris.
Vicia foliis subsessilibus obverse ovatis apice emargina-
tis, leguminibus solitariis villosis. *Dalib. paris. 219.*
Vicia leguminibus solitariis deorsum flexis hirsutis. *Sauv.*
monsp. 235.
Vicia sylvestris lutea, filiqua hirsuta. *Baub. pin. 345.*
Vicia flore luteo pallido, filiquis hirsutis crassis brevibus
propendentibus. *Moris. hist. 2. p. 62. f. 2. t. 21. f. 5.*
Habitat in Gallia.
Variat foliis lanceolatis & retusis, Leguminibus hirsu-
tis & subglabris. Stipulae alternatim integerrime &
tridentatae.

DIADELPHIA DECANDRIA.

13. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis pentaspermis, corollae vexillis villosis.

Habitat Monspeli, Massiliae. ☉

Affinis V. lutea. Foliola obverse ovata, retusa, parva, pilis adpersa. Stipulae non ad caulem fusca, sed totae virides. Flores flavi, supra subgrisei, pilosi. Cetera V. lutea.

14. VICIA leguminibus subsessilibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis.

Vicia peregrina angustissimis foliis, siliqua lata glabra: Pluk. alm. 386. t. 233. f. 6.

Vicia angustifolia purpureo-violacea, siliqua lata glabra. Magn. monsp. 276.

Habitat in Gallia. D. Sauvages. ☉

15. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescen-

tibus. Vicia leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. Hort. cliff. 362.

Fl. suec. 602. Roy. lugdb. 365. Dalib. paris. 219. Sauv. monsp. 234.

Vicia sepium, folio rotundiore acuto. Baub. pin. 345.

Vicia sepium. Riv. tetr. 56. Habitat in Europa sepibus. ☉

16. VICIA leguminibus subsessilibus solitariis erectis, foliolis ovatis subovatis, stipulis denticulatis. Hort. ups. 218. Sauv. monsp. 234.

Vicia petiolis interioribus tetraphyllis: superioribus polyphyllis, foliolis ovatis cirriferis. Roy. lugdb. 365. Hort. cliff. 360.

Vicia petiolis tetraphyllis cirriferis. Hort. cliff. 360.

Vicia narbonensis. Riv. tetr. 56.

Faba sylvestris, fructu rotundo atro. Baub. pin. 338.

Bona sylvestris. Dod. pempt. 516.

Habitat in Gallia, Anglia. ☉

17. VICIA caule erecto, petiolis absque cirthis. Hort. cliff. 369. Hort. ups. 218. Mat. med. 353. Roy. lugab. 366. Dalib. paris. 220.

Faba. Baub. pin. 338.

Bona f. Phaseolus. Dod. pempt. 513.

Faba minor f. equina. Baub. pin. 338.

Habitat in - - ☉

Vicia ad.

+

Vicia ad.

sepium.

+

aphaca fuchs, analt. gen.

Rapum

Rafavia adam.

Faba

Vicia ad. 331.

Vicia ad.

narbonensis.

Phaseolus vestrin. gab. 20

aracy. fuchs

cusophies. grac. recunt

apaxos. thuy

arschuy

arouste gall.

arakos. altu.

Faba ad 331.

Faba. Arum. thuy. fuchs

Phaseolus gal. 20

Bona Dod.

Phaseolus. grac.

Ran. de mania.

Bona Dod. minor

Sandru

Phaseolus japon

Phaseolus des chereun

CICER. 2331

+ *arietinum.* 1. CICER foliolis serratis. Hort. cliff. 370. Hort. ups. 224. Mat. med. 359.
Cotonez arab. hamos
1. Omnes
opz flos. Dist. g.
cicor. Anup. flos. malle.
 Cicer sativum. Bauh. pin. 347.
 Cicer arietinum. Dod. pempt. 525.
 Habitat inter Hispaniæ, Italiæ segetes. ☉

ERVUM.

Leu. ad. 331.
 I. *Gen.* *Lens, gal. Anup. flos.*
+ *paris*
a paros. thyp. Dist.
 ERVUM seminibus compressis convexis.
 Cicer pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipulis indivisis. Hort. cliff. 124. Mat. med. 360. Sauv. monsp. 233.
ad. 2. arab. at hady
 Cicer pedunculis bifloris, seminibus compressis. Hort. cliff. 370. Dalib. paris. 346.
 Lens vulgaris. Bauh. pin. 346.
 Lens. Dod. pempt. 526.
 Habitat inter Galliæ segetes. ☉

4. arab. ad.
tetrasper-
mm.
+ *Sipaca ad*
 2. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. Fl. succ. 606. Dalib. paris. 227.
4. arab. ad.
 Vicia segetum, singularibus filiquis glabris. Bauh. pin. 345. *Fl. succ. 606. Dalib. paris. 227.*
 Habitat inter Europæ segetes. ☉

nov. gen. cor. angust. fruct.
hirsutum.
+ *vicia ad.*
vicia hirsuta. gal. Dod.
vicia hirsuta.
 3. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis.
 Cicer pedunculis multifloris, seminibus globosis. Hort. cliff. 370. Fl. succ. 607. Roy. lugdb. 389. Dalib. paris. 228. Sauv. monsp. 233.
vicia ad.
 Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis. Bauh. pin. 345.
 Cracca minor. Tabern. ic. 507.
 Habitat in Europæ agris. ☉

monanthos.
+ *Leu. minor.*
 4. ERVUM pedunculis unifloris.
 Vicia pedunculis unifloris, foliolis integerrimis, stipulis alternis dentatis. Hort. ups. 219. *
 Lens monanthos. Herzm. lugdb. 360.
 Habitat in Asia ruthenica. ☉

2. Gen.
Erva.
+ *Ervia. lin.*
opz fol. græc. dicitur
Erva latini
Erva
Moisy. Dod. Cast.
 5. ERVUM *germinibus undato-plicatis.* Hort. ups. 224. Mat. med. 361. Sauv. monsp. 237.
 Ervum leguminibus pendulis. Hort. cliff. 370.
 Orobus filiquis articulatis, flore majore. Bauh. pin. 346.
 Habitat in Gallia, Italia. ☉
2. arab. ad. 2. arab. ad. 2. arab. ad.
2. arab. ad. 2. arab. ad. 2. arab. ad.
2. arab. ad. 2. arab. ad. 2. arab. ad.
2. arab. ad. 2. arab. ad. 2. arab. ad.
 GYTI

CYTISUS.

- 1. CYTISUS racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. Hort. cliff. 354. Hort. ups. 210. Roy. lugdb. 369. Hall. helv. 591. *Cytisus ad 321*
I. Gen. id genus
Laburnum *799*
Egano. theophr. aug **+**
 Anagyris non foetida major alpina. Baub. pin. 391.
 Anagyris non foetens minor. Baub. pin. 391.
 Laburnum arbor trifolia anagyridi similitis. Baub. hist. *Egalo. Dod*
Faba inuicula
 2. p. 361.
 Habitat in Helvetia, Sabaudia. **h**
- 2. CYTISUS racemis simplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis. Hort. cliff. 354. Roy. lugdb. 369. Sauv. monsp. 190. *Cytisus ad*
nigricans. I. Gen. +
Squido. cytisus. cad.
 Cytisus glaber nigricans. Baub. pin. 390.
 Cytisus IV. Clus. hist. 1. p. 95.
 Habitat in Austria, Pannonia, Bohemia, Italia. **h** *Sp. mag. cytisus. d.*
- 3. CYTISUS racemis erectis, calycibus bractea triplici sessilibus. *15 aprili flor.* *Cytisus. d.*
 Cytisus foliis saepius sessilibus, calycibus squamula triplici auctis. Vir. cliff. 71. Hort. cliff. 355. * Roy. *Cytisus. d.*
 lugdb. 369. Sauv. monsp. 191. *cytisus. Thunb. l. 4. c. 20. in luteis plantis viciis non*
est omnes folia viciis. lignum dicitur quod luteum est
 Cytisus glaber foliis subrotundis, pediculis brevissimis. *Ebenum luteum, cotinus,*
 Baub. pin. 390. *Cajan. ad 326.*
 Cytisus glaber, siliqua lata. Baub. hist. 1. p. 373. *3. Gen.*
 Habitat in Italia, Galloprovincia **h** *3. Gen. f. subquadrata. 3. nate*
puto le hirtum ab 19. lignum compositum in p. lorum tenere. dicitur p. 2. laterale
 4. CYTISUS racemis axillaribus erectis, foliolis sub-lanceolatis tomentosis: intermedio longius petiolato. *Cajan. aliud genus ad*
 Fl. zeyl. 354. * Hort. ups. 211. *ad anagyris et*
 Cytisus foliolis ovato-lanceolatis: intermedio petiolato, *Phalarinaceis.*
 pedunculo ex alis multifloro. Hort. cliff. 354. Roy. *Undi 3. Punjab*
 lugdb. 369. *San alba glob. p. 190. uniuersa cocta bene sapat. et aliam*
 Cytisus folio molli incano, siliquis orobi contortis & *Katjang. Bali. malacca*
 acutis. Burm. zeyl. 86. t. 37. *Comanda quisa. Probat. magis*
 Phaseolus erectus incanus, siliquis torosis. Pluk. alm. 62.
 293. t. 213. f. 3. *Undi. Undi. 1. Balorne Punjab. Si U. 135. 12.*
 Habitat in India. *pl. lutea in Malacca. Katjang. Bali. malacca*
 5. CYTISUS pedunculis simplicibus lateralibus, calycibus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis. Hort. *3. Gen.*
 ups. 211. * *cytisus. d.*
 Cytisus calycibus hirsutis sessilibus, pedunculis simplicibus brevissimis. Hort. cliff. 355. Roy. lugdb. 370. *Cytisus ad 321.*
 Sauv. monsp. 190.
- Cytisus incanus, siliqua longiore. Baub. pin. 390.

A a a a

Cyti-

{ *Cacara. 1. Pygomaus. Punjab. 5. 132. f. 2.*
planta 2. Radice tuberosa. p. 190. uniuersa. fl. 3. nate inuicula. fl. al. p. 190.
Cajan. cytisus. p. 190. ad 321. 8 ad 9. lutea. fl. p. 190.

Vingon. *Sisyox. aegy.* *Thuyph. l. c. m.* *fol. ampla, germin. multum, radix vna long.*
et fluitat in part. adult. colliguntur cum annis efflor. fluit, eoque
demum ass. enonant.

Pratata.

740 DIADELPHIA DECANDRIA.

3. Gen. chamaepartium ad. 321.
1. Junii flor. 2. 1. p. d. v. p. p. l. t. v.
stipulae vna conspicua
flor. lutei longi ad 5 termin.
subovales.
cal. cyl. 3 pd.
cor. 5 pet.
st. 10. monadelph.
Sisyxi. adans.

Cytisus. *Clus. hist. 1. p. 94.*
Habitat in Hispania, Sibiria, Austria, Italia. h

6. CYTISUS floribus capitatis, ramis decumbentibus.
Roy. lugdb. 376. Hort. ups. 211.
 Cytisus supinus, foliis infra & filiquis molli lanugine
 pubescentibus. *Bauh. pin. 390.*

Cytisus VII. species altera. *Clus. hist. 1. p. 96.*
 β. Cytisus supinus, foliis incana lanugine inferne pube-
 scentibus. *Bauh. pin. 390.*

Cytisus VII. species altera. *Clus. hist. 1. p. 96.*
 γ. Cytisus incanus, folio oblongo, austriacus. *Bauh. pin.*
390.

Cytisus V. *Clus. hist. 1. p. 195.*
Habitat in Sibiria, Italia, Sicilia, Galloprovincia. h
Structura floris indicat summam cum C. hirsuto affini-
tatem. 2. 1. p. d. hum. p. d.

æthiopicus. 7. CYTISUS racemis lateralibus strictis, ramis angulatis,
 foliolis cuneiformibus.
 Cytisus æthiopicus, subrotundis incanis minoribus foliis,
 floribus parvis luteis. *Pluk. alm. 128. t. 278. f. 3. an?*
Habitat in Æthiopia. h

U. p. d. v. p. p. l. t. v.
græcus.
Barba jovis.

8. CYTISUS foliis simplicibus lanceolato-linearibus, ra-
 mis angulatis.
 Barba jovis, linariæ folio, flore luteo parvo. *Tournef.*
cor. 44? folio.
Habitat in Archipelagi insulis. h

3. Gen. monspessula-
chamaepartium mis.
chamaepartium ad.

9. CYTISUS floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule
 erecto striato. *Sauv. monsp. 191. †*
 Cytisus monspessulanus, medicæ folio, filiquis dense
 congestis & villosis. *Tournef. inst. 648.*
Habitat Monspeli.

Folia subsessilia. Foliola ovalia, tomentosa, incana. Le-
 gumina conferta, recta, villosa. *Sauv.*

fl. p. p. p.
 • *argentus.*
Loti. adans.

10. CYTISUS floribus subsessilibus, foliis tomentosis,
 caulibus herbaceis.
 Cytisus acaulis, floribus solitariis: foliolis sericeis lan-
 ceolatis. *Sauv. monsp. 191.*

Lotus fruticosus incanus siliquosus. *Bauh. pin. 332.*
 Lotus asperior fruticosa narbonensis incana. *Lob. ic. 2.*
p. 41.

Trifolium argenteum, floribus luteis. *Bauh. hist. 2. p.*
359.
Habitat in G. Narbonensi. h 4 p. d. v. p. p. l. t. v.