

Hunt Institute for Botanical Documentation 5th Floor, Hunt Library Carnegie Mellon University 4909 Frew Street Pittsburgh, PA 15213-3890 Telephone: 412-268-2434 Email: huntinst@andrew.cmu.edu Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

altragaly miant, incaner, filionen enjugationity danlikeing, Bour, Con 29.] frick pianatif M. Hist. opp. confortig, leviter emogientig. Recently.

Altragalus acaulos, leguminibus inflatis subglobosis. Amoen. acad. 2. p. 359. * Habitat in Sibiria.

Bracteæ villosæ; Fructus Coluteæ, sed magis globosus.

27. ASTRAGALUS acaulos, scapo erecto foliis longio- uralensis. . re, leguminibus subulatis inflatis villosis crectis. Hort. ups. 226. * cens diffusus, pedunc

Astragalus non ramosus villosus & incanus spicatus, floribus purpuro-violaceis. Amm. ruth. 167. Habitat in Sibiria. 2 helvet. Nº 410. Lellen

arting aly a 324 28. ASTRAGALUS acaulis, scapis declinatis longitu- monspessfula. dine foliorum Aeguminibus lubulatis teretibus lubar mus. cuatis glabris. Hort. upf. 227. Sauv. monsp. 238. Astragalus monspellulanus. Baub. Hist. 3. p. 338. Astragalus purpureus perennis monspeliens. Moris. bist. 2. p. 106. Line Tet genere and the former of the fast fast function of the fast fast function of the fast fast function of the fast fast former of the fast fast former. Habitat Monspelii. 2 / mil. acaulty 1. mai for for 1 when the fast function of the fast fast former. 29. ASTRAGALUS acaulos hirsutus, scapis crectis spi- grandistorns.

astragaly ad

Vecudos. alab frendy, arring

Altragalus, tragacanthæ folio, non ramosus, floribus luteis. Amm. ruth. 168?

Habitat in Sibiria D. Gmelin. 24

catis, foliolis ovatis obtufis.

ECANDRIA.

2. p. 240. t. 241.

mi, plarimi Supernem

olliolis 21. J. 23, mian

albis adspersis. Pedur

oliis Sæpius breviores,

ie, ovatum, calycibus

bus nigris. Cotolla

e duplo longiores.

o longioribns.

hill 38: 412.

pureo. Bauh. pin. 30

escens procumbens,

gummibus utrinque ac

longioribus, floribus

F. 362. Fl. Juec. 592.4

Fl. lapp. 267. t. 9. f.

B. Schench. alp. 509.

is, Helvencis. 4

re caule foliofo.

los, scapis folio longioni

rectis. Roy. lugdb. 301.

oribus caruleo-purpur

nz. Baub. pin. 351

ulis vix ac ne vix bahn

. p. 240.

ofis nudis,

Folia spithamæa: foliolis 17, ovalibus, obtusis, hirsutis præsertim subtus. Scapi crassi, pilosi, terminati Spica crassiuscula. Calyces birsuti. Corollæmagnæ, flavæ.

a thugaly ad. 30. ASTRAGALUS acaulos, calycibus leguminibus- campestris. el Onobrychis aliis. Ban que villosis, foliolis acutis. It. æl. 50. Fl. suec. 593.* Altragalus acaulos, foliis peracutis, calyce & fructu vil-1010. Hall. belv. 567. t. 13. A. 405, Astragalus perennis supinus, foliis & filiquis hispidis, flo-

re luteo, Buxb. Hall. 32. Habitat in Oelandia, Germania, Helvetia. 2

unada, erecti; nec penda 31. ASTRAGALUS subacaulos, scapis subbifloris, legu- trimestris, minibus hamatis subulatis bicarinatis. , fcapis folio longion Phaca leguminibus arcuatis. Roy. Ingdb. 390. ninibusque inflatis hirin Habitat in Ægypto. O næ folio, velicarius. Im Planta tenera. Caules vix ulli aut breves. Scapi e ra-27. 1. 27. Raj. hill. 4 dice s. pedunculi e caule, pauciflori subbifiori. Flores flavi. Legumen subulatum, in hamum flexum, comfcapis folia aquantiti pressum, externe duobus angulis compressis carinatum.

Bb b

Caule

trugacanthoules.

hivinna gazos

702

They acanthum

Dragagautter

* Caule lignoso. 32. ASTRAGALUS subacaulos, floribus radicalibus nu. merofis subseffilibus.

DECANDRIA.

has

Hal

Ped

2. PS

CI

Ç

f

I

Hal

Ped

3. PS

11

Hal

Ped

4. PS

C

Pfc

Tr

Tr

Tr

B.T

TI

H

Va

5. P

T

H

C

Ger

Plo

queuni nagacenthum sa radice. nagacenther vulnente effluit. Probation condiditionum prenum, sequaliter trans lucus, laeve, dulus, al coging minime portio manimum aqual equiam coagulet. B. Pin 498

Astragalus acaulos, flore luteo. Tournef. cor. 28. Buxb. cent. 3. p. 21. t. 38. f. 2

Astragalus repens, barbæ jovis foliis, acaulos ferme polyanthos. Amm. ruth. 170.

Habitat in Sibiria, Armeria. 2

Caulis aut Scapus nullus, sed radicis ramisupraterram diffusi, & depressi, vestiti Foliis pinnatis, parvis, villosis. Flores aggregati ad radicem, sessiles. Calyces birsuti dentibus nigricantibus. Corollæ flavæ. Leguthe ad 324 minasubrotunda, lævia.

• Tragacantie 33. ASTRAGALUS caudice arborescente, petiolis spi-Trayanavia theyer 33. nescentibus 21. 1900 Sentry Foolt. Standy the Strange the sentence of t Astragalus aculeatus fruticosus massiliensis. Pluk. alm. Return ? Queb. alihata

Tragacantha. Baub. pin! 388. Cam. epit. 446. Hort. Cliff. 361! Mat. med 348. Tragacantha affinician 348.

B. Tragacauthæ affinis lanuginosa, s. Poterium. Baub. pin. Magasae. and torigion. Dia tobe neurop. que new 388 and 1it. at Loniby in gracia Diturium on buter grandi hand, floraboca hat flocandidigani and Tragacantha altera. Poterium forte. Cluf. bift. 108. Plin Lib 25. cap. 10. Thyaim and munda coo mede suich my of functional of the Andrew Martin and Martin and and a solution of the of the suice of the suice of the second suice of the of the second second suice of the second sec

BISERRULA.

milemila ad. 324. · Pelecinus. I. BISERRULA. Hort. cliff. 361. Seolonusia contaci Astragalus purpureus annuus peregrinus, filiquis utrinque serre similibus. Morif. hist. 2. p. 107. J. 2.t. 9. f. 6. Securidaca filiquis planis utrinque dentatis. Baub. pin.

349. Securidaca peregrina. Clus. bist. 2. p. 238. Habitat in Sicilia, Hispania, Galloprovincia. O PSORALEA. 1. PSORALEA foliis pinnatis, floribus axillaribus. Hort. ups. 225. * Psoralea foliis pinnatis: foliolis linearibus acuminatis. Roy. lugdb. 373. Dorychnium caule fruticoso, foliis pinnatis: foliolis linearibus. Hort. cliff. 370. Spartium africanum. Riv. tetr. 5. 19.186. Genista affinis arbor africana monospermos, flore ca. tuleo, foliis pinnatis. Herm. lugdb. 272. t. 273. Haand afflicity of a star DECANDRIA floralace glowulow artoregun, filis annih. Busty, florib. pication alos, floribus radicalibu O. Tournef. cor. 28.B Habitat in Æthiopia. 5 Pedunculi axillares, solitarii, eglumes, birsuti. is foliis, acaulos ferme 2. PSORALEA foliis ternatis, foliolis cuneiformibus re- aculeara. curvo-mucronatis. Psoralea foliis ternis : foliolis cuneiformibus triquetris adradicis ramisupraten culeatis. Roy. lugd. 373. Foliis pinnatis, parvin, GenistaSpartium africanum trifolium, floribus cæruleis, foliis minimis in spinulam definentibus. Raj. dendr. radicem, Seffiles. Ca bus. Corollæ flave. L 104. Habitat in Æthiopia. 3 Pedunculi axillares, plures, glumofi. e arborelcente. 3. PSORALEA foliis inferioribus ternatis; superioribus tenutfelia. × fimplicibus lanceolato fubulatis, oalofmen enget Habitat in Æthiopia. 5 Cratrat. oalofmen enget antigto awap \$ 9 as mattilientis. Pedunculi axillares, solitarii, glumosi. :322. inequarily Dime 4. PSORALEA foliis omnibus ternatis : pedunculis spi- kitumineste catis folio longioribus. Hort. upf. 225. Día, f. Poterium. Bank Pforalea trifolia. B. Jull. act. 1744. p. 381. applat hour Trifolium capitulis subrotundis, calycibus ventricosis a fate grandie hand ony trip by the n forte. Cluf. bift. 10 caule arborescente. Hort. cliff. 373. 2 gours 6 Gartin Dire Trifolium bitumen redolens. Baub. pin. 327. , Æthna, Olympo, j Trifolium bituminosum. Dod. pempt. 566. aline 6. Trifolium bitumen redolens angustifolium. Boerb. lugdb. 2. p. 32. Trifolium bituminosum inodorum. Best. eyst. ast.t. II. L.1.n. 900. s peregrinus, filiquis un f. 2. Habitat in Siciliæ, Italiæ, Narbonæ collibus mariti-. bift. 2. p. 107. 1.1 mis. h Varietas B. differt Foliis radicalibus numerofis; Radirinque dentatis. Baub ce bienni; Caule minore, angustiore, magis herbaceo. Pratat hift. 2. p. 238. 5. PSORALEA foliis ternatis: foliolis subrotundis an-americana. gulatis, spicis axillaribus pedunculatis. , Galloprovincia. O gulatis, spicis axillaribus pedunculatis. Trifolium americanum. Les ic. 2. p. 31. Dod. pempt. Long i Tricand. 567. Bauh. pin. 327. s, floribus axillaribus.b S.L.F Habitat in America? Caules diffusi, herbacei, punctis glandulosis adspersi. lolis linearibus acumi Folia ternata: intermedia majore, petiolato, subrotunda, obtusissima, obsolete dentata aut angulata, adsper-, foliis pinnatis: folioi Sa punctis glandulosis, ut in congeneribus. Spicæ axillares, oblongæ, pedunculis longitudine foliorum. Lob. etr. 5. 19.186. & Dod. figuræ bonæ sunt. Hoc ævo mibi non visain a monospermos, flor Hortis Europæis. m. lugdb. 272. t. 273.

- Sa al alforge - 6. PSO - -

lignoso.

12

F. 361.

LEA.

Kouatte. Carib. terne Spartien fluer ic 246: 1: avb. med. Rami, tetrendin, contice cim. Kouatte. Carib. terne Spartien fluer is the third thetilie alberno alber flor. Spine twame in hu Ebene viai, farme Stragero higes right aunor. fil. confute alt. infl. rtulaise crafta 141:1. aspalethy fleugo bury. Faflen bute count anju. 2ad inal esthete papiliance musice. cal pate, a casta phythema Saflan bute count anju. 2ad inal esthete papiliance musice. cal pate, "Lequenen. ov at. inflatur moren suther ale Mintera cintum Veliter (J. Coul. Sem 1. remit. . I Deter alevone per able livet de comine tacent A Corvitpolia. 6, PSORALEA foliis simplicibus ovatis. Hort. ups. 227. Salune ammic pinne et Psoralea folio integro subrotundo. Juss. act. 1744. p. En E Din Soy. Etenny and Much. Shyt. 7. 105 f. 1. 12 anal 382. flored Co. Dorycnium foliis simplicibus ovatis. Roy. lugdb. 389. 322 Loto affinis coryli folio. Dodart. act. 4. p. 289. t. 289. Covirie au Pluk. alm. 227. t. 96. f. Sichen Righ 5 7.132:/1. Habitat in India. O? Down Jahan Might 5 7.132:/1. pentaphylla. 7. PSORALEA foliis digitato-quinatis: foliolis inæqualibus. Hort. upf. 225. Contrahinter hips. Psoralea pentaphylla, radice crassa. B. Juss. act. 1744. p. 381. t. 17. Habitat in Mexico vel Malabaria. 2 8. PSORALEA foliis pinnatis, spicis terminalibus. Daleg. and Dalea. Hort. cliff. 363. t. 22. * plangines. Habitat in America. O Foliola subtus punctis glandulosis adspersa. Spica densa nt in Plantagine, alba aut cerulea. archmony lon lutas. EBENUS. Dige. Theyn an aling the. Comy Salpar. 321. eretica, i. EBENUS. Bubiow huger enter inter ine fly inter 3 provo So zu nov. continu Ebenus cretica. Alp. exot. 279. t. 278. Pon. ital. 128. Trifolium spicis ovatis villosis, caule fruticoso. Roy. lugdb. 380. Anthyllis fruticosa, foliolis ternatis ac quinatis lanceolatis tomentosis. Sauv. meth. 237. Cytisus incanus creticus. Baub. pin. 390. Barba jovis cytisi folio, flore rubello. Barr. rar. 1389. t. 377. & 913. Loto affinis alata, folio & facie pentaphylloides frutico-

Ju

ft-11

2. TI

Tri

1

P fi

Me

i d

B. Me

bi

Hat

3. TF

n

Hab

Dif

1

R

0

1

Tr

Me

y. Mi

4. TI

Lo si, floribus in spicam longiorem positis. Plak. alm. Ha Habitat in Creta. 2 372, mbu shulling the states and the states an 5. T M Wim de a Trifolins. El mas hegh hojie atget fig chis and at hine Winne Wint the tating up wing by Mila * Meliloti leguminibus nudis polyspermis. 6. T M. carulea. I. TRIFOLIUM spicis oblongis, leguminibus seminuhiptigen Dion. hag dis mucropatis, caule crecto. Hort. cliff. 375. Roy. Lity. gal. publiched lugdb. 381 Loty majorinat writing Mor. T H Lotur. gal. puters In Lotus hortensis odorata. Baub. pin. 330. H militting lab Lotus sylvestris. Cam. epit. 724. Loty. gal fuch In Habitat in Bohemia, Lybia. Notor. Dissing for bet nom by with by lost and hortenter 2. TRI-

S Sucudad' pulla h. m. g 2. 40. O 2003 pud in annow). prices melileti. Hat pour not. H. picanthe pople 4 put. alresont. My bus not. 10 prod. 10. Ind. g./pur mulitate.

2. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis mono-M. indica. metitory ad 325 spermis, caule crecto. Hort. upf. 223.

Trifolium erectum, caule teretiusculo, pedunculis compresso-angulatis, pericarpiis racemosis rotundis rugofis nudiusculis monospermis. Fl. zeyl. 552. * Melilotus lutea indiæ orientalis erecta, folliculis rotun-

dis parvis. Pluk. alm. 246. t. 45. f. 4. B Melilotus humilis erecta, floribus exiguis odoratis al-

bis. Pluk. alm. 247. t. 45. f. 5. Habitat in India, Africa. O

3. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper- M. polonica mis lanceolatis, caule erecto. metity

Habitat in Polonia. 💿

againing that

bus ovatis. Hort. un

undo. JuJ. att. 174

ovatis. Roy. lugdb.

lart, aft, 4. P. 289.1.1

Jahan Righ S P. 1321

quinatis ; foliolis inau

craffa. B. Juf. act. 1)

, fpicis terminaliaus

losis adspersa. Spica da

S. Dige Mythe or display

matora stor ine Hyping

1. 2. 278. Pon. ital. 128

fis, caule fruticolo. Ro

rnatis ac quinatis lanceo

rubello. Barr. rar. 1389

e pentaphylloides fruio-

orem politis. Plak. alu

-lifel - he any it. Flip.

diftingvunt genus abun

The Signed mail

is, leguminibus femine

p. Hort. cliff. 375. Ry

a portentin 2. TR

time . How .

· pim. 330.

adis polyspermis.

. 237-

o. pin. 390.

White the phase the p

aria. 2

c.srulea.

Differt a T. Meliloto officizali Caule omnino tereti; Foliis minoribus, acuminatis, superne acute serratis. Racemo floribus rarissimis longiusque pedicellatis. Pedunculis teretibus nec sulcatis. Florum vexillis replicatis, nec alis extrorsum marginibus longitudinaliter conniventibus. Leguminibus dispermis, parum rugosis, lanceolato-acuminatis, longioribus. Statura &

4. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper-Mofficinalis. mis, caule erecto. Hort. cliff. 376. Hort. upf. 223. melitty. gal. Brunk Fl. Snec. 619. Mat. med. 355. Roy. Ingdb. 223. un site theme Trifolium odoratum s. Melilotus. Dod. pempt. 567. Longa dettala. Camin Melilotus officinarum germaniæ. Banh. pin. 331. y. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. Tournef. inst. 407. Lotus sylvestris, flore albo. Tabern. hist. 893.

Habitat in Europæ campestribus. O. 3

M. italica into 5. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper- M. italica. mis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis integris. Melilotus italica, folliculis rotundis. Baub. pin. 331. Melilotus italica. Cam: bort. 99. t. 29. Ltur ative grace neulat flo Blin 331. Triquino paty - quibed. 7 Habitat in Italia. () 1 w 2./un

6. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper-M. cretica. meliloty a mis membranaceis, caule erectiusculo. Tinter

Relli

Trifolium peltatum creticum. Baub. pin. 339. prodr. Line mit the dy here 142. t. 142. Lifti melitaty cutica fute maning int ani 42 15 turk mit the dy here Habitat in Creta. O Yyur for here pulledi/picate limi 42 15 turk pactors na cutimin platory na critinin Habitus Meliloti italica, foliis crassis, vix serratis carnofis, inodoris, obtufis. Legunien plane about toute toute unhance Sem 1ad 2 about congres, prothe sule ? TRIalso End waverit amailimum.

military. ad 7. TRIFOLIUM floribus spicatis, leguminibus nudie M. COTTISCHlata. math, mucronatis falcatis declinatis. Hort. cliff. 376. * Roy. 1 lugdb. 381. Gort. gelr. 435. Cast.

alchimelech alg meliloty comiculi reflent min. p. Sin. 331 Vai à antreste les Thif Walthier micheli gen 2.25. p. 26.

72 Melilotus, corniculis reflexis, major. Baub. pin. 331. Symulation /. /. Melilotus lutea major, corniculis reflexis ex codem centro ortis. Morif. bift. 2. p. 162. f. 2. t. 16. f. 11. Trifolium corniculatum 2. Dod. pempt. 573. Habitat in Gargano, Apuliæ.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Trif

Hab

12. T

te

10

cli

37 Trif

Trif

Habi

2 nd 0 13. T.

ca

tra

Lag

m

Hab

14. T.

pe

CC

Trit

Tri

And

F

d

Hal

15. T

Tr Tr

Tr

Ha

16. -

Trif

Trif

podioider.

Enzymilla- 4

1.905.

M. ornitho. S. TRIFOLIUM leguminibus nudis octospermis subternis calyce duplo longioribus, caulibus declinatis. Medicago leguminibus ternatis erectis recurvis descendentibus, pedunculo communi. Hort. cliff: 376. Trifolium siliquosum, loto affine, siliquis ornithopodii. Pluk. alm. 375. t. 68. f. I. Fœnu græcum humile repens, ornithopodii siliquis brevibus erectis. Raj. angl. 3. p. 331. t. 14. f. I. Habitat in Anglia, Gallia. O

Lupinaster . 2.323 * Lotoidea leguminibus tectis polyspermis. 3.6. Emptuaster. 9. TRIFOLIUM capitulis dimidiatis, foliis quinatis sesfilibus, leguminibus polyspermis. Hort. upf. 223. Lupinaster. Buxb. act. 2. p. 345. t. 20. Astitute for Lupinaster floribus purpureis & albis, siliquis minoribus. Amm. rath. 143. 144. Habitat in Sibiria. 2

veflexunt. n

10. TRIFOLIUM capitulis fructiferis reflexis, leguminibus trispermis.

Trifolium leguminibus polyspermis, foliolis obverseovatis denticulatis, floribus tetrapetalis, capitulis fructiferis reflexis. Gron. virg. 84. Trifolium montano simile virginianum, floribus amœne purpureis amplioribus & magis patulis summo caule glomeratis per maturitatem reflexis. Pluk. mant. 285. Habitat in Virginia.

11. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus bybridum. tetraspermis, caule adscendente. Trifoliastrum pratense corymbiferum. Mich. gen. 28. t. 25. f. 2. 6. B. Trifolium caule fistuloso crecto, capitulis subglobosis, foliolis obverse ovatis serratis. Dalib. paris. 226. Trifolium orientale altissimum, caule fistuloso, florealbo. Vaill. paris. 195. t. 22. f. s. Tri Vitium at 322. haller M. 378 . helostia D. hitolats

DECANDRIA. spicatis, leguminibus Daluh, natis. Hort. cliff. 376. DIADELPHIA DECANDRIA. 707 Trifolium flore albo. Riv. tetr. 19194 is, major. Banh. pin. · fugueliam .ad. iculis reflexis ex coden Habitat in Europæ Cultis. P. 162. J. 2. t. 16. f. 322 12. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus repens. • tetraspermis, caule repente. This of allo, minure fraine rifetium gal fut. 22. Dod. pempt. 573. Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. Hort. ibus nudis octosperni cliff. 375. Fl. Snec. 612. Mat. med. 354. Roy. Ingdb. gioribus, caulibus decin 378. Gron. virg. 85. Dalib. paris. 224. atis crectis recurvis del Trifolium pratense album. Banh. pin, 327. Trifolium repens. Riv. tett. 145. Fl. lapp. 274. nınuni. Hort, cliff: x Habitat in Europæ pascuis. 26 stipula phyte vaginary dia any yride. affine, filiquis ornithon 13. TRIFOLIUM capitulis umbellato-globofis imbri-comefum. ns, ornithopodii filiqui catis, vexillis deflexis persistentibus, leguminibus tetraspermis. Roy. lugdb. 379. 331. t. 14. f. 1. Lagopus americanus, floribus majoribus comosis. Pet. mul. 214. Habitat in America. us tectis polyspermis, niplium and irmidiatis, foliis quinati 14. TRIFOLIUM scapo nudo, leguminibus dispermis alpinara. Ipermis. Hort. upf. 201 pendulis, foliis lineari-lanceolatis. gluton. adams. Trifolium scapo nudo simplicissimo, foliis lineari-lan-345. 1. 20. ceolatis. Hort. cliff. 499. Sanv. monsp. 185. s & albis, filiquis minori Trifolium alpinum, flore magno, radice dulci. Baub. pin. 328. prodr. 143. Kotani Trifolium angustifolium alpinum. Pon. bald. 340. r. s tructiferis tefferis, legum 340. Anonis acaulis, floribus longiffimis, foliis non serratis. Hall. helv. 588. S. Triblet y [permis, foliolis obverle Habitat in Alpibus Italicis, Helveticis, Pyrenzis, Balis tetrapetalis, capitolish do. 24 Layong . rz. 84. virginianum, floribus m * Lagopoda calycibus villosis. & magis patulis somme 15. TRIFOLIUM capitulis villosis quinquessoris, in- subterrante. tatem reflexis. Pluk, m volucro centrali reflexo rigido fructum involvente. cathe blogs. Barvel. Hort. cliff. 374. * Hort. upf. 222. Roy. lugdb. 379. Dalib paris. 224. Trifolium blesense. Dodart. mem. 4. p. 313. s umbellaribus, legumin Trifolium album tricoccum subterraneum gastonium reticulatum. Morif. bist. 2. p 132. s. 2. t. 14. f. 5. ndente. molferum. Mich. gen.1 Trifolium pratense supinum cathobleps. Barr. ic. 881. Habitat in Gallia, Italia. O reelo, capitulis subglob

-26.

. 1.

Tratis. Dalib. parif. 20

um, caule fiftulolo, for

22. 1. 5.

Shitchts

16. TRIFOLIUM capitulis villosis globosis, calycibus globosum. superioribus flosculo destitutis. Hort. cliff. 374. * Zifoliand. Roy. Ingdb. 379. Tri-

Trifolium globosum repens. Banh. pin. 329. prodr. 143. Trifolium glomerulis personatæ cherleri. Baub. hist. 2. Tril

pi Trif

P. Hab

31. T.

lis

22

Trif

Trif

XI

Lag

Trif

26

Hab

11. T

til

bi

3 Trif

pi Trif

60

Hab

13. T

ly

6

Tri

Lag Hab

4. T

C: Tri

C

S

Tri

Lag

20 Ha

1. T

Tri-

P. 277 .. Lagopus minor supinus, molli & compresso capite. Barr. ic. 859.

B. Trifolium capitulis villosis globosis, calycibus omnibus fertilibus tomento connexis. Roy. lugdb. 379. Habitat Monspelii.

nifolicum au. 17. TRIFOLIUM spicis villosis longis, corollis mono-

munnic. jaeg. Trifolium montanum, spica longissima rubente. Banh, B. Sign. pin. 328.

Lagopus major alter. Dod. pempt. 578. Habitat in Italia, G. Narbonensi, Helvetia. O

18, TRIFOLIUM spicis subvillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. Triplium. Thing

Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis. Hort. cliff. 375. Fl. Juec. 612. Roy. lugdb. 580. Dalib. paris. 222.

Trifolium pratense, flore monopetalo. T. Fl. lapp. 273. Trifolium pratense purpureum. Baub. pin. 327.

funt institute for Trifolium prateuse! Cam. epit. 582. Chtation Habitat in Europæ graminosis. 24.

Spica se filis inter Folia duo, opposita, se filia, quorum Stipulæ membranacese, dilatatæ, calycem quasi communem constituunt.

/. Jquarrolum. 19. TRIFOLIUM spicis subpilosis, calycum infimo dente longissimo reflexo, caule herbaceo.

Trifolium purpureum lagopoides hirsutum annuum rotundifolium, spica dilute rubente. Moris. kist. 2. p. 140. J. 2. t. 13 f. I. Tritolium angustifolium hispanicum, spica dilute rubente. Baub. pin. 328. Habitat in Hispania. O. Habitus Trifolii pratensis. Folia Subpilosa, lanceolata autovalia, emarginata. Spicæ terminales, ovatæ; calyces parum villesi, 5-dentati: dentibus nudis, setaceis: 4 crectis; 5:0 seu infimo reliquis triplo majore, reflexo, unde Spica squarroja & uncinata valde existit.

lappacenin.

768

blium al

Lagonus ad

pratense.

20. TRIFOLIUM spicis globosis, calycibus setis rigidis obvallatis, caule erecto.

Trifolium globosum s. capitulo lagopi rotundiore. Banh. pin, 329. prodr. 143.

Trifolium capitulo glomerato rigido. Banb. hist. 2. p. 377.

Habitat Monspelii.

DECANDRIA.

. Banb. pin. 329. prode

natæ cherleri. Baub.

ili & compresso capite.

globofis, calycibus om

xis. Roy. lugdb. 379.

illofis longis, corollist

ferrulatis. Hort. cliff.

a longiffima rubente, b

bonensi, Helvetia. Q

bvillofis, cinctis stipuis

aule diffuso, foliolising

Fl. Juec. 612. Roy. in

nonopetalo. T.Fl. lapp.

oppolate, Sellua, quorum S

ta, calycem quais communi

pilofis, calycuminhmod

oides hirfurum annum

rubente. Morif. bift. 1

ispanicum, spica dilutes

Olia Jubpilofa, lancen

cæ terminales, ovateja

ts: dentibus nudis, state

eliquis triplo majore, 1

Functimata valde exift

bofis, calycibus fetis if

e herbaceo.

m. Banh. pin. 327.

epit. 582.

0/15. 24.

rollis monopetalis.

mp. 184.

pempt. 578.

21. TRIFOLIUM spicis villosis oblongis obtusis aphyl- internatione, lis, foliolis subrotundis. Roy. lugdb. 380. Hort. upf. 222. Dalib. paris. 225.

Trifolium spica rotunda rubra. Banh. pin. 328.

Trifolium album incarnatum spicatum s. Lagopus maximus. Baub. hist. 2. p. 376.

Lagopum maximum, folio & facie trifolii pratensis. Lob. 10. 39.

Trifolium alopecurum latifolium, spica longa. Barr. 10. 697.

Habitat in Italia. O

22. TRIFOLIUM spicis villosis conico-oblongis, den- angustifeli- . tibus calycinis setaceis subæqualibus, foliolis lineari- um. bus. Hort. cliff. 375. Hort. upf. 222. Roy. Lugdb. 1 Eugenia adam. 379.

Trifolium montanum angustifimum spicatum. Baub. pin. 328.

Trifolium alopecurum angustifolium elatius. Barr. ic. 698.

Habitat in G. Narbonensi, Italia. O

Lagony. w. 23. TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus ca- arvense. lycinis setaceis æqualibus. Hort. cliff. 375. Fl. Suec. Nayon 81. Bien 616. Roy. Ingdb. 379. Dalib. paris. 225.

hayonspor, hippon. Trifolium arvense humile spicatum f. Lagopus. Bank. Lagopuy Thay, puty. matt pin. 328.

Lagopus. Fuchs. hist. 494. Cam. epit. 724. Habitat in Europa, America septentrionali. O

24. TRIFOLIUM spicis pilosis, calycibus patentibus, stellatum. . / caule diffuso, foliolis cuneiformibus. Trifolium spicis ovatis pilosis, denticulis calycinis lanceolatis patulis. Hort. cliff. 375. * Roy. lugdb. 738. Sauv. monsp. 184. Trifolium stellatum. Baub. pin. 329. prodr. 143-

Lagopus minor erectus, capite globoso stellato. Barr. ic. 860. 5 755.

Habitat in Sicilia, Italia, G. Narbonensi. O

25. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus patulis: la- clypeatum. Ccc cinia

cinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. Hort. cliff. 373. * Roy. lugdb. 377.

m

11

Trit

C

Hab

21. TI

fo

Spic

Mel

gn

Habi

42. TI

br

ph

Trif

14

-2.

Habi

2. T

de

R

Trif

Trif

ra Trif

B

Hab

Lon

pe

T

Ca

l'rif

Trif

ne

20

vau

de

CI

Hab

Trif

Trifolium clypeatum argenteum. Alp. exot. 307. t. 306. Habitat in Oriente. O

. feabrunt.

770

- 26. TRIFOLIUM capitulis seffilibus ovatis, calycibus villosis inæqualibus. Trifolium spicis seffilibus lateralibus ovatis scabris. Hort,
 - cliff. 373. * Roy. lugdb. 377. Hall. helv. 583. Dalib. parif. 225. Sauv. monsp. 183.
 - Trifolium capitulo oblongo aspero. Baub. pin. 329. prodr. 140.
 - Trifolium cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. Bauh. hist. 2. p. 378.

Trifolium flosculis albis in glomerulis asperis cauliculis adnatis. Vaill. parif. 196. t. 33. f. I.

Habitat in Anglia, Gallia, Italia. O

"gomeratum. 27. TRIFOLIUM capitulis seffilibus globosis, calycibus striatis patulis æqualibus.

- Trifolium capitulis seffilibus lateralibus subglobosis. Hort. chiff. 373.* Roy. lugdb. 377. Sauv. meth. 183. Trifolium cum glomerulis, ad caulium nodos rotun-
- Ddis. Raj. angl. B. P. 329. Trifolium arvense supinum verticillatum. Barr. 10.882. Habitat in Anglia.
- 28. TRIFOLIUM capitulis seffilibus sublateralibus ovatis, calycibus striatis rotundatis.
 - Trifolium capitulis sessibles lateralibus ovatis, calycibus subrotundis villosis striatis. Fl. suec. 614. Dalib.

Trifolium parvum hirsutum, flore parvo dilute purpureo in glomerulis mollioribus oblongis, semine magno. Vaill. paris. 196. t. 33. f. 2. Habitat in Germania, Gallia, Hispania.

Apy. 37. w montanum. 2

. Ariatum.

unt Institute for

29. TRIFOLIUM capitulis terminalibus, corollarum vexillis fubulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis ferratis. Fl. fuec. 611. Dalib. parif. 223.
Trifolium montanum album. Bauh. pin. 328.
Trifolium pratenfe album. Fuchf. hift. 818.
Habitat in pratis ficcis Europæ septentrionalis. 2

fruticans. 30. TRIFOLIUM spicis subvilloss: lacinia calycum fruticans. 30. TRIFOLIUM spicis subvillos: lacinia subsetsibus. 14 tufflinta infima maxima, caule fruticoso, foliis subsetsibus. An / n 479.

maxima, foliis fere seffilibus. Hort. cliff. 373.* Roy. Ingdb. 378.

Trifolium africanum fruticans, flore purpurascente. Comm. bort. 2. p. 211. t. 106. Habitat in Æthiopia. B

31. TRIFOLIUM acaule, pedunculis unifloris, floribus uniflorum. foliisque commixtis.

Spica trifolia. Alp. exot. 169. t. 168.

DECANDRIA.

coolata, foliolis ovatis.)

nteum. Alp. exot. 307.1

is seffilibus ovatis, cal

iteralibus ovatis scabris.

377. Hall. belv. 583.

go aspero. Baub. pin.

geniculis glomerulos di

glomerulis asperis call

s feffilibus globofis, cal

ibus lateralibus fubgion

lugdb. 377. Sauv. meth

s, ad caulium nodos ro

verticillatum. Barria

s feffilibus fablateralibus o

bus lateralibus ovatis, cal

Atriatis. Fl. Jucc. 614. D.

m, flore parvo diluten

oribus oblongis, seminer

lis terminalibus, corola

erecto, foliolis lance

Dalib. parif. 223.

m. Baub. pin. 328.

Fuchf. bift. 818.

ropæ Septentrionalis. 2

fubvillofis: lacinia ci

fruticofo, foliis subsell

dis: lacinia calycum

1. 33. 1. 2.

Ilia, Hispania.

otundatis.

zon∫p. 183.

1. 2. p. 378.

6. t. 33. f. I.

, Italia. O

IS.

9.

Melilotus cretica humillima humifusa, flore albo magno. Tournef. cor. 28. Habitat in Creta.

aut gune. Viflater. * Vesicaria calycibus inflatis ventricosis. 32. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus inflatis gla-Spumosum.

bris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis. Hort cliff. 373. * Roy. lugdb. 378.

Trifolium capitulo spumoio lævi. Baub. pin. 329. prodr. 140.

Trifolium caule nuco, glomerulis glabris. Baub. bist. 2. p. 379. Habitat in Gallia, Italia, Apulia.

Triflater ad. 33. TRIFOLIUM spicis subovatis, calycibus inflatis re/upinatum. dorso gibbis, caulibus prostratis. Hort. cliff. 373 Ocumentat Roy. Ingdb. 378. Gort. gebr. 429. Trifolium pratense folliculatum. Baub. pin. 329. Trifolium pratense folliculatum, flore inverso Barr. rar. 824. 2. 872. Trifolium folliculatum s. vesicarium minus purpureum. Banh. bift. 2. p. 379. Habitat in Anglia, Belgio.

Corollæ resupinatæ in boc sunt, ut vexillum respiciat peripheriam, carina centrum.

mittatuy ad

34. TRIFOLIUM capitulis sessibles globosis hirsutis, tomentosum. calycibus inflatis reflexis. Sauv. monsp. 175. * Trifolium fragiferum tomentosum. Magn. mons. 265.

t. 264.

Trifolium glomerulis tomentofis per caulium longitudinem. Baub. hift. 2. p. 379.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania, D. Sauvages. Loefling. 2

Caules andique decumbentes, non repentes. Folia obovata denticulata, obtusa, glabra, stipulis acuminatis; Pedunculi axillares, foliis non longiores. Capitula paron. Caly-Gcc2 CIS

cis dentes 3 Superiores elongati, inferiores 2 parvi. Calyx crassissimo tomento involutus, ut vasa minime conspiciantur. Accedit propins T. folliculato, quamfragifero. Involucrum universale dodecaphyllum. Corollæ fere resupinatæ.

Tri

Tri

Hab

39. T

p.t

b

Tril

Hab

Cau

li

1 1%

40. T

fr Tri

r

An

Hai

Cau

6

12

Le

La

L

Ha

L

R

hiffatty au frogiferum. 35. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus in-frogiferum. 35. University reflexis, caulibus repentibus. Hort. flatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. Hort, cliff. 373. * Fl. Snec. 613. Roy. Ingdb. 378. Dalib. parif. 224. Gort. gelr. 428.

Trifolium fragiferum frisicum. Bauh. pin. 329. Clus.

cur. app. 38. t. 39. Trifolium fragiferum. Vaill. paris. 195. t. 22. f. 2. Trifolium caule nudo, glomerulis glabris. Banh. hist. 2.

P. 371). fig. majore. Habitat in Suecia, Gallia. Anglia. 2 Pedunculi in hoc foliis longiores, & Caules radices agunt. Calyces parum pubescentes.

* Lupulina vexillis corollæ inflexis. • agrarium. 36. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis des Lupulinum hiv . md. flexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. Fl. Juce. 617: Hort. cliff. 374. Roy. lugdb. 378. Dalib. stitute tor entat parif. 2.26. d Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli s' agrarium. Baub. pin. 328. Vaill. parif. 196. t. 22. f. 3. flow une ality instalis. this Trifolium agrarium. Dod. pempt. 576. alies formais 1. fatily B.B. 3 Habitat in Europæ pratis. () Calyx ante florescentiam vix manifeste villosus 5. un alterove pilo ad apices instructus. Corollæ flave ne

Spadicere.

hanalinem. and mostanum.

772

37. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis de L flexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. Trifolium montanum lupulinum. Baub. pin. 328. prodr.

Trifolium pratense, flore rufescente. Vaill. paris. 196. Lupulinum montanum, capitulis spadiceis. Rupp. jen. 207. Lotus montanus aureus, amplo lupuli capitulo, annus.

Barr. ic. 1024. Habitat in Europæ pratis siccis. O Differt a præcedenti vexillis ferrugineis, calycibus præcipue ante florescentiam manifeste pilosissimis. ens. 38. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus. Fl. Snec. 618. It. gotl. 257.

nifolium ægyptiven lagner og flore allerante. harrain ægypt? Alenandrinum mægypta profoen elletter el Barrain So DIADELPHIA DECANDRIA. 773

Trifolium pratense luteo-croccum. Vaill. paris. 196. Trifolium lupulinum alterum minus. Raj. angl. 3. P. 330. t. 14. f. 3. Habitat in Europæ campestribas. 24 helvat. D. Wiblet.

DECANDRIA.

elongati, inferiores 21

involutus, ut vaja mi

opins T. folliculato, quan

ersale dodecapbyllum. (

s fubrotundis, calyciau

caulibus repentibus.

13. Roy. Ingdb. 378.0

um. Bauh. pin. 329.0

ill. parif. 195. t. 1.

merulis glabris. Banh.

Anglia. 2

bescentes.

is corollæ inflexis,

valibus imbricatis, verili

cibus nudis, caule erecht

374. Roy. Ingdb. 378.D.

, capitulo Tupuli Lagran

parif. 196. 1. 12. f. 3.

vix maxifeste villofus f.

fiructus. Corolle flau

valibus imbricatis, veri

cibus pilofis, caule erett

inum. Baub. pin. 328.0

ufescente. Vaill. pari

itulis spadiceis. Ruppyen

mplo lupuli capitulo, au

pemps. 576.

39. TRIFOLIUM spicis subimbricatis, vexillis deflexis sufforme. perfiltentibus, calycibus pedicellatis, caulibus procumbentibus.

Trifolium lupulinum minimum. Morif. bift. 2. p. 142. Raj. angl. 3. p. 331. t. 14. f. 4. Habitat in Anglia. (9)

Caules filiformes, procumbentes. Pedunculi filiformes, foliis longiores, sustimentes Flores 3 ad 5, in satis sape 12. ad 15, deflexos, Calycibus fructum ferentibus insidentibus manifestis & distinctis pedicellis.

giores, & Caules raine 40. TRIFOLIUM spicis bifloris sessibus, involucris hi- biflorum. spidis infundibuliformibus, foliis lanceolatis.

Trifolium caule piloso, foliolis subserratis, floribus lateralibus subsolitariis, leguminibus ovatis. Gron. virg. 84. Anonis mariana lutea, foliis angustioribus. Pet. fice. 84. Habitat in Virginia, Canada.

Caulis erectiusculus. Folia ternata, lanceolata: Petioli breves: Stipulis vaginalibus, dentibus duobus acuminatis longitudine vagina. Capitula axillaria, infundibuliformia, sefficia, foliolis pluribus obvoluta leviter trifidis: lacinia media longiore. Flores duo, alternatim prodeuntes.

LOTUS.

* Leguminibus rarioribus nec capitulum constituentibus.

1. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadran-maritima. 1. Gen.

gulatis, bracteis lanceolatis. It. al. 143. * Fl. suer. 610. Sauv. monsp. 188. Lotus tetragonolobus maritimus, flore luteo. Bart. act.

2. p. 346. Lotus filiquosa lutea, siliquis pinnatis strictioribus & longioribus. Raj. bist. 967. Habitat in Europæ maritimis. 2

Candalida.

Scandalida ed. 326

2. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadran- tetragonolo- • L Gun. 15 ferrugineis, calycibu bis. Causer 1 gulatis, bracteis ovatis. Hort. upf. 220, manutifeste pilosisimis. Lotus leguminibus subsolitariis: angulis quatuor mem- Candalida. Hell ovalibus imbricatis, branaceis. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388. aulibus procumbentito Lotus ruber, siliqua angulosa. Baub. pin. 332. Ccc3 10-

Lotus pulcherrima tetragonolobus. Cam. bort. 91. 2.26. Habitat in Siciliæ collibus. O

8. LC

C

I

Lo

Lo

Hal

9. L(

e

Lo

j

Ha

10. 1

1

10

"La

Ha

11.]

L

L

L

H

- 3. LOTUS leguminibus c'onjugatis membranaceo-quadrangulis, bracteis oblongo-ovatis.
- 326. Lotus Intens, siliqua angulosa. Boërb. lugdb. 2. p. 37. Habitat Monspelii. O

Convenit cum 2 habitu, acate, foliis, hirsutie, leguminibus; differt vero corollis duplo minoribus, leguminibus duobus, eorumque alis integris minus crispis, foliorum basi caulem non amplexante, sed ab opposito latere debiscente.


US leguminibus solitariis rectis teretibus termi-

" Dalida

conjugata.

Vcandalida ad

774



oto nelol

2. Gen.

Loty

nalbus, caule crecto. Sano. monsp. 189. f. Tournet. inst pio multiculmi) Lotus tritolla pratentis filiquola monospelienfium. Lob. Habitat Monspelii. 21. "how inputit his alter why a

5. LOTUS leguminibus subsolitariis gibbis incurvis. Hort. cliff. 370. Roy. Ingdb. 388.

Billi Lotus pentaphyllos, filiqua cornuta. Banb. pin. 332 Lotus edulis cretica. Raj. bist. 967. Espansori Vent. Lotus oligoceratos cretica lutea, siliquis binis curvis pro-

pendentibus. Morif. bist. 2. p. 176. s. 2 t. 18 f.s. Habitat in Italia, Sicilia, Creta.

· peregrinns. 6. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus compresfis nutantibus. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388. Sauv. monsp. 188. Lotus, filiquis geminis, peregrina Boërb. lugdb. 2.p. 38. Habitat in Europa australi. Sydeny H. mb.

- angustissimur 7. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule crecto, pedunculis alternis.
 - Lotus leguminibus sæpius ternatis linearibus strictis ere-Etis. Hort. cliff. 372. Ray. Ingab. 388. Sauv. monsp. 188.
 - Lotus pentaphyllos minor hirsutus, siliqua angustissima. Baub. pin 332. Lotus corniculata, siliquis singularibus s. binis, tenuis, Baub. bist. 2. p. 356. Habitat in G. Narbonensi. 8. PO

DECANDRIA 24. 3 2 5 per pl tar. enter the plan Her think B. Bir. 332. x foou 2 Don. tolobus. Cam. bort. 91.) Libyon) DIADELPHIA DECANDRIA. Loty ad 321 8. LOTUS leguminibus subquinatis arcuatis compressis, ornithopodi- . popjugatis membranaceo. ordes. caulibus diffusis. Hort. cliff. 372. Hort. upf. 220. Lotitzia · ad. Roy. lugdb. 388. Sauv. monf. 188. ofa. Boerb. Ingdb. 2. Lotus filiquis ornithopodii. Banh. pin. 332. Lotus peculiaris filiquosa. Cam. hort. 91. t. 25. chate, foliis, birfutie, Habitat in Sicilia. O rellis dupla minoribus, 9. LOTUS leguminibus fubternatis, caule herbaceo ere- jacoban, e alis integris minuso cto, foliolis linearibus. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. Lotuy. ad amplexante, Sed aboy 388. Lotus angustifolia, flore luteo purpurascente, infulæ f. jacobi. Comm. hort. 2. p. 165. t. 83. itariis rectis teretio Habitat in Infula S. Jacobi. O m on 7. 7180? * Pedunculis multifloris in capitulum. Banb. pm. 332 10. LOTUS eapitulis dimidiatis, caule fruticoso, foliis cretica. . nitidis. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 387. Loty a. Lotus argentea cretica. Pluk, alm. 226. t. 43. f. I. Lotus polyceratos fruticosa cretica argentea, filiquis lon-Darry alter ulig gissimis propendentibus rectis. Morif. hist. 2. p. 177. Habitat in Syria, Creta. 4. mang 1. 1/ p. 15 hai for, 25 junii fuel. folitariis gibbis incurvis! 11. LOTUS capitulis hirsutis, caule erecto hirto, legu-birsuta. . minibus ovatis. Hort. upf. 220. Sauv. monsp. 188. 7 my triphyllun Alin cornuta. Banb. pin. 20 Lotus caule fruticolo, florum capitulis depression, calybift. 967. 111 oly a ! cibus lanigeris. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 387. lucea, Higusomicorris Emmital gall Lotus pentaphyllos filiquosus villosus. Baub. pin. 372. . 2. p. 170. J. 2 t. 18 f. Lotus polyceratos frutescens incana alba, filiquis erectis craffioribus & brevioribus rectis. Morif. bist. 2. p. 177. J. 2. t. 18. f. 14. ibomatis linearious com Habitat in G. Narbonensi, Italia. 24 -372. Roy. lugdb. 388. 4 12. LOTUS capitulis subglobosis, caule erecto, legumi- recta. nibus rectis glabris. Hort. ups. 221. regring Boerb. lugdb.1

Agini

388.

Creta.

ht a Syderady He rule.

culis alternis.

Dispatis linearibus fried

ternatis linearibus frith

lay. Ingdb. 388. South

hirfurus, filiqua angul

s fingularibus f. binis,

G.

Lotus caule fruticoso, florum capitulis globosis. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 387. Sauv. monsp. 188. Lotus siliquosus glaber, flore rotundo. Baub. pin. 332. Lotus polyceratos frutescens hirsuta alba major latifolia, filiquis tenuibus curtis rectis. Morif. hist. 2. p. 177. J. 2. t. 18. f. 13. Loty Lybra Daler ? Lotury a Habitat in G. Narbonensi, Sicilia, Calabria. 2 13. LOTUS capitulis depression, caulibus decumbentibus, corniculate. leguminibus cylindricis. Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus decumbentibns teretibus. Hort. cliff. 372. Fl. suec. 609. Roy. Ingab. 388. Dalib. parif. 221. Ccc4 Lotus

Mel

C

1

8.

Mel

Hab

Foli

3. TR

Me

11

Me

P Foe

P

Fæ

Ha

4. T]

1

1

Me

Fa

Ha

Sti

M

F

H S

1a

Lotus f. Melilotus pentaphyllos minor glabra. Baub. pin. Lagnur: 1. hag Loty gal Dod. 94 militating 7 hay Safuely 3.32.

Stails omelilety. iam Trifolium corniculatum. Dod. pempt. 573.

376

plending ad

B. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente. Bauh. pin. 222.

tenuifolia. (y. Lotus pentaphyllos frutefcens, tenuissimis glabris foliis. Baub. pin. 332.

Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis folijs, Baub. prodr. 144. Burl. XVIII. 73. Habitat in Europa. 24

Hujus forte varietas etiam y. est, sajus Caules duple longiores & angustiores, Folia linearia, & Legumina angustiora. Videtur in umbra nata; Bufferus C. Baubino hanc attulit.

14. LOTUS capitulis dimidiatis, caule diffuso ramosiscytifoides. simo, foliis tomentosis. Roy. Ingdb. 387. ? to Topey Tpa. Theph Lotus filiquosa maritima lutea, cytisi facie. Barr. rar. Loto metra Ung C. A. 71. t. 1031.

Dorycnium D. 323. Habitat in maritimis Europæ anstralis. Dorgenium, 15. LOTUS capitulis aphyllis, foliis seffilibus quinatis. dy. Dorycnium foliis digitatis setfilibus. Hort. cliff. 371.* Roy. Ingdb. 389. Sauv. monsp. 214. Dorycnium monspeliensium. Lob. ic. 51. Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis. Baub. pin. 329. Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Austria. 24

TRIGONELLA.

1. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis Withentica. pendulis linearibus rectis, foliolis sublanceolatis. Trigonella leguminibus pedunculatis. Vir. cliff. 76. Hort. cliff. 378. * Roy. lugdb. 382. Melilotus supina angustifolia, medicæ facie, siliqua compressa. Amm. ruth. 159. Lotus montana humilior trifolia ad caulem alata lutea, siliqua modo recta, modo medicaginis instar falcata nigra. Amm. ruth. 119. Habitat in Sibiria. Foliola lanceolata, obtusissima, superne acute serrata, dentata. Stipulæ integerrimæ. Legumina linearia. platyearpos. 2. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis 6. pendulis ovalibus compressis, caule difuso, foliolis fubrotundis. Hort. cliff. 229. Meli-

Melilotus supina latifolia, siliqua lata membranacea compressa. Amm. ruth. 158. Act. goett. 1. p. 213. t.

13.

DECANDRIA.

yllos minor glabra. Bank

najore luteo splendente, B

ens, tenuiffimis glabiss

rutescens, tenuissimis f

diaris, caule diffulo m

uten, cytifi facie. Ban.

Illis, foliis seffilibus quin

s feffilibos. Hort. cliff.

lium, honious velati in ci.

Narbonenfi, Auftia 4

inibus pedunculatis com

, foliolis fublanceolati

unculatis. Vir. diff. 76.1

olia, medica facie,

rifolia ad caulem alatal

odo medicaginis infar

fund, Superne acaie fen

right. Legumina linear

nibus pedunculatis con

effis, caule diffuio, h

Roy. Ingdb. 387.

opz anstralis.

mon[p. 214.

pin. 329.

NELLA.

. 382.

199.

19.

229.

m. Log. 46. 51.

1. XVIII. 73.

Dod. pempt. 573.

Melilotus filiqua membranacea compressa. Act. petrop. 8. p. 209. t. 12.

Habitat in Sibiria. 3

Foliola subovata, longitudinaliter acute serrata. Stipulæ sæpins dentatæ. Legumina ovalia.

2. eft, snjns Caules 3. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis polyceration. . 1. Gen Folia linearia, & Lo erectis rectis parallelis linearibus. 7.449. Kentia al. 322 in umbra nata; Butfen Medicago leguminibus confertis sessibus erectis. Roy. 2 D. Kentmann lugdb. 382. Sauv. monsp. 187. potan.

Medicago leguminibus confertis longis rectis parallelis, pedunculo communi. Hort. cliff. 376. *

Foenum græcum sylvestre alterum polyceration. Baub. pin. 348.

Foenum græcum sylvestre alterum. Dod. pempt. 547. Habitat in Hilpania.

4. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis conge-spinos. stis declinatis subfalcatis compressis, pedunculo com- Kentra. muni spinoso foliis longiore.

Medicago leguminibus sæpius ternatis sessibus arcuatis declinatis, spina ex alis. Hort. cliff. 377.

Fœnum græcum sylvestre polyceration creticum majus. Breyn. cent. 79. t. 33. f. I.

Habitat in Creta. O Stipulæ dentatæ; Pedunculus fit spina rigida ad cujus basins sæpe Legumina 5, venosa, glabra.

mus 5. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis monspeliaca. declinatis subfalcatis, pedunculo communi inermi fojusta. liis longiore. 12 March 1 Charles Medicago leguminibus confertis seffilibus arcuatis inclinatis. Hort. cliff. 377. Roy. lugdb. 382. Dalib. parif. 231. Sanv. monsp. 187. Fænum græcum sylvestre polyceratium minus monspeliacum. Breyn. cent. 80. t. 33. f. 2. Riv Jrg. 278. Habitat Monspelii. () Stipulæ simplices. Pedunculus apice desinit in acumen SE STO 2M molle, sub qua Legumina 10 ad 12. pung raun a 322 6. TRIGONELLA leguminibus sessibus strictis ere-Fammingra-Etiusculis subfalcatis acuminatis. Hort. upf. 229. Mat. cum. Shin For no grossim. gal filly. 20

med. 356.

Cccs

TANS. Die . et Mayor 1. Buszepass J. alyongowr J. REPaity1. Viliale. Mann vilida. Alin. lib 14:0.16. Zyle Thegeh L. S. c. 17.

The monthly good

Kentia ad.

778

Trigonella leguminibus seffilibus. Vir. cliff. 76. Roy. lugdb. 383. Dalib. parif. 2.2.8. Sauv. monsp. 187. Medicago leguminibus subsolitariis seffilibus erectis reflexo-falcatis acuminatis. Hort. cliff. 376. Fœnum græcum fativum. Baub. pin. 348. Fœnum græcum. Fuchs. bist. 798. Cam. epit. 199. B.F.œnum græcum fylvestre. Banh. pin. 348. Habitat Monspelii. O

Foel

Hab

prame MI

11

2

p:

Me

Hab

7. M]

b

Tri

n

11

Tri

Tri

Ha

8. M

Tr

M

H

a.N

Tri

7. TRIGONELLA leguminibus sessibus subsolitariis subfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuso.Fl.zeyl.285.* Lotus maderaspatanus villosus, ornithopodii siliqua singulari. Pluk. alm. 226: t. 200. f. 7. Habitat in India.

MEDICAGO.

I. MEDICAGO leguminibus lunatis margine integerimis, caule arboreo. Hort. cliff. 376. Hort. ups. 230, Cytipy. gal. crap. Lignum Rhodium Belle Roy. 122 db. 382. Cytisus incanus, siliquis falcatis. Baub. pin. 389. 20 TEGOS - gracy.

Cytifus marantæ. Lob. ic. 2. p. 46. Habitat in Rhodo, Neapoli. 5

R. C. ist. a. 2. MEDICAGO caule erecto ramofissimo, floribus fafoiculatis terminalibus. Gron. virg. 86. ite tor Loto affinis trifoliata frutescens glabra. Pluk. mant. 120, Habitat in Virginia.

· vadiata. medica . ad

· indica.

2.325

virginica,

A PRIME AD. S. C. P. S. P.

in a set and the

medica

3. MEDICAGO leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. Hort. cliff. 377. * Hort. ups. 230. Roy. Ingdb. 381. Berg. viadr. 95. Medicago annua, filiqua falcata striata. Morif. bist. 2. p. 158. f. 2. t. 16. f. 3. Trifolium siliqua falcata. Baub. pin. 330. Lunaria radiata italorum. Lob. ic. 2. p. 38. Habitat in Italia. O

DICAGO leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. Hort. cliff. 377. *. Hort. up. 230. Roy. Lugdb. 382. Loto affinis siliquis hirsutis circinnatis. Baub. pin. 333. Habitat in Hispania, Italia. O

5. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus con-Medica Gud. dol.gin tortis, caule crecto glabro. Hort. cliff. 377. Roy. pusing. Dire thigh lugdb. 281. 100 grand and program of the Medica legitima. Clus. bist. 2. p. 2.42. Medica sativa Moris. bist. 2. p. 150. S. 2. t. 16. f. 2. Fæ

DECANDRIA.

effilibus. Vir. cliff. 76.

. Hort. cliff. 376.

Banb. pin. 348.

c. Banh. pin. 348.

\$. 200. J. 7.

us lunatis margine inter

rt. cliff. 376. Hort. H

alcatis. Baub. pin. 389.

cto ramofifimo, floribus

cens glaora. Plak, mant, 1-

15 reniformious margine de

ra. cliff. 377. * Hort,

alcata ftriata. Morif. bil.

Berg. viadr. 95.

Baub. pin. 330.

Lob. 16. 2. p. 38.

s reniformibus margined

rt. cliff. 377. *. Hort.

circinnatis. Baub. pw.

racemofis, leguminibus

bro. Hort. cliff. 377.

2. P. 150. J. 2. t. 16.

F. 2. P. 242.

. 0

rrom. virg. 86.

AGO.

2. p. 46.

J. 228. Sano. monsp. il osolitariis seffilibus ereti Fænum burgundicum. Lob. ic. 2. p. 30. Habitat in Hilpaniæ, Galliæ apricis. 24 2 p. nutaeur, rami Agni. 10 note for aduat cantur " cinguity relioti fun langited triang. 5 ad 7 Instit. malature car ift. 798. Cam. epit. 100 6. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lu-falcata. milla ad T natis, caule prostrato. Fl. suec. 620. Dalib: paris. mora /ylouto) j.A. 229. Trifolium sylvestre luteum, filiqua cornuta. Banh. pin. 330. migo /y/r finity cruis Vall. Art. Medica flavo flore. Clus. bist. 2. p. 243. ibus seffilibus subsolitario nis, caule diffuso.Fl.zeyl ofus, ornithopodii filiqui Habitat in Europæ pratis apricis, ficcis. 24

7. MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformi Iupuliua. 216un adau bus monospermis, caule procumbente. Fl. succ. 621. medicages. 325. Dalib. paris. 281. maileter captul mission incapitation Computer 4.7. icages. 325. Trifolium leguminibus spicatis reniformibus nudis mo-

nospermis, caule procumbente, Hort. cliff. 375. Roy. lugdb. 380.

Trifolium pratense luteum, capitulo breviore. Baub. pin. 328. Rifstown tugendiaena goo Trifolium pratense luteum. Fuchs. bist. 819. Habitat in Europæ pratis. 3

8. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus maring. cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. medica Hort. cliff. 378. * Roy. lugab. 381. Sauv. monsp. 1186.111110

Trifolium cochleatum maritimum tomentofum. Banb. pin. 329.

Medica marina. Cluf. bist. 2. p. 243. 18 200 Harden Habitat in maris Mediterranei littoribus.9

9. MEDICAGO leguminibus cochleatis, stipulis denta; polymorpha. . tis, caule diffuso. Hort. cliff. 378. Hort. upf. 230. maria ant. Roy. lugdb. 381. Datib. parif. 230. Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido. Bauh. media alpin. 329. a. Medicago leguminibus solitariis cochleatis compressis orbicularis. . planis, stipulis ciliatis, caule diffuso. Sano. monsp. 186. Medica major dicarpos capsula compressa orbiculata nigra plana oris crilpis. Morif. bist. 2. p. 152. f. 2. t. 15. f. I. Medica orbiculata. Banh. bist. 2. p. 384. Trifolium cochleatum f. scutellatum, folio latiore, fructu minuto obruso. Baub. pin. 329. prodr. 140. B. Medica cochleata major dicarpos, capsula rotunda scutellata. globo-

	780	DIADELPHIA DECANDRIA.	
	a la serie	globosa scutellata. Moris. hist. 2. p. 152. S. 2. 2.	Me Tri
, tornata.	T.A. A.	edica scutellata. Baub. hist. 3. p. 384. rifolium cochleatum, fructu latiore. Baub. pin. 329. ledica tornata major & minor lenis. Park. theatr.	µ.Me n I. Me
rurbinata.	D M	edicard fructu turbinato. Sauv. monsp. 187.	Tri
		edica dicarpos, fructus capfula turbinata rugosa. Mo. rif. hist. 2 p. 153. ledica magna turbinata. Baub. hist. 2. p. 385.	Tri
	T	oblongo Bauh, pin, 329.	6
· intertexta.	E. N	ledica cochleata spinosa major dicarpos, capsula s. spinis longioribus sursum & deorsum tendentibus. Morif. bist. 1. p. 153. J. 2. t. 15. f. 8. 9. 7.	
• arabica.)	iore alba, folio cordato macula fusca. Morif. kist. 2.	
	T	p. 144. s. 2. t. 15. f. 17. Iedica arabica. Cam. bort. 97. t. 27. Vrifolium cochleatum, folio maculato cordato. Bauh.	
coronata.	er A	pin. 329.	11
titute fo	and the bar of	tam referente. Sauv. monsp. 187. Aedicago cochleata polycarpos annua, capfula minima coronata. Morif. hist. 2. p. 155, f. 25. t. 15. f. 21.	и
in the second	A	Aedica coronata cherleri parva. Baub. Bill. 2. p. 300. Frifolium folio obtuso, folliculis coronatis. Baub. pin.	
ciliaris.		329. prodr. 141. n. 13. Viedicago leguminibus congestis globosts hispidis, sti-	

unt ths

pulis ciliatis. Sauv. monsp. 186.

