



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

*ridens mucronalis folio fruille 2.32.
fl. et fructus pedunculis datig. fl. plurimi umbellae terminis. radice
cole, simplici floruli 5 denti. calyculato 5 in rotula. Semen 1 gram 10 ottos*} *Paica jullo. Seru jule
subtiliter latet cum aliis incertis. siccando numerat. videtur species. Secta lin*

SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA. 921

Habitat in Peru. D. Jussien. hic diffit genere a frumento fruille 2.50.
Caulis teres, erectus, compositus. Folia apposita, sessilia,
amplexicaulia, cordato-oblonga, glabra, subtrinervia,
integerrima, margine scabra. Calyx terminalis, sessilis,
solitarius, glaber, cylindrico-oblongus, imbricatus squa-
mis raris, obtusis. Corolla lutea; Radius pentapetalus,
longitudine calycis, pistillis bifidis. Discus flosculis 5
paleis distinctus. Rami ex alis (non flori proximis) can-
li similes.

Zinnia

Caryilla ad. 130.

MELAMPODIUM. eu nome grecum Lillei vige Hartenii altius officin. germanicae.

1. MELAMPODIUM. Hort. cliff. 425.*

Habitat in Vera Cruce. reponit 1 pd. radiatum angustae rami opp. flosculis hypani. basi ciliata. tallo
Jacobea humifusa hyperici foliis. Muell. cat. p. 110 tab. 95. primitur hyperi idem probat
H. blt annua et terminalis.

CALENDULA.

1. CALENDULA seminibus radii cymbiformibus echino officinalis.

natis: disci bicornibus. Hort. cliff. 425. Hort. ups. Caltha. Plin. Suec. und
274. Fl. suec. 712. Mat. 407. Roy. lugdb. 177. Da-
lib. paris. 268.

Caltha vulgaris. Bauh. pin. 275.

B. Caltha arvensis. Bauh. pin. 275.

G. Caltha polyanthos major. Bauh. pin. 275.

J. Caltha floribus reflexis. Bauh. pin. 275.

E. Caltha prolifera, majoribus f. minoribus floribus. Bauh.
pin. 275.

Habitat in Europæ arvis. Ore dicunt 3 ad 2 pd. pl. ter.

2. CALENDULA foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis pluvialis.

culis filiformibus. Hort. ups. 274.

Calendula foliis dentatis. Roy. lugdb. 177.

Calendula seminibus radii obsolete serratis; disci corda-
tis. Hort. cliff. 425.

Calendula humilis africana, flore intus albo, foris vio-
laceo simplici. Herm. lugdb. 104. t. 105. Breyn. ic.

26. t. 14. Stiss. bot. 59. t. 59.

Habitat in Æthiopia. Ore mititerraneum. At flore amplexo
unusquam planus hordeaceus.

3. CALENDULA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis superne incrassatis. hybrida. 4600.

Calendula foliis radicalibus sinuatis, caulinis superne
denticulatis. Roy. lugdb. 177.

Cardispernum africanum pubescens, foliis incisis, par-
vo flore. Trant. act. paris. 1724. p. 39. t. 2.

Habitat in Æthiopia. 3

Tacca foliis latris ac marginis rotundatis. Plen. cat. 18. Pect. 1. Lin. ed.
nunc Synphyta
atram marginem rotundatam. 4. CA-
Seala ad 134

atram marginem rotundatam. 4. CA-
Seala ad 134

Quesse 14 pd. fl. opp. crenatis lobi virgin. cult. hyperi

perfeta levibus velut abbas vel aploca ciliata. floret ann.

car. sp. phyt.

Tacca humi folia hyperi flv. 1724 cat. 1718.

Malabaricae Bauh. Plen. tab. 100. id falsa. ciliata. flores

Organy hyper. fl. 1724. pl. 100. ciliata. Receptac.

Plen. 1724. 100. id falsa. ciliata.

- *nudicaulis.* 4. **CALENDULA** foliis lanceolatis sinuato-dentatis,
 caule nudo. *Caltha afric. fl. intus alto, fons violaceo.* 2. 499.
Calendula africana, foliis scabiosæ argenteæ viridibus.
Herm. afr. 5.
 Bellis florum pediculis pene aphyllis, foliis incisis. *Comm.*
hort. 2. *p.* 66. *t.* 33.
Caltha africana, flore intus albo extus leviter violaceo,
 semine plano cordato. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 113.
Habitat in Aethiopia. ◊

• *graminifolia* 5. **CALENDULA** foliis linearibus subintegerrimis,
 caule subnudo.
Calendula foliis linearibus denticulatis & integerrimis.
Roy. lugdb. 177.
Calendula africana, foliis gramineis rarius dentatis au-
 reis. *Herm. afr.* 5.
Caltha africana, foliis croci angustis, florum petalis ex-
 terne purpurascensibus interne albis. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 113.
Dimorphotheca statices folio. *Vaill. act.* 1720. *p.* 280.
 Bellis africana, florum pediculis foliosis foliis angustis
 & integris. *Comm. hort.* 2. *p.* 67. *t.* 34.
Habitat in Aethiopia.
 Anne bæ posteriores 3. 4. 5. e *C. pluviali* olim or-
 tæ sint? Sic suadet locus, semina, color corollæ, ba-
 bitus.

~~Egumenus avicula usi greci; ARCTOTIS.~~

Arctotheca jacobææ folio, radiis florum intus luteis, extus purpureis. Vaill. act. 1720. p. 428.

Anemonospermos africana, foliis cardui benedicti, florum radiis intus sulphureis. Comm. hort. 2. p. 43. t. 22.

β. *Anemonospermos afra*, folio jacobææ tenuiter lacinato, flore aurantio pulcherrimo. Boerb. lugdb. 1. p. 100. t. 100.

Habitat in Aethiopia.

4. *ARCTOTIS* foliis lanceolato-linearibus integris denticulatis. Hort. cliff. 412. Roy. lugdb. 178. *angustifolia*.

Anemonospermos afra, folio serrato rigido, flore intus sulphureo extus puniceo. Boerb. lugdb. 1. p. 100.

Habitat in Aethiopia.

OSTEOSPERMUM. Lm. osteocarpon. Pluk. 7.3. 82. f. 4.

1. *OSTEOSPERMUM* foliis oppositis palmatis. Hort. Uvedalia. Petas n° 797. cliff. 424. Hort. upf. 274. Roy. lugdb. 179. Gron. ? BiKerav ad. 130. virg. 106,

Chrysanthemum, angulosis platani foliis, virginianum.

Pluk. alm. 99. t. 83. f. 3.

Chrysanthemum perenne virginianum majus, platani orientalis folio. Moris. bist. 3. p. 22. f. 6. t. 7. f. 55.

Habitat in Virginia. 2. 5.

2. *OSTEOSPERMUM* spinis ramosis. Hort. cliff. 424. *spinosum*. *Monilifera* ad. *fusca*.
Roy. lugdb. 179.

Chrysanthemoides osteospermum africanum odoratum spinosum & viscosum. Comm. hort. 2. p. 85. t. 43.

Chrysanthemum africanum frutescens spinosum. Volk. norib. 105. t. 105.

Habitat in Aethiopia. 5

3. *OSTEOSPERMUM* foliis ovalibus serratis. Hort. *moniliferum* cliff. 424. Roy. lugdb. 179. *monilifera*

Chrysanthemoides afrum, populi albæ foliis. T. Ditt. 3. Will. ad. 127. elth. 80. t. 68. f. 79.

Chrysanthemum africanum frutescens, telephii fere foliis crassis, osteocarpon. Pluk. amalb. 55. t. 382. f. 4.

Chrysanthemum arborescens æthiopicum, foliis populi albæ. Breyn. cent. 155. t. 76.

Habitat in Aethiopia. 5

4. O-

924 SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA.

SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA. 925

- Conyza aquatica laciniata.* Baub. pin. 266.
Habitat in Europæ paludibus maritimis. 2
6. *OTHONNA* foliis lanceolatis subdenticulatis villosis, *integrifolia.* *Dona*
floribus umbellatis. *mai fl.* *Zacotra ad 124.*
- Solidago* foliis lanceolatis sessilibus integris denticulatis,
floribus umbellatis, involucro setaceo. Gmel. sib. 2.
p. 154. t. 71.
- Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non lacinia-*
ta. Baub pin. 131. Moris. hist. 3. p. 111. f. 7. t. 12.
f. 28.
- Jacobæa pannonica* 2. Clus. hist. 2. p. 22.
Habitat in Alpibus Pyrenæicis, Helveticis, Austriacis,
Sibiricis. *sp. oryg. fol. Radd. Donæi petiol. sublaev. Caulis Jacobæa villosa*
ovato-ott. lanuginosa.
7. *OTHONNA* foliis lanceolatis integris subdentatis vil-helenitis. *justicia ad*
losis, floribus umbellatis.
- Conyza incana.* Baub. pin. 265.
- Conyza helenitis mellita incana.* Lob. it. 347. sec. figura-
- ram.*
- Habitat in Sibiria. D. Gmelin. Gallia.* 2
- Caulis sesquipedalis, simplicissimus. Folia lanceolata,*
sursum sensim minora, albis villis utrinque subhirsuta,
margine minimis dentibus notata. Umbella termina-
lis: pedunculis simplicissimis, unifloris, intermedio
brevissimo. Corolla lutea. Ex Sibiria.
8. *OTHONNA* foliis pinnatifidis subvillosis: laciniis *fr. Cineraria.* *Zacobæa*
nuatis, caule herbaceo. *ad 3.*
- Jacobæa maritima s. Cineraria latifolia.* Baub. pin. 131.
prodr. 69.
- Habitat in Canada.*
- Simillima O. maritima, at Folia non tomentosa, sed*
parum villosa præsertim subtus; Corollæ radius non
recurvatus, sed patens. Caulis non fruticans. Calyx
simillimus maritima, sed apice parum sphaelatus,
quod illa non habet.
- * *Fruticosæ.* *Zacobæa ad*
9. *OTHONNA* foliis pinnatifidis tomentosis, *laci-maritima.*
niis sinuatis, caule fruticoso. Hort. ups. 273.
- Solidago* foliis pinnatifidis: laciniis sinuatis, *corymbis achaouan abiad.*
racemosis. Hort. cliff. 410.
- Jacobæa maritima.* Baub. pin. 131.
- Cineraria. Dod. pempt. 642.*
- Habitat ad Maris inferi littora.* *Sp. rami angul. levante caro*
petioli flm 3gani typi concavis. unipelti. fol. 2pia 1 ordine 2ad 5 abenun
ling. ala opere 2 ad 2 ped. ottusa. subtus laevis tomentosa altera typi etivis.
floribus jacea cinerea qua typi etiam tomentosa altera. *10 O.*

aristotela. ad. 125.

Caltha apric. 2. mons. folio integ. glauco. 1670. A.P. B.
2. 27. ped. mag. 9 laeva grana 13 cui aud. flvs magno.
a. D. Sey. Malabar. Barticae allata.

926 SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA

X

peccinata.

10. OTHONNA foliis pinnatifidis: laciniis linearibus parallelis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 179.

Jacobaea africana frutescens, foliis absinthii umbelliferi incanis. *Comm. hort.* 2. p. 137. t. 69. *Raj. suppl.*

B. *Jacobaea absinthites*, tomentosis cinerariæ foliis, æthiopica, calice integro summis oris dentato. *Pluk. alm.* 106.

Habitat in Æthiopia. ♂

abrotanifolia 11. OTHONNA foliis multifido-pinnatis linearibus. *Roy. lugdb.* 380.

Jacobaea africana fruticans, foliis abrotani s. crithmi, major & minor. *Volk. norib.* 225. t. 225. *Raj. suppl.* 179.

Habitat in Æthiopia. ♂

fl. fr. jaetaria ad. 125.

fl. fr. coronopifolia 12.

OTHONNA foliis infimis lanceolatis integerrimis, superioribus sinuato-dentatis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 179.

Jacobaea africana frutescens, coronopi folio. *Comm. hort.* 2. p. 139. t. 70. *Raj. suppl.* 175.

Habitat in Æthiopia. ♂

• *cheirifolia.*

13. OTHONNA foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 179.

Jacobaea africana frutescens, crassis & succulentis foliis. *Comm. hort.* 2. p. 147. t. 74. *Raj. suppl.* 174.

B. *Aster fruticosus africanus luteus*, foliis thymeleæ. *Raj. suppl.* 167.

Habitat in Æthiopia. ♂ *1. pd. orang. fl. caltha* ad. acutior
minima & *lancea*.

dentata.
aristotela. ad. 125

14. OTHONNA foliis ovato-cuneiformibus dentatis.

Solidago foliis oblongis dentatis glabris, floribus magnis umbellatis. *Burm. afr.* 164. t. 59.

Jacobaea africana lutea, folio obtuso dentato. *Herm. afr.* 14.

Habitat in Æthiopia.

POLYMNIA.

canadensis. 1. POLYMNIA. *Gen. nov.* 1181. t. 1. f. 5. *

Habitat in Canada. *Kalm.* 2

Erioccephalus. Dill. ad. 126. ERIOCEPHALUS.

• *africanus.*

1. ERIOCEPHALUS.

Erioccephalus foliis integris divisisque *Hort. cliff.* 424. *Roy. lugdb.* 178.

Erioccephalus sempervirens, foliis fasciculatis & digitatis. *Dill. elth.* 132. t. 110. f. 134.

Abro-

SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA

botanum africanum

Hort. I. t. I.

Habitat in Æthiopia.

LAGO floribus

bos majoribus

cephalium caule

oribus. *Roy. lugd.*

cephalium (species

cephalium roseum

12. *Barr. ic.* 12

Habitat in Europa.

LAGO tomento

longis obtusis cre

cotolina corymbo

integerrimis obtusi

levo. monsp. 80.

cephalium maritit

santhemum pe

ij. hist. 3. p. 81

Habitat in Europa.

itteribus. 2. *indap* 7

cephalium 7

ICROPU. H

cephalium supinu

3. 187. f. 6. *R*

endo-Gnaphaliu

hist. 3. p. 93.

Habitat in Lusita

SPE

PHÆRANTH

phœranthus purp

94. f. 3. *O*

Scabiosa iudica m

pbyt. 312. f. 6

Adaca-manjen. R

241. *manj* 10.

Habitat in India.

Phœranto folio o

menti nub. foli

SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA. 927

Abrotanum africanum, folio tereti tridentato. *Walth.*
hort. I. t. I.

Habitat in Æthiopia. ♂

FILAGO.

1. FILAGO floribus sessilibus terminalibus, foliis flora-pygmaea,
libus majoribus. *accut. L. f. m.*

Gnaphalium caule simplicissimo, foliis superioribus ma-
joribus. *Roy. lugdb. 147.*

Gnaphalium (species omnes). *Vaill. act. 1719. p. 314.*

Gnaphalium roseum hortense. *Bauh. pin. 263. prodr.*
122. Barr. ic. 127.

Habitat in Europa australi. ○

2. FILAGO tomentosa, corymbo subramoso, foliis ob-
longis obtusis crenatis. *Recept. ignavis med. latit. apri lanuginos.* *maritima.* *ad. 118.*

Santolina corymbo terminali subdiviso, foliis oblongis
integerrimis obtusis. *Hort. cliff. 398. Roy. lugdb. 147.*
Sauv. monsp. 80.

Gnaphalium maritimum. *Bauh. pin. 263.*

Chrysanthemum perenne gnaphaloïdes maritimum. Mo-
rif. hist. 3. p. 81. s. 6. t. 4. f. 47.

Habitat in Europæ australis, marisque mediterranei
litoribus. *littoralia apri aut. lento 7 dect obt. Recep-*

MICROPOUS.

3. MICROPOUS. *Hort. upf. 275. Roy. lugdb. 145. supinus.*

Gnaphalium supinum, echinato semine. *Pluk. alm. 171. gnaphaloïdes. Royas*
t. 187. f. 6. Raj. suppl. 191. *ad. 118.*

Pseudo-Gnaphalium supinum, semine echinato. *Moris.*
hist. 3. p. 93.

Habitat in Lusitanæ maritimis. ○

SPHÆRANTHUS.

1. SPHÆRANTHUS. *Roy. lugdb. 145. Fl. zeyl. 312. indicus.*

Sphæranthus purpurea alata serrata. *Burm. zeyl. 220. t. Boulette gall.*
94. f. 3. Oculodonta angustiflavae pallidæ nob. *adsea manjen malab.*

Scabiosa indica major, caule & pediculis foliosis. *Pluk. Ratanunn. Sreebf.*
phyt. 312. f. 6. & t. 108. f. 7. Raj. suppl. 235.

Adaca-manjen. *Rheed. mal. 10. p. 85. t. 43. Raj. suppl.*

241. caule alata. foliis pinnatis dentata. Odontea galani et egyptiacæ

Habitat in India. ○

Sphaeranthus folio oblongo majori. act. ac 24. 1 p. egyptia indora. fl. indora.
oblonga rotunda. fol. rugosa minus altet pubesci.

MO-

MONOGAMIA.

Eumenia dor. artemisie 7. p. 646.
SERIPHIUM.

cinereum.

1. SERIPHIUM floribus racemosis, foliis patentibus. Artemisia floribus simplicibus. *Hort. cliff.* 403. * Breynia cineroides capensis. *Pet. gaz.* 2. t. 3. f. 9. Tamariscus æthiopicus, coridis folio glabro, herbæ impiæ capitulis in spicam sessilibus. *Pluk. mant.* 178. t. 297. f. 1. Frutex cinereus muscosus, herbæ impiæ capitulis in spicam sessilibus. *Pluk. alm.* 159. *mant.* 85. *Habitat in Æthiopia.* 5

plumosum.

2. SERIPHIUM floribus spicatis, foliis linearibus. Stoebe floribus spicatis, calycibus unifloris. *Roy. lugdb.* 145. Breynia capensis, capitulis albis plumosis. *Pet. gaz.* 9. t. 5. f. 4. *Habitat in Æthiopia.* 5

fuscum.

3. SERIPHIUM floribus capitatis, foliis imbricatis. Eupatorium ericoides capitatis bonæ spei. *Breyn. cent.* t. 69. *Moris. hist.* 3. p. 97. f. 7. t. 18. f. 10. Abrotanoides capensis, ericæ folio. *Pet. gaz.* 9. t. 5. f. 2. *Habitat in Æthiopia.* 5

Habitus Ericæ magnitudine, foliis, flosculis. Fruticulus Ramis lignosis, teretibus, inæqualibus. Folia acerosa, brevissima, filiformia, conferta, imbricata, tomentosa. Capitula florum terminalia, globosa ex pluribus, sessilia. Calyces glabri, nigricantes.

CORYMBIUM.

africanum. 1. CORYMBIUM. *Hort. cliff.* 494.

Kontarensia adans. Corymbium foliis ad radicem longissimis liratis. *Burm.* 120. *afr.* 189. t. 70. f. 1.

Bupleurifolia, semine papposo, valerianoides umbellata, caulinulo scabro. *Pluk. alm.* 73. t. 272. f. 5.

Bupleuri similis planta æthiopica, ad caulinum nodostomentosa. *Pluk. alm.* 73. t. 272. f. 4.

Habitat in Æthiopia. 2

Ovilla ^{caerulea ad. 134} ^{cyanocarpa} ^{montana.} ^{aphyllanthus. D.} ^{1733.} JASIONE.

Jasione

SYNGENES

atione foliis linearib.
cliff. 426. Fl. sue
holz. 496. Dalib.
Apunculus scabiosaf

Apantium montan
apbr. 1. P. 226
Ballylanthes. Date
Habitat in Europa

* F

LOBELIA frutescens.
timis. Fl. zeyl.

lobelia frutescens.

Catesb. car. 1. 1.

Habitat in Indiis.

Acemus dichotom

terne ad basin vi

LOBELIA fruticosa.

gerrimis. Roy. 1.

Apunculus æthiop.

pinaltri. Breyn.

Apunculus fruticosa.

in ramulorum s

Apunculus flore angustiore. Raj.

Apantium æthiop.

pinastris. Raj. su

Habitat in Æthi

LOBELIA foliis

caule subnudo.

lobelia foliis b

Hort. cliff. 42

Dottmannia lacini

ag. upf. 1720

Gladiolus stagna

15. Gladiolus stagna

1911. * Habitat in Euro

LOBELIA fo

cato.

- Jasione foliis linear-lanceolatis obsolete serratis. Hort. cliff. 426. Fl. suec. 713. Roy. lugdb. 191. Hall. helv. 496. Dalib. paris. 268. *Aphyllanthus* v. 294. *ovilla*. Camer. c. 92.
- Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. Bauh. pin. 92.
- Rapuntium montanum capitatum leptophyllum. Col. ecphr. I. p. 226. t. 227.
- Aphyllanthes! Dalech. hist. 864.
- Habitat in Europæ collibus siccissimis. ☽

LOBELIA.

* Foliis integerrimis.

Lobelia ad 157.

1. LOBELIA frutescens, foliis ovali-oblongis integer-plumierii, rimis. Fl. zeyl. 313. *Lobelia* Plum. ad. 157.
- Lobelia frutescens, portulacæ folio. Plum. gen. 21. Catesb. car. I. p. 79. t. 79.
- Habitat in Indiis. ☽
- Racemus dichotomus, bracteis subulatis, oppositis, interne ad basin villosis. Fructus bilocularis. *Lovellia* ad. aritomus. alii præc. à d. Lovell. Acta.
2. LOBELIA fruticosa, foliis linearibus confertis integrifolia, gerrimis. Roy. lugdb. 241.
- Rapunculus æthiopicus, violaceo galeato flore, foliis pinastri. Breyn. cent. 173. t. 87.
- Rapunculus fruticosus, foliis nervosis acutis, floribus in ramulorum summo. Burm. afr. 111. t. 41. f. 2.
- Rapunculus flore cæruleo galericulato, rosmarini folio angustiore. Raj. suppl. 384.
- Rapuntium æthiopicum, violaceo galeato flore, foliis pinastri. Raj. suppl. 385.
- Habitat in Æthiopia. ☽
3. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule subnudo. Fl. suec. 714. *Dortmannia* Dortmannia ad 134.
- Lobelia foliis bilocularibus subulatis. Fl. lapp. 279. Hort. cliff. 426.
- Dortmannia lacustris, floribus sparsis pendulis. Rudb. act. upf. 1720. p. 97. t. 2. *
- Gladiolus stagnalis s. lacustris. Rudb. elys. 2. p. 202. f. 15.
- Gladiolus stagnalis dortmanni. Clus. cur. 40. Raj. hist. 1911. *
- Habitat in Europæ frigidissimæ lacubus & ripis. ☽
4. LOBELIA foliis lanceolatis integerrimis, racemo spicate. Tapa. Farner.

N n n

Ra-

Kalm Polyp. h. m. 92. 66. ♂ spic. in arenis septent. rami 4 ti. alt. pilos.
 fol. opp. crenatae alineas. crassa rura. fl. solit. crenat. glabra ali. tubo l. spica
 cal. ovar. int. 4. 5. dnat. capul. taet. l. ver. ? famili. Valerianaceae val. Verbena
Val. Campanula?

930

SYNGENESIA MONOGAMIA.

Rapuntium spicatum, foliis auritis, vulgo Trap. Few.
peruv. 2. p. 739. t. 29.

Habitat in Peru.

kalmii.

5. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolato-linearibus obtusiusculis alternis integerrimis, racemo terminali. Rapuntium canadense pumilum, linariæ folio. Tournef. inst. 164.

Habitat in Canada. Kalm. ◎

Planta pedalis, Caule tereti, vix ramoso. Folia linearilanceolata inferne, superne linearia, integerrima, obtusiuscula, nuda, sessilia. Racemus terminalis, laxus, Pedunculis alternis, unifloris, ex alis supremorum foliorum, foliolo instructis. Flores cærulei.

paniulata.

6. LOBELIA foliis linearibus integerrimis, panicula dichotoma.

Rapuntium, foliis linearibus acutis, floribus gemellis, polyanthos. Burm. afr. 100. t. 38. f. 3.

Habitat in Æthiopia.

cornuta.

7. LOBELIA foliis ovatis petiolatis, staminibus florum longissimis.

Habitat in Cayenna.

Plantam apud D. Roycum vidi, utrum Folia integerrima e memoria excidit.

* Caule erecto, foliis incisis.

Phyteuma.

8. LOBELIA foliis ovatis crenatis, caule subnudo, antheris hirsutis distinctis.

Habitat in Æthiopia.

Redekard. • longiflora.

9. LOBELIA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollæ filiformi longissimo. Roy. lugdb. 241. Dorothyum sancti p. pl. 10. t. 253

Rapunculus aquaticus, foliis cichorei, flore albo: tubo longissimo. Sloan. jam. 58. hist. 1. p. 158. t. 101. f. 2. Raj. suppl. 383.

Habitat in Jamaica ad ripas.

Dortmanna ^{Cardinalis} _{2. 134}.

10. LOBELIA caule erecto. foliis lanceolatis serratis, spica terminali. Hort. cliff. 426. Hort. upf. 276. Roy. lugdb. 241. Gron. virg. 107.

Rapuntium galeatum virginianum, coccineo flore magiore. Moris. hist. 2. p. 466. f. 5. t. 5. f. 54.

Rapuntium maximum, coccineo spicato flore. Herm. mex. 879. t. 880.

Habitat in Virginia. 2.

II. LO-

~~Trachelium sancti fol. Plam. ic. 253. Lobelia. Anna.~~

SYNGENESIA MONOGAMIA.

931

11. LOBELIA caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ^{sphiliticis} crenatis, calycum sinubus reflexis. *Hort. cliff.* 426.*
Roy. lugdb. 241. ^{Rapuntium annua pedunculata cærulea. Act. acad. Sav.}
- Rapunculus galeatus virginianus, flore violaceo majore.
Moris. hist. 2. p. 466. s. 5. t. 5. f. 55.
- Trachelium americanum, flore cæruleo. *Lob.* ic.
- Habitat in Virginia*
12. LOBELIA caule erecto, foliis ovatis subserratis pe- ^{inflatis} dunculo longioribus, capsulis inflatis. *Hort. ups.* 276.
Act. ups. 1741. p. 23. t. 1. ^{Rapuntium annua virginiana}
- Lobelia caule erecto brachiato, foliis ovato-lanceolatis ^{obsoleta} obsolete incisis, capsulis inflatis. *Hort. cliff.* 500. *Roy. lugdb.* 528.
- Habitat in Virginia, Canada.* ◎
13. LOBELIA caule erecto, foliis cordatis obsolete den- ^{cliffortiana} tatis petiolatis, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 426.
*t. 26. * Gron. virg.* 107.
- Rapuntium trachelii folio, flore purpurascente. *Plam. spec.* 5.
- Habitat in Virginia, Canada.* ◎
- * *Caule prostrato, foliis incisis.*
14. LOBELIA caule erecto, foliis inferioribus subrotundidis crenatis, superioribus lanceolatis serratis, floribus racemosis.
- Lobelia foliis oblongo-ovatis, floribus laxe spicatis.
Gvett. stamp. 1. p. 35. *Dalib. paris.* 268.
- Rapunculus galeatus blesensis s. soloniensis, flore vio- laceo minore. *Moris. hist.* 2. p. 407. s. 5. t. 5. f. 56.
- Rapuntium urens solonense. *Moris. bles.* 300. *Bocc. sic.* 20. t. 11. *Raj. hist.* 746.
- Draba flore cæruleo galeato. *Baub. prodr.* 53. *pin.* 110.
- Habitat in Gallia.* ◎
15. LOBELIA caule prostrato, foliis lanceolatis ovalibus crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis unifloris longissimis.
- Laurentia annua minima, flore cæruleo. *Mich. gen.* 18.
t. 14.
- Rapunculus aquaticus repens, flore cæruleo inaperto.
Raj. suppl. 383. *Bocc. mns.* 35. t. 27.
- Habitat in Italia.* ◎

N n n 2

16. LO.

Laurentia. mich. ad. 134

SYNGENESIA MONOGAMIA.

932

Erinus.

16. **LOBELIA** caule patulo, foliis lanceolatis subdentatis, caule erecto ramoso, pedunculis longissimis.
Campanula minor africana, erini facie, flore violaceo, caulis erectis. *Herm. lugdb.* 110. t. III.

Habitat in Æthiopia. ◎

Caulis spithameus, filiformis, inferne ramosus. Folia radicilia ovalia, caulina lanceolata, omnia glabra, subdentata. Pedunculi axillares, nudi, foliis triplo longiores, uniflori. Corollæ cæruleæ.

erinoides.

17. **LOBELIA** caulis procumbentibus, foliis lanceolatis ferratis, pedunculis lateralibus. *Hort. cliff.* 426.
Campanula minor africana, erini facie, caulis procumbentibus. *Herm. lugdb.* 108. t. 109.

Habitat in Æthiopia. ◎

ceylanica.

18. **LOBELIA** caule repente, foliis ovatis serratis: inferioribus obtusis, superioribus acutis, pedunculis unifloris, capsulisque subvillosis.
Campanula ceylanica, senecionis folio, flore purpureo.

Seb. thes. I. p. 37. t. 22. f. 12?

Habitat in China. Osbeck.

Planta parva, facie Veronicæ chamaedryos. Caulis repens. Folia alterna, ovata, petiolata, fere glabra: inferiora obtusa crenata; superiora acuta, argute serrata. Pedunculi axillares, subsolitarii, folio longiores, uniflori; pubescentes. Calyx subvillosus.

birta.

19. **LOBELIA** caulis procumbentibus, foliis ovatis subserratis, pedunculis solitariis glabris longioribus, germinibus hirsutis.

Habitat in Æthiopia.

Caules procumbentes. Folia ovata, glabra, obtuse serrata, remota, petiolata. Ex alis singulis Ramulis & Pedunculus capillaris, longus, Germine piloso.

lutea,

20. **LOBELIA** caulis procumbentibus, foliis lanceolatis serratis, floribus sessilibus subspicatis.

Rapuntium foliis oblongis dentatis, flore luteo spicato, flagellis procumbentibus. *Burm. afr.* 101. t. 39. f. 1.

Rapunculus africanus ramosus, foliis dentatis, floribus gladioli lacustris. *Herm. afr.* 18. *Raj. suppl.* 248.

Habitat in Æthiopia.

hirsuta.

21. **LOBELIA** foliis ovalibus crenatis lanatis, floribus laterilibus solitariis.

Rapuntium foliis subrotundis hirtis, flore ex alis solario. *Burm. afr.* 105. t. 40. f. 2.

SYNGENESIA

africanum

dentatis villosi

galeatum

longissimis.

folio longissimis.

æthiopicis

unoppi. Herm. a

Æthiopis.

caulinthus a

t. 42.

Æthiopia.

foliis tuberc

Burm. af

Æthiopia.

acaulis

individisque.

olla foliis palm

Gron. virg. 18

olla virginiana

Pluk. mant. 1

olla alba, folio

amalt. 209. t.

Æthiopis.

Rapuntium africanum galeatum, foliis oblongo-rotundis dentatis villosis. *Raj. suppl.* 385.

Rapunculus galeatus æthiopicus cæruleus, hirsutis & subrotundis crenatis foliis. *Pluk. alm.* 316.

Habitat in Æthiopia.

22. LOBELIA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis *coronopifolia* *neu* longissimis.

Rapuntium folio longo profunde dentato, florum petalis longissimis. *Burm. afr.* 98. t. 38. f. 1.

Rapuntium æthiopicum, flore cæruleo galeato, foliis coronopi. *Herm. afr.* 18. *Breyn. cent.* t. 88.

Habitat in Æthiopia. 2

23. LOBELIA foliis linearibus dentatis, spica terminali *comosa*.

foliosa. *Hort. cliff.* 500.

Habitat in Æthiopia. ○

Dorriana ad.

24. LOBELIA caulis erectis, foliis ovatis dentatis.

Cheiranthus africana, flore luteo. *Comm. hort.* 2. p. 83. t. 42.

Habitat in Africa.

Lavontia ad.

Manulaa liniger

Cheiranthus 1264

Sytnat. 1. 419.

25. LOBELIA foliis inferioribus pedatis.

bulbosa.

Rapuntium tuberosum, foliis multifidis, floribus spicatis. *Burm. afr.* 99. t. 38. f. 2.

Habitat in Æthiopia.

VIOLA. ad. 389.

* Acaules.

1. VIOLA acaulis, foliis palmatis quinquelobis dentatis *palmata*.
indivisique.

Viola foliis palmatis sinuatis, stolonum reniformibus.

Gron. virg. 182.

Viola virginiana, platani fere foliis parvis & incanis.

Pluk. mant. 187.

Viola alba, folio securis romanæ effigie, floridana. *Pluk.*

amalt. 209. t. 447. f. 1.

Habitat in Virginia. 2

2. VIOLA acaulis, foliis pedatis septempartitis.

pedata.

Viola foliis palmatis. *Gron. virg.* 107.

Viola virginiana tricolor, foliis multifidis, caulinulo aphylo. *Pluk. alm.* 388. t. 114. f. 7.

Viola mariana, folio digitato. *Pet. sicc.* 20.

Habitat in Virginia. 2.

SYNGENESIA MONOGAMIA.

934

Viola. 2349.

• pinnata.

lanceolata.

birta.

palustris.

odorata.

*Loz. Rhyp.
Viola. Anuff. fuit. null.*

*Sabonodion
(et Sabo quan) quan*

3. **VIOLA acaulis**, foliis pinnatifidis.
Viola alpina, folio in plures partes disiecto. *Baub. pin. 199.*
Viola montana, folio multifido. *Baub. hist. 3. p. 544.*
Habitat in Siberia & Alpibus Europae. *habetur a. 2.*
4. **VIOLA acaulis**, foliis lanceolatis crenatis.
Viola acadiensis, folio longo sruata. *Dierv.*
Habitat in Canada, Siberia.
Planta Canadensis a D. Kalm. allata. Folia habuit angusta, longe petiolata, nervis alternis, parallelis, obsolete serrata; Sibirica a D. Gmelino: Folia habuit ovato-lanceolata, petiolis folio dimidio brevioribus, minus striata & Flores majores.
- primulifolia** 5. **VIOLA acaulis**, foliis oblongis subcordatis: petiolis membranaceis.
Viola acaulis, foliis ovatis crenatis glabris. *Gron. virg. 182.*
Habitat in Siberia, Virginia.
Folia cordata, oblonga, obtusissima, crenata, basi decurrentia per petiolum, omnino ut in Primula officinali.
6. **VIOLA acaulis**, foliis cordatis piloso-hispidis. *Fl. suec. 718. Dalib. paris. 269.*
Viola martia hirsuta inodora. *Moris. hist. 2. p. 475. s. 5. t. 35. f. 4.*
Viola trachelii folio. *Raj. hist. 1051.*
Viola. Brunsf. herb. 1. p. 137. f. 3.
Habitat in Europae frigidioris nemoribus. 2
7. **VIOLA acaulis**, foliis reniformibus. *Hall. helv. 501.*
Fl. suec. 717. Dalib. paris. 270.
Viola foliis subrotundo-cordatis; pedunculis radicatis.
Fl. lapp. 278.
Viola palustris rotundifolia glabra. *Moris. hist. 2. p. 475. s. 5. t. 35. f. 5. fl. latu.*
Habitat in Europae frigidioris paludibus. 2
8. **VIOLA acaulis**, foliis cordatis, stolonibus reptantibus.
Viola acaulis, stolonibus teretibus repantibus, pedunculis radicalibus. *Hort. cliff. 427. Fl. suec. 715. Mat. med. 410. Dalib. paris. 268.*
Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Baub. pin. 119.*
Viola odorata. *Renealm. spec. 141. t. 140.*
Viola nigra s. purpurea. *Dod. pempt. 156. t. 1. 2.*
9. *Viola martia alba*. *Baub. pin. 199.*
10. *Viola martia*, multiplice flore. *Baub. pin. 199.*
Habitat in Europae nemoribus. 2

* Can-

* *Caulescentes.*

9. **VIOLA** caule demum adscendente, foliis oblongo-^{canina} cordatis.

Viola caulis adscendentibus floriferis, foliis cordatis.

Hort. cliff. 427. *Fl. suec.* 716. *Roy. lugdb.* 430. *Gron.*

virg. 182. *Hall. helv.* 501. *Dalib. paris.* 269.

Viola foliis cordatis oblongis, pedunculis subradicatis.

Fl. lapp. 277.

Viola martia inodora sylvestris. *Bauh. pin.* 199.

Viola cærulea martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens. *Bauh. hist.* 3. p. 543.

Habitat in Europæ apicis. 2

10. **VIOLA** caulis erectis, foliis cordatis oblongis. ^{montana}.

Viola foliis ovato-lanceolatis, caule erecto, stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 430. *Dalib. paris.* 269.

Viola martia arborescens purpurea. *Bauh. pin.* 199.

Viola erecta, flore cæruleo & albo. *Moris. hist.* 2. p. 475. f. 5. t. 7. f. 7.

Viola arborescens. *Cam. epit.* 911.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Austriæ, Baldo. 2

11. **VIOLA** caule fruticoso foliis lanceolatis integerrimis. ^{arborescens}.

Viola hispanica fruticosa longifolia. *Tournef. inst.* 421.

Viola hispanica fruticans. *Barr. ic.* 568.

Habitat in Hispania. 5

12. **VIOLA** caule abbreviato, florum nectario subulato ^{calcarata}.

petalis longiore, foliis subovatis.

Viola alpina purpurea, exiguis foliis. *Bauh. pin.* 199.

Viola montana cærulea grandiflora. *Tournef. inst.* 420.

Melanium montanum. *Dalech. hist.* 1204.

13. *Viola pyrenaica* longius caudata, teucrii folio. *Tournef. inst.* 421.

Viola pyrenaica, folio teucrii, serotina. *Tournef. schol.*

131. *Raj. suppl.* 510.

Habitat in Pyrenæis. *Herbar. Haller* No 566.

Quæ demit natura ex herba V. tricolor, adjectit floribus in hac planta.

13. **VIOLA** caule triquetro diffuso, foliis oblongis inci-

cis, stipulis dentatis. *Fl. suec.* 721. *Dalib. paris.* *Calathina* *flor.* 269.

Viola pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort.*

cliff. 527. *calathina munus autumni, intellatina*
adne, minuta ampla. *Pl. L. 21. c. 6.*

N n 41 4 Vio.

*Kinai. Japan.
Sumire vulgo*

Viola bicolor arvensis. Baub. pin. 200.

Trinitatis herba. Fuchs. hist. 803.

Jacea altera. Cam. epit. 913.

φλοξ θερ.? *B. Viola tricolor hortensis repens. Baub. pin. 199.*

ει φλοξινού. Lutea trinitatis. Drus. Ind. Viola tricolor. Renealm. spec. 144. t. 140.

Jacea f. Flos trinitatis. Cam. epit. 912.

Habitat in Europæ cultis. ☽

canadensis. 14. VIOLA caule erecto, foliis cordatis acuminatis.

*Viola caulescens, foliis cordatis oblongis acuminatis. Amœn. acad. 1. p. 157. **

Habitat in Canada. Kalm.

Caulis erectus, spithameus, teretiusculus. Folia alterna, reniformi-cordata, acuminata, serrata, lœvia, sub-tus pallida, petialis falio dimidio brevioribus, in summis adhuc minoribus. Stipulæ binæ, erectæ, lanceolatae, marcescentes. Pedunculi ex singulis alis solitarii, nudi, longitudine foliorum. Flores corollati. Differt a sequenti Foliis magis mucronatis & Floribus caulinis corollatis, Caulibus firmioribus majoribus.

mirabilis. 15. VIOLA caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis.

*Viola floribus radicalibus corollatis abortientibus, caulinis apetalis feminiferis, Hort. cliff. 427. It. el. 81. * Fl. suec. 719.*

Viola montana latifolia, flores e radice, semina in cacumine ferens. Dill. elth. 408. t. 303. f. 390.

Habitat in Germaniæ, Sueciæ nemoribus. 2

biflora.

16. VIOLA caule bifloro, foliis reniformibus serratis.

Viola foliis reniformibus, pedunculis caulinis. Fl. lapp. 276. Fl. suec. 720. Hort. cliff. 427. Roy. lugdb. 431.

Viola alpina rotundifolia lutea. Baub. pin. 199.

Viola rotundifolia montana major. Pluk. alm. 388. t. 234. f. 1.

Viola alpina rotundifolia minor lutea. Pluk. alm. 388. t. 233. f. 7.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Austriæ, Helvetiæ, Angliæ. 2

uniflora.

17. VIOLA caule unifloro, foliis cordatis dentatis.

Habitat in Sibiria. 2

Caulis vix spithameus, nudus, firmus, apice ferens Folia tria, subalterna, cordata, dentata, subvillosa, petiolis

*tiolis brevissimis insidentia. Flos unicus, pedunculo
brevissimo, luteus, foliis major.*

18. VIOLA caule basi ramosissimo, foliis lanceolato-^{lineo}_{ennea}perma
nearibus integerrimis distantibus, calycibus pone æ-
qualibus. Fl. zeyl. 317. *

Herba indica, flore monopetalo labiato, capsula e rotundo trilaterali octosperma. *Raj. suppl.* 402.

Nelam-parenda Rheed. mal. 9. p. 117. t. 60. ♂ December, reuni cyl. alt.
Habitat in India. 2 ft. tall. in the hills. oval or rounded. gl. / st. with long publ.
cyl. fol. cor. velv. sp. tan brown. leaves later. No. 5. Capt. Brab. 1 loc. 819.

19. VIOLA caule procumbente, foliis lanceolatis sub-suffruticosa.
ferratis confertis, calycibus pone æqualibus. Fl. zeyl.
318. *

318.

Habitat in India. 5

IMPATIENS.

* *Pedunculis unifloris.*

1. IMPATIENS pedunculis unifloris solitariis, foliis *chinensis*.
oppositis ovatis, nectariis arcuatis.

Habitat in China. ○

Caulis alternatim ramosus, ruber. Folia opposita, sessilia, ovata, subserrata. Pedunculi axillares, solitarii, folio longiores, uniflori. Flos purpureus. Nectarium valde arcuatum, crassum.

2. IMPATIENS pedunculis unifloris solitariis, foliis o-*latifolia*.
vatis: ferraturis lanceolatis,nectariis flore longiori-
bus.

Valli-anapu. Rheed. mal. 9. p. 91. t. 48. *Lacca nigra*. Rumph. 2. 90.

Habitat in India. ◎

Folia lanceolata, alterna, crenata, e singula crena mu-
crone prominente. Pedunculi solitarii, uniflori, longitu- 2 emarginata.
dine fere foliorum. Flos magnitudine J. Balsaminæ, San vltoræ
at Calcar subulatum, longitudine fere pedunculi.

3. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis oppositifolia.
oppositis linearibus. Fl. zeyl. 314. * *fl. pro parte* *caerulea* *ppm 2 pt.*
fl. pro parte *caerulea* *ppm 2 pt.*

Kondam-pallu. Rheed. mal. 9, p. 57. t. 31? *O. S. amata*? Cat 5 phys.
conservata (and tenuis).

Habitat in Zeylonæ arenosis. Spad. caud. & goni' genital. fl. opp. crinidens

4. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis cornuta.
lanceolatis, nectariis flore longioribus El zeyl. 316.*

Balsamina latifolia. floris calcari longissimo. *Burm.*

Baileya latifolia, no
spec. pl. 16 f. I.

Habitat in Zeylona ②

N u n s

S. IM-

{ Onopordum g. R. 47. Tambido, Peru. ♂ 2 pd. in adi nose
fl. opp. Petal very. petals fl. 2 small. Corolla pedunc. rosaceus 2 pd.
cap. 5 valv. ^{halberd} ~~crenata~~ fibro bristly.

Gymnosoma. var. *griseum*. Vito. Russ. fl. att. 2. w. opp. 2 in. diam.
fl. 2 att. large pubescent. Calyx glabrous flattened above opp. with 5: val.

938

SYNGENESIA MONOGAMIA

H

- *Balsamina*. ^{var. gal. Dod. Trag. metr.} 5. *IMPATIENS* pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore brevioribus, *Hort. upf.* 276.
Balsamella. ^{condi} *Impatiens* pedunculis confertis unifloris, *Hort. cliff.* 428.
Balsamina femina. *Baub. pin.* 306.
Balsamina. *Dod. pemt.* 671. ^{*angustifolia* 7.47.}
Habitat in India. ○ ~~276~~

* *Pedunculis multifloris*.

X

- triflora*. 6. *IMPATIENS* pedunculis trifloris solitariis, foliis angusto-lanceolatis, *Fl. zeyl.* 315.*
Balsamina angustifolia, floribus ternis communi pedunculo ortis. *Burm. zeyl.* 41. t. 16. f. 2.
Balsamina erecta s. *femina*, persicæ angusto folio, zeylanica. *Herm. par.* 105. t. 105.
Habitat in Zeylonæ paludosis.
- *noli tangere*. 7. *IMPATIENS* pedunculis multifloris solitariis, foliis ^{*Impatiens* Dod. 201.} ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Fl. suec.* 722.
chrysocoma. ^{chrysocoma} Dalech. *Dalib. paris.* 270.
Balsamita. ^{archynome} Col. *Impatiens* pedunculis solitariis multifloris. *Hort. cliff.* 428. *Roy. lugdb.* 431. *Hall. helv.* 405. *caule angulato*. *Gort. gelr.* 502.
Noli me tangere. ^{*Steno aponeurus*} Col. *Balsamina lutea* s. *Noli me tangere*. *Baub. pin.* 306.
Noli me tangere. *Col. ecphr.* I. p. 149. t. 150.
Habitat in Europæ, Canadæ nemoribus. ○

{ man onop. h. m. 7. 50 & 1 p. - propp. cl. alt. orini. zeyl.
 budo. p. 1. fl. p. 1. car. 1. st. and. 1. caps. tenus byss.
 calcar. long. 1. velia. 1.
 Belutta onop. 7. 51. id ae man onop.

{ 2. 10. onop. h. m. 9. 7. 52. s. Notanya. propp. Balsam velz.
 fl. 1. alt. and. 1. p. 1. calcar. budo. 1. f. 1. test. vel. 1. vel. 1. al. 1.

• • •

Clas.

Classis XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

*Zubriches**Bulbis indivisis.*

1. ORCHIS *bulbis indivisis*, *nectarii alis amplioribus ci-susannae*. *Satricularia*
liatis. *X 70*

Orchis amboinensis, *floribus albis fimbriatis*. *Herm.*

parad. 209. t. 209. Bonga susanna. Augst. 5. R. 99. f. 12 et 3.

Habitat in Amboina. bulb. 2. strob. 2. char. 2. videretur

2. ORCHIS *bulbis indivisis*, *nectarii labio lanceolato ci-ciliatis*. *Satricularia*
liato; *cornu longissimo*. *Act. upf. 1741. p. 6.*

Orchis nectarii labio lanceolato ciliato, *seta germinate in-*
torto longiore. *Roy. lugdb. 15. Gron. virg. 183.*

Orchis palmata elegans lutea americana, *cum longis*
calcaribus luteis. *Moris. hist. 3. p. 499.*

Orchis marilandica grandis & procera, *floribus luteis*,
calcaris longissimo: *lobulo fimbriato*. *Raj. suppl. 588.*

Habitat in Virginia, Canada. 2

3. ORCHIS *bulbis indivisis*, *nectarii labio lanceolato bifolia*, *integerrimo*: *cornu longissimo petalis patentibus*. *Act. Satyrium ad*
upf. 1740. p. 5. Fl. suec. 723. Dalib. paris. 273. Mat. med. 411. *G + 70*

Orchis alba bifolia minor, *calcari oblongo*. *Baub. pin. Satyrium velut. ang.*
83. Vaill. paris. 151. t. 30. f. 7. Segu. ver. t. 15. ovulethphora. ger
f. 10.

Testiculi species V. Cam. epit. 625. by 559 —

B. Orchis trifolia minor. *Baub. pin. 83.*

γ. Orchis bifolia altera. *Baub. pin. 82.*

Orchis bifolia latissima. *Baub. pin. 82.*

Habitat in Europæ pascuis asperis. 2

4. ORCHIS *bulbis indivisis*, *nectarii labio trifido*, *peta-cucullato*. *Divat. ad*
lis confluentibus, *caule nudo*.

Orchis radice rotunda, *cucullo tridentato*: *Gmet. fib.*

I. p. 16. t. 3. f. 2.

Habitat in Sibiria. 2

Folia radicalia ovata, bina.

s. OR.

Batrachites. genas Orchis hermaphroditica. (A. A. 43)

Meditatis. gen.

GYNANDRIA DIANDRIA.

940

Triturus ad II
pyramidalis. 5

Satyrion ad. 70

orchis. 2. scapulae

4

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido antice bidentato: cornu longo, petalis acuminatis. *Act. ups.* 1740. p. 7. *Dalib. paris.* 273.

Orchis radicibus subrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, seta longissima. *Hort. cliff.* 429.

Orchis spica densa brevi; petalis caudatis. *Hall. it. helv.* 46.

Orchis purpurea, spica congesta pyramidali. *Raj. angl.* 3. p. 377. t. 48. *Segu. ver. t. 15. f. 11.*

Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglobata. *Baub. pin.* 81. *prodr.* 28.

B. Orchis globoso flore. *Baub. pin.* 81.

y. Orchis latifolia, hiante cucullo, altera. *Baub. pin.* 81.

d. Cynosorchis latifolia, spica compacta. *Baub. pin.* 81.

Habitat in Helvetia, Belgii, Anglia, Gallia arenosa, cretaceis. 4

Triturus ad 70.

coriophora. 6

cavios mitis. lob

Satyrion ad. 70

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. *Act. ups.* 1740. p. 8. *Dalib. paris.* 272.

Orchis bulbis indivisis, labello trifido punctato: lacinula media longiore, cornu germinibus breviore. *Sauv. monsp.* 23.

Orchis odore hirci minor *Baub. pin.* 82. *Vaill. paris.* 149. t. 31. f. 30. 31. 32. *Hall. it. herc.* 7.

Tragorchis minor, flore fuliginoso. *Raj. hist.* 1213.

Tragorchis minor & verior gemmae. *Lob. ic.* 177.

B. Orchis odore hirci minor, spica purpurascente. *Baub.*

-y. *Hpin. 82. dubius v. m.*
Habitat in Europa australioris pascuis. 4

Triturus ad.

cubitalis.

7. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido filiformi: intermedia ovata: cornu germinibus breviore. *Fl. zeyl.* 320. *

Habitat in Zeylona. 4

Triturus ad 70.

morio.

Satyrion ad

triflor. pub.

roy. lugd. 3. p. 945.

Salp. venen. decaen.

carpov. Scap. pub.

angustifol. junc.

8. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso. *Act. ups.* 1740. p. 8. *Mat. med.* 412. *Fl. suec.* 724. *Dalib. paris.* 273.

Orchis radicibus subrotundis, nectarii labio quadrifido æquali crenulato: cornu obtuso. *Roy. lugdb.* 15.

Orchis morio femina. *Baub. pin.* 82. *Vaill. paris.* t.

31. f. 13. 14. *Segu. ver. t. 15. f. 7.*

Triorchis serapias mas. *Fuchs. hist.* 559 *Lond.*

B. Orchis angustifolia. *Baub. pin.* 83. *Vaill. paris.* t. 31. f.

33. 34. y. Or-