



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

aristolochia orientalis foliis lanceolatis. Bonn. Acad. 162.
caule infirmo, angusti foliis hastatis intus floribus recurvis / titanum Rhaetum Rhinoceros
Rheumati / in auctor Rueningi / pax

GYNANDRIA HEXANDRIA. 961

carolo

Gatellæ-vegon. *Rheed. mal.* 8. p. 48. t. 25. *Raj. suppl.*

394.

β. *Aristolochia caule volubili*, foliis cordato-oblongis, fructu pendulo, pedunculis ramosis. *Hort. cliff.* 433.
Aristolochia scandens odoratissima, floris labello purpureo, semine cordato. *Sloan. jam.* 60. *bist.* 1. p. 162.
t. 104. f. 1. *Raj. suppl.* 394.

Aristolochia mexicana, folio acutiore. *Moris. bist.* 3.
p. 508. f. 12. t. 17. f. 7.

Habitat in India. 2

aristolochia ad.

6. **ARISTOLOCHIA** foliis cordatis acutiusculis, caule bætica. • fl. flore. 75.
volubili, pedunculis solitariis petiolo longioribus. *Sophœri oegym*
Aristolochia Clematitis serpens. *Baub. pin.* 307. *Moris.*
bist. 3. p. 509. f. 12. t. 17. f. 6.

Aristolochia Clematitis bætica. *Clas. bist.* 2. p. 71.

Habitat in Hispania, Creta, arbores scandens. Gron. sp. *florivaga solit. pendente fructu longior. inuid.*

7. **ARISTOLOCHIA** hirta, floribus solitariis pendulis hirta,
recurvatis sublabiatis.

Aristolochia longa subhirsuta, folio oblongo, flore (minimo male *Tournef. cor.* 8.) maximo. *Tournef.*
itin. 1. p. 147. t. 147.

Habitat in Chio. 2

Ephutios
Ephesios græc.

Limbus corollæ non elegatus in labium.

8. **ARISTOLOCHIA** foliis cordato-oblongis undatis, semipervirens. • fl. fl. pr.
caule infirmo, floribus solitariis. *fl. hirsuta subnigra atrocaerulea* *sauv.* *sauv.*
Aristolochia caulis infirmis, foliis cordato-oblongis undulatis, floribus recurvis solitariis pendulis. *Hort. cliff.* 432. *Sauv. monsp.* 111.

Pistolochia cretica. *Baub. pin.* 307. *Moris. bist.* 3. p. 510. f. 12. t. 17. f. 16.

Τυριόνες
Touritis

Pistolochia altera. *Clas. bist.* 2. p. 260.

Habitat in Creta. 3

aristolochia ad.

9. **ARISTOLOCHIA** foliis cordato-oblongis planis, Serpentaria.

caulibus infirmis flexuosis teretibus, floribus solitariis.

accan pulmon. Raym
shehvarne. Rech. L. 5.
? Zlacopatl. Rech. L. 6.
c. 35.
c. 20.

Aristolochia *Pistolochia* f. *Serpentaria virginiana*, caule nodoso. *Pluk. alm.* 50. t. 148. f. 5. *Catesb. car.* 1.
p. 29. t. 29.

Aristolochia *Pistolochia* caule nodoso; f. *Serpentaria virginiana*. *Raj. suppl.* 394.

P p p

Ari-

GY
GYNANDRIA HEXANDRIA.

962

- Aristolochia* polyrrhizos virginiana, fructu parvo pentangulari. *Moris. hist.* 3. p. 510. s. 12. t. 17. f. 14.
Habitat in Virginia. & *acarpulm. Aug. 5. 17. 17.*
- aristolochia* ad. 10. *ARISTOLOCHIA* foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis. *flori hyacinthoides. color flavo-luteus.*
Aristolochia caule infirme ramoso, foliis cordatis obsolete dentatis, floribus solitariis erectis. *Hort. cliff.*
433. Sauv. monsp. III.
Aristolochia *Pistolochia* dicta. *Bauh. pin.* 307.
Pistolochia. *Clus. hist.* 2. p. 72. *Dod. pempt.* 525.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. &
- aristolochia* ad. 11. *ARISTOLOCHIA* foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirme, floribus solitariis. *subcylindrici.*
Aristolochia, caule infirme ramoso, foliis cordatis integrerrimis, floribus solitariis erectis. *Hort. cliff.* 432
Mat. med. 414. *Sauv. monsp. II.*
Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bauh. pin.*
307.
Aristolochia rotunda 1. *Clus. hist.* 2. p. 70.
Aristolochia. *Cam. epit.* 419.
B. *Aristolochia* rotunda, flore ex albo purpurascente.
Bauh. pin. 307.
Habitat in Italia, Hispania, G. Narbonensi. &
- longa.* 12. *ARISTOLOCHIA* foliis cordatis petiolatis integerimis obtusiusculis, caule infirme floribus solitariis.
Aristolochia caule infirme ramoso, foliis cordatis integrerrimis longe petiolatis, floribus solitariis. *Sauv. monsp. III.*
Aristolochia longa vera. *Bauh. pin.* 307.
Aristolochia longa. *Clus. hist.* 2. p. 70.
B. *Aristolochia* longa hispanica. *Bauh. pin.* 307.
Habitat in Hispania, Italia.
- antibotella* ad. 13. *ARISTOLOCHIA* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. upf.* 279. *Mat. med.*
415. Dalib. paris. 279. *fol. adato apice crenulata imita.*
Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis. *Hort. cliff.*
432. Sauv. monsp. III.
Aristolochia Clematitis recta. *Bauh. pin.* 307.
Aristolochia Clematitis vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 71.
Aristolochia rotunda. *Fuchs. hist.* 90.
Habitat in Gallia, Tataria. & *3 ped. exalt. non vobis*
Sancto Ioh. Capri. { *In Tataria in monte sancto ac sept. flor. striata*
clavata. Radix ann. p. 884.

PI-

PISTIA.

1. PISTIA foliis obcordatis. Fl. zeyl. 322.

Koddapail palustris, folio oblongo specioso. Plum. gen.

30.

Kodda-pail. Rheed. mal. II. p. 63. t. 32. Kiamban. Augst. 6. 2. 64. f. 2.

Stratiotes ægyptia. Baub. hist. 3. p. 787. Moris. hist. 3. p. 619. f. 15. t. 4. f. infer. Vest. ægypt. 44. t. 45. ad 1749. herbar. Raj. hist. 1324.

Stratiotes Hai-alem maovi. Alp. ægypt. 106. t. 108.

Lenticula palustris VI, f. ægyptia, f. Stratiotes aquatica, foliis sedo majore latioribus. Baub. pin. 362. Sloan. jam. II. hist. I. p. 15. t. 2. f. 2.

Habitat in Asiae, Africæ; Americæ meridionalibus, natans.

Flores siccii mihi satis non fecere, examinent autoptæ accuratius.

Koddapailæd.

Stratiotes. Dioc. Shu.

Plum. gen. Maribyrn. Bon.

hai alei maovi. alp. idem

sed unguiculata

Pana. obof. Seneg.

no 148. elfigue.

DECANDRIA.

HELICTERES.

Isora. mal. ad.

1. HELICTERES foliis cordatis serratis, fructu com- Isora. Mal. ad.

posito contorto.

Helicteres. Hort. cliff. 433.

Helicteres arbor indiæ orientalis, siliqua varicosa & funiculi in modum contortuplicata. Pluk. alm. 181. t. 245. f. 2.

Frutex indicus, fructu e styli apice egresso sextuplici funiculo in spiram convoluto constante. Raj. hist. 1765.

Isora Murri. Rheed. mal. 6. p. 55. t. 30.

3. Helicteres arbor Indiæ occidentalis, fructu majore. Pluk. alm. 182. t. 245. f. 3.

Abutilo affinis arbor, altheæ folio, cuius fructus est styli apex acutus quatuor f. quinque siliquis hirsutis, funis ad instar in spiram convolutis. Sloan. jam. 97. hist. I. p. 22.

Habitat in Malabaria, Jamaica. 5

2. HELICTERES foliis lanceolatis integerrimis, fructu angustifolia ovato recto.

Habitat in China. Osbeck. 5

Arbor. Folia lanceolata, supra nuda, subtus tomentosa, petiolata, integerrima, acuminata. Flores petiolati, sparsi. Calyx tomentosus. Petala quinque, ad basin laminarum utrinque dente aucta. Receptaculum longi-

Schne. h. m. II 2. 18. Turno. Braun 3 ad sp. in arena. Rad in tuberosa stylis alterna alteri invid. actis at aderit. petio longa, spinatip. capite vix. dilato undulat. latente vix. vandy. Scapus flex. ex 2 adre lacinias per 2 adre inter. bract ante folia angust. involucrum conro. style apice vudo. ovario strobilis. clista ovario 2 mm
contig. imediate 964 GYNANDRIA POLYANDRIA.
2. Catena Turno. Braun uti Schne. ed. major. fol. 1. Spiculae

GYNANDRIA POLYANDRIA.

*tudine floris, filiforme, cuius apici stamina 10 par-
va, & Stylus unicus. Capsula ovata, tomentosa, mi-
nime contorta, sed ex Capsulis 5, parallelis, rectis,
approximatis composita.*

Katuchena. h. m. 112. 21. Cajero turvo. Brown. 2 ped. Haedubosa sepiaginosa
drypetum ^{2 ft} lat. latae; articuli singuli
altus iutridos. singulis per ramum
cava. folio quem amittunt tenuentes
florib. paleas. s. flava

POLYANDRIA.

Koradi malai 1754
Grewia occidentalis. I. *GREWIA* foliis subovatis. *Hort. cliff.* 433.
Grewia corollis acutis. *Hort. cliff.* 433.
Ulmifolia arbor africana baccifera, floribus purpureis.
Pluk. alm. 393 t. 237. f. I.
Ulm facie arbustula æthiopica, ramulis alatis, floribus

Habitat in Æthiopia, Curaçao. *h* *Spud.*

Pai-parœa f. Couradi

• *orientalis.* 2. *GREWIA* foliis sublanceolatis. *Fl. zeyl.* 324. *
Grewia corollis obtusif. *Roy. lugdb.* 476. *Hort. cliff.*
 433.
Pai-parœa f. Couradi. *Rheed. mal.* 5. p. 91. t. 46. *Raj.*

1824.

Habitat in India. 5

Dracontium polyphyllum major in Indus fortis crenulatae canth. 24. 2.
24. 1' high. Name. fol. 2 ad 3 caulin. infima 2 palmata 13 lvs in
undulat. petio. crenulatus. petio. vag. dr. polyphyllum ARUM.

Draconulus ad. 470. * *Acaulia*: foliis compositis.

I. Genus. • *Dracunculus*. I. ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis
lvs. æquantibus spatham spadice longiore. Roy. Ingdb. 7.
~~Dracunculus~~ Arum foliis palmatis: foliolis undecim lanceolatis inte-

angustior } *Lob.* *Arum foliis palmati-*
Dracontia } *gerrimis*: interm.
dracontior *Sua Lippman.* *Hort. cliff.* 344.

Dracunculus polyphyllus. Baub. pin. 195. Moris. hist.
3; p. 548, f. 13 t. 5, f. 46.

3. p. 548. f. 13. t. 5. f. 46.
Dracontium. Dod. pempt. 329.
Habitat in Europa australi. 4. sp. pl. 10.

Lacuna *habitat in Europa australi.* 24. *Sp. nov.*
mauriana *fol. 4 ad 8 palm. atro vire mact. fl. aperum rotat. 3 glandibus*
virginiana *fol. 7 ad 10 mm undulata, peti. 1.A. ? corona. T. A.*
~~*Dracontium*~~ 2. **ARUM** foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis
superantibus spatham spadice brevioram. Roy. lugd. 7.

Vaccinium ad ^{Zucca. Rumph.} superantibus spatham spadice breviorem. Roy. lugav. 1.
Arum polyphyllum minus & humilius. Herm. lug db. 60.

B. Arum s. Arisarum virginianum, dracontii folio, pene
viridi longo acuminato. Pluk. alm. 52. t. 271. f. 1.

viridi longo acuminato. Pluk. alm. 52. t. 211.
Habitat in America. Terc. Phys. 52 912.

Romphal. Zapentaphyl- 3. ARUM acaule, foliis quinatis.
lum.

Draconis ^{lum.} ad 844

Zucca Cant. Angl. fol. 2. multij. in altero spathis erit
angustis foliis 1. lychni. apud arbores citra utr. Zucca habet.
flory 6 petalis

{ Uccellatore. Regn. 3. R. 113. heba vira 1 ped. fol. lato 1. multijugis inaeq. anaejux
entes gradus ex longior aperte spatales genit, cum bella florir tenetur.
cante viridi ex fave granulatae viretigato. 3 ped. fol. caerulea 3 ad 4. gano. virete palustris

GYNANDRIA? POLYANDRIA.



Filamento.
Mucina S.
Ovario O.

Romphal planta indiae orientalis. Zan. hist. 205. fig.
mal.

Habitat in India.

P p p 3

Arum

T P P S XIII

{ *Aivakiti*, *jl.* Augt. 5. 2. III. *paciforaria* *apicalis*. Spreading 4-5 bracts
ptd. - anthers caulis. Enkaysh. id. as *Wilbottii* 5. 60 ft. mella
3600
areum India on. andabar dict. Liliaceae in inter-mane } andabar. robust
tutip. lvs. -

Nelenschena minor. h. n. II. 2. 17. V. ped. acaule. fl. ovat. petal. apicant. cordata.
angust. folio rotund. segus cordatis petal. flor. long. cerasus agit prosto sub
966 **GYNANDRIA POLYANDRIA.**

Arum maximum macrorrhizon zeylanicum. *Herm. par.*
73. t. 73. *Raj. suppl.* 574.
Habitat in Zeylona. 2

peregrinum. 9. ARUM acaule, foliis cordatis obtusis mucronatis, an-
gulis rotundatis. *Hort. cliff.* 435. *
Habitat in America. 2

divaricatum 10. ARUM acaule, foliis cordatis, angulatis divaricatis.
Arum acaule, foliis subhastatis. *Fl. zeyl.* 325. *

Nelenschena major. *Rheed. mal.* II. p. 39. t. 20.
Habitat in India. 2 *cayenii Sours. Bram* 1. ped. cerasus.
Rad. tuberosa *folio. exaltatur* *dum ruris est al sicca* *luteo* *athrys.*

sagittæfoli- 11. ARUM acaule, foliis sagittatis triangulis: angulis
divaricatis acutis, *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 8.

Arum minus esculentum, sagittariæ foliis viridi nigri-
cantibus. *Sloan. jam.* 63. *hist. I.* p. 167. t. 106. f. 2.

Arum minus *sagittariæ foliis.* *Pluk. phyt.* 149. f. 2.
Habitat in Brasilia, Jamaica, Barbados. 2 *flor. lutea*
foliis *sagittatis* *triangulis* *viridi nigris* *floribus luteis* *divaricatis*

maculatum. 12. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice
nervis typhonio h. n. II. 2. 16. 1. ped. *clavato.* *Hort. cliff.* 8. *Hort. upl.* 279. *Mat. med.*
fl. ovat. petal. acutis. baseo. 417. *Roy. lugdb.* 8. *Dalib. paris.* 279.
angust. baseo. Arum vulgare non maculatum. *Bauh. pin.* 195.

rotundatis. spadice petiolatis. *fl. ovat. petal. acutis. baseo.* Arum. *Fuchs. hist.* 69. *Lob. ic.* 597.

fl. ovat. petal. acutis. baseo. Arum venis albis. *Bauh. pin.* 195.

Arum maculatum, maculis candidis s. nigris. *Bauh.*
pin. 195. *Praca 2/psana hundsp.*

Habitat in Europa australiore. 2 *fl. radice* *an* 1551
spadicea *petal. alt. lat. alt. cerasus* *quodammodo* *lutea*

virginicum. 13. ARUM acaule, foliis hastato-cordatis acutis: angu-
lis obtusis. *Hort. cliff.* 434. * *Gron. virg.* II2.
Habitat in Virginia. 2

proboscideum.
anum ad 14. ARUM acaule, foliis hastatis, spatha declinata fili-
formi-subulata. *Arisarum minus* *latifolium* *bifida*
Arisarum *flore in tenuem caudam abeunte.* *Tournes.*
inst. 161.

Arisarum minus proboscideum. *Bocc. mus.* 2. p. 61. t.
50.

Arisarum latifolium minus repens cespitosum. *Barr. rar.*
182. t. 1150.

Habitat in Apenninis.

Arisarum *2. 11* 15. ARUM acaule, foliis cordato-oblongis, spatha bifida,
spadice incurvo. *Hort. cliff.* 435. *Roy. lugdb.* 7.

Arisarum latifolium majus. *Bauh. pin.* 196.

Arisarum latifolium alterum. *Bauh. pin.* 196.

Arum minus *nym*

A-

{ anum foliis hastatis, cuspidiis inferioribus laterali. protuber. flavo. } ovidae. arab. flavo.
mucronibus. longus auriculatus. mon. h. t. 3. p. 544
anum foliis palmatis, foliis connatis, inter 2nd & majori flavo
GYNANDRIA POLYANDRIA. 967 { lepro. arab
phyllis mucro. lepro. arab. et diversitas mucro. David. mon. 3. p. 542 } 598

Arisarum latifolium. Clus. hist. 2. p. 73. Lob. ic. 598.
Utric. in Mauritaniæ, Italijæ, Lusitanijæ, Hispanijæ, Gal-

*Habitat in Mauritaniae, Italiæ, Lusitaniæ, Hispaniæ, Galloprovinciæ, nemoribus. 2. rad. tuberosa gradatim ~~angustata~~ amara et oxy. velut. impetrans.
foliis apiculis rotundatis calice 1. 2. lato-pinnatis ad petioles atrovirentes parvissim rotatis. ^{anerga} foliis 13.
ovatum.*

ARUM acaule, foliis ovato-oblongis.

5. ARUM acaule, foliis ovato-oblongis.
Karinpola. Rheed. mal. II. p. 45 t. 23. ^{in aqua.} *Bixa acer* Dugl. fol. aliacea longe
Habitat in India. petiol. cantic. base erucif. cyclospadix. Phyl. laevigata. ^{extra inflata} ^{campanulata}
^{instar alii (200)} fundo cinctus involucrum. fol. palm. pinnat. styl. apice

ARUM acaule, foliis lanceolatis spadiceo de- *tenuifolium*
7. *Balz* *pedicellata* *fructuosa* *aequali* *oppositi* *in* *racem* *simplici* *fracta*, *apicula* *sub* *tear* *recorta* *homaiet.*
cinato. *Hort. cliff.* 345. *Roy.* *Lugd.* 8. *Sallv.* *Mons P.* *homaiet?* *unum*
et longior *ex* *4* *aruncis* *contata*. *littera* *quoniam* *chrysanthemum* *in* *50* *ovario* *circulari* *composita* *1*. *homaiet?* *et* *lance*
16 *num* *coquens* *folio*. *Zorn.* *inst.* 150. *pl.* *novissim* *Pr.* *Vaginella*
lata *alterum* *angustante*; *anter.* 2 *bud.*

Arum angustifolium. Baub. p. 196. Clus. hist. 2. p. 196. *Clus. hist. 2. p. 196.*

Habitat in Dalmatia, Romæ, Monspelii. 15 *Rumex* fruct. floribus et autumno ante foliis
bald & partitum floribus ad apicem terræ. Testiculis supra radicum. Spatha & foliis hymen radicum, basi sub terra alta ex quo
i. petioli attit. 2 phyllo, apice i. cuneam atque eret. Dolens, basi squamis, & columnis cinit. alijs membranæ. 1) pro Mor
longi conus. stipata. gradus e fusi grata emarginat. ciliata. subl. ea 1. longior laevior, angustior inter basi tantum floribus
Caulis SPNS. **arborescens** & costata nubes lant

8. ARUM caulescens, foliis sagittatis.
Arum arborescens, sagittariæ foliis. Plum. amer. 44.t. *arborescens* *caerulea* *nitens* *lancea*
aringa *Sp. 103.*

51. g. & 60.
Habitat in America meridionali. ♂ caule 3 ad 4 m. longo, foli-termin.
flor. Spadix affe caule terminans 2 ad 3.
Pheasde Herz.

*Numerosa cohors Ari apud Plumierum, Rheede, Her-
mannum, nondum sufficienter genere distincta est.*

DRACONTIUM.

I. DRACONTIUM scapo brevissimo, petiolo radicato *polyphyllum*
lacero, foliolis tripartitis: lacinias pinnatifidis. *Hort.*
cliff. 434. * *Roy. lugdb.* 6

Arum polypyllum, caule scabro punicante. Herm.

par. 93. *t.* 93. *l.* 1. *luminous glass*

Arum polyphyllum sirinamense, caule atrorubente gla-

bro & eleganter variegato. Pluk. alm. 52. t. 149.

f. I.
Hedysarum Scopariense 24

Habitat Surinami. ♀

2. DRACONTIUM foliis sagittatis, pedunculis petio-^{spino/um.}

lisque aculeatis. Fl. zeyl. 328. Arum zeylanicum spinosum Mourea, varian
Arum zeylanicum spinosum, sagittæ foliis. Herm. par. s. mark.

75. *Adonis amurensis* Regel. *Adonis amurensis* Regel. *Adonis amurensis* Regel. *Adonis amurensis* Regel.

Arum minus zeylanicum, *Tagittariae Tomis.* *Ruf. J. P. F.*

575. *Habitat* in Zeylona.

Habitat in Zeylona.

DRACONTIUM foliis subrotundis. Cola. novem. 214.
Glossa. foliis adors. allii vehementer praedita. Gron. virg.

Calla aquatilis odore allii vehementer praedita. Gron. virg.
86 *

186. *
Habitat in Virginia

Habitat in Virginia.

P p p 4

4. DRÄ-

{ Diacumentus diaconis majoris affinis, caule viventibus in aulis vanigato
filos longos ramos ex magnis latis inaequaliter plate, radice obvoluta
prolifera, fructuosa, levigata, et prugnatrix; compite Kœnigf. anno. 786, } Konjaku
{ Konjaku } Japan
{ Konjaku Dame }
it. Kusatto

acum. angustifoliae cordiformis radice cordata rotunda. T. 159 —
2. 2 pd. lach. fl. 3 radice cordata rigida et levigata petiolae cyl. plen-
dus 5 cm. long.

canitschat-
cense.

4. DRACONTIUM foliis lanceolatis. Amoen. acad. 2.
p. 360. *

monstera ad à d. monstro.

Habitat in Sibiria.

• pertusum.

5. DRACONTIUM foliis pertusis, caule scandente.

Liane a eau. gall. Arum hederaceum, amplis foliis perforatis. Plum. amer.

Damer. amur. laudat. Cippe in haren vnde. deam. quare. vay. agri. bident. a Kalata. quiam. Damer. 40. t. 56. 57. paula. 58. Damer.

a Kali. quiam. Damer.

Habitat in America meridionali. h. znd. radur. foliis petiolis curv. f. & v. carinat. ad altera velut. ined. profusa.

? Dracunculus

• ethiopicus.

Dracunculus. pacif.

1. CALLA foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, spadice superne masculo. Hort. cliff. 435.

Arum æthiopicum, flore albo odorato moschum olente. Comm. hort. 1. p. 25. t. 50.

Habitat in Æthiopia. 2. ad 6pdi. fl. altera. cordato. hor. 1. verna. petio. lumen. folioli. vagina. scuta. tegmine. crenulata.

2. CALLA foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. Hort. cliff. 436. Fl. suec. 744.

Calla foliis cordatis. Fl. lapp. 320.

Dracunculus palustris s. radice arundinacea. Bauh. pin. 195.

Dracunculus aquatilis. Dod. pempt. 330.

Provenzalia palustris. Petit. gen. 45.

Habitat in Europæ borealis paludibus. 2. ad 3m. v.

monstera ad Eucommia

scandens.

1. POTHOS. Fl. zeyl. 329. *

Potha. Burm. zeyl. 197.

Habitat in Zeylona. h.

alga ad.

• marina.

1. ZOSTERA. It. wgoth. 166. t. 4. f. 1.

Ruppia foliis linearibus obtusis. Mæhr. act. angl. 1741. p. 217. Spica. fl. ut in aro. contan. in fructu. aperte. hirsuta.

Alga angustifolia vitriariorum. Bauh. pin. 464? Fl. suec. 1137. rhiz. lutea. placenta. utr. exterrata. qui ruit. cuncte. ciliata.

Fructus 1. Alga marina graminea angustifolia seminifera famosior. Raj. angl. 3. p. 52. crista. flava. calo.

Habitat in mari Balthico, Oceano. 2.

algæ. Impen.

algæ. Indon.

Attag. spec.

ZOSTERA.

{

1. C. canadensis. Rata. fl. 1. Specie. ex. de. Bot. Clas-
2. just. fl. calore. dmentum. uti. syb. mud. p. 1. aw.

3. Apres. foli. redit. tenuis. cordat. acut. p. 1. condit. caria. multig. v. vaginata.

Classis XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

ZANNICHELLIA.

1. ZANNICHELLIA. Fl. lapp. 321. Fl. suec. 745. palustris. •
Hort. cliff. 437. Roy. lugdb. 9.
Zannichellia palustris major, foliis gramineis. Mich.
gen. 71. t. 34. f. 1. 2.
Algoides vulgaris. Vaill. act. 1719. p. 15. t. 1. f. 1.
Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis,
Baub. pin. 193. prodr. 101.
Potamogetoni similis graminifolia ramosa & ad genicula polyceratos. Pluk. alm. 305. t. 102. f. 7.
Habitat in Europæ, Virginiae fossis, flaviis. ◎

CALLITRICE.

callitrichæ ad.

1. CALLITRICE. Gen. nov. 1104.
Callitrichæ plinii. Col. ecpbr. 315. t. 316.
Corispermum foliis oppositis. Fl. lapp. 2. Fl. suec. 3.
Hort. cliff. 3. Gron. virg. 3. Roy. lugdb. 205.
Stellaria foliis omnibus subrotundis. Hall. helv. 199.
Lenticula palustris bifolia, fructu tetragono. Baub. pin.
362.
 2. Stellaria foliis omnibus angustis; apice resecto. *Hall. bifida.* •
helv. 198.
Lenticula palustris angustifolia, folio in apice dissecto.
Læs. pruss. 140. t. 38.
 2. Stellaria foliis ad caulem angustis; in summitate subrotundatis. *Hall. helv. 108.*
Stellaria aquatica. Baub. pin. 141. lobul. pendul. agnatis. alba illa plantæ.
Habitat in Europæ fossis paludibus. ◎

CERATOCARPUS.

ceratocarpus ad. 880

1. CERATOCARPUS. Amœn. acad. 1, p. 412. *Hort. arenarius.*
*ups. 281. * Buxb. act. 1. p. 241.*
Habitat in Tatariæ arenosis. ◎

CYNOMORIUM.

- Cynomorium ad coccineum.* I. CYNOMORIUM. Mat. med. 534.
Cynomorium sub. mich. Cynomorium purpureum officinarum. Mich. gen. 17. t. 12.
Fungus mauritanicus verrucosus ruber. Petiv. gaz. t. 39. f. 8
Fungus typhoides coccineus tuberosus melitensis. Boccon. mus. 2. p. 69. sic. 80. t. 81.
Fungus typhoides liburnensis. Till. pis. 64. t. 25.
Habitat in Sicilia, Melita, Mauritania parasiticum terrestre.

DIANDRIA.

Lenticula ad

LEMNA

- trisulca.* 1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. Fl. lapp. 470. Fl. suec. 1000. Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. 516.
hederula. lob. 201.
enclat. repens. grac. Lemna foliis lanceolatis: extremitis decussatis. Sauv. monsp. 91.

Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. Mich. gen. 16. t. 11. f. 5.

Lenticula aquatica trisulca. Bauh. pin. 362.

Hederula aquatica. Lob. ic. 2. p. 36.

Habitat in Europa sub aquis pigris puris.

*Lenticula ad**minor.*

- le* 2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. Hort. cliff. 417. Fl. suec. 999. Roy. lugdb. 516.

utringua vel. japon. Lenticula major monorhiza, foliis subrotundis utrinque viridibus. Mich. gen. 16. t. 11. f. 3.

migdonii. Rom. Lens palustris. Cam. epit. 852. Raj. angl. 3. p. 129. t. 4. f. 1

Habitat in Europæ aquis quietis.

*Lenticula ad**gibba.*

Tceos. Rom.

3. LEMNA foliis sessilibus subtus hemisphaericis, radicibus solitariis. Hort. cliff. 417. Fl. suec. 998.

Lenticula palustris major: inferne magis convexa, frumentu polyspermo. Mich. gen. 15. t. 11. f. 1.

Habitat in Europæ aquis jegribus.

*Lenticula ad**polyrhiza.*

Lenticula. Rost. Rhod.

quadri. D. D.

Viperalis. Lat.

4. LEMNA foliis sessilibus, radicibus confertis. Hort. cliff. 417. Fl. suec. 997. Roy. lugdb. 516.

Lenticularia major polyrhiza inferne atropurpurea. Mich. gen. 16. t. 11. f. 1.

Len-

Lenticula palustris major. Raj. angl. 3. p. 129. t. 4 f. 2.
Habitat in Europæ paludibus fossis.

TRIANDRIA.

TYPHA.

Typha ad. 39.

1. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femi- *latifolia*. •
neaque approximatis. It. scan. 168. *Typha* *latifolia* *Dicot. Theor.*
Typha palustris major. Bauh. pin. 20. Moris. hist. 3. *ulva angustifolia*
p. 246. s. 8. t. 13. f. 1.
Habitat in paludibus Europæ.
2. TYPHA foliis semicylindricis, spica mascula feminea- *angustifolia*. •
que remotis. It. scan. 198. *Typha* *angustifolia* *Pub.*
Typha. Hort. cliff. 439. Fl. suec. 772. Roy. lugdb. 73.
Gmel. sib. 1. p. 133. Fuchs. hist. 822.
Typha palustris, clava gracili. Bauh. pin. 20.
Typha palustris media. Moris. hist. 3. p. 246. s. 8.
t. 13. f. 2.
Habitat in Europæ paludibus.

Typha palustris *grida* *lunaria* *Bauh.* *Typha* *345* *lunaria* *Haenke*.

SPARGANIUM.

Sparganium ad.

1. SPARGANIUM foliis erectis triquetris. Fl. lapp. *erectum*.
345. Fl. suec. 770. Hort. cliff. 439. Roy. lugdb. 73. *Sparganium* *erectum*.
Gron. virg. 114. Gmel. sib. 1. p. 133.
Sparganium ramosum. Bauh. pin. 15. theatr. 228.
Platanatia f. Butomon. Dod. pempt. 601.
2. Sparganium non ramosum. Bauh. pin. 15. theatr. 231.
Habitat in Zonæ frigidæ septentrionalis aquosis.
2. SPARGANIUM foliis decumbentibus planis. *natans*. • *Sparganium* *ad.*
Sparganium foliis natantibus plano-convexis. Fl. lapp. 345. Fl. suec. 771.
Sparganium non ramosum minus. Dill. giss. 130.
spec. 58.
Sparganium minimum. Raj. hist. 1910. angl. 3. p. 437.
Habitat in Europæ borealis lacubus, paludibus.

ZEA.

Maij ad. 39.

1. ZEA. Hort. cliff. 437. Hort. upf. 281. Roy. lugdb. 73. *Mays*. *avati*. *Brasil*.
Frumentum indicum Mays dictum. Bauh. pin. 25. *Pagatoe*. *Virgin.*
theatr. 490. *Indians potem cici et chica dictum parant* *Fra-* *avayu* *Ind*.
maiz granis amari natus ad *chicay insp* *maizum monaci*.
maiz granis rubentibus c. 35. *3. C. 458* *chicay insp* *avayu abiaci confecta in*
maiz glutinosa flor primita ad *cici amandi* *3. C. 459* *Stet aida es confecta*.
maiz granis simplici nata natus ad *Sora* *Peruv* *Kaawi Brasil*
maiz glutinosa flor primita ad *3. C. 460* *Moschus* *3. C. 460* *Peruvia minore*.

Coix coquidae h. 12. C. 72. Linn. laudanii. Braun. Cad. 21. 69.
 caulis foliat. sp. flum. lata petrae endym. flor. vaginæ. May. 1. floriferis. inibz.
 ovato cocco invol. pedunculo ex parte orata ac 10 macula pubescit. eam profumato.
 972 MONOECIA TRIANDRIA.

Frumentum indicum. Cam. epit. 186. Dod. pempt. 509.
 Habitat in America. ◎
 Varietates hujus plurimæ existunt.

COIX.

Coix.. ad. 39

C 456 *Lacryma Jobi. lob.*

coix thugr. myrsin.

Rodoc. mag.

? *Lithospermum digitoides*

Jokui Tokuei *Tokuei* *Japan*

dactyloides.

Digitaria. leist. ad. 38

C 455.

Zizanium Dactylodes

Lex. n. 615.

1. COIX seminibus ovatis. Hort. cliff. 437. Hort. ups.

281. Fl. zeyl. 330. Gron. virg. 114. Roy. lugdb. 72.

Lithospermum arundinaceum. Baub pin. 258.

Lacryma Jobi. Clus. hist. 2. p. 216.

Habitat in Indiis. 2

2. COIX seminibus angulatis. Hort. cliff. 438. Roy.

lugdb. 72.

Gramen Daetylon maximum americanum. Pluk. alm.

178. t. 190. f. 2.

Gramen Daetylon indicum esculentum, spica articulata.

Ambr. phyt. 1. p. 545. t. 546. 547. Moris. hist. 3.

p. 185. f. 8. t. 3. f. 11. Scheuch. gram. 108.

Sesamum perenne indicum, spica frumentacea. Zan.

hist. 181. t. 68. *Sesamum indicum* Augst. 3275 f. 2

Habitat in America. 2

CAREX.

Spica unica simplici.

X dioica.

1. CAREX spica simplici dioica. Hort. cliff. 438. Fl.

suec. 746.

Cyperoides parvum, caulis & foliis tenuissimis triangularibus, spica longiore (& subrotunda), capsulis oblongis. Mich. gen. 56. t. 32. f. 1. 2.

Gramen cyperoides minimum, spica simplici cassa.

Moris. hist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. ult. (mas). Scheuch. gram. 497. t. 11.

Gramen cyperoides minimum, ranunculi capitulo simplici asperiore rotundo. Moris. hist. 3. p. 245. f. 8.

t. 12. f. 36.

Habitat in Europæ pratis humidis. 2

Carex ad 41.

• pulicaris.

Carex ad

2. CAREX spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis.

Carex spica simplici androgyna. Hort. cliff. 438. Fl.

suec. 747. It. gotl. 240. Dalib. paris. 287. Gmel. sib.

1. p. 144.

Carex spica unica. Fl. lapp. 747.

Carex minima, caulis & foliis capillaceis, capitulo-

singulari

ulva. Vetus. ex caricae sylvestris specie. vid. Ponted. d'ellert.

MONOECIA TRIANDRIA.

973

singulari tenuiori, capsulis oblongis utrinque acuminatis & deorsum flexis. *Mich. gen. 66. t. 33. f. 1.*

Gramen cyperoides minimum, seminibus deorsum reflexis puliciformibus. *Raj. hist. 1298. Pluk. phyt. 34. f. 10. Moris. hist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 21.*

Habitat in Europæ paludibus limosis. 2

3. CAREX spica simplici androgyna: inferne mascula, squarrosa.
capsulis imbricatis horizontalibus.

Carex ad. 41

Habitat in Canada. Kalm.

Spica oblonga, cylindrica, crassa, constans Capsulis horizontalibus, imbricatis, apice linearí longitudine ipsius capsulae prominentibus; inferne Spica paleis exaridis masculis tegitur. Inter Careces majores numeranda.

* Spicis androgynis.

4. CAREX spica composita, spiculis androgynis: inferne *arenaria. Karen*
rerioribus remotioribus, foliolo longiori instructis, cul-
mo triquetro. *It. aet. 139. Fl. suec. 749. **

*Carex maritima humilis, radice repente, caule trique-
tro, spica spadicea. Mich. gen. 67. t. 33. f. 4.*

Gramen cyperoides spica simplici compressa disticha.
Scheuch. gram. 498.

Gramen cyperoides minus repens, spica divisa. *Læs.
pruss. 116. t. 31.*

Habitat in Europæ arena, præsertim mobili. 2

5. CAREX spica composita, spiculis androgynis: inferne *uliginosa. Karen*
rerioribus remotioribus foliolo longiori instructis, cul-
mo tereti. *Fl. suec. 748. Interv. etat. 139. Fl. suec. 749. Ray.*

Habitat in Sueciæ paludibus sylvaticis.

6. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus *leporina. • Karen*
approximatis alternis androgynis nudis. *Fl. suec. 751. carex. ad
Gmel. sib. 1, p. 147.*

*Carex spicis ternis sessilibus confertis androgynis. Fl.
lapp. 322.*

Gramen Cyperoides, spica e pluribus spicis mollibus
composita. *Scheuch. gram. 456.*

Gramen Cyperoides palustre majus, spica divisa. *Baub.
pin. 6. Moris. hist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 29.*

Habitat in Europæ pratis uidis. 2

7. CAREX spica supradecomposita inferne laxiore: spi- *vulpina. • Karen*
culis androgynis ovatis sessilibus glomeratis: superne *carex. ad*
*fl. coronæ her. 2 ang. 17. segm. interclusa.
caulis 3 ang. apic. corona
spicula 6 ang. fl. in 1. coquida coacta. apic. nubila
ovata 3 quatra.*

masculis. *Hort. cliff.* 438. *Fl. suec.* 750. *Dalib. paris.* 286. *Roy. lugdb.* 74. *Gmel. sib.* 1. p. 146. t. 32.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule exquisite triangulari, spica brevi habitore compacta. *Mich. gen.* 69. t. 33. f. 13. 14.

Gramen Cyperoides palustre majus, spica compacta. *Bauh. pin.* 6. *Moris. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 14.

Habitat in Europæ paludibus nemorosis.

Karen muricata.

Yucca

8. *CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis*, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Fl. suec.* 752. *Gmel. sib.* 1. p. 148.

Carex spica androgyna, spiculis compactis obscure alternis, culmo nudo compresso. *Gvett. stamp.* 1. p. 149.

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia minima, caule exquisite triangulari, spica brevi interrupta. *Mich. gen.* 69. t. 33. f. 11.

Gramen Cyperoides spicatum minimum, spica divisa aculeata. *Scheuch. gram.* 485.

Gramen nemorosum, spicis parvis asperis. *Bauh. pin.* 7. *Moris. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 27.

Habitat in Europæ nemoribus humentibus. 2

loliaceæ.

Karen

9. *CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis*: capsulis ovatis teretiusculis muticis divaricatis.

Habitat in Svecia.

Radix repens. Folia graminea, tenera, lœvia. Culmus lœvis, superne nudus. Spiculæ 4 f. 8, ovatae, parvae, ad apicem culmi sparsæ, albidae. Semina ovata, obtusa, mutica demto pistillo, subtus rotundata. Differt a *C. muricata*, cui simillima, quod dimidio minor, quod capsulae minus divaricatae, obtuse, nec margine acutæ; ad hanc nostram propius accedunt figuræ. *Moris. hist.* f. 8. t. 12. f. 26. *Pluk. phyt.* 34. t. 4. quam ad alias.

Karen elongata.

Karen

10. *CAREX spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis*, capsulis ovatis acutis. *Fl. suec.* 753.

Cyperoides polystachyon, spicis laxis paniculam veluti componentibus. *Scheuch. gram.* 487. t. 13. f. 4.

Habitat in Europa. 2

Karen canescens.

pann.

11. *CAREX spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis*, capsulis ovatis obtusiusculis. *Fl. suec.* 745. *Dalib. paris.* 287.

Carex spica androgyna, spiculis compactis obscure alternis, culmo nudo compresso. *Gvett. stamp.* 149.

Supradicta s. Aragon

Carex spicis plurimis remotis sessilibus subrotundis tur-
gidis. Fl. lapp. 332.

Gramen Cyperoides spicis curtis divulsis. Læs. pruss.
117. t. 32.

Habitat in Europa septentrionali. 2

* *Spicis sexu distinctis: feminineis sessilibus.*

12. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis: *flava.*
mascula linearis, capsulis acutis recurvis. Fl. lapp. 755. ~~Carex~~ ad. 41
Dalib. paris. 284.

Carex spicis ad apicem tribus sessilibus: feminineis sub-
rotundis, capsulis acutis recurvis. Fl. lapp. 334.

Gramen Cyperoides palustre aculeatum, capitulo bre-
viore. T. Scheuch. gram. 426.

Gramen Cyperoides aculeatum germanicum s. minus.

Bauh. pin. 7. Moris. hist. 3. p. 243. s. 8. t. 12. f. 19.

Habitat in Europæ paludibus.

13. CAREX spicis remotis, feminineis subsessilibus, ca- *birta.* C
psulis hirtis. Fl. lapp. 335. Fl. suec. 757. Dalib. paris. ~~Carex~~ ad
282. Roy. lugdb. 74.

Carex pilosa, spicis erectis: masculis tribus sessilibus:
secunda minore; feminineis duabus remotis. Hort.

cliff. 438.

Cyperoides polystachyon lanuginosum. Moris. hist. 3.
p. 243. s. 8. t. 12. f. 10. Pluk. alm. 178. t. 34 f. 6.

Habitat in Europæ sabulosis.

14. CAREX spicis linearibus erectis: mascula breviore digitata. *ulva G*
inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus.
Fl. suec. 758. Hort. cliff. 438. Dalib. paris. 285.
Roy. lugdb. 75.

Carex spica mascula terminali, quam femininea suprema
breviore, capsulis distantibus. Fl. lapp. 338.

Cyperoides montanum nemorosum, caule triquetro
compresso, spicis ferrugineis tenuioribus inter se di-
stantibus. Mich. gen. 65. t. 32. f. 9.

Gramen caryophyllum montanum, spica varia. Bauh.
pin. 4. prodr. 9. Scheuch. gram. 448.

Gramen caryophyllum polycarpon, fructu triangulari.
Læs. pruss. 112. t. 27.

Habitat in Europæ nemoribus. 2

15. CAREX spicis feminineis sessilibus subsolitariis ova- *montana.* *ulva*
tis masculæ approximatis, culmo nudo, seminibus
glabris.

Cype-

gramen caryophyllum alpinum. C. S. lira 4. Rabinum, s. Reginum. gen.

Cyperoides montanum, foliis angustis parvis, spica spadicea divisa. Scheuch. gram. 419?

Cyperoides alpinum saxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, spica seminali nigricante plerumque unica. Mich. gen. 64. t. 32. f. 3.

Habitat in Europæ montanis apricis. 2

Folia mollia, congenerum magis flavescens.

ulva

globularis.

16. CAREX spica mascula oblonga, feminea sessili ovata, foliolo florali breviori approximata. Fl. suec. 759.

Carex spica mascula a feminea in ala folioli remota. Fl. lapp. 336.

Habitat in Europa frigidiore.

ulva

filiformis.

17. CAREX spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis, inferiore foliolo proprio breviore. Fl. suec. 760.

Cyperoides sylvaticum tenuifolium, spicis parvis tenuibus spadico-viridibus. Scheuch. gram. 425. t. 10. f. II.

Habitat in Europæ nemoribus.

ulva

pilulifera.

4

18. CAREX spicis terminalibus confertis subrotundis: masculina oblonga. Roy. lugdb. 75.

Gramen cyperoides tenuifolium, spicis ad summam caulis sessilibus globulorum æmulis. Plak. alm. 178. t. 91. f. 8.

Habitat in Europa.

ulva

saxatilis.

19. CAREX spicis tribus ovatis. sessilibus alternis; mascula oblonga. Fl. suec. 756.

Carex spicis tribus ad apicem sessilibus, femineis ovatis atris. Fl. lapp. 337.

Cyperoides alpinum saxatile, caule cubitali rotundo-triquetro nudo, spicis brevibus binis s. ternis confertim nascentibus, squamis obtuse mucronatis. Mich. gen. 63. t. 32. f. 4?

Habitat in Europæ alpibus.

* Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.

ulva

atrata.

20. CAREX spicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. Hort. cliff. 438. Gmel. sib. I. p. 149.

Carex spicis ad apicem culmi pendulis androgynis. Fl. lapp. 324. Roy. lugdb. 74.

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, spicis atris & tumentibus. Scheuch. gram. 481.

Caro ad. cœm.
fusca atat
dichotomia
Carr. ad. cœm.
ant. expon.

on Scheuch. Itam 2-tantum sed 3-4 di
est. malvæ i. strigis exstirpatis
græt. caro.

Gramen

Gramen Cyperoides alpinum majus, spicis atris plurimi simul junctis. *Rudb. elys.* I. p. 55. t. 23.

Habitat in Alpibus Europæ. ~~Alpibus d. virtut.~~

21. CAREX spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente. *Hort. cliff.* 439. n. 8. *Fl. suec.* 762. *Gmel. sib.* I. p. 140.

Carex spicis versus apicem pendulis: masculis & feminis. *Fl. lapp.* 325.

Carex spicis seminiferis latis ovalibus pendulis. *Hall. helv.* 239.

Cyperoides spica pendula breviore: squamis e spadiceo s. fusco rutilante viridibus. *Schenck. gram.* 442. t. 10. f. 15.

Habitat in Europæ frigidæ paludibus sylvaticis.

22. CAREX spicis pendulis: mascula erecta, femineis oblongis distichis, capsulis nudis acuminatis. *Fl. suec.* 763. * *It. gotl.* 240.

Carex spicis ex apice pendulis: masculina & femineis albis. *Fl. lapp.* 326.

Gramen Cyperoides pusillum, spica flavescente. *Rudb. elys.* I. p. 58. t. 40.

Habitat in Sueciæ pratis humidis.

23. CAREX spicis pendulis: mascula erecta, femineis o-vatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Fl. suec.* 764. * *Gmel. sib.* I. p. 139.

Carex spicis tribus pedunculatis erectis remotis: mascula & femineis. *Fl. lapp.* 327. *Rey. lugdb.* 75.

Cyperoides polystachion flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis. *Pluk. alm.* 178. t. 34. f. 5.

Mich. gen. 61. t. 39. f. 13.

Habitat in Europæ paludibus. 2

24. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: femineis panicea linearibus, capsulis obtusifusculis inflatis. *Fl. suec.* 765. *Dalib. paris.* 283. *Gmel. sib.* I. p. 136.

Carex spicis remotis sessilibus, capsulis globosis. *Fl. lapp.* 333. *Cyperoides spicis parvæ longæ sessilibus.* 2

Carex spicis maribus sessilibus, feminis turgidis & erectis. *Hall. helv.* 240.

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis e rarioribus & tumidiорibus vesicis compositis. *Mich. gen.* 61. t. 32. f. 11. *Pluk. alm.* 178. t. 91. f. 7.

Habitat in Europæ uliginosis. 2

ulva. *folliculata.*

25. CAREX spicis terminalibus pedunculatis: mascula
femineaque, capsulis subulatis longitudine spicæ.

Habitat in Canada. Kalm.

Culmus triqueter, bipedalis, vestitus Foliis angustioribus. Spica terminalis mascula, oblonga, pedunculata. In eadem ala Spica feminea ex Capsulis 7-8, conico-subulatis, longitudine ipsius spicæ, in fundo semine fœtis, patulis.

- C. Pseudocyperus.* 26. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis.

ολιγόρυπτος. Thali. ad. 41. Carex ad. 41. ulva. *rus. græm. 22.*

Carex spicis pendulis: omnibus feminis: unica androgyna inferne mascula. Hort. cliff. 439. Fl. suec. 766.

Roy. lugdb. 75. Gron. virg. 114. Dalib. paris. 281.

Cyperoides spica pendula breviore. Schenck. gram. 440.

Gramen Cyperoides spica pendula breviore. Bauh. pin.

6. Moris. hist. 3. p. 242. s. 8. t. 12. f. 5.

PseudoCyperus. Dod. pempt. 339.

Habitat in Europæ fossis.

ulva. ad *cespitosa.*

27. CAREX spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro *Fl. suec* 767.

Gmel. fib. 1. p. 137.

Gramen Cyperoides cariophyllum, folio longiore & angustiore, spicis sessilibus compactis erectis. Moris.

hist. 3. p. 243. s. 8. t. 12. f. 14.

Cyperoides sylvaticum angustifolium, spicis arvis tenuibus spadiceo viridibus. Schenck. gram. 425?

Habitat in Europæ paludibus turfosis. 2

C. acuta.
ad
ulva.

nigra.

rufa.

* *Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.*

28. CAREX spicis masculis pluribus, feminis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Fl. suec.* 769. *Dalib. paris.* 281.

Carex spicis erectis oblongis sessilibus alternis foliolo florali brevioribus: superioribus masculis. Hort. cliff.

439. Roy. lugdb. 74.

a. Carex nigra verna vulgaris. Fl. lapp. 330.

Gramen Cyperoides, foliis cariophyllæis, vulgatissimum.

Raj. hist. 1292.

B. Carex spicis masculis superioribus numerosis, feminis inferioribus: intermedia unica androgyna. Roy. lugdb.

75.

Carex maxima, spicis plurimis remotis longis. Fl. lapp.

329.

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis habitioribus:

squamis curtis. Mich. gen. 62. t. 32. f. 12.

Cype-

fatuò cur longe 6. et 7.

Cyperoides latifolium, spica rufa s. caule triangulo. *Carex mag. Salub.*
Scheuch. gram. 458.

Germen Cyperoides spica rufa, s. caule triangulo. *Bauh.*
pin. 6.

Habitat in Europa ubique: a. in siccioribus, b. in aquosis. 2

29. CAREX spicis masculis pluribus, femineis pedunculis inflatis acuminatis. *Fl. suec. 768. Dalib. paris. 282. Gmel. fib. 1. p. 143.* *Carex ad. 41*

Carex spicis plurimis: florescentibus tenuibus, fructiferis crassis. *Fl. lapp. 330.*

Cyperoides vesicarium, spicis viridantibus & subfuscis. *Scheuch. gram. 470.*

Germen Cyperoides angustifolium, spicis longis erectis. *Bauh. pin. 6.* *• 52 Art. C*

b. Carex culmo longissimo, spicis tenuibus remotis. *Fl. lapp. 328. Roy. lugdb. 75.*

Germen Cyperoides sylvarum tenuius spicatum. *Raj. hist. 1295. Moris. hist. 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 9.* *• 132 Art. C*
Scheuch. gram. 418.

y. Carex spicis femininis oblongis pedunculatis brevioribus: masculis sessilibus, ultima longissima, capsulis inflatis acuminatis. *Roy. lugdb. 76.*

Germen Cyperoides majus præcox, spicis rurgidis teretibus flavescentibus. *Moris. hist. 3. p. 242.* *• 18 Art. C*

Habitat in Europæ udis sylvaticis.

~~A XYRIS~~, ex axi et rame piperis. *Ind. et Kyn. ex nom.*
gladoli

1. AXYRIS foliis lanceolatis tomentosis, floribus feminis lanatis. *Gen. nov. 1105.* *Ceratoïdes. • 260*

Urtica foliis lanceolatis, femininis hirsutis. *Roy. lugdb. 210.*

Ceratoïdes orientalis fruticosa, elæagni folio. *Tournef.*
cor. 52. hec unica ceratoïdes non est una species axyri. utique alia quæ sunt.

Habitat in Tataria, Moravia. 5

2. AXYRIS foliis ovatis, caule erecto, spicis simplicibus. *Gen. nov. 1105.* *Amaranthoides.*

Atriplex montana incanescens, latiusculo folio non sinuato, fructu in thyrsulis squarrosis nigricante patulo. *Amm. ruth. 230?*

Habitat in Dauria. ②

Folia scabra pilis stellatis. Rami fructiferi ad basin longe nudi. Spica minima, subsessilis, simplicissima, ramos terminans.

hybrida.

3. AXYRIS foliis ovatis, caule erecto, spicis conglobatis. *Gen. nov. 1105.*

Habitat in Sibiria. ♂

Simillima praecedenti, a qua differt Spica longe pedunculata, conglobata s. secunda, torta, ramis fructiferis juxta caulem congestis. Foliis, magisque asperis.

prostrata.

4. AXYRIS foliis obovatis, caule subdiviso, floribus capitatis. *Gen. nov. 1105.*

Habitat in Sibiria. ♂

Caulis ramosissimus, spithameus, diffusus. Folia obverse ovata, petiolata. Flores ad apices ramorum conglobati, immixtis foliolis numerosis.

Nomen Ephedra. Di. 12. 1045 TRAGIA.

volubilis.

1. TRAGIA foliis cordato-oblongis, caule volubili. *Tragia scandens, longo betonicæ folio. Plum. gen. 14. Urtica racemosa scandens angustifolia, fructu tricocco. Sloan. jam. 38. hist. 1. p. 123. t. 82. f. 1. Raj. suppl. 105.*

Habitat in Jamaica. ♀. ♂

Caulis volubilis, contra solem scandens. Folia cordata, oblongo-acuminata, argute serrata, petiolata, pilis rigidis adspersa. Racemi axillares, solitarii, masculi. Flosculis viridibus, trifidis. Antheris 3, luteis. Feminus flos axillaris, solitarius, insidens Pedunculo longo, articulato, incurvo. Capsula tricocca, setis rigidis urentibus tecta, singulo loculo extus ad basin notato punctis duobus prominentibus.

- involucrata. 2. TRAGIA involucris feminineis pentaphyllis pinnatifidis.

Schorigeram. mal. ad.

Acalypha involucris feminineis pentaphyllis pinnatifidis. Fl. zeyl. 34.

Croton foliis ovato-lanceolatis serratis hispidis, caule fruticoso. Roy. lugdb. 201.

Ricinocarpos zeylanica hirsuta, foliis lanceolatis serratis. Burm. zeyl. 202. t. 92.

Schorigeram. Rheed. mal. 2. p. 73. t. 39. Raj. hist. 160.

Habitat in India. ♂

- Mercurialis. 3. TRAGIA foliis ovatis. *Fl. zeyl. 334.*

Mercurialis maderaspatensis tricoccos acetabulis desituta. Pluk. alm. 248. t. 205. f. 4.

Pee-

Lacki. Ryd. } *carbo mercurialis. Lacki. Augph. 22. 79 et 80.*
Exceandum. } *Lias dioica* ^{alt} *videtur pseud. Tragi. fol. alt.*
Mercurialis } *flor. max. ianuâ plant. spicatis. inflati termini exserta ramis*
Mercurialis *affectionem* *Augph. calore. 3. tamen. tali conniv.*
Mercurialis *agallium purpureum. flor. max. id abq. capre. pro parte inter rami. stylis 3. 103. 3rd*
Mercurialis *condensata. Rafatatum. 3. sem. 2. rami. Lactatio. 3. 103. 3rd*