



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Ornithogalum spicatum flore a viridi latente c. s. 2. idemae s.
 f. folia angustiora in ped. Spica scapo 2 longior. pedunculi florum
 longi. flori viridi lingulo foli callosi linea viridi longiora similitur
 habitate

HEXANDRIA MONOGYNIA. 307

- tis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus: fructiferis scapo approximatis.
- Ornithogalum racemo longissimo, filamentis dilatato-linearibus, capsulis erectis. *It. scap. 220.*
- Ornithogalum spica longissima, filamentis triangularibus. *Hall. helv. 294.*
- Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *Baub. pin. 70. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 3.*
- Ornithogalum majus. *Clus. hist. 1. p. 187.*
- Ornithogalum pyrenaicum. *Clus. car. 21.*
- Stachyoides. *Reneal. spec. 93. t. 90.*

Habitat in Alpibus Helveticis, Genevensibus, Pyrenæicis. & *multa folia lanam duntaxat nunciis admodum. Stachy. quædam in vna sagin.*

- ORNITHOGALUM racemo longissimo, foliis lanceolato-eniformibus.
- Ornithogalum latifolium & maximum. *Baub. pin. 70.*
- Ornithogalum vel Lilium alexandrinum, floribus albis innummerabilibus. *Swert. floril. 58.*

Habitat in Arabia, Ægypto. Folia pedalia *us quam duos pollices lata. &*

- ORNITHOGALUM racemo conico, floribus numerosis. *Roy. lugdb. 32.*
- Ornithogalum angustifolium spicatum maximum. *Baub. pin. 70. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 4. mod. h. ut 7. 13. f. 6.*

Ornithogalum lacteum maximum. *Best. eyf. vern. 5. t. 14. f. 2. Staminibus alternis emarginatis.*

- ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filamentis emarginatis. *Roy. lugdb. 32.*

Ornithogalum umbellatum maximum. *Baub. pin. 69.*
 Ornithogalum arabicum. *Clus. hist. 11. p. 186. Best. eyf. vern. 5. t. 12. f. 1.*

Melanomphale. *Reneal. spec. 89. t. 90.*
 Habitat juxta Alexandriam Ægypti. &

- ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Hort. cliff. 124. Hort. ups. 84. Roy. lugdb. 32.*

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. *Baub. pin. 70.*
 Eliocamos. *Reneal. spec. 88. t. 87.*

Habitat in Germania, Gallia. & *filamenta integra. non callosa*
ad ruptam iuncturam 21. mui fl. in ped. 10.
fl. spica laxa umbellam inferam ab pedunculo florum longiora
quam p. strium. florum. staminibus. latif. peristoma circa ovam
dem calice tubitum ad se alio. simul cum 6 florum de tubulo
quod dicitur communis linte distans a calice 9. ornithogalum

1925
 Scilla
 Scilla ad. 49.
 Epimedium Min. c. s. 70. 4
 Epimedium
 a corruptione qd id est
 ac. pag. 308.
 Scilla ad. 49.
 pyramidalis. • fruct.
 Epi. delat.

MONOGYNIA
 foliis ovato-lanceolatis
 foliis ovato-lanceolatis
 Roy. lugdb. 31. Fl. suc.
 Baub. pin. 57.
 hist. 213.
 in Europam
 foliis linearibus
 foliis linearibus
 Ruob. elys. 2. p. 11
 OGALUM.
 scapo angulato
 simplicibus. Fl. suc.
 pedunculis
 omnibus. subulatis
 31.
 Bank. pin. 71.
 91. t. 90. duntaxat
 matellis. &
 scapo angulato
 Fl. suc. 271.
 Baub. pin. 71.
 aleracis.
 scapo angulato, pedunculis
 Roy. lugdb. 31.
 luteum. Pet. 922.
 virginianum, foliis
 272. t. 350. f. 12.
 cum, foliis angustis
 umbellatis, spicatis

Juncago maritima. Barr. rar. 55. t. 271.
Habitat in Europæ inundatis uliginosis. ♂

2. TRIGLOCHIN capsulis sexlocularibus ovatis. Fl. maritimum.
suec. 299. Act. stockh. 1742. p. 147. t. 6. f. 4. 5. *Juncago ad 471*
Triglochin fructu subrotundo. Fl. lapp. 135. Roy. lugdb.
45. Gort. gelr. 76.
Juncago palustris & maritima perennis, fructu brevior
quinquecapsulari. Mich. gen. 44.
Gramen spicatum alternum. Baub. pin. 6. theatr. 82.
Habitat in Europæ maritimis. ♀

MELANTHIUM. *Est nomen nigellæ. Diqu.*

1. MELANTHIUM petalis ungviculatis. *fl. picata virginicum*
Melanthium foliis linearibus integerrimis longissimis, flo- *Veratrum ad 47*
ribus paniculatis. Gron. virg. 59.
Habitat in Virginia. ♀ *Est veratrum picat. Roy. par. 1044.*
2. MELANTHIUM petalis sessilibus: *Amoen. acad. 2. sibiricum.*
49. t. 1. * *Veratrum ad 47*
Melanthium spicis florum longissimis ramosis. Græcl.
110. t. 45. t. 8.
Habitat in Sibiria. ♀
Ex herb. Sibiria ad idem genus ac Veratrum. g. veratrum folia ovata fertilibus

MEDEOLA *Aperta fl. cor frul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

1. MEDEOLA foliis verticillatis, ramis aculeatis. *Jacquina Lin. ad 186*
Fruticosa foliis rufi stellatis. Dill. elzb. 148. t. 123. *capota Jacq. ut*
f. 149 *laeva. antium. oparibus. grotus. ovan. abq. d. r. u. s. t. h. a. d. s. t. y. o. n. s. c. o. n. d. u. c. t. u. s. t. y. t. i.*
Habitat in America calidior. *h. v. i. c. i. p. d. r. a. m. i. r. i. g. d.*
- MEDEOLA foliis verticillatis, ramis inermibus. *virginicum*
Medola foliis stellatis lanceolatis, fructu baccato. *Medola ad 52*
Gron. 39. * *Salsa. feuille 24*
- Lilium s. Martagon pusillum; floribus minutissime her-
baceis. Pluk. alm. 401. t. 328. f. 4.
Habitat in Virginia. ♀

3. MEDEOLA foliis alternis. *15. elb. h. d. f. l. o. r. s. m. a. i. s. p. r. i. n. t. u. s. a. p. a. r. a. g. u. s. a. d.*
Asparagus foliis ovato-lanceolatis solitariis. Hort. cliff. asparagoides. 52.
122. Roy. lugdb. 29.
Asparagus africanus scandens, myrti folio. Till. pis.
16. t. 12. f. 1. 2. *Est una asparagi spec. s. l. o. r. s. i. a. d. 2. v. e. l. g. t. s. u. n. a. n. i. l. l. a. d. a. d. o. r. e.*
Habitat in Ethiopia. *h. v. i. c. i. p. d. r. a. m. i. r. i. g. d. c. o. n. d. u. c. t. u. s. t. y. t. i. a. p. a. r. a. g. u. s. a. d. 52. s. t. y. l. o. u. s.*

TRILLIUM. *ad 446.*

1. TRILLIUM flore pedunculato cernuo. *cernuum.*

Classis VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

TROPÆOLUM. ^{bon} *quoc ad. 348* ~~indianum ad~~ *348*

1. TROPÆOLUM foliis integris, petalis acuminato-^{majus.} *se-* *348*
 taceis. *Hort. ups. 93.*
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. Hort. cliff. 145.
Cardamindum minus & vulgare T. Fewill. peru. 3.
p. 14. t. 8.
Nasturtium indicum majus. Baub. pin. 306.
Nasturtium indicum. Lob. ic. 166. f. 2. 1.
Habitat in Peru, Lima. ☉ ♀

2. TROPÆOLUM foliis subquinelobis, petalis obtusis. ^{minus.}
Hort. ups. 93.

Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. Hort. cliff. 143.
Cardamindum ampliori folio & majori flore. T. Few.
p. 3. p. 14. t. 8.

Acrymmon maxima odorata. Boerb. lugdb. 1. p. 244.
Vicia scabra scandens, nasturii sapore, maxima odora-
ta. n. lugdb. 628. t. 629.

Habitat in Peru, unde in Europam venit 1684 cura Be-
wernigii. ☉ ♀

3. TROPÆOLUM foliis palmatis, petalis multifidis. ^{peregrinum.}
Cardamindum quinquefolii folio, vulgo Malla. Few. Malla. Sws.
peru. 2. p. 756. t. 42.
Habitat in Peru, nondum mihi visa in Europa. ☉

OSBECKIA.

1. OSBECKIA. ^{chinensis.}
Echinophora maderaspatana, sideritis non ferratis nervo-
sis foliis, fructu capsulari caucalidis æmulo. Pluk. Kadali. Raj' ad. 234
atm. 132. t. 173. f. 4.
Kadali maderaspatanum minus, capsulis pilosis. Raj. Osbeckia Lin.
suppl. app. 236.
Habitat in India; in honorem Petr. Osbeck, Sveci, qui
1751. plantas Chinæ & Javæ periculoso itinere adiit, le-
git, examinavit, descripsit, communicavit.
Habitus Melastomæ. Caulis erectus, brachiatus, acute tetra-
gonus.

Sedum alpinum hirsutum lactes flore

} *Saxifraga* C. B. *mont.*

DECANDRIA DIGYNIA.

Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. *Bauh. pin.* 285.

onoblitum hippur
Salmonia Rab

3. Cotyledon minor, foliis subrotundis ferratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133.

2. Saxifraga, sedi folio, flore albo, multiflora. *Tournef. inst.* 252. *Sed*

Sedum ferratum, flore albo, multiflorum. *Dod. pempt.* 113.

3. Saxifraga, sedi folio, pyrenaica ferrata. *Tournef. inst.* 252.

Pyrenaeid alba

3. Cotyledon pyramidale, lato crenato & retuso folio, polyanthos. *Bocc. mus.* 2. p. 109. t. 86.

Saxifraga sedi folio angustiore ferrata. *Segu. ver.* 448.

Habitat in Alpibus Europæ. 2

2. SAXIFRAGA foliis lanceolatis denticulatis, caule nudo pilulato, floribus subcapitatis.

pensylvanica

Saxifraga ad
243

Saxifraga foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, caule nudo piloso ramoso, floribus confertis capitatis.

Gr. virg. 49.

Saxifraga noveboracensis. *Cold. noveb.* 105.

Saxifraga pensylvanica, floribus muscosis racemosis. *Dill. elth.* 337. t. 253. f. 328.

Sanicula virginiana alba, folio oblongo mucronato.

Pluk. alm. 331. t. 59. f. 1. & t. 222. f. 5.

Habitat in Virginia, Pensylvania, Canada.

3. SAXIFRAGA foliis lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifloro.

androsacea

Saxifraga ad

Saxifraga caule paucifloro, foliis subhirsutis lingulatis & tridentatis. *Hall. helv.* 405.

Sedum alpinum tertium. *Col. ecpbr.* 2. p. 66. t. 67. f. ult.

Saxifraga alpina, habitu androsaces, villosa. *Hall. norib.* 1736. t. 1. f. 3.

Habitat in Sibiria, Helvetia. *hall. 984*

4. SAXIFRAGA foliis linearibus subtus punctatis aggregatis recurvatis, caule nudo multifloro.

caesia

Saxifraga rosulis densissimis, foliis crassis glaucis repandis subtus sulcatis. *Hall. helv.* 402.

Saxifraga alpina minima, foliis caëlis deorsum incurvis.

Tournef. inst. 253. *Segu. veron.* 449. t. 9. f. 2.

Sedum alpinum album, foliis compactis. *Bauh. pin.* 284.

Moris. hist. 3. f. 12. t. 7. f. 32.

Sedum alpinum minimam, foliis cinereis, flore candido. *Scheuch. alp.* 341. 141. t. 21. f. 1.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenacis, Baldo. *hall. 982.*

Fo-

acervum congesta. Caules digitales, filiformes, maxima parte nudi: superne bifidi in 2 pedunculos subjecto pari foliorum: altero pedunculo in medio foliolis duobus.

ARENARIA.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnofis. Fl. suec. peploides. 375. Fl. lapp. 149. It. cl. 151. *ramis rufis alt. fl. 149. lat. caps. coruli. sem. 6. sept. cauto. 6. lapp.*

Alfene litoralis, foliis portulacæ. Baub. pin. 251. *fl. alb. an. petiolo med. cal. gypophyl. p. 251.*
Læs. pruss. 12. t. 2. *con. 5 pet. med. cal. gypophyl. p. 251.*

Telephium maritimum, portulacæ folio. Buxb. act. 3. *stam. 10. med. alt. calicis opposita lapp. 149. omnia non corollæ p. 271. ad lapp. ipsa dicitur lapp. 149. quod in lapp. angul. inter dunt.*

Habitat ad littora maris Europæ borealia. *2. p. 15. apr. fl. lapp. 149. 10. dunt. alt. cum lapp. 149. gaudet et petiolo. cor. lob. 6. lapp. 149. lapp. ipsa dunt. inter dunt.*

2. ARENARIA foliis ovatis carinatis recurvis quadri-fariam imbricatis. Baub. pin. 211. prodr. 125. Burs. XI. 135.

Habitat in Pyrenæis &

Herba omnino Gypsophile aggregata, sed Pedunculus uniflorus, terminalis.

3. ARENARIA foliis ovatis obtusis, pedunculo laterali lateriflora, uniflora.

Habitat in Sibiria.

Caulis digitalis filiformis simplicissimus. Folia ovata obtusa subpetiolata glabra. Pedunculus axillaris unicus longus bifidus. Corolla calyce longior.

4. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *trinervis. gypophyl. lapp.*

Hort. cliff. 173. Fl. suec. 374. * Roy. lugdb. 471.

Alfene plantaginis folio. Baub. hist. 3. p. 364.

Habitat in Europæ sylvis. *fl. 3. unis. horti. petiolo. cam. cap. lapp. pet. integra. gypophyl. lapp.*

5. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. Fl. suec. 373. Hort. cliff. 173. *hipp. sub. theoph.*

Roy. lugdb. 451.

Alfene minor multicaulis. Baub. pin. 251.

Alfene minor. Fuchs. hist. 23.

Habitat in Europæ sylvis glareosis. ☉

6. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membrana-
ceis vaginantibus. Fl. suec. 376.

α. Alfene, spergulæ facie, minor s. Spergula minor, sub-
cæruleo flore. Baub. pin. 251. prodr. 119.

Polygonum foliis gramineis, spergulæ capitatis. Læs. *Spurgula p. ut. p. 440. p. 440. Varda. ad. 270. p. 100.*

pruss. 203. t. 63.

β. Arenaria foliis linearibus longitudine intermediorum. marina. *Breda. ad. anth. cl. d. 2. thul.*

Hort. cliff. 173. Gron. virg. 161. Roy. lugdb. 451. *Sper- ex vult. stam. 10. 2. D d 4. 3. p. 440.*

Stylis. 3. } 5. D d 4. 3. p. 440.

DECANDRIA TRIGYNIA.

11. ARENARIA foliis ovatis ciliatis acutis. *Alfina, serpilli folio, multicaulis & multiflora. Segu. ver. 421. t. 5. f. 2.*

β. Arenaria foliis ovatis nervosis sessilibus imbricatis acutis. *Amoen. acad. 1. p. 162. n. 155.*

γ. Alfina foliis lanceolatis, petalis integris calyce majoribus. *Hall. helv. 390. t. 7. f. 3. Hall. n. 676. Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis. 2*

12. ARENARIA foliis subulatis subtus hispida.

Habitat Monpelii in monte calcaris.

Habens spergulae. Caules simplices, pilis raris adpersi. hispida.

Folii opposita, subulata, plana, subtus pilis raris hispida.

ca. panicula primum dichotoma, mox alternis pedunculata ramosa.

CHERLERIA

*34 per. citina
Cherleria ad. 256*

1. CHERLERIA. *Hall. helv. 391. t. 6.*

Lycnis alpina, muscosis foliis densius stipatis, floribus Sedoides. parvis, calyce duriore. Pluk. alm. 233. t. 42. f. 8.

Sedum montanum perpusillum luteum.. Moris. hist. 3. p. 471. f. 12. t. 6. f. 14.

Sedum montanum perpusillum, luteolis floribus. Park. theatr. 738. Haller. n. 659.

Habitat in Alpibus Helvetiae, Valeriae, Gothardo. 2 D. V. 181.

GARIDELLA.

1. GARIDELLA. *Hort. cliff. 170. Hort. ups. 108. Nigellastrum. Roy. lugdb. 481.*

Garidella foliis tenuissime divis. Garid. prov. 203. t. 39. Nigellastrum raris & foeniculaceis foliis. Magn. hort. 43. t. 143.

Nigella cretica, folio foeniculi. C. B. Moris. hist. 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 6.

Habitat in Galloprovincia. ©

MALPIGHIA. ad 388

1. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis. *Hort. cliff. 169. Hort. ups. 108. Nigellastrum.*

Roy. lugdb. 459. Malpighia cyanea minoribus foliis. Pluk. Cerasus jamaicensis, fructu tetrapyreno. Comte. hort. 1. p. 145. t. 75.

2. Sp. d. d. cortex capax foliorum.

Cera-

Rami juv. tenues, vincti, pubes.

delapsi cruent. 10 pubes. 1 plicata vicia opposit. non lacina. ovato obt.

1/2 long. quam lata 1/2 p. long. petalis brevi tenuit. sup. subplanis imid.

sup. 2 minim. canice ad latera petali erect. Rachis supra florum elevata.

Silene lapponica alpina, facie viscaria. Fl. lapp. 185. *
Silene floribus in capitulum congestis. Hall. belv. 376.

t. 7.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenaicis. 4 8 2. *tributa*.

5. LYCHNIS petalis bifidis, caule dichotomo, foliis subhirtis.

Habitat in Sibiria. Gmelin. 4

Statura *Silenes rupestris*, sed Radix perennis, Folia minus glabra, & Styli 5 distinguunt plantam.

Flora
~~Lychnis~~ ad. 254
Melandrium

6. LYCHNIS floribus dioicis. Hort. cliff. 171. Fl. suec. 361. Roy. lugdb. 448.

Cucubus caule composito, calycibus oblongo-ovatis. Fl. pp. 182.

Lychnis sylvestris f. aquatica purpurea simplex. Baub. pin. 204.

Lychnis sylvestris noctiflora alba simplex, calyce amplissimo. Till. pis. 105. t. 41. f. 1.

Melandrium plinii genuinum. Clus. hist. 1. p. 294. mas.

β. Cucubus floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis unilocularibus. Hort. cliff. 171.

Lychnis sylvestris alba simplex. Baub. pin. 204.

γ. Lychnis alba multiplex. Baub. pin. 204.
Habitat in Europæ frigida pratis succulentis. 4

7. LYCHNIS calyce inflato, corolla calyce brevior, caule unifloro.

Cucubus caule simplicissimo unifloro, petalis calyce brevioribus. Fl. suec. 363.

Cucubus caule simplicissimo unifloro, corolla inclusa. Fl. lapp. 181. t. 12. f. 1.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Sibiricis.
In Sibiria planta caule multifloro lecta est.

genuinum
Melandrium Plin. Clus.
Cucubus Math. Bauh.
Basilicum Agl. Cast.
apocathemum Causs.
αποκαθημενός Ταυρος. May
Eragrostium
Eragrostium
Cappadocia Rom. Vet
Eragrostium
Eragrostium
Eragrostium
Eragrostium

CERASTIUM. *et nomen græcum. Siliqua 256*

* Capsulis oblongis. *in ma. id genus ac Cerastium*

1. CERASTIUM foliis connatis. Hort. cliff. 173. Hort. persoliatum. upf. 115. Roy. lugdb. 450.

Myosotis orientalis perfoliata, lychnidis folio. Tournef. cor. 18. Dill. elth. 295. t. 217. f. 284.

Habitat in Græcia. 1 ped. 1. mai. fl. 1. l. 10. 10. 10.

2. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. Hort. cliff. viscosum. 174. Fl. suec. 379. Roy. lugdb. 450.

Kerastion
~~Cerastium~~
Siliqua 256
Cerastium
Cerastium
Kerastion
Cerastium

Tithymalus ad

12. EUPHORBIA inermis fruticosa, foliis distiche alternis ovatis, Hort. cliff. 198. * Roy. lugdb. 195. dos. *Tithymaloides*

Tithymalus curassavicus myrtifolius, flore coccineo mel-myrtifolia. •
lituo. Herm. par. 234. t. 234.

Tithymalus curassavicus myrtifolius, flore papilionaceo coccineo parvo. Comm. hort. 1. p. 31. t. 16. Pluk. alm. 369. t. 230. f. 2.

13. *Tithymaloides laurocerasi folio non serrato*, Dill. elth. padifolia. • *alia quæ est.*
Habitat in Curassao, at B. forte in India. •

13. EUPHORBIA inermis, foliis serratis petiolatis difformibus ovatis lanceolatis panduriformibus. Diff. euph. 13. *heterophylla.*

Tithymalus curassavicus, foliis & atriplicis foliis variis, caulibus viridantibus. Pluk. alm. 369. t. 12. f. 6.

Tithymalus curassavicus, foliis & atriplicis foliis hirsutis, caulibus subrubentibus. Moris. hist. 3. p. 336.
Habitat in America calidiore.

14. EUPHORBIA foliis oppositis subcordatis petiolatis emarginatis integerrimis, caule fruticose. Diff. euph. *Tithymalus ad*

Euphorbia inermis, caule fruticose, foliis oppositis subcordatis emarginatis, petiolis folio longioribus. Hort. cliff. 198. Roy. lugdb. 196.

Tithymalus curassavicus, folio cotini triphyllis, petalis florum serratis. Pluk. alm. 369. t. 230. f. 3.

Tithymalus arboreus curassavicus, cotini folio. Seb. thes. 1. p. 75. t. 46. f. 4.

Tithymalus arboreus americanus, cotini folio. Comm. hort. 1. p. 29. t. 15.

Habitat in Curacao. •

15. EUPHORBIA inermis herbacea ramosa, foliis subcordatis integerrimis petiolo brevioribus, floribus solitariis. Diff. euph. 14. *ocymoides.*

Euphorbia inermis, foliis subcordatis obtusis integerrimis petiolatis, caule ramoso erecto. Roy. lugdb. 199.

Habitat in Campechia. Houst.

* *Dichotomæ (umbella bifida aut nulla).*

16. EUPHORBIA dichotoma, foliis serrulatis ovatis obtusis trinerviis, panicula terminali, caulibus simplicibus. Diff. euph. 17. * *origanoides.*

F f 3

Ha

Tithymalus ramosissimus frutescens penè aplyllus. herm. Radr. A. Pat.
2 1/2 ped. Sinch. laevi atre vir. nitro. fl. hava inapicib. ramis ingali & cicut. fl. fo.

Tithymalus ad

12. EUPHORBIA inermis fruticosa, foliis distiche alternis ovatis, Hort. cliff. 198. * Roy. lugdb. 195. dos. *Tithymaloi-*

Tithymalus curassavicus myrtifolius, flore coccineo mel-myrtifolia. •
littuo. Herm. par. 234. t, 234.

Tithymalus curassavicus myrtifolius, flore papilionaceo coccineo parvo. Comm. hort. 1. p. 31. t. 16. Pluk. alm. 369. t. 230. f. 2.

13. *Tithymaloides laurocerasi folio non serrato, Dill. elth. padifolia.* • *alia quæ est.*
Habitat in Curassao, at B. forte in India. 5

13. EUPHORBIA inermis, foliis serratis petiolatis dif- heterophylla.
formibus ovatis lanceolatis panduriformibus. Diff. euph. 13.

Tithymalus curassavicus, foliis & atriplicis foliis variis, caulibus viridantibus. Pluk. alm. 369. t. 12. f. 6.

Tithymalus curassavicus, foliis & atriplicis foliis hirsutis, caulibus subrubentibus. Moris. hist. 3. p. 336.
Habitat in America calidiore.

14. EUPHORBIA foliis oppositis subcordatis petiolatis cotinifolia. • X
emarginatis integerrimis, caule fruticoso. Diff. euph. *Tithymalus ad*

15. *Euphorbia inermis, caule fruticoso, foliis oppositis subcordatis emarginatis, petiolis folio longioribus.* Hort. cliff. 198. Roy. lugdb. 196.

Tithymalus curassavicus, folio cotini triphyllis, petalis florum serratis. Pluk. alm. 369. t. 230. f. 3.

Tithymalus arboreus curassavicus, cotini folio. Seb. thes. 1. p. 75. t. 46. f. 4.

Tithymalus arboreus americanus, cotini folio. Comm. hort. 1. p. 29. t. 15.

Habitat in Curacao. 5

15. EUPHORBIA inermis herbacea ramosa, foliis sub- ocymioidea.
cordatis integerrimis petiolo brevioribus, floribus folitariis. Diff. euph. 14.

Euphorbia inermis, foliis subcordatis obtusis integerrimis petiolatis, caule ramoso erecto. Roy. lugdb. 199.

Habitat in Campechia. Houst.

* *Dichotomæ (umbella bifida aut nulla).*

16. EUPHORBIA dichotoma, foliis serrulatis ovatis ob- origanoides.
tusis trinerviis, panícula terminali, caulibus simplicibus. Diff. euph. 17. *

F f 3

Ha

Tithymalus ramosissimus frutescens penè aplyllus. herm. Radr. A. Pat. 2. 3 ped. sin. ch. laevis atri vir. nitid. fl. hava inapicib. ramis inapicib. & cicut. lona, l. & cicut. lona ovata acut.

Habitat in Gallia æquinoctiali.
Caulis, Folia, Corollæ villosa. Folia ovata, serrata, petiolata.

ACANTHUS.

acanthus ad 210

ACANTHUS foliis sinuatis inermibus. Hort. cliff. mollis. Hort. ups. 181. Mat. med. 318. Roy. lugdb. 304. Sauv. monsp. 278.

Acanthus fativus f. mollis virgilii. Baub. pin. 383.
Carduus Acanthus f. Branca ursi. Baub. hist. 3. p. 75.
Habitat in Italia, Siciliae humentibus, duris. 4

*acanthus matth. cordi
axavta. } Dion.
epaxavta }*

ACANTHUS foliis pinnatifidis spinosis. Hort. cliff. spinosus. 326. Roy. lugdb. 304.

acanthus ad

Acanthus spinosus. Baub. pin. 383.
Acanthus spinosus. Dod. pempt. 719.
Habitat in Italia humentibus. 4

ACANTHUS caule fruticoso aculeato. Acanthus fruticosus, agrifolii folio. Pet. succ. 10. gaz. t. 94.

Frutex inermis spinosus, foliis agrifolii, filiqua geminata brevis. Raj. hist. 1766. Pluk. phyt. 261. f. 4.
Carduus aquaticus f. indorum Dilivaria. Camell. lux. 6. n. 16.

Paina schylli. Rheed. mal. 2. p. 93. t. 48.
Habitat in India. 4

ACANTHUS foliis quaternis obsolete dentatis inermibus, calycibus ciliatis. maderaspatis.

Adhatoda maderaspatis, calyce barbato, foliis subtus villosis. Pet. mus. 23.
Habitat in India.

MELIANTHUS.

melianthus ad

MELIANTHUS stipulis solitariis petiolo adnatis. Hort. cliff. 492. Hort. ups. 181. Roy. lugdb. 402.
Melianthus africanus. Herm. lugdb. 414. t. 415.
Habitat in Æthiopiæ succulentis. 4

MELIANTHUS stipulis geminis distinctis. Hort. cliff. 492. Roy. lugdb. 402.

Melianthus africanus minor foetidus. Comm. rar. 4. t. 4.
Habitat in Æthiopia. 4

melianthus ad

Clas-

2. RANUNCULUS foliis linearibus, caule repente. *reptans.* 459
Fl. lapp. 236. t. 3. f. 5. Fl. suec. 459
Ranunculus flammeus minimus, spergulæ folio. Buxb.
cent 5. app. 41.
Var deleb. vet.

Ranunculus repens, gramineis foliis, e singulis geniculis radices agens. *Amm. ruth. 80. t. 13. f. 1.*
Habitat in Suecia, Russia ad ripas lacuum antecedenti valde affinis & forte varietas.

3. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Lingua. Nila*
Hort. cliff. 228. Fl. suec. 457. Roy. lugdb. 489. Dalib. πρῶτος ποταμός. Thal
paris. 163. Zuegenum. vet.

Ranunculus longifolius palustris major. *Bauh. pin. 34.*
Ranunculus lanceolatus major. *Tabern. ic. 48. herb. hall. 1781.*
Habitat in Europæ borealioris fossis, aquis limosis. &

4. RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis, floribus sessilibus. *nodiflorus. & tres pua*
Hort. cliff. 229. Dalib. paris. 164. Madagasc. vet.

Ranunculus parisiensis pumilus, plantaginellæ folio.
Pet. gaz. 40. t. 25. f. 4. Vaill. act. 1719. p. 52. t. 4. f. 4.
Ranunc. Plantaginif. folio, floribus caudiculis ad her. val. h. h.

β. Ranunculus ficulus, folio rotundo vix serrato. *Pet. gaz. 39. t. 24. f. 9.*
Habitat Parisiis & in Sicilia locis paludosis. à fontainebleau & hypodromicub. in

5. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus sessilibus, caule erecto, radice bulbosa. *gramineus. & tres pua*
Hort. cliff. 288. Ke bi Kengi. vet
Roy. lugdb. 489. Dalib. paris. 163. Sauv. monsp. 75.
Ranunculus, gramineo folio, bulbosus. *Bauh. pin. 180. Leptomenophyllum. Col*
Ranunculus pumilus, gramineis foliis. *Bauh. hist. 3. p. 366.*

Hypopiper lanceolatum. Daelch. hist. 1038.
Habitat in Pyrenæis & Gallia pratis aridis. & herb. hall. 1180

6. RANUNCULUS foliis subovatis nervosis integer-rimis petiolatis. *parnassifolius*
Ranunculus montanus, graminis parnassi-folio. *Tournef. Cinnam. graminis pumil.*
inst. 286. Parnassi pumil. cupis videri
Habitat in Europa australi. aqua bona inflammantia

7. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis amplexicaulis, caule subunifloro, radice fasciculata. *amplexicaulis.*
Hort. cliff. 229. Roy. lugdb. 484. Sauv. monsp. 76. Le laech. vet

Ranunculus montanus, folio plantaginis. *Bauh. pin. 180.*
Moris. hist. 2. p. 444. f. 4. t. 30 f. 36.
Ranunculus dulcis, foliis latis rapistri perfoliatis, floribus albis. *Menz. pug. t. 8. f. 6.*

2. RANUNCULUS foliis linearibus, caule repente. *reptans.* 459
Fl. lapp. 236. t. 3. f. 5. Fl. suec. 459
Ranunculus flammeus minimus, spergulae folio. Buxb.
cent 5. app. 41.
Var deleb. vet.

Ranunculus repens, gramineis foliis, e singulis geniculis radices agens. *Amm. ruth. 80. t. 13. f. 1.*
Habitat in Suecia, Russia ad ripas lacuum antecedenti valde affinis & forte varietas.

3. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Lingua. Nila*
Hort. cliff. 228. Fl. suec. 457. Roy. lugdb. 489. Dalib. πρᾶσιπυρρος. Thal
paris. 163. Zuegenum. vet.

Ranunculus longifolius palustris major. *Bauh. pin. 34.*
Ranunculus lanceolatus major. *Tabern. ic. 48. herb. hall. 1781.*
Habitat in Europæ borealioris fossis, aquis limosis. &

4. RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis, floribus sessilibus. *nodiflorus. & tres pua*
Hort. cliff. 229. Dalib. paris. 164. Madagson. vet.

Ranunculus parisiensis pumilus, plantaginellæ folio. *Pet. gaz. 40. t. 25. f. 4. Vaill. act. 1719. p. 52. t. 4. f. 4.*

β. Ranunculus ficulus, folio rotundo vix serrato. *Pet. gaz. 39. t. 24. f. 9.*
Habitat Parisiis & in Siciliae locis paludosis. à fontainebleau & hypodromicubun

5. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus sessili-gramineis. *& tres pua*
caule erecto, radice bulbosa. Hort. cliff. 238. Ke bi Kengi. vet
Roy. lugdb. 489. Dalib. paris. 163. Sauv. monsp. 75. Ranunculus, gramineo folio, bulbosus, Bauh. pin. 180. Leptomenophyllum. Col
Ranunculus pumilus, gramineis foliis. Bauh. hist. 3. p. 366.

Hypopiper lanceolatum. Daelch. hist. 1038.
Habitat in Pyrenæis & Gallia pratis aridis. & herb. hall. 1780

6. RANUNCULUS foliis subovatis nervosis integer-parnassifolius
rimis petiolatis. Kinnia. 884. et alia
Ranunculus montanus, graminis parnassi-folio. Tournes. Cinnam. graminis parnassi
inst. 286. Parnassi (pseud) cupes videtur
Habitat in Europa australi. & auro bona inflammantur

7. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis amplexicaulis
caulibus, caule subunifloro, radice fasciculata. Hort. cliff. 229. Roy. lugdb. 484. Sauv. monsp. 76. Le le laeth. vet

Ranunculus montanus, folio plantaginis. *Bauh. pin. 180. Moris. hist. 2. p. 444. f. 4. t. 30 f. 36.*

Ranunculus dulcis, foliis latis rapistri perfoliatis, floribus albis. *Menz. pug. t. 8. f. 6.*

2. ONONIS caulibus diffusis, ramis erectis, foliis cauli-
nis ternatis. *repens.*

Ononis ed 323

Anonis maritima procumbens, foliis hirsutie pubescen-
tibus. *Pluk. alm. 33. Dill. elth. 29. t. 25. f. 28.*

Habitat in Angliæ littoribus maris. 2

*Affinis admodum precedenti, differt caulibus-procum-
bentibus undique diffusis, & quod minor; Flores ex a-
lis solitarii (quorum non memor) speciem determina-
bunt. © spelticæ erit subsp. fl. carni erectæ. Lignum pedale*

3. ONONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus
ternatis petiolatisque, stipulis fetaceis. *miratissima.*

Ononis ed 124

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis &
stipulis longas setas exerentibus. *Sauv. monsp. 190.*

Ononis floribus lateralibus sessilibus solitariis, petiolis
longissimis. *Roy. lugdb. 375.*

Ononis lutea sylvestris minima. *Col. ecphr. 1. p. 304*

Anonis spinosa lutea minor. *Bauh. pin. 389.*

Anonis lutea montana non spinosa minima. *Barr. ic.*

1107.

Habitat in Italia, Monspeli.

*Ononis ed 4^e lyp
1. n. 479*

4. ONONIS stipulis floralibus ovatis membranaceis inte-
gerrimis. *Roy. lugdb. 376.*

Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. *Dill.*

elth. 2. t. 24. f. 27.
Anonis spicata erecta annua latifolia, filiquis
rectis. *Moris. hist. 2. p. 169. f. 2. t.*

Habitat in Lusitania. ©

5. ONONIS foliosis, foliis simplicibus obtusis.

*Monsp. 3^{ed}
alopecuroides 323*

Ononis floribus spicatis. *Hort. cliff. 358. Roy. lugdb. 376.*

Anonis ficula alopecuroides. *Tournef. inst. 408.*

Anonis purpurea spicata alopecuroides major. *Boerb.*

lugdb. 2. p. 33.
Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania. ©

6. ONONIS stipulis bracteisque acute ferratis. *Roy. lugdb. variegata.*

*376. **
Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia
maritima. *Tournef. inst. 409.*

Habitat in Europæ australis maritimis.

** Floribus pedunculatis.*

7. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis
terna- *Natrix. Plin. lob.*

*2 1/2 p. 1 Julii flor rosea subglossata. pinna.
fl. lutea
fl. flouida simple stipula 2. un spyllo bifida petalum folie annu
fl. ruppice buntunda lobis aplice pedunculo luteo. nigro. velut. pinna in dno
infirma abanata liberum. stilo huius
cal. (p. 8) 5 p. aq. ludo. longis. Cor lepat. cordi. spet. melleo angulato
vtem 10. 1 ad dph.*

...ul nomen Indicum in garcin et Pluch. Robinia sicut d. fructu c

DIADALEPHIA DECANDRIA. 723

4. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis petiolatis. Hort. ups. 212. Aspalathus frutescens major latifolius, cortice aureo. Amm. ruth. 283. Habitat in Sibiria, Tataria.

ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis sessilibus. Hort. ups. 212. Aspalathus frutescens minor angustifolius, cortice aureo. Amm. ruth. 282. t. 35. Habitat in Sibiria. Vix hac sufficienter, a priori, distincta.

COLUTEA.

COLUTEA arborea, foliolis obcordatis. Hort. cliff. 365. Hort. ups. 228. Roy. lugdb. 374. Sauv. monsp. 238. Colutea vesicaria. Baub. pin. 396. Colutea. Dod. pempt. 784. Colutea africana, serinae foliis, flore sanguineo. Comm. rar. II. Habitat in Africa, G. Narbonensi, Italiae praecipue ad Vesuvium.

COLUTEA foliosa, foliolis ovato-oblongis. Hort. cliff. 366. Hort. ups. 228. Roy. lugdb. 374. Colutea aethiopica, flore purpureo. Breyn. cent. 70. t. 29. Habitat in Aethiopia.

COLUTEA herbacea, foliis linearibus. Hort. ups. 266. Roy. lugdb. 374. Colutea africana annua, foliolis parvis mucronatis, vesiculis compressis. Comm. hort. 2. p. 87. t. 44. Habitat in africa.

PHASEOLUS.

* Scandentes.

PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis. Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis compressis torosis. Roy. lugdb. 367. Hort. ups. 213. Mat. med. 351. Phaseolus vulgaris. Lob. ic. 59. Hort. cliff. 359. milax hortensis s. Phaseolus major. Baub. pin. 339. Habitat in India.

Phaseolus simplicissimus flore violaceo, siloquibus lateribus hemine... Phaseolus latere dentellatus nigro... Phaseolus purpureus...

...ul nomen Indicum in garcin et Pluk. Robinia fujus d. frutic

DIADALEPHEA DECANDRIA. 723

4. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis petiolatis. Hort. upf. 212. Aspalathus frutescens major latifolius, cortice aureo. Amm. ruth. 283. Habitat in Sibiria, Tataria.

ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis sessilibus. Hort. upf. 212. Aspalathus frutescens minor angustifolius, cortice aureo. Amm. ruth. 282. t. 35. Habitat in Sibiria.

Vix hac sufficienter, a priori, distincta.

COLUTEA.

COLUTEA arborea, foliolis obcordatis. Hort. cliff. 365. Hort. upf. 228. Roy. lugdb. 374. Sauv. monsp. 238. Colutea vesicaria. Baub. pin. 396. Colutea. Dod. pempt. 784. Colutea africana, fennae foliis, flore sanguineo. Comm. rar. II. Habitat in Africa, G. Narbonensi, Italia praecipue ad Vesuvium.

COLUTEA foliosa, foliolis ovato-oblongis. Hort. cliff. 366. Hort. upf. 228. Roy. lugdb. 374. Colutea aethiopica, flore purpureo. Breyn. cent. 70. t. 29. Habitat in Aethiopia.

COLUTEA herbacea, foliis linearibus. Hort. upf. 266. Roy. lugdb. 374. Colutea africana annua, foliolis parvis mucronatis, vesiculis compressis. Comm. hort. 2. p. 87. t. 44. Habitat in africa.

PHASEOLUS.

* Scandentes.

PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis. Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis compressis torosis. Roy. lugdb. 367. Hort. upf. 213. Mat. med. 351. Phaseolus vulgaris. Lob. ic. 59. Hort. cliff. 359. milax hortensis f. Phaseolus major. Baub. pin. 339. Habitat in India.

Phaseolus simplicissimus flore violaceo, villosus latioribus semine... Phaseolus latioribus dentibus nigro. Phaseolus simplicissimus flore violaceo, villosus latioribus semine... Phaseolus latioribus dentibus nigro. Phaseolus simplicissimus flore violaceo, villosus latioribus semine...

