



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Catananche. *Dod. l. 4 c. 129. 2 / and / p. 129. 1a. folia composita longa Radix quilibet juncus.*
capitata 6. ad 7. orbi in quibus tenuerunt fructus sub (nuda) & recaly hic flabellum
to tenuerunt et in lori in quibus tenuerunt fructus sub (nuda) & recaly hic flabellum
2. p. 129. 1a. folia composita longa Radix quilibet juncus.
Catananche. *Dod. l. 4 c. 129. 2 / and / p. 129. 1a. folia composita longa Radix quilibet juncus.*

YNGENESIA: POLYGAMIA EQUALIS. 813
Chondrilla cyanoides lutea, coronopi folio non diviso.
Bocc. mus. 2. p. 21. t. 7. Barr. ic. 1135.
Stoebe plantaginis folio. Alp. exot. 287. t. 286.
Habitat in Creta. ☉ 1^o p. fol. 3 nuncia uti 2. ad latina

CATANANCHE foliis incis.
Catananche lutea, foliis varie incis. Vaill. act. 1721.
p. 216.
Scorzonera græca saxatilis & maritima, foliis varie laci-
natis. Tournef. cor. 36. itin. 1. p. 223. t. 223.
Habitat in Græciæ maritimis

græca

CICHORIUM.

CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis.
Fl. suec. 650. Dalib. paris. 244. Mat. med. 373.
Cichorium caule simplici. Hort. cliff. 389.
Cichorium sylvestre f. officinarum. Bauh. pin. 126.
Intybus sylvestris. Cam. epit. 285. Fuchs. hist. 979.
Habitat in Europâ ad margines agrorum viarumque. ☉

cichoria carnidit,
cikaria
Intybus. Luchy. +
πικρις? dist. thuy
πικρις
amarigo. gaza
Solegrium. Brouss
hippochari. Balch

CICHORIUM caule simplici, foliis integris crenatis.
Hort. cliff. 389. Hort. upf. 247. Mat. med. 374.
Cichorium latifolium f. Endivia vulgaris. Bauh. pin.
125.

Endivia. +
Endivo.
βέρις. Senj. Dign. St.
Scariota. arab.
Scario. Lib.
apete. Thuyh. ces
Intybus. Dod.

Intybum fativum. Dod. pempt. 634. *flor. anill.*
Endivia crispa. Bauh. pin. 125. *Cichorium crispum. 7. 479.*
Habitat - - - - - ☉ *in p. 125. 1a. folia composita longa Radix quilibet juncus.*

CICHORIUM caule dichotomo spinoso. Hort. cliff. 388.

spinosum.
σαρραλασι. gree. neu
Stamragazi
S. Stamragazi. Imper. 1581

Cichorium spinosum. Bauh. pin. 126. *prodr. 62. t. 62.*
Chondrillæ genus elegans, cæruleo flore. Clus. hist. 2.
p. 145.
Habitat in Cretæ, Siciliæ collibus arenosis maritimis. ☉

SCOLYMUS.

SCOLYMUS foliis margine attenuatis.
Scolymus annuus. Hort. upf. 244. *fl. limulata.*
Scolymus. Hort. cliff. 388. *fl. limulata.*
Scolymus Chrysanthemus annuus. Dodart. mem. 4. ☉
303,
Scolymus theophrasti narbonensis. Clus. hist. 2. p. 153.
Habitat in G. Narbonensi, Italia. ☉ *2^o p. 153.*

maculatus. •
hispanicus. •
βρόλυμος. Thuyh. Clus.
Urbymus
ascolymus. gree. Peller

SCOLYMUS foliis margine incrassatis.
Scolymus vivax. Sauv. monsp. 294. *fl. lutei.*
Scolymus Chrysanthemus. Bauh. pin. 384. *7. 480.*
Scolymus Thuyh. Radix lactuca lutea folio. 2. 4. 6. c. 4. SCO-
fl. aurata. fl. pulchra et dicitur fructus circa Adhæterum inquit
carosus et dicitur quod patem 10 obliqua non pueris. et dicitur dicitur
lutea aurata fl. et dicitur, aliud dicitur.
Radix dicitur et dicitur et dicitur.
Radix fl. et dicitur et dicitur.

hispanicus. •
βρόλυμος. Thuyh. Clus.
Urbymus
ascolymus. gree. Peller

INGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 847

Artemisia foliis compositis multifidis, racemis simplicibus alternis, floribus erectis sessilibus. Roy lagdb. 113. Sauv. monsp. 264.

Abinthium seriphium belgicum. Bauh. pin. 139. Bauh. hist. 3. p. 178.

Abinthium seriphium germanicum. Bauh. pin. 139. Habitat in Europæ septentrionalioris littoribus maris. &

ARTEMISIA foliis pinnatis, caulibus adscendentibus rupestris. hirsutis, floribus globosis cernuis: receptaculo pappo- genipi. fo. it. gotl. 285. t. 285. * Fl. suec. 669. *

Artemisia foliis pinnatis pilosis, ramis adscendentibus, floribus oblongis suberectis. Gmel. sib. 2. p. 111. t. 49. t. 1.

Abinthium pumilum repens & supinum. C. B. Pluk. alm. 3. t. 37. f. 1.

Abinthium pumilum palmeum minus, argenteo sericeoque folio. Bocc. mus. 2. p. 81. t. 71.

Abinthium alpinum incanum. Bauh. pin. 139. prodr. 71? abri

Abinthium viride, foliis multifidis linearibus. Gmel. sib. 2. p. 131. t. 64. f. 2.

Habitat in Sibiria, Oelandiæ rupibus calcareis.

Differt C. B. (ex Bursero) planta ramis longioribus, aliisque forte ex loco notis; Sibirica magis fruticosa est.

Planta in rupibus alba sericea. In horto major, atroviridis, nuda.

* Erectæ herbacæ, foliis compositis.

ARTEMISIA foliis multipartitis subtus tomentosis, pontica. floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. Hort. ups. 257. Hort. cliff. 404. Mat. med. 387. Galatium y Diosc. 11. Cardominis

Abinthium ponticum tenuifolium incanum. Bauh. pin. 138.

Abinthium tenuifolium. Dod. pempt. 24.

Habitat in Hungaria interiore, Pannonia, Thracia, Myfia. &

ARTEMISIA foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus: receptaculo glabro conico. Hort. ups. 257. annua.

Artemisia, radice annua, viridis, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis, calycibus subrotundis fere erectis ex alis copiosissimis. Gmel. sib. 2. p. 125.

Abinthium, tanaceti folio, odoratissimum. Amm. ruth. 142. t. 193. f. 23. imperfecte.

B. Ab-

Abinthium alpinum candidum humile. C. B. genipi.
Nya A espece de plante apalee genipi par les Savoyards à caule de
lens verte pubescente qui fait qu'on les emploie en infusion à chaud dans
les pleuresies ou point de coté, acutis par le froid.
1° Abinthium alpinum candidum humile. C. B. C'est le vrai.
2° Abinthium alpinum tenuifolium. C. B. C'est le meilleur au dit pays de l'Abinthium.
3° Tanacetum vulgare. C. B. C'est la racine pinnatifide et latifolia. C. B.
4° Stachys flata herba della Rota.

INGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 847

Artemisia foliis compositis multifidis, racemis simplicibus alternis, floribus erectis sessilibus. Roy lugdb. 113. Sauv. monsp. 264.

Abinthium seriphium belgicum. Bauh. pin. 139. Bauh. hist. 3. p. 178.

Abinthium seriphium germanicum. Bauh. pin. 139. Habitat in Europæ septentrionalioris littoribus maris. &

ARTEMISIA foliis pinnatis, caulibus adscendentibus rupestris. hirsutis, floribus globosis cernuis: receptaculo pappo- fo. it. gotl. 285. t. 285. * Fl. suec. 669. *

Artemisia foliis pinnatis pilosis, ramis adscendentibus, floribus oblongis suberectis. Gmel. sib. 2. p. 111. t. 49. t. 1.

Abinthium pumilum repens & supinum. C. B. Pluk. alm. 3. t. 37. f. 1.

Abinthium pumilum palmeum minus, argenteo sericeoque folio. Bocc. mus. 2. p. 81. t. 71.

Abinthium alpinum incanum. Bauh. pin. 139. prodr. 71? abri

Abinthium viride, foliis multifidis linearibus. Gmel. sib. 2. p. 131. t. 64. f. 2.

Habitat in Sibiria, Oelandiæ rupibus calcareis.

Differt C. B. (ex Bursero) planta ramis longioribus, aliisque forte ex loco notis; Sibirica magis fruticosa est.

Planta in rupibus alba sericea. In horto major, atroviridis, nuda.

* Erectæ herbacæ, foliis compositis.

ARTEMISIA foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. Hort. ups. 257. Hort. cliff. 404. Mat. med. 387.

Abinthium ponticum tenuifolium incanum. Bauh. pin. 138.

Abinthium tenuifolium. Dod. pempt. 24.

Habitat in Hungaria interiore, Pannonia, Thracia, Myfia. &

ARTEMISIA foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus: receptaculo glabro conico. Hort. ups. 257.

Artemisia, radice annua, viridis, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis, calycibus subrotundis fere erectis ex alis copiosissimis. Gmel. sib. 2. p. 125.

Abinthium, tanaceti folio, odoratissimum. Amm. ruth. 142. t. 193. f. 23. imperfecte.

B. Ab-

Abinthium alpinum candidum humile. C. B. Genupi.
Nya A. spec. de plantis apalix genupi parvè Savoyard à caule de
lens v. antea sudorifuge qui fait qu'on les emploie en infusion à chaud dans
les pleurésies ou point de côté, causé par le froid.
1° Abinthium alpinum candidum humile. C. B. C'est le vrai.
2° Abinthium alpinum tenuifolium. C. B. C'est le meilleur aussi fait de l'Abinthium
3° Tanacetum vulgare. C. B. C'est la racine pinnatifide et latifolia. C. B.
4° Artemisia laticarpa. C. B. C'est la racine pinnatifide et latifolia. C. B.

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 855

Elichrysum spicatum obtusifolium, basi angustiore. *Dill. elth.* 131. t. 109. f. 132.

Gnaphalium spicatum majus non ramosum erectum virginianum, foliis obtusioribus. *Morif. hist.* 3. p. 92. *Habitat in* Carolina, Virginia, Pennsylvania. ☉

3. GNAPHALIUM foliis lanceolatis semiamplexicaulibus, caule inferne ramoso terminali. *Hort. cliff.* 401. *

Elichrysum africanum, folio longo subtus cano supra viridi, flore luteo. *B. Dill. elth.* 128. t. 107. f. 128. *Habitat in* Africa. 4

24. GNAPHALIUM foliis lanceolatis tomentosis, caule ramoso, squamis calycinis reflexis. *Filago ad.*

Gnaphalium incanum angustifolium, calycis, squamis ferrugineis reflexis. *Burm. afr.* 226. t. 80. f. 2. *Habitat in* Æthiopia.

25. GNAPHALIUM foliis oblongis tomentosis sessilibus, capitulis foliosis villosissimis. *Roy. lugdb.* 150.

Gnaphalium, latiore folio, æthiopicum, flore roseo, calyculis spinosis. *Pluk. alm.* 171. t. 323. f. 1. *Habitat in* Æthiopia.

26. GNAPHALIUM foliis amplexicaulibus spatulatis, ramis patentibus, corymbis aggregatis. *Hort. cliff.* 402. *Ulichryd*

Elichrysum africanum, folio oblongo tomentoso caulem amplectente, flore luteo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 121. *Habitat in* Æthiopia.

27. GNAPHALIUM foliis decurrentibus obtusis mucronatis utrinque tomentosis planis. *Ulichryd. odoratissimum.*

Elichrysum latifolium villosum, alato caule, odoratissimum. *Pluk. alm.* 134. t. 173. f. 6. *Habitat* - - -

* Filagine calycibus cinereis.

28. GNAPHALIUM caule simplicissimo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato.

Gnaphalium alpinum, magno flore, folio oblongo. *Baub. pin.* 264. *Filago alpina capite folio 454*

Gnaphalium alpinum pulchrum. *Baub. hist.* 3. p. 161.

Gnaphalium alpinum. *Clus. hist.* 1. p. 328. *Leontopodium. Dod. pempt.* 68.

β. Gnaphalium magno flore, folio brevi. *Baub. pin.* 264. *Habitat*

End. Septi. fl. macul. top. femineis cinn. int. central. 5 fodi. f. univ. ligulati 4 dent. end. Septi.

Filago ad. 122. Leontopodi- um. Dica. malth. Dod. 1507. no. Dica. Dica. Censor. alid. Phi. Mamm. India. ex D. Septi.

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 855

Elichrysum spicatum obtusifolium, basi angustiore. *Dill. elth.* 131. t. 109. f. 132.

Gnaphalium spicatum majus non ramosum erectum virginianum, foliis obtusioribus. *Moris. hist.* 3. p. 92. *Habitat in* Carolina, Virginia, Pennsylvania. ☉

3. GNAPHALIUM foliis lanceolatis semiamplexicaulibus, caule inferne ramoso terminali. *Hort. cliff.* 401. *

Elichrysum africanum, folio longo subtus cano supra viridi, flore luteo. *B. Dill. elth.* 128. t. 107. f. 128. *Habitat in* Africa. 4

4. GNAPHALIUM foliis lanceolatis tomentosis, caulibus ramoso, squamis calycinis reflexis. *Filago ad.*

Gnaphalium incanum angustifolium, calycis, squamis ferrugineis reflexis. *Burm. afr.* 226. t. 80. f. 2. *Habitat in* Æthiopia.

5. GNAPHALIUM foliis oblongis tomentosis sessilibus, capitulis foliosis villosissimis. *Roy. lugdb.* 150.

Gnaphalium, latiore folio, æthiopicum, flore roseo, calyculis spinosis. *Pluk. alm.* 171. t. 323. f. 1. *Habitat in* Æthiopia.

6. GNAPHALIUM foliis amplexicaulibus spatulatis, ramis patentibus, corymbis aggregatis. *Hort. cliff.* 402.

Elichrysum africanum, folio oblongo tomentoso caulem amplectente, flore luteo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 121. *Habitat in* Æthiopia.

7. GNAPHALIUM foliis decurrentibus obtusis mucronatis utrinque tomentosis planis. *Ulichrysum?*

Elichrysum latifolium villosum, alato caule, odoratissimum. *Pluk. alm.* 134. t. 173. f. 6. *Habitat* - - -

* Filagine calycibus cinereis.

8. GNAPHALIUM caule simplicissimo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato.

Gnaphalium alpinum, magno flore, folio oblongo. *Baub. pin.* 264. *Filago alpina capite folio 154*

Gnaphalium alpinum pulchrum. *Baub. hist.* 3. p. 161.

Gnaphalium alpinum. *Clus. hist.* 1. p. 328.

Leontopodium. *Dod. pempt.* 68.

9. Gnaphalium magno flore, folio brevi. *Baub. pin.* 264.

H h h 4

End. Septi. flos maculæ top. feminarij cinninti centralis 5 fodi. f. feminarij ligulati 4 d. end. Septi.

Filago ad. 122.

Leontopodi-

um. Dica. malth. Dod. 1507. no. 6. Dica.

Cemor. alit. Phi.

manducaria ex D. Septi.

GTNANDRIA DIANDRIA

orchis fl. simiam...
941

Orchis papilionem referens angustifolia alba. Bauh. pin. 81. ^{ornithoglossum} ^{gemma} ^{lib. adu.}

84. Orchis morio mas. foliis maculatis. Bauh pin. 81. masculus. ^{gulus} ^{Calypion Br} ^{undf}

Testiculis IV. ^{Cam. epit. 624.} ^{ad mundum prope Capruis 20 aprilij floris} ^{Fl. h. d. 5. r. ad. m. d. r. v.} ^{Tetratatis ad 70}

Orchis foliis sessilibus non maculatis. Bauh. pin. 82.

Habitat in Europæ nemoribus. ^{obtusula maculata utraque, lucida capillata fructu uly. spicam} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

a. Labium aequale, calcar emarginatum, galea con-

nivens obtusa. ^{ad 30 floris. lta rubra cum f. nemi.}

b. γ. Labium medio brevius, calcar obtusum, galea

alis reflexis obtusis ^{varietatem regni aemulon} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

d. ε. Labium aequale, calcar integrum, galea alis

reflexis ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.} ^{varietatem regni aemulon} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido pun-

ctis ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.} ^{varietatem regni aemulon} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

1741. p. 11. Fl. suec. 726. It. æl. 45. * Dalib. paris. ^{ustulata.} ^{Satyrion ad} ^{Tetratatis ad}

272. Orchis militaris pratensis humilior. T. Vaill. paris. 149.

t. 31. f. 35. ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.} ^{varietatem regni aemulon} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

Orchis pannonicæ IV. Clus. hist. 1. p. 268.

Cynosorchis militaris pratensis humilior. Bauh. pin. 81.

Habitat in Europæ temperatæ pratis. 4 ^{Pentatatis ad} ^{Satyrion ad} ^{70.}

10. C. albis indivisis, nectarii labio quinquefido ^{militaris.} ^{Cynosorchis adu. ang.} ^{Pentatatis ad}

punctato: cornu obtuso, petalis confluentibus. ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.} ^{varietatem regni aemulon} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

Aët. upf. 1740. p. 11. Fl. suec. 725. It. æl. 45. * Da- ^{Pentatatis ad}

lib. paris. 271. ^{Pentatatis ad}

Orchis galea & alis cinereis. Bauh. hist. 2. p. 755. ^{Pentatatis ad}

Orchis mas latifolia. Fuchs. hist. 554. ^{Pentatatis ad}

Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. Bauh. ^{Pentatatis ad}

pin. 80. ^{orchis floris undi hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.} ^{varietatem regni aemulon} ^{causa hinc innotuita arabis. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

β. Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante. ^{Pentatatis ad}

I. B. Raj. angl. 3. p. 378. t. 19. f. 2. ^{Pentatatis ad}

γ. Orchis latifolia, hiante cucullo, minor. T. Vaill. pa- ^{Pentatatis ad}

ris. t. 31. f. 22. 23. 24. ^{orch. milit. minor} ^{Pentatatis ad}

Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, minor. Bauh. pin. ^{Pentatatis ad}

81. ^{Pentatatis ad}

δ. Orchis militaris major. Tournef. inst. 438. t. 247. ^{Pentatatis ad}

Vaill. paris. 148. t. 31. f. 21. 27. 28. ^{Pentatatis ad}

Cynosorchis militaris major. Bauh. pin. 81. ^{Pentatatis ad}

Habitat in Europæ temperatæ pratis. 4 ^{Pentatatis ad}

* ^{Tuberibus insip.} ^{Bulbis palmatis.}

11. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu co- ^{latifolia.} ^{Satyrion}

ni: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore lon- ^{Satyrion ad}

gus. Aët. upf. 1740. p. 15. Fl. suec. 728. It. æl. ^{Or-} ^{Triatatis ad}

GTNANDRIA DIANDRIA

orchis fl. similiae... GYNANDRIA DIANDRIA. 941

Orchis papilionem referens angustifolia alba. Bauh. pin. 81. ornithoglossum gamma lib. adu.

84. Orchis morio mas. foliis maculatis. Bauh pin. 81. masculus. Testiculis IV. Cam. sept. 624. fl. pedic. 4. h. 3. rad. m. 2.0. Tetratatis ad 70

Orchis foliis sessilibus non maculatis. Bauh. pin. 82. Habitat in Europæ nemoribus.

a. Labium aequale, calcar emarginatum, galea con-

nivens obtusa. fl. pedic. 4. h. 3. rad. m. 2.0. Tetratatis ad 70

b. γ. Labium medio brevius, calcar obtusum, galea

alis reflexis obtusis. fl. pedic. 4. h. 3. rad. m. 2.0. Tetratatis ad 70

d. ε. Labium aequale, calcar integrum, galea alis

reflexis obtusis. fl. pedic. 4. h. 3. rad. m. 2.0. Tetratatis ad 70

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido pun-

ctis ter cornu obtuso, petalis distinctis. Act. ups. 1741. p. 11. Fl. suec. 726. It. æl. 45. * Dalib. paris. 272. Satyrium ad Tetratatis ad

Orchis militaris pratensis humilior. T. Vaill. paris. 149.

t. 31. f. 35. Fl. suec. 725. It. æl. 45. * Dalib. paris. 271. Pentatatis ad

Orchis pannonica. IV. Clus. hist. 1. p. 268.

Cynosorchis pratensis humilior. Bauh. pin. 81.

Habitat in Europæ temperatae pratis. 4

10. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido

punctato: cornu obtuso, petalis confluentibus. Act. ups. 1740. p. 11. Fl. suec. 725. It. æl. 45. * Dalib. paris. 271. Pentatatis ad

Orchis galea & alis cinereis. Bauh. hist. 2. p. 755.

Orchis mas latifolia. Fuchs. hist. 554.

Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. Bauh. pin. 80. orchis fl. undi humilior. T. Vaill. paris. 148. t. 31. f. 21. 27. 28. Pentatatis ad

β. Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante.

I. B. Raj. angl. 3. p. 378. t. 19. f. 2.

γ. Orchis latifolia, hiante cucullo, minor. T. Vaill. paris. t. 31. f. 22. 23. 24. orch. milit. minor. Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, minor. Bauh. pin. 81. 81. Satyrium ad

δ. Orchis militaris major. Tournef. inst. 438. t. 247. Vaill. paris. 148. t. 31. f. 21. 27. 28. Cynosorchis militaris major. Bauh. pin. 81. Habitat in Europæ temperatae pratis. 4

* Bulbis palmatis.

11. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu co-

lato: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore lon-

gioribus. Act. ups. 1740. p. 15. Fl. suec. 728. It. æl. 45. * Dalib. paris. 274. Or- Tetratatis ad

orchis fl. similiae...
941

Orchis papilionem referens angustifolia alba. Bauh. pin. 81. ^{ornithoglossum} ^{gamma} ^{lib. ad.}

84. Orchis morio mas. foliis maculatis. Bauh pin. 81. masculus. ^{apuli} ^{Calypion Br}

Testiculis IV. Cam. epit. 624. ^{a mundon pro Capruis 20 aprilij floris} ^{Fl. h. d. s. rad. m. d. s. m.} ^{Tetraclat. ad 70}

Orchis foliis sessilibus non maculatis. Bauh. pin. 82.

Habitat in Europæ nemoribus. ^{obtusula maculata ut laces, lucida capillata fine utly. spicam} ^{causa hanc involuente arbor. spica tenuis. caule 2 ad 3 pedum.}

a. Labium aequale, calcar emarginatum, galea con-

nivens obtusa. ^{2 ad 3 floris. lta rubra cumly namij.}

b. γ. Labium medio brevius, calcar obtusum, galea

alis reflexis obtusis. ^{varietatem vperi mundon} ^{varietatem vperi mundon}

d. ε. Labium aequale, calcar integrum, galea alis

reflexis. ^{varietatem vperi mundon} ^{varietatem vperi mundon}

ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido pun-

ctis re... cornu obtuso, petalis distinctis. Act. upf. ^{ustulata.} ^{Satyrion ad}

1741. p. 11. Fl. suec. 726. It. æl. 45. * Dalib. paris. ^{Tetraclat. ad}

272. Orchis militaris pr... amilior. T. Vaill. paris. 149.

t. 31. f. 35. ^{leg. ver. t. 15. f. 4.}

Orchis pannou... IV. Clus. hist. 1. p. 268.

Cynosorchis... pratenfis humilior. Bauh. pin. 81.

Habitat in Europæ temperate pratis. 4

10. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido

pu... cabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. ^{militaris.} ^{Cynosorchis ad. ang.} ^{Castoreus ad.}

Act. upf. 1740. p. 11. Fl. suec. 725. It. æl. 45. * Da- ^{lib. paris. 271.}

Orchis galea & alis cinereis. Bauh. hist. 2. p. 755.

Orchis mas latifolia. Fuchs. hist. 554.

Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. Bauh. ^{pin. 80. orchis floris undi humidis... rymat... m... d.}

β. Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante. ^{I. B. Raj. angl. 3. p. 378. t. 19. f. 2.}

γ. Orchis latifolia, hiante cucullo, minor. T. Vaill. pa- ^{ris. t. 31. f. 22. 23. 24. orch-milit-minor}

Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, minor. Bauh. pin. ^{81.}

δ. Orchis militaris major. Tournef. inst. 438. t. 247. ^{Vaill. paris. 148. t. 31. f. 21. 27. 28.}

Cynosorchis militaris major. Bauh. pin. 81. ^{Habitat in Europæ temperate pratis. 4}

* ~~Bulbis palmatis.~~

11. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu co-

niot: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore lon-

gus. Act. upf. 1740. p. 15. Fl. suec. 728. It. æl. ^{latifolia. Satyrion}

48. Dalib. paris. 274. ^{Or-} ^{Triclat. ad.}

^{floris longioris pro 1.}

^{labio infero. labiis. hiante modo via longiori}

^{caule variis fore 1. budis. 2 ad 3 longioris quora lateribus}