

Q. D. B. V.

114.

NOVA PLANTARUM GENERA,

QUÆ,

CUM CONSENSU AMPL. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. UPSALIENSI.

PRÆSIDE,

VIRO CELEBERRIMO ET EXPERIMENTISSIMO,

D. D. CAROLO LINNÆO,

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,

MEDIC. ATQUE BOTAN. PROFESS. REG. ET ORDIN. ACAD.

IMPER. N. C. MONSP. BEROLIN. STOCKH. ET UPSAL.

SOCII, HUJUSQUE SECRETARIO,

SPECIMINIS ACADEMICI

Loco,

PUBLICO BONORUM EXAMINI SUBMITTIT.

CAROLUS MAGNUS DASSOW,

STOCKHOLMIENSIS.

IN AUDIT. GUSTAVIANO, DIE 15 JUNII ANNI MDCCCLVII.

HORIS, ANTE MERIDIEM, CONSNETIS.



HOLMIAE.

Typis LAURENTII SALVII.

à
MONSIEUR
CHARLES
d'HORLEMAN,
SUR-INTENDANT DES BATIMENS
DU ROI ET DU ROYAUME
DE SUEDE.

MONSIEUR.

ON a coutume de dedier ses ouvrages, à ses protecteurs, pour leur donner par là une marque de reconnaissance aux bienfaits qu'on en a reçu, ou pour s'attirer leur recommandation dans le besoin, qu'on peut en avoir. Pour moi, Monsieur, je ne m'adresse à vous par aucun de ses motifs, mais seulement par ce que je fais, combien vous vous interessez à l'avancement des sciences. Vous avez surpassé dans votre art les plus grands hommes, & faites aujourd'hui leur admiration.

Dai-

Daignez, Monsieur, recevoir avec un oeil favorable le petit essai de mes travaux academiques, que j'ai l'honneur de vous presenter. Il contient des nouvelles decouvertes dans la Botanique, & tache en même tems à porter plus loin cette science. S'il vous etoit agreable, tous mes desirs seroient satisfaits, & les yeux de l'envie ne sauroient jamais troubler mon repos. Je souhaite, Monsieur, que vous jouissiez des jours remplis de felicité, & que vous puissiez vivre longues années, pour le bien du public, & pour la gloire de la Suede; peutétre aussi que j'y trouverai mon avantage. J'ai l'honneur d'etre avec respect,

MONSIEUR,

Votre très-humble & très
obeissant Serviteur.

CHARLES MAGNE DASSOW.



Vastissima Regni vegetabilis sylva tam late patet, tantaque florum varietate & multitudine intuentium oculos animosque distrahit, ut mirandum non sit, primos eam ingressos veteres a recta statim aberrasse via, donec SYSTEMATICI, utpote Cæsalpinus, Morisonus, Rajus, Hermannus, illam certis veluti spatiis & regionibus distinguerent. Horum, quamvis egregia, nondum tamen votis sufficerat opera, antequam nova divisione Tournefortius ampliores illos tractus in minores alias quasi areolas distribueret, easque suis, intra quas contineri deberent, limitibus finiret. Nempe ad optatam scientiam satis non erat, Classes plantarum & ordines struxisse, nisi certa & determinata accederent Genera, qua in re primam Tournefortii industriam grata agnoscit posteritas. Bona Tournefortio coepta continua-
runt deinceps optimi quique Botanici, Plumierus, Petitus, Vaillantius, Boerhavius, Ruppius, Dillenius, Michelius, Jussiæns, Gronovius, Royenius, Hallerus, ceteri. Unde in tantum crevit Generum numerus, ut Celeb. Dn: Præses in suis Plantarum generibus 1021. genera, orbi erudito exhibere potuerit.

His addita postmodum fuere 10 nova genera a Celeb. Dno Præside in Act. Upsal. 1741. p. 77. descripta, nempe Proserpinaca, Callicarpa, Polypremum, Ceanothus, Cynometra, Stewertia, Mimulus, Carpesium, præter Mnium & Porellam. Sic cognita genera numerum impleverunt 1031.

Ex quo tempore a peregrinationibus meis literarum causa institutis ad Hallensem in primis & Argentoratensem Academiam redii felicem na-
ctus

et us occasionem ad illustrem hanc Camenarum sedem, cum in ceteris medicinæ partibus, tum præcipue Botanica, operam collocandi, solicite non tantum perlustravi ingentem multitudinem plantarum, tam communium quam rariorum, quæ in Horto Academicó Upsaliensi, optime instructo, florent; sed privatim etiam in eximio rerum naturalium museo, apud Celeb. D:num Præsidem, singulari cum voluptate contemplatus sum, insignem satis numerum novorum plantarum generum, quæ a celebratissimis Europeæ Botanicis, Gronovio, Jussiæ, Hallero, Gmelino, Sauvagesio, ad eum missa fuere: & præterea magnum illud Herbarium Zeylanicum, quod in Zeylandia ipsa collegit b. Hermannus.

Proinde specimen Academicum editurus, nec dignius aliud, nec Botanicis magis gratum futurum duxi laboris mei argumentum, quam si novorum generum numerum aliquem, tanquam insigne Botanicæ scientiæ augmentum publice exhiberem. Huic consilio meo mirifice favit Cel. D:n. Præses, cuius beneficio ad necessaria quævis ac desiderata bujus operæ adminicula facilis mihi patuit aditus.

Nova igitur genera 43 exhibeo, singula distin-
ctissima, licet quorundam pericarpia & semina invenire nondum contigerit. Floris tamen partes indeque desumptæ notæ characteristice ad genera hæcce ab aliis omnibus, antea detectis, distinguenda sufficiunt.

Additæ sunt species, ut percipiant Botanici, ex quibus characteres genericæ desumpti sunt. His speciebus congrua quoque & selecta, ubi inveniri potuerunt, synonyma, simulque majoris lucis gratia, breves adjunxi descriptiones.

Denique genera hæcce sub ordinibus quæque suis distribui, ut statim pateret, quibus locis singula eorum in systemate sexuali collocanda sint.

D IANDRIA.	MONOGYNIA.	Eranthemum.	1032.
	DIGYNIA.	Amethystea.	1033.
T RIANDRIA.	MONOGYNIA.	Bufonia.	1034.
	DIGYNIA.	Olax.	1035.
T ETRANDRIA.	MONOGYNIA.	Bobartia.	1036.
		Pavetta.	1037.
		Tomex.	1038.
		Cissus.	1039.
		Exacum.	1040.
		Hedyotis.	1041.
		Camphorosma.	1042.
		Coldenia.	1043.
P ENTANDRIA.	T ETRAGYNIA.	Mussenda.	1044.
	MONOGYNIA.	Nama.	1045.
	DIGYNIA.	Cressa.	1046.
		Basella.	1047.
H EKANDRIA.	TRIGYNIA.	Flagellaria.	1048.
	MONOGYNIA.	Melanthium.	1049.
	TRIGYNIA.	Mimusops.	1050.
O CΤΑΝΔΡΙΑ.	MONOGYNIA.	Allophylus.	1051.
		Jambolifera.	1052.
D ECAΝDRIA.	MONOGYNIA.	Memecylon.	1053.
		Stellera.	1054.
I COSANDRIA.	MONOGYNIA.	Bartramia.	1055.
P OLYANDRIA.	MONOGYNIA.	Samyda.	1056.
		Cambogia.	1057.
		Elæocarpus.	1058.
		Delima.	1059.
		Microcos.	1060.
		Uvaria.	1061.
		Atragene.	1062.
D IDΥΝΑΜΙΑ.	P OLYGYNIA.	Citharexylon.	1063.
M ONADELPHIA.	ANGIOSPERMIA.	Connarus.	1064.
	DECANDRIA.	Pentapetes.	1065.
D IADELPHIA.	POLYANDRIA.	Indigofera.	
S YNGENESIA.	DECANDRIA.		
	POLYGAMIA.		
	SUPERFLUA.		
G YNANDRIA.	POLYANDRIA.		
		Inula.	1066.
M ONOECIA.	MONANDRIA.	Pothos.	1067.
	POLYANDRIA.	Zostera.	1068.
D IOECIA.	PENTANDRIA.	Ceratocarpus.	1069.
	DECANDRIA.	Sterculia.	1070.
I MPERFECTE DESCRIPTA.		Antidesma.	1071.
		Datisca.	1072.
		Cervaria.	1073.

* * *

1032. ERANTHEMUM.

CAL. *Perianthium* quinquefidum, tubulosum,
angustissimum, erectum, breve, acuminatum, per-
sistens.

COR. Infundibulifomis: *Tubo* filiformi, longissimo.
Limbo quinquepartito, (quadri - partito in-
terdum) piano: *Laciniis* obverse ovatis.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, in fauce co-
rollæ. *Antheræ* subovatae, compressæ, extra
tubum.

PIST. *Germen* ovatum, minimum. *Styles* filiformis,
longitudine. staminum. *Stigma* simplex.

PER.

SEM.

1. *Eranthemum*

Herba *Epilobii* facie, foliis oppositis, lan-
ceolato ovatis, petiolatis, nervosis, glabris,
Spicis terminatricibus ex bracteis oppositis.
lanceolatis.

1033. AMETYSTEA. (*) Amethystina. Hall. Act. Svec. Ined.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulofo-cam-
panulatum, angulatum, semi - quinque - fidum.
patens, subæquale, acuminatum, persistens.

COR. monopetala, ringens, calyce paulo longior: *Lim-
bus* quinquepartitus fere æqualis: *Labium supe-
rius* erectum, rotundatum, concavum, bipartitum,
dehiscens. *Lab. inferius* tripartitum: Lateralibus
rotundatis, erectis, brevioribus: Intermedio
integerrimo, concavo, longitudine labii su-
perioris.

A

STAM.

(*) Characterem & descriptionem ampliorem videre est in Act. Svec.
R. Ups. propediem edendis ex observationibus consummatissimi Bo-
tanici D. D. Alb. Halleri, Profess. Goettingensis.



STAM. *Filamenta* duo, filiformia, approximata, sub labio superiore, coque longiora. *Antheræ* simplices, subrotundæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* magnitudine staminum. *Stigmata* duo, acuta.

PER. nullum. *Calyx* magis campanulatus, patens.

SEM. quatuor, calyce breviora, obtusa, introrsum angulata.

OBS. *Lycopus* itaque distinguitur corollæ Labio superiore indiviso, Labio inferiore non concavo; staminibus distantibus.

I. *Amethystea*

Amethystina montana erecta, foliis exiguis digitatis trifidis ferratis, flosculis cum coma in cæruleo janthinis. *Amman. ruth. 54.*

Radix fibrosa, annua. *Caulis tetragonus*, eretus, pedalis, obtusus, glaber. *Folia opposita* (decem circiter oppositionibus) ovata, glabra, patentia, profunde serrata, tripartita: *Lobis lanceolatis*, obtusiusculis, basi in petiolos decurrentia. *Rami ex aliis inferioribus oppositi*; *Pedunculi ex superioribus dichotomi*, erecti, septemflori, involucris setaceis, diphyllis, minimis. *Corolla cæruleæ*, *calyces cærulecentes*.

1034. **BUFONIA.** *Autore Fr. de Sauvages.*
Alsinoides. Raj. Syn. 346.

CAL. *Perianthium tetraphyllum*, erectum, persistens; foliolis subulatis, carinatis: alternis brevioribus.

COR. *Petala* quatuor, æqualia, ovato-linearia, erecta, integerrima, calyce dimidio breviora.

STAM. *Filamenta* duo, æqualia, longitudine corollæ. *Antheræ* didymæ.

PIST. *Germen* ovatum, compressum. *Styli* duo, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER.

PER. *Capsula ovalis, compressa, unilocularis, bivalvis.*

SEM. duo, ovalia, compressa, cum torula.

I. Bufonia.

Polygonum, angustissimo gramineo folio, erectum. *Magn. monsp.* 211. *Raj. Hist.* 1026.

Alsine polygonoides tenuifolia, flosculis ad longitudinem caulis velut in spicam dispositis *Raj. syn.* 3. pag. 346. *Pluk. alm.* 22. t. 75. f. 3. Caules herbacei, tenues, erecti sculi, vix ramosi, polygoni facie.

Folia subulata, opposita, basi coadunata, marcida.

1035. OLAX.

CAL. *Perianthium monophyllum, concavum, brevissimum, integerrimum.*

COR. Infundibuliformis: *Limbo* trifido, obtuso, lacinia *tertia* profundiore. *Nectaria* quatuor, rotunda, petiolata, corolla breviora, erecto-coniventia, in fauce corollæ.

STAM. *Filamenta* tria, subulata, nectariis alterua, iisque breviora. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigma* capitatum.

PER.

SEM.

I. Olax.

Arbor stercoria zeylanica, glandifera. *Burm.* zeyl. 26. *Mela-hola.* *Herm. zeyl.* 13.

Arbor ramis flavescensibus. Folia exalte ovata, glabra, avenia, integerrima, alterna, petiolata: Pedunculi subramosi, ex alis foliorum.

1036. BOBARTIA.

CAL. uniflorus, imbricatus *Glumis* numerosis, cylindricis: quarum *Exteriores* plurimæ, breves, univalves.

Interiores æquales, longiores, bivalves: valvula exteriore maxima; interiore linearis, truncata, ejusdem longitudinis.

COR. *Gluma bivalvis, tenuissima, calyce brevior, germini insidens, marcescens.*

STAM. *Filamenta tria, capillaria, brevissima, Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen breve sub corolla. Stylis duo, filiformes. Stigmata simplicia.*

PER. *Nullum. Calyces immutati.*

SEM. *Unicum, oblongiusculum.*

OBS. *Glumis calyciis numerosis, Floreque unico supra germen diversissima est ab affinibus.*

I. *Bobartia.* spicis capitatis, involucro folioso. *Scirpus maderaspatanus,* capitulo squamoso, subrotundo. *Scheuch. Hist. 369.*

Culmus nudus. Involucrum bi-f. triphyllum, longum.

Spicæ oblongæ, in capitulum digestæ, undique exstantes.

1037. PAVETTA.

CAL. *Perianthium campanulatum, minimum, obsolete quatuordendatum, germen cingens.*

COR. *Infundibuliformis: Tubo longo, tenui, cylindrico. Limbo quadripartito, patente, tubo dimidio breviore; laciniis lanceolatis.*

STAM. *Filamenta quatuor, brevissima, ex ore Tubi. Antheræ lineares, patentes, longitudine limbi.*

PIST. *Germen sub receptaculo floris, turbinatum. Stylus filiformis, corolla duplo longior. Stigma crassiusculum, oblongum, obliquum.*

PER. *Bacca subrotunda, unilocularis.*

SEM. *Unicum, subrotundum, cartilagineum.*

Obs.

Obs. Dissert. ab Ixora stigmate simplici, & germinne sub receptaculo.

i. Pavetta.

Sambucus humilis zeylanica. Pawatha zeylonensisibus. *Herm. prodr.* 373. *Burm. zeyl.* 209. Pavate *Acost. Arom.* 256. *Dalech. hist.* 1862. *Raj. Hist.* 1581.

Pavate. Arbor foliis mali aureæ. *Baub. hist.* 2. p. 102.

Pavetta. s. Malleomothe. *Rheed. mal.* 5. p. 19. t. 10.

Arbor malabariensium, fructu lentisci. *Baub. pin.* 399.

Pawatha. *Herm. zeyl.* 3.

Folia obverse ovata, subacuta, petiolata, opposita (ergo non Plukenetii). Corymbi compositi.

1038. TOMEX.

CAL. *Perianthium monophyllum, tubulosum, integerrimum, sub quadridentatum.*

COR. *Petala quatuor, oblonga, obtusa, calyce longiora.*

STAM. *Filamenta quatuor, capillaria, corolla duplo longiora. Antheræ ovales.*

PISR. *Germen subrotundum, hirsutum. Stylus filiformis, superne crassior, longitudine staminum. Stigma emarginatum.*

PER.

SEM.

i. Tomex tomentosa.

Arbor malabarica Illa dicta; cuius cortice vescuntur indi defectu foliorum Beteles. *Burm. zeyl.* 26.

Illa. *Herm. Zeyl.* 11.

Arbor inter omnes ramis, petiolis, pedunculis

*lis & foliis maxime tomentosa & crasso panno
quasi obvoluta. Folia ovata, magna, acumina-
ta, integerrima, opposita, petiolata, supranuda.
Callicarpæ affinis, sed distincta petalis quatuor,
& staminibus receptaculo insertis.*

1039. CISSUS.

CAL. *Perianthium monophyllum*, planum, bre-
ve, integerrimum.

COR. monopetala, semiquadrifida, obtusiuscula.

STAM. *Filamenta* quatuor, capillaria, longitudine
corollæ, receptaculo inserta. *Antheræ* subro-
tundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, obtuso tetragonum,
retusum. *Stylus* filiformis, longitudine stami-
num. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* rotunda, nitens.

SEM. *Ossiculum* subrotundum.

1. Cissus.

Vitis maderaspatana, fructu azureo, folio sub-
rotundo & anguloso. Pet. mus. 696.

Galberya Herm. zeyl. 22. *Burm.* zeyl. 105.

Schupam-buu Valli. *Rheed.* mal. 7. p.. t. II.

Hedera indica, folio simplici integro, clavicu-
lata, racemosa, racemis laxis, uvis rotundis
nigris. *Raj. dendr.* 37.

Facies vitis. Caulis tomentosus. Folia corda-
ta, obsolete pentagona, crenata, tomentosa
(malvæ), petiolis longitudine foliorum, e quo-
rum alis, regione pedunculi umbella compo-
sta, irregularis.

*Differt a Vite calyce, corolla monopetala, sta-
minibus quatuor, stylo præsente.*

1040. EXACUM.

CAL. *Perianthium tetraphyllum*: foliolis ovatis,
obtusis, erecto-patulis, persistentibus.

COR.

COR. monopetala, persistens: *Tubo* subgloboſo, longitudine calycis, *Limbo* quadripartito: *Laciniis* subrotundis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, tubo insidentia, longitudine limbi *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, tubum implens. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine limbi. *Stigma* capitatum.

PER. *Capsula* subrotunda, compresa, utrinque sulcata, bilocularis, longitudine calycis.

SEM. numerosa, receptaculo capsulam replente.

I. Exacum.

Centaurium zeylanicum minus, flore luteo;
Herm. zeyl. 36. *Burm. zeyl.* 57.

Facies centauri Aethiopici. Pluk. Phyt. 275.
f. 3. sed flores diversissimi. *Planta annua.*
Caulis tetragonus, *levis*, *simplex*, *superne dichotomus*. *Folia ovata*, *sessilia*, *integerrima*, Flores in divaricationibus solitarii, *sessiles*, *foliis maiores*.

1041. HEDYOTIS.

CAL. *Perianthium monophyllum*, quadripartitum, germini insidens, persistens: *laciniis linearibus*, acutis.

COR. monopetala, infundibuliformis, calyce paucilo longior, semi-quadrifida: *laciniis patulis*, subæqualibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, ad sinus corollæ inserta. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, sub receptaculo. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, crassiuscula.

PER. *Capsula* globoſo-didyma, bilocularis, dehiscens juxta calycem coronatricem rima transversali.

SEM.

SEM. pauca, angulata.

1. *Hedyotis* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. (*).

Valerianella palustris, foliis nervosis oblongis, flosculis ad caulum nodos inter foliorum sinus collectis. *Burm. zeyl.* 227. t. 108. f. 1.

Mentha zeyl. aquatica inodora latifolia. *Herm. zeyl.* 35. *Burm. zeyl.* 158.

Planta zeylanica menthae aquaticæ in insula zeylana nācentis species. *Raj. dendr.* 134.

Planta glabra. Rami longi, articulati: Folia lanceolato-ovata, sessilia, glabra, nervosa, integerrima (*Phyllidis*), opposita, pendula. Flores verticillati, multi, pedunculis propriis brevissimis ex singula ala. Rami alterni, ex singula alterna ala, breves, simplices.

2. *Hedyotis* foliis lanceolatis, petiolatis, corymbis terminantibus involucratis.

Valerianella foliis nervosis acutis, flosculis in caulum summo quasi involucratis. *Burm. zeyl.* 227. t. 107.

Arbor zeylanica, folio caryophylli barbati. *Herm. zeyl.* 35. *Burm. zeyl.* 129.

Wæranya. *Herm. zeyl.* 4.

1042. CAMPHOROSMA. Camphorata. Tournefort. 1705. Auth. Cl. de Sauvages.

CAL. Perianthium monophyllum, urceolatum, semiquadrifidum, compressum, perfistens; segmentis acutis: lateralibus oppositis majusculis, reflexis.

COR.

(*) Hęc planta est *Auricularia* Dal. pharm. 160 decantatum illud specificum in Cophosi. s. surditate, quam perperam Menthae speciem fuisse Medici plurimi statuerunt; nec *Mentha* hujus succedaneum esse potest, cum *Hedyotis* bellata sit planta, Galio affinis, nec ullo modo verticillatis associanda.



COR. Nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, æqualia,
calyce longiora. *Antheræ* ovales.

PIST. *Germen* ovatum, compressum. *Stylus* fili-
formis, semibifidus, calyce longior. *Stigmata*
acuta.

PER. *Capsula* unilocularis, superne dehiscens, ca-
lyce tecta.

SEM. Unicum, ovale, compressum, nitidum.

OBS. ergo diversi generis a *Polycnemo*.

1. *Camphorosma* foliis hirsutis linearibus.

Camphorata hirsuta. *Bauh. pin.* 486. (*)

Camphorata cespitosa tartarica, floribus in glo-
merulis ad caules cespitosis, foliis ericæ bre-
vissimis *Gerb. wolg.* 49.

2. *Camphorosma* foliis subulatis rigidis glabris.

Camphorata altera. *Tabern. hist.* 57.

Anthyllis altera italorum. *Lob. ic.* 407.

3. *Camphorosma* foliis semitriquetris glabris
inermibus.

Camphorata glabra. *Bauh. pin.* 286.

1043. COLDENIA.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis lanceo-
latis, erectis, longitudine corollæ.

COR. monopetala, infundibuliformis: *Limbo* pa-
tulo, obtuso.

STAM. *Filamenta* quatuor, tubo inferta. *Antheræ*
subrotundæ.

PIST. *Germina* quatuor, ovata. *Styli* totidem, ca-
pillares, longitudine staminum. *Stigmata* sim-
plicia, persistentia.

PER. nullum. *Fructus* ovatus, compressus, sca-
ber, auminatus, terminatus, restris quatuor.

B

SEM.

SEM. quatuor, hinc convexa scabra; inde angula-
ta, acuminata.

I. *Coldenia*. (*)

Tuecrii facie bisnagarica tetracoccus rostrata.

Pluk. alm. 363. t. 64. f. 6.

Hansape. *Herm. zeyl.* 13. *Burm. zeyl.* 113.

Herba facie *Neuradæ*, procumbens, diffusa.

Rami alterni, villosi. Folia alterna, petiolata,

lunata, s. ovalia: latere interiore versus

basin deliquescente. s. attenuato, margine cre-

nato - lobata lobis XI, plicata, villosa.

Fructus axillares, sessiles.

1044. MUSSÆND A. *Burm.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum*, æquale: folio-
lis linearí-acuminatis, persistentibus.

COR. Infundibuliformis; *Tubo* longo, filiformi,
hirsuto: *Limbo* quinquefido, æquali: laciniis
ovatis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, tubo in-
terne adnata. *Antheræ* linearí-setaceæ, lon-
gæ, intra tubum.

PIST. *Germen* ovatum, sub receptaculo. *Stylus*
filiformis, tubo longe brevior. *Stigmata* duo,
simplicia.

PER. Ovato-oblongum (H. M.), succulentum, co-
ronatum.

SEM. numerosa, in quatuor phalanges digesta.

I. *Mussænda*. *Herm. mus.* 36.

Mussænda zeylanica, flore rubro, fructu o-
blon-

(*) Dicta a D. *Codwalladero Colden* Coldenghamiæ, in provincia No-
boracensi Americes, summo Praefecto, qui plantas Noveboracenses
plus quam 300 secundum earum characteres fructificationis & totius
plantæ ad methodum sexualem accuratissime & acutissime descripsit;
quæ manuscripta in Bibliotheca Celeb. Dom. Praesidis non sine vo-
luptate multoties vidimus.

blongo polyspermo, folio ex florum thyrsi
prodeunte albo. *Burm. zeyl.* 165. t. 76.

Mussenda arbor indica, floribus in summis
ramulis velut in fasciculos dispositis, e quo-
rum medio folium latum singulare flavicans. *Raj.*
dendr. 126.

Frutex indicus baccifer, fructu oblongo poly-
spermo. *Raj. hist.* 1422. *Comm. mal.* 31.

Folium principissæ. *Rumpf. amb.* I. l. 6. c. 57.
Arbor foliis oppositis, ovatis, integerrimis,
petiolatis, nervosis. Corymbis dichotomis,
terminatricibus, hirsutis.

1045. N A M A.

CAL. *Perianthium pentaphyllum*: foliolis lanceo-
latis, rectis, patulis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, ovata, calyce breviora, pa-
tentia.

STAM, *Filamenta* quinque, capillaria, longitudi-
ne corollæ. *Antheræ oblongiusculæ*.

PIST. *Germen* ovatum. *Styli* duo, capillares; e-
recti, longitudine staminum. *Stigmata* obtu-
sa, patentia.

PER. *Capsula* ovalis, bivalvis, unilocularis, lon-
gitudine calycis.

SEM. numerosa, minima; *Receptaculo* ovali, basi
affixo.

I. *Nama*.

Anagallis zeylanica, aquatica, foliis longis al-
ternis. *Herm. zeyl.* 36. *Burm. zeyl.* 19.

Caulis herbaceus, laevis, erectus, ramosus.

Folia lanceolata, glabra, integerrima, pa-
tentia, petiolata, alterna. Racemi erecti, ex
alis singulis foliorum singuli, simplices, lon-
gitudine foliorum.

Flores alterni, pedicellis longitudine florum
insidentes.



1046. CRESSA. Anthyllis. *Magn.*, *Char.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum*: foliolis ovatis, obtusis, incumbentibus, persistentibus.

COR. monopetala, hypocrateriformis: *Tubo* longitudine calycis, inferne ventricoso.

Limbo quinque-partito: laciniis ovatis, acutis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, longa, tubo corollæ insidentia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* ovatum: *Styli* duo, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* ovata, unilocularis, bivalvis, calyxce paulo longior.

SEM. Unicum, ovato-oblongum.

1. Cressa.

Anthyllis. Alp. exot. 157. t. 156.

Quamoclit minima humifusa palustris, herniariae folio. *Tournef. cor. 4.*

Lysimachiae spicatae purpureæ affinis, flosculis in cacumine plurimis quasi in nodos junctis.

Pluk. alm. 236. t. 43. f. 6.

1047. BASELLA.

CAL. nullus.

COR. sexfida, urceolata: laminis duabus exterioribus latioribus, superne connivens, basi carnosa.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, æqualia, corollæ adiata, eaque paulo breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subglobosum. *Styli* tres, filiformes, longitudine staminum. *Stigmata* oblonga, a latere altero apicum stylorum.

PER. *Corolla* persistens, clausa, carnosa, baccam mentiens.

SEM. unicum, subrotundum.

1. *Basella*. *Rheed. mal.* 7. *p. 45. t. 24. Raj. app. 358.*
Cuscuta foliis subcordatis. *Hort. Cliff.* 39.

1048. FLAGELLARIA.

CAL. *Perianthium hexaphyllum*, æquale: foliolis ovatis, persistentibus: exterioribus acutioribus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta sex*, filiformia, longitudine ferre calycis. *Antheræ oblongæ.*

PIST. *Germen ovatum*, minimum. *Stylus* longitudine staminum, trifidus. *Stigmata simplicia*, planiuscula, persistentia.

PER. *Drupa* subrotunda, unilocularis, coronata flore.

SEM. *Nucleus* subrotundus.

1. *Flagellaria*.

Lacryma jobi, gramineis foliis in capreolos definentibus. *Burm. zeyl.* 138.

Panambu-valli. *Rheed. mal.* 7. *t. 53.*

1015. MELANTHIUM. Clayt.

CAL. nullus, nisi corollam dicas.

COR. *Petala sex*, ovato-oblonga, patentia, unguibus linearibus longioribus insidentia, persistentia.

STAM. *Filamenta sex*, filiformia, erecta, longitudine corollæ, cui inserta supra ungues. *Antheræ globosæ.*

PIST. *Germen conicum*, striatum. *Stylæ tres*, distincti, curvi. *Stigmata obtusa.*

PER. *Capsula* ovata, trigona, trifulca, trilocularis, ex capsulis tribus introrsum unitis.

SEM. plurima, compressa, semiovata.

1. *Melanthium* Gron. *virg.* (*)

(*) Melanthii character habetur in generibus plantarum N:o 1015 sed imperfectus ob staminum defectum; nuper autem D. Claytonus

1049. MIMUSOPS.

CAL. *Perianthium octophyllum*, coriaceum: foliolis dupli serie, ovatis, acutis, persistentibus.

COR. *Petala octo*, lanceolata, patentia, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta octo*, pilosa, brevissima. *Antheræ oblongæ*, erectæ, longitudine calycis.

PIST. *Germen subulatum*, hispidum. *Stylus cylindraceus*, longitudine corollæ. *Stigma simplex*.

PER. *Drupa ovalis*, acuminata.

SEM. unum s. duo, ovalia.

1. *Mimusops* foliis alternis (*).

Arbor zeylanica, floribus odoratis faciem humanam quodammodo referentibus. *Burm. zeyl.* 27.

Arbor pallidioribus foliis, fructu conoide ex magno calyce emergente. *Pluk. mant.* 21.

Arbor Kauki indorum, floribus odoratis. *Breyn. cent.* 20. *t. 8. Raj. app.* 665.

Kauki indorum. *Pluk. alm.* 203.

Kauken indorum. *Herm. zeyl.* 23. *Burm. zeyl.* 133.

Elengi. *Rheed. mal.* 1. *p. 34. t. 20.*

Folia alterna, petiolata, Flores laterales, pendulis plurimis simplicibus.

2. *Mimusops*, foliis confertis.

Manumal. *Herm. zeyl.* 23.

Folia conferta, ad fines ramorum. Rami crassiores, cicatricibus parvis undique adspersi.

1050. ALLOPHYLUS.

CAL. *Perianthium tetraphyllum*: foliolis orbiculatis: exterioribus duobus oppositis, duplo minoribus.

COR. *Petala quatuor*, orbiculata, æqualia, caly-

ce
ipse characterem complevit, & Clar. D. Gronovius perfectum misit,
quem heic loco allegati substituimus.

(*) Affinis Rhizophoræ.

ce minora: unguibus latis, longitudine foliorum minorum calycis.

STAM. *Filamenta octo, filiformia, longitudine corollæ. Antheræ subrotundæ.*

PIST. *Germen subrotundum, didymum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma bifidum: laciniis revolutis.*

PER.

SEM.

1. *Allophylus. Fl. zeyl. miss. 140.*

Arbor zeylanica, facie Perseæ Plumieri. Rami teretes. Folia ovalia, acuminata, spithamæa, integerrima, glabra, venosa, petiolata, alterna. Racemi parvi, brevissimi, erecti, in alis.

1051. JAMBOLIFERA.

CAL. *Perianthium quadridentatum, brevissimum, persistens.*

COR. *Petala quatuor, linear-lanceolata, medietate superiore extrorsum flexa.*

STAM. *Filamenta octo, planiuscula, subulata, a medio extrorsum flexa, longitudine corollæ. Antheræ ovales, incumbentes.*

PIST. *Germen ovale, superne hisutum. Stylus filiformis, staminibus brevior, Stigma simplex.*

PER.

SEM.

1. *Jambolifera.*

Prunus indica fructu nigro. Burm. zeyl. 197.

Jambolines. Baub. pin. 466 an?

Arbor ramis rectis, obtusis, teretibus. Folia ovata, glabra, integerrima, petiolata, opposita. Pedunculi axillares, oppositi, trichotomi, pedunculis partialibus trifloris.

1052. MEMECYLON.

CAL. *Perianthium* indivisum, campanulatum, turbinatum, integerrimum, supra germen, persistens.

COR. *Petala* quatuor, ovata, acuta, patentia.

STAM. *Filamenta* octo, subulata, erecta. *Antheræ* simplices.

PIST. *Germen* turbinatum, sub receptaculo. *Stylus* subulatus. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* coronata, calyce cylindrico.

SEM.

1. *Memecylon* foliis ovatis.

Cornus sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus. *Burm. zeyl.* 76. t. 30.

Walikaha f. Wælikaha. *Herm. zeyl.* 47.

1053. STELLERA. *Auctore Cl. Gmelino.*

Chamæjasme. *Amm.*

CAL. nullus.

COR. monopetala, infundibuliformis, persistens.

Tubo filiformi, longo; *Limbo* quadri-(quinque)-partito: lobis ovatis.

STAM. *Filamenta* octo (decem), brevissima. *Antheræ* oblongæ: alternæ in tubi medio, alternæ intra faucem.

PIST. *Germen* subovatum. *Stylus* brevissimus, persistens. *Stigma* capitatum.

PER. nullum.

SEM. unicum, nitidum, rostratum.

1. *Stellera* foliis lanceolatis, corollis quinquefidis. (*)

Chamæjasme radice mandragoræ *Amm. rhut.* 16. t. 2.

2. Stel-

(*) Dicitur fuit a Clarissimo Botanico STELLERO, qui jussu Imperatricis Russie exteras Boree adiit plagas, ubi plantas nullo ante tempore lectas laboriosissime detexit, proinde redditum laboriosissimi viri serio exceptavimus sed prepropera fata d. 12. Novembr. 1736, in urbe Sibirie, Tiumeni, abfutere virum longiori vita dignissimum.

2. *Stellera* foliis linearibus, corollis quadrifidis.
Passerina Fragi. *Bauh. hist.* 3. p. 456.
Thymelæa linariæ folio, germanica. *Bauh. pin.*
 259.
Linaria altera botryoides montana. *Coleophr.*
 1. p. 80.

1054. BARTRAMIA.

CAL. *Perianthium* quinque-partitum: laciniis linearibus, infra apicem aristatis, deciduis.

COR. *Petala* quinque, cuneiformia: unguibus erectis, longitudine calycis. *Limbo* patente, obtuso.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria, longitudine tubi corollæ. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* capillaris, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. Globosum, undique echinatum spinis hamosis, desiliens in

SEM. quatuor s. quinque, hinc convexa echinata, inde angulata.

1. *Bartramia*. (*)

Triumfetta decima tertia. *Amm. herb.* 370.

Lappula benghalensis tetraspermous, *ribesii* folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortum plurimis simul sessilibus. *Pluk. alm.* 206. t. 41. f. 5.

Alcea indica floribus rosaceis parvis, fructibus parvis quinquepartitis hispidis lappaceis.

Burm. zeyl. 9.

Æpala. *Herm. zeyl.* 9.

1055. SAMYDA. comm. D. Math. Benzolio. Guidonia. *Plum.* 24.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum,

C

ru-

(*) Est media inter *Urenam* & *Triumfettam*. A *Triumfetta* differt paucioribus staminibus, cum in *Triumfetta XVI*, adjunt; praeterea calyx, quo defititur *Triumfetta*.

rugosum, semi quinque-fidum, interne coloratum: laciniis ovatis, patentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quindecim, subulata, brevissima, calycis medio interne inserta in orbem.

Antheræ ovatæ.

PIST. *Germen* globosum, villosum. *Stylus* cylindricus, altitudine staminum. *Stigma* capitatum.

PER. *Bacca* ovata, quadrifulca, quadrilocularis, quadrivalvis.

SEM. numerosa, reniformia, receptaculo ovato immersa.

OBS. sœpe una pars numeri in flore eximitur, tum calyx quadrifidus, stamina duodecim.

I. *Samyda*.

Guidonia, nucis juglandis folio, major. *Plum.* gen. 24.

Guidonia, nucis juglandis folio, minor. *Plum.* gen. 24.

Arbor foliis pinnatis cum impari; Foliolis ovato-acuminatis; Racemis lateralibus..

1056. CAMBOGIA. *diff. de Anandria.*

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis subrotundis, concavis, deciduis.

COR. *Petala* quatuor, subrotundo-oblonga: petiolis concavis.

STAM. *Filamenta* plurima, brevia. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* subrotundum, striatum. *Stylus* nullus. *Stigma* quadrifidum, persistens.

PER. *Pomum* subrotundum, octies sulcatum, octoloculare.

SEM. solitaria, reniformi-oblonga, compressiuscula.

I. *Cambogia* (*).

Car.

(*) E Cambogia haec *Gumi gutta officinarum* colligitur.

Carcapuli. *Baub.* pin. 437.

Coddam-pulli. *Rheed. mal.* 1. p. 41. t. 24.

Rami oppositi. Folia lanceolato-ovata, integrifolia, petiolata. Flores verticillati, sessiles.

1057. ELÆOCARPUS. *Burm.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum: foliolis lanceolatis, acutis, æqualibus.*

COR. *Petala quinque, laciniato-lacera, æqualia, longitudine calycis.*

STAM. *Filamenta viginti, brevissima, receptaculo affixa, Antheræ lineares, corolla breviores.*

PIST. *Germen acuminatum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma acutum.*

PEK. *Drupa ovalis.*

SEM. *Nucleus crispus.*

OBS. numerus sœpe excludit quintam partem numeri in floris partibus.

I. *Elæocarpus.*

Elajocarpos folio lauri serrato, floribus spicatis.

Burm. zeyl. 93. t. 40.

Olea sylvestris malabarica, fructu dulci. Raj. hist. 1546. Comm. mal. 48.

Laurus indica serratifolia inodora, fructu olivæ magnitudine & forma, nucleis crispis lapi-deis. Herm. zeyl. 9. 22.

Prunus zeylanica, laurifolio, Veralu zeylanensisibus. Raj. dendr. 42.

Prunus racemosa, celastrifolio. Pet. mus. 672.

Perin-kara. Rheed. mal. 4. p. 51. t. 24.

1058. DELIMA.

CAL. *Perianthium pentaphyllum: foliolis ovatis, obtusis, æqualibus, persistentibus.*

COR. nulla.

STAM. *Filamenta numerosa, capillaria, calyce subæqualia. Antheræ subrotundæ.*

PIST. *Germen ovatum. Stylus cylindricus, longitudine floris. Stigma simplex, persistens.*

PER. (*Drupa?*) *calyce longe major, ovata, acuminate, bivalvis.*

SEM. duo.

I. *Delima.*

Frutex indicus farmentosus, foliis hispidis rigidis.
Burm. zeyl. 101.

Koroswæl. Herm. zeyl. 19.

Arbor foliis Fagi, ovatis, scabris, ferratis, pliatis, nervosis, petiolatis, alternis. Flores paniculati.

1059. MICROCOOS. *Burm.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum; foliolis oblongis, obtusiusculis, patulis, deciduis.*

COR. *Petala quinque, omnium minima, linearia, æqualia, emarginata, superna medietate patula.*

STAM. *Filamenta numerosa, capillaria, longitudine calycis. Antheræ subrotundæ.*

PIST. *Germen tubrotundum. Stylus subulatus, longitudine staminum. Stigma acutum.*

PER. *Drupa subrotunda, unilocularis.*

SEM. *Ossiculum turbinatum, fibrosum.*

OBS. *Affinis Greviæ, licet nec proxima.*

I. *Microcos paniculis terminatricibus.*

Microcos foliis alternis oblongis acuminatis.

Burm. zeyl. 159. t. 74.

Kokukirilla. Herm. zeyl. 10.

Corus malabarica, folio cuspidato ossiculo tomento obsito. Comm. mat. 89.

Schageri cottam. Rheed. mat. I. p. 105. t. 56.

2. *Microcos. pedunculis axillaribus confertis dichotomis.*

Hamdamanias. Herm. zeyl. 3.

Ar-

*Arbor foliis alternis, petiolatis, cordatis,
obtusiusculis, obtuse serratis, glabris, venosis.
Stipulae dimidiatae (longitudinaliter), ovatae,
utrimque acutae, latere affixa, Pedunculi ex
alis, plurimi, longitudine petiolorum, ali-
quoties dichotomi, apicibus fructificantibus.
Calyx pentaphyllus, raro dehiscens, deciduus.
Petala quinque, minima. Stamina numerosa,
capillaria, longa. Pistilli stigma trifidum s.
quadrifidum. Fructus ignotus. Ex facie &
flore ad hoc genus retuli.*

1060. UVARIA.

CAL. *Perianthium tripartitum, planum: foliolis
ovatis, acutis, persistentibus.*

COR. *Petala sex, lanceolata, sessilia, patentia,
calyce longiora.*

STAM. *Filamenta nulla. Antherae numerosae, trun-
catae, oblongae, tegentes germen cui insident.*

PIST. *Germen ovatum, tectum antheris. Styli nu-
merosi, longitudine antherarum, capitulum
terminantes. Stigmata obtusa.*

PER. *Baccæ numerosae, distinctæ, globosæ, pe-
dunculatae, Receptaculo oblongo affixaæ.*

SEM. *plurima.*

I. Uvaria.

*Uva zeylanica sylvestris, mali aurantiæ sapore.
Burm. zeyl. 231.*

*Frutex baccifer, fructu ad singulos flores mul-
tiplici. Raj. hist. 1636.*

Palukena. Herm. zeyl. 8.

Narum panai. Rheed. mat. 2. p. II. t. 9.

Folia alterna. Affinitas Anonæ.

1061. ATRAGENE.

CAL. *Perianthium tetraphyllum: foliolis ovali-
bus, patenribus, obtusis, deciduis.*

COR. Petala duodecim, linearia, basi angustissima, obtusa, patula, calyce longiora.

STAM. Filamenta plurima, brevissima. Antheræ oblongæ, acuminatæ, calyce breviores.

PIST. Germina plurima, oblonga. Styli villosi. Stigma simplicia, longitudine Antherarum.

PER. nullum.

SEM. plurima, desinentia in caudam pilosam, calyce longiore.

I. *Atragene.*

Clematis zeylanica hermanni. Breyen. prod. 2.
p. 46.

Clematis zeylanica, floribus obsoletis parvis.
Burm. zeyl. 66.

Narawæl. Herm. zeyl. 26.

1062. CITHAREXYLON. Auth. Cl. B.
JUSSIÆO. comm. D. D. BÆCK.

CAL. Perianthium monophyllum, campanulatum, quinque-striatum, quinque-dentatum.

COR. monopetala, infundibuliformi-rotata. *Tubus* perianthio duplo longior, superne crassior. *Limbus* quinque-partitus: laciinis æqualibus, patulis, supra villosis.

STAM. Filamenta quatuor, ex tubi medio, filiformia, quorum duo paullo longiora. Antheræ oblongæ, biloculares.

PIST. Germen subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* obtusum, capitato bifidum.

PER. Capsula bilocularis.

SEM. plura, subrotunda.

OBS. Locetur post Bignoniam.

I. *Citharexylon.*

Citharexylon americanum alterum, foliis ad marginem dentatis. Pluk. alm. 108. t. 161. f. 5.
Habitat in insula Barbadensi.

1063. CONNARUS.

CAL. *Perianthium monophyllum*, quinque-partitum, erectum, tomentosum, persistens.

COR. *Petala quinque*, lanceolata, erecta, æqualia.

STAM. *Filamenta decem*, subulata, erecta, connecta basi: alternis longitudine floris, alternis brevissimis. *Antheræ subrotundæ*.

PIST. *Germen subrotundum*. *Stylus cylindraceus*.
Stigma obtusum.

PER. *Capsula oblonga*, gibba, unilocularis, bivalvis.

SEM. *Unicum*, ovatum, magnum.

I. *Connarus*.

Rhus zeylanicus trifoliatus, *phaseoli facie*, *floribus copiosis spicatis*. *Burm. zeyl. 199. t. 89.*

Phaseolus arborescens zeylanicus monocarpos hermanni, *Radelisawæl zeylonensis*. *Raj. app. 438.*

1064. PENTAPETES. *Pterospermaden-dron. Amm.*

CAL. *Perianthium quinque-partitum*: foliolis coriaceis, oblongis, reflexis, interne lanatis.

COR. *Petala quinque*, lanceolata, patentia, longitudine calycis.

STAM. *Filamenta quindecim*, linearia, basi connectata in tubum. *Antheræ subulatae*, *erectæ*.

Filamenta quinque, filiformia, inflexa, eodem tubo innata, sterilia, antheris longiora, inter singula tria stamina singula.

PIST. *Germen subrotundum*. *Stylus cylindraceus*, *longitudine staminum*. *Stigma crassiusculum*.

PER. *Capsula lignosa*, clavato-ovata, *quinquelocularis*, loculamentis bivalvibus.

SEM. plura, oblonga, compressa, ala membranacea.

I. *Pentapetes foliis ovatis repandis*.

Weglaghæ *Herm. zeyl. 3. Burm. zeyl. 33.*

Pte-

*Pterospermadendron suberis folio anguloſo
ſubtus incano, floribus albis.* Amm. Act. petrop. 8. p. 215. t. 12.

*Arbor champaccæ ſuberis folio, fructu ligneo,
ſeminibus alatis referto.* Pet. mus. 349.

2. *Pentapetes foliis cordatis repandis.*

*Pterospermadendron foliis accretis, flore fru-
ctuque majore.* Amm. Act. 8. p. 216. t. 16. 17.

OBS. *Alcea floridana quinquecapsularis, lau-
rinis, foliis leviter crenatis, ſeminibus coni-
ferarum in ſtar alatis.* Pluk. alm. 7. t. 352. Ca-
tiſb carol. 1. p. 44. t. 44. pro bujus ſpecie
habetur in act. petrop. ſed eſt *Hypericum flo-
ribus pentagynis, foliis lanceolatis ferratis.*
Hort. cliff. 380,

1065. INDIGOFERA.

CAL. *Perianthium monophyllum, patens, ſub-
planum, quinque-dentatum.*

COR. Papilionacea. *Vexillum rotundatum, reſle-
xum, emarginatum, patens.*

*Alæ oblongæ, obtufæ, deorsum gibbæ, deſle-
xæ, longitudine vexilli.*

*Carina obtusa, patens, deſlexa, utrinque mu-
crone acuto cavo notata.*

STAM. *Filamenta diadelpha, in cylindrum digeſta,
apicibus adſcendentia. Antheræ ſubrotundæ.*

PIST. *Germen cylindricum. Stylus brevis, ad-
ſcendens. Stigma obtusum.*

PER. *Legumen teretiusculum, longum.*

SEM. aliquot reniformia.

1. *Indigofera leguminibus arcuatis incanis, ra-
cemis folio brevioribus. Coluteæ affinis fruti-
cosa, floribus spicatis purpurascenibus, ſili-
guis incurvis ex cuius tintura indigo confici-
tur.* Sloan. flor. 141.

Anil.

Anil. s. Nil indorum color. Bauh. hist. 2. p. 945.

Ameri. Rheed. mal. 1. p. 101. t. 54.

2. *Indigofera leguminibus pendulis lanatis tetragonis.*

Astragalus spicatus, siliquis pendulis hirsutis,
foliis sericeis. Burm. zeyl. 37. t. 45.

Kattu tagera. Rheed. mal. 9. p. 55. t. 30.

3. *Indigofera leguminibus horizontalibus ter-*
tibus, foliis pinnatis ternatisque.

Colutea siliquosa glabra, ternis quinisve fo-
liis, maderaspatana, semine rubello. Pluk. alm.
113. t. 166. f. 1.

Nir-pullari. Rheed. mal. 9. t. 67. mala.

1066. INULA. Enula. Cæsalp. Magnol. He-

lenium. Moris. Raj. Herm. Riven. Rupp.

Knaut. Vaill.

CAL. *Perianthium imbricatum: foliolis laxis, pa-*
tulis: exterioribus majoribus, æqualis longitudinis.

COR. Composita, radiata, lata. *Corollulae herma-*
phroditæ, æqualis altitudinis, numerosissimæ
in disco. Femineæ ligulatæ, numerosæ, conser-
tæ, in radio.

Propria Hermaphroditi infundibuliformis: lim-
bo quinquefido, erectiusculo.

Feminea ligulata, linearis, integerrima.

STAM. Hermaphroditis *Filamenta quinque, fili-*
formia, brevia. Anthera cylindrica, compon-
ta ex minoribus quinque, linearibus, coalitis:
singulis pone desinentibus in setas duas, rectas
longitudine filamentorum.

PIST. Hermaphroditis *Germen longum, corona-*
tum. Stylus filiformis, longitudine staminum.

Stigma bifidum, erectiusculum.

Femineis Germen longum, coronatum. Stylus
filiformis, capillaris, semibifidus. Stigmata
erecta.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. *Hermaphraditis* solitaria, linearia, quadrangulara, coronata *pappo* simplici, longitudine seminis.

Femineis similia hermaphroditis.

REC. planum, nudum.

OBS. Ergo antheris pone in setas decem desinentibus non modo ab *Astere*, sed ab omnibus adhuc notis cognitis differt. (*)

1. *Inula foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis.*

*Aster foliis ovatis rugosis subtus tomentosis
amplexicaulibus, calycum squamis ovatis
patulis.* Hort. Clif. 807.

Aster omnium maximus Helenium dictus. Tournef. inst. 482.

Helenium vulgare. Bauh. pin. 276. Vail. aet. 1720. p. 390.

Helenium s. Enula campana. Bauh. hist. 3. p. 10.

1067. POTHOS.

CAL. *Spatha* globosa, monophylla, altero latere hians.

Spadix brevis, simplicissimus, reflexus, globosus, tectus fructificationibus sessilibus.

Perianthium nullum (nisi corollam sumas).

COR. *Petala* quatuor, cuneiformia, oblonga, erecta.

STAM. *Filamenta* quatuor, latiuscula, erecta, petalis angustiora, eiusdenique longitudinis. *Antheræ* minimæ.

PIST.

(*) Systematici *Cesalpinus*, *Morissonus*, *Rajus*, *Hermannus*, *Rivius*, *Krautius*, *Ruppium*, *Magnolius Vaillantius* Enulam ab *Astere* generē distinguere allaborarunt, sed ob defectum notariorū characteristarum conjangere coacti fuere *Tournefortius*, *Boerhaeuius*, alii; hinc *Vaillantius* in compositis colorem floris luteum pro charactere assūmisit, ubi nulla alia nota succurrerat. *ENULA* vulgo dicitur. *INULA* vero Plinio audit.

PIST. *Germen parallelipipedum, truncatum. Stylus nullus. Stigma acuminatum.*

PER. *Baccæ aggregatæ.*

SEM.

I. *Pothos zeylanica.*

Potha. Herm. zeyl. 6. Burm. zeyl. 197.

Frutex scandens, hederæ modo. Rami teretes.

Folia lanceolata, integerrima, alterna, petiolis alatis (aurantii). Fructificatio ex alis reflexa. Affinis Dracontii.

1068. ZOSTERA. Alga vulgo.

CAL. *Folii basis vaginans, longitudinaliter connivens, superne utrinque emarginata, includens spadicem.*

Spadix linearis, planus, altero latere staminibus superne, pistillisque inferne, alternis reflexis, Perianthium nullum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta alterna, plura, brevissima, supra germina spadici inferta. Antheræ ovato-oblongæ, nutantes, obtusæ, pone sursum retro subulatæ, incurvæ.*

PIST. *Germina pauciora, ovata, compressa, ancipitia, subpediculata, apice affixa, nutantia.*

Stigmata capillaria, simplicia.

PER. *Membranaceum, immutatum, angulo laterali longitudinaliter dehiscens.*

SEM. *unicum, ovatum.*

I. *Zostera.*

Fucus s. Alga marina graminea angustifolia seminifera ramosior. Raj. syn. 3. p. 52.

Potamogeton marinum, in utriculis epiphylo spermon, minus. Raj. syn. 3. p. 53.

Alga angustifolia vitriariorm. Raj. syn. 3.

p. 53.

Habitat in mari.

Alga angustifolia vitriariorum. Bauh. pin 364.
Fl. suec. 1137. *Vix ab hac specie diversa videtur, sed potius loco marino profundiore nata.*

1069. CERATOCARPUS. Buxb. *Auctore Cl. Gmelino.*

* *Masculi flores.*

CAL. nullus.

COR. monopetala, tubulosa, $\frac{1}{3}$ parte a latere hians.

STAM. *Filamentum unum*, corolla longius, co-rollæ adnatum. *Anthera ovalis*, incumbens,

* *Feminei flores in eadem planta.*

CAL. *Foliola duo*, germini secundum totam longitudinem adnata.

COR. nulla.

PIST. *Germen ovatum*, compressum. *Styli duo*, capillares. *Stigmata simplicia*: altero recto, altero horizontali.

PER. *Capsula bivalvis*, inferne angustior, compressa, semini adnata, ex calycinis foliolis germini longitudinaliter ac mutuo accretis, bicornis.

SEM. oblongum, compressum, capsula tectum, sutura utrinque longitudinali, bicornis: corniculis rectis, subulatis.

1. Ceratocarpus. Buxb. act. petrop. I. p. 241.

Ceratospermum Gerb. wolg. 55. tanais. 90.

Planta nova incognita ramosa, foliis gramineis angustissimis & acutissimis, floribus staminosis ex alis caulinis & foliorum, semine nuda unico bidentis. Heintz. tart. 299.

Habitat in campis feris & desertis circa Samoram, Czaritzin, Tanain, Stanitza, Melichowa.

1070. STERCULIA.

* *Masculi Flores.*

CAL. *Perianthium quinque-partitum, monophyl-lum, maximum, coriaceum, planum: laciniis lanceolatis.*

COR. nulla.

STAM. *Filamenta quindecim (circiter), brevissima, inferne coalita in columnam, calyce dimidio breviorem. Antheræ ovatæ.*

* *Feminei Flores in eadem planta.*

CAL. ut in masculis.

COR. nulla.

PIST. *Germen globosum, hirsutum, cinctum coro-nula e filamentorum rudimentis, insidens co-lumnæ calyce breviore. Stylus filiformis, lon-gitudine germinis.*

PER. *orbiculatum, depresso, saepius quinquelobu-culare: loculis dissilientibus, cymbiformibus.*

SEM. *Nuclei ovales, plurimi, margini loculorum insidentes.*

1. *Sterculia foliis digitatis.*

Merda papaveris s. lignum stercoris. Grim. zeyl. 98.

Nux zeylanica; folio multifido digitato, flo-re merdam olente. Herm. prodr. 357. zeyl. 61. Burm. zeyl. 169. Pluk. alm. 266. t. 206. f. 3.

Nux juglans zeylanica magna bifida, flore puniceo stercus humanum redolente, nucleis ovalibus triplici cortice vestitis oleosis. Tela-bo. Herm. zeyl. 5.

Prunus pentaphyllos malabarica, fructus ca-lyce insidente. Raj. hist. 1564. Pluk. alm. 306.

Karil. Rheed. mal. 4. p. 75. t. 36.

2. *Sterculia foliis ovalibus integerrimis, alter-nis petiolatis, floribus paniculatis.*

Nux juglans zeylanica minor bifida, flore puniceo. Burm zeyl. 170.

Nux malabarica sulcata mucilaginosa fabacea.

Pluk. alm. 266.

Arbor siliquosa malabarica, pluribus ad singulos flores lobis. Raj. hist. 154. Comm. mal. 8.

Cavalam Rheed. mal. 1. p. 89. t. 49.

Nawaghas. Herm. zeyl. 23.

1071. ANTIDESMA. Burm.

* *MAS.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum: foliolis oblongiusculis, concavis.*

COR. nullā.

STAM. *Filamenta quinque, capillaria, calyce longiora, æqualia. Antheræ subrotundæ, semibifidæ.*

* *FEMINA* in distincto individuo.

CAL. ut in mare, persistens.

COR. nullā.

PIST. *Germen ovatum. Stylus nullus. Stigmata quinque, obtusa.*

PER. *Bacca cylindrica, unilocularis, stigmatibus coronata.*

SEM. unum.

1. *Antidesma mas* (*).

Antidesma spicis geminis. Burm. zeyl. 22. t. 10.

Grossularia zeylanica, baciis minoribus, acidiusculis. Herm. zeyl. 11. Burm. zeyl. 113.

Baccifera maderaspatana, ribis more floribus muscosis Juli instar. Pet. mus. 621. Raj. dendr. 27.

An-

(*) Antidesmæ sola antidotum habentur mortui colubri, Heretimandri malabariensis dicti, cuius mortu homines quidem non statim intereunt, sed interim totius corporis carnes corruptiuntur, computescunt, decidunt, tandemque post rotundat miseras debitum naturæ persolvunt, nisi utantur potu qui ex solis hisce cum salito Mange fructu in aqua coctis conficitur. Raj. hist. 1606. ex hort. mal.

S. Antidesma femina.

Berberis indica, aurantiæ folio Comm. mal.

15. Raj. hist. 1606.

Planta, *folia habens oblongo rotunda*. Herm. zeyl. 19. Burm. zeyl. 194.

Noeli-tali. Rheed. mal. 4. p. 119. t. 56.

Aembilla. Herm. zeyl. 26. 19.

1072. DATISCA. *Cannabina* Tournef
cor. 52.

* *MAS.*

CAL. *Perianthium pentaphyllum*: foliolis linea-
ribus, acutis, æqualibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antheræ* decem, ob-
longæ, calyce multoties longiores, obtusæ.

* *FEMINA.*

CAL. ut in mare.

COR. nulla.

PIST. *Germen oblongum*, *pervium*, *calyce* longius, *Styli* tres, *breves*. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula oblonga*, triangularis, trivalvis, tri-
cornis, ore *pervia*, unilocularis.

SEM. numerosa, parva, trifariam capsulæ longita-
dinaliter adhærentia.

OBS. Ergo *Mas* *cannabis*, *Femina* *Resedæ*, mira
copula.

1. *Datisca.*

Cannabina Cretica florifera & fructifera. *Tour-
nef. Cor. 52.*

Cannabis foliis pinnatis. *Hort. Cliff. 457.*

1073. CERVARIA. *Minuartii.*

CAL. *Perianthium monophyllum*, globosum, quin-
que-partitum.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta quinque* - - *Antheræ*

PIST. *Germen ovatum. Stylus* - *Stigma*

PER. *Capsula rotundo-trigona, calyce tecta.*

SEM. *exigua, cordiformia.*

Cervaria. ()*

Cervaria. Minuart. monogr.

*Rubia linifolia aspera. Bauh. pin. 333. Raj.
hist. 1033.*

*Synanchiæ species. Juncaria salmanticensis.
Dalech. hist. 1185.*

Juncaria salmanticensis. Clus. hist. 2. p. 114.

*Gerh. hist. 1115. Park. theatr. 453. Lob. obs.
462. Moris. hist. 3. p. 601.*

Juncaria. Bauh. hist. p. 723.

(*) Hic character nondum sufficienter datus est, stamina enim & po-
stilla minus perfecte determinata sunt.



COROLLARIUM

Continens nova, in morbis specifica dicta medicamenta,
ex Tr. de Plantis Coldinghamensis in Provin-
cia Noveboracensi Americes conscr. 1742.

a Codwald Colden.

1. *RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis, nudis, fo-*
liis cordato-lanceolatis. Hort. cliff. 138. Fl. succ. 292.
Pharmacopœis. Herba Britannica.

α. Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus aequalibus & similibus, ra-
dice exterius & interius flava. Cold. pl. Coldingb. n. 67.

β. Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus similibus, radice exterius
nigra, interius aurantii vel crocei coloris. Britannica veterum. Cold.
pl. Coldingb. n. 68.

Inspicienti utriusque (*α - β*) plantæ partes, nulla differentia nisi in
sola radice se obtulit.

Prioris (*α*) Radix magis pallide flava, ejusdem coloris & externe &
interne, ramosa, nullis annulis notata & consistentia magis tenacis.

Posterioris (*β*) Radix crescit in luto profundo, aquoso, nigro, hæc
exterius nigra, rimis circularibus notata, interius coloris aurantii vel cro-
cei, fragilis, spongiosa, minime fibrosa, raro ramosa, sed fibris tenuio-
ribus lateralibus instrueta.

Hæc *β*. Planta est secretum magnum nostris indigenis (provinciæ Col-
dinghamensis in Noveboraco Americes) ad *ULCERA PHADAGÆNICA*;
ad quod Christianis revelandum quoconque pretio allici non potue-
runt, sed felici eas detectum. Ego etiam vidi ulcus palati phadagæni-
cum, in quo os palati peræsum erat, cum successu inopinato curatum,
lavando solummodo ulcus decocto radicis & haustulo ejusdem quotidie
exhibito. Hattenus egreg. D. Colden.

Eximia observatio, quæ Practicis ansam præbet experiundi, numne in
hæc radice lateat vis specifica ad ulceræ internæ uti phthiseos &c. vel si
modo ulceræ phadagænica pedum certo tolleret, esset medicamentum
quod in nulla officina pharmaceutica deficeret, & plurium hominum
vitam eriperet a prematuoro fato.

2. *COLLISONIAE radix est specificum in colica puerarum, seu do-*
loribus post partum. Colden.

ACTÆ racemis longissimis Gron. virg. 57. radix est specificum in A-
thenia s. languore virginico (morbo virginicæ endemio), sed moderata
dosi, cum Tinctura radicis copiosius assunta ægritudinem & sudorem
frigidum causet. Colden.

MONSIEUR.

Considerant en Vous, Monsieur, deux belles qualitez, qui ne sont pas communes à tout le monde, savoir la Sincerité d'amour que Vous avez pour des Amis & le mépris de la louange, je me trouve, pour dire la vérité, en suspens, s'il vaut mieux mettre la main à la plume où d'en desister. C'est l'une qui me l'oblige & l'autre qui me le défend. Les pensées ainsi combattans l'une avec l'autre, je me suis enfin résolu à ne point laisser une si favorable occasion de déclarer ma joie, lorsque Vous allez donner au public votre belle & savante Dissertation, le premier fruit de vos travaux & de certaines preuves de votre diligence à étudier. Permettez donc, Monsieur, que je me décharge de cette obligation, non pour en vouloir récompenser l'amitié dont Vous m'avez honoré, mais pour en épargner aux reproches auxquels je m'expose moi-même, si j'en manquerois. Je Vous félicite donc les perfections aux quelles l'art & la nature Vous ont mené, je Vous félicite les récompenses qui en sont ordinairement accompagnées, savoir une place d'honneur dans la République, qui est digne de vos travaux, de votre diligence & de votre vertu. Je suis

MONSIEUR

Votre

Très humble & très obéissant
Serviteur.

NICOLAS ARRELIUS.