



Hunt Institute for Botanical Documentation
5th Floor, Hunt Library
Carnegie Mellon University
4909 Frew Street
Pittsburgh, PA 15213-3890
Telephone: 412-268-2434
Email: huntinst@andrew.cmu.edu
Web site: www.huntbotanical.org

The Hunt Institute is committed to making its collections accessible for research. We are pleased to offer this digitized item.

Usage guidelines

We have provided this low-resolution, digitized version for research purposes. To inquire about publishing any images from this item, please contact the Institute.

About the Institute

The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora.

Hunt Institute was dedicated in 1961 as the Rachel McMasters Miller Hunt Botanical Library, an international center for bibliographical research and service in the interests of botany and horticulture, as well as a center for the study of all aspects of the history of the plant sciences. By 1971 the Library's activities had so diversified that the name was changed to Hunt Institute for Botanical Documentation. Growth in collections and research projects led to the establishment of four programmatic departments: Archives, Art, Bibliography and the Library.

Linum ad. 269

17. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis caule dichotomo, corollis acutis. Hort. cliff. 372. Fl. suec. 255. Mat. med. 157. Roy. lugdb. 434.

Linum pratense, flosculis exiguis. Baub. pin. 214.
Spergula bifolia, lini capitulis. Loes. pruss. 261. t. 86.
Habitat in Europæ septentrionalis pascuis succulentis. ☉

Millegrana Lob

18. LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Hort. cliff. 114. Fl. suec. 256. Roy. lugdb. 434.

Radiola. Roy ad 269

ChamæLinum vulgare. Vaill. paris. 33. t. 4. f. 6.
Linocarpum, serpilli folio, multicaule & multiflorum. Mich. gen. 23. t. 21.

millegrana Lob

Radiola vulgaris serpillifolia. Raj. angl. 3. p. 161. t. 15. f. 3.

Linocarpum. Mich

Polygonum minimum f. Millegrana minima. Baub. pin. 282.

Habitat in Europæ sabulo inundato. ☉

19. LINUM foliis quaternis.

quadrifolium.

Linum africanum, rubiæ foliis quaternis stellatis. Raj. suppl. 525.

Habitat in Æthiopia.

20. LINUM foliis verticillatis.

verticillatum.

Linum sylvestre, flore cæcio, foliis verticillatis. Bocc. mas. 2. p. 49. t. 42. Raj. suppl. 524. Barr. rar. 685. t. 1226.

Habitat in Italia. ☉

Calyces & folia superiora villosa.

ALDROVANDA.

aldrovanda ad 444.

1. ALDROVANDA. Mont. act. bonon. 2. p. 3. p. 404. t. 12. vesiculosa. 1500. fl. juv.

Lenticula palustris indica, foliis subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis. Pluk. alm. 211. t. 41. f. 6.

Habitat in Italiæ & Indiæ paludosis. D. Monti.

DROSERA.

Rosolij ad. 245.

2 Rosolij. Dod.

1. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis. Fl. lapp. 109. Fl. suec. 257. Mat. med. 158. Fl. zeyl. 120. Gran. virg. 35. Roy. lugdb. 120.

rotundifolia.

4 Rosella. Rab.

4 Solania. Camer

3 Rosida. Lob

Ros solis folio rotundo. Baub. pin. 357. Dod.

Salifiora f. Ros solis. Thal. herc. t. 9. f. 1.

Habitat in Europæ, Asiæ, Americæ paludibus.

*6. Solimna } Thal. Ros. solis. cap. Prtavan
Spina (di) } Drosera & Card
Drosera }
Drosera }
Drosera }
Drosera }*

*lingit l'p'ntum v'ni colare co'ad'os qui inde Ros (di) dicitur. DRO-1
4 p'nt. fol. radice' locatum radice' p'nta. orbicul. long. petiol. protuber. p'ntis
in inculhar. inculhar supra p'ntis h'p'nta apud globulo terminat.
Spina flor. centrali 4 ad 5 flor. in sp'ntum brevem subrotundis
p'ntis quavis non stipit.*

*ovari. receptaculo inculhar. Styli 2 singuli bifidi, uno velis. simpliciter ita ut stipitatis tantum
cyb. ob. cap.
v'ni oblonga*

3. CRASSULA foliis subulatis obsolete tetragonis. Hort. tetragona. cliff. 116. * Roy. lugdb. 455. Habitat in Æthiopia. 5

4. CRASSULA foliis oppositis obtuse ovatis integerri-cultrata. 1. Gen mis: hinc angustioribus. Hort. cliff. 496. Roy. lugdb. 455. gomara ad 248
Crassula anacampferotis folio. Dill. elth. 115. t. 97. f. 114. Habitat in Æthiopia. 5

5. CRASSULA foliis oppositis oblongis planiusculis di-ciliata. 2. Gen. finctis ciliatis. Hort. cliff. 496. Roy. lugdb. 455. Stissera adary
Crassula caulescens, foliis sempervivi cruciatis. Dill. gomara ad 248 elth. 116. t. 98. f. 116. Habitat in Æthiopia. 4


6. CRASSULA foliis oppositis patentibus scabris. scabra. 1. Gen. Crassula mesembryanthemi facie, foliis longioribus a- crassula ad 248 speris. Dill. elth. 117. t. 99. f. 117. Cotyledon africana frutescens, foliis asperis angustis a- cuminatis, flore virescente. Mart. cent. 24. t. 24. Habitat in Africa?

7. CRASSULA foliis serrato-dentatis planis alternis, crassula ad 248 caule simplicissimo, floribus pendulis. Hort. cliff. 497. * Roy. lugdb. 455. alternifolia. 1. Gen.
Cotyledon, flore luteo, media. Herm. lugdb. 191. flor. Cotyledoni. S. B. p. 429.
Habitat in Æthiopia. 4

8. CRASSULA foliis subulatis radicatis, caule nudo. nudicaulis. 2. Gen. Hort. cliff. 116. Roy. lugdb. 455. gomara ad 248
Crassula cesposa longifolia. Dill. elth. 116. t. 98. f. 115. Habitat in Æthiopia. 4

9. CRASSULA caule flaccido prolifero determinate-fo- orbicularis. 2. Gen. lioso, foliis patentissimis imbricatis. Hort. cliff. 496. gomara ad 248
Roy. lugdb. 455. Crassula orbicularis repens, foliis sempervivi. Dill. elth. 119. t. 100. f. 118. Habitat in Æthiopia. 4

10. CRASSULA caule flaccido repente, foliis oppositis. pellucida. 2. Gen. Crassula, portulacæ facie, repens. Dill. elth. 119. t. 100. f. 119. gomara ad 248
Habitat in Æthiopia. 4



Suriana ad 249. *Lin. n. 318.* **SURIANA.**

maritima. 1. **SURIANA.** Hort. cliff. 492.

Suriana foliis portulacæ angustis. Plum. gen. 37.
Thymelææ facie frutex maritimus tetraspermos, flore tetrapetalo. Sloan. jam. 138. hist. 2. p. 29. t. 162. f. 4.
Raj. dendr. 96.

Arbor americana, salicis folio, frondosa bermudienfis. Pluk. alm. 44. t. 241. f. 5.

Habitat ad littora maris in Bermudis, Jamaica. b

Sibaldia ad 295 **SIBBALDIA.**

procumbens. 1. **SIBBALDIA** foliolis tridentatis. Fl. lapp. III. Fl. succ. 260. Hall. herb. 342. Roy. lugd. 276.

Fragariæ affinis sericea incana. Bank. pin. 327. prodr. 139.

Fragariæ sylvestri affinis planta, flore luteo. Sibb. Scot. 2. p. 25. t. 6. f. 1.

Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flore luteo. Pluk. alm. 284. t. 212. f. 3.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scotiæ. 2

2. **SIBBALDIA** foliolis linearibus multifidis.

Pentaphylloides foliis tenuissime laciniatis, flosculis car-
neis. *Arum. ratis.* 112. t. 112.

Habitat in Sibira D. Gmelin.

POLYGYNIA.

Myosurus ad 459. **MYOSURUS**

minimus. 1. **MYOSURUS.**

Myosurus. Dod. gal. Myosurus foliis integerrimis. Hort. cliff. 117. Fl. succ. 261. Roy. lugdb. 492.

Holosteum. Daba Holosteum affinis Cauda muris. Bank. pin. 190.

Cauda muris. Dod. pempt 112.

Habitat in Europæ collibus apricis aridis. ©

оксепанак. Haiti Virgin. Radix rotund. capiti humani magnis, quamcum carnibus et pedibus in panis panaria comestur. Haiti. Virgin. B. Sin 91.

Кайшупанак. Virgin } *Кайшупанак;* Radix alba, vii gallinævi magnitudine et formâ quæ alina vocantur in Virginia Haiti B. Sin 91.

Уинаш. Virgin } *Уинаш.* Radix chinæ similis amyris succo cum aqua panis puryator, et pulp gelatina similis conficitur. Haiti. Virgin. B. Sin 92.

habacon. Virgin. } *habacon;* Radix magnitudine et figurâ radiceæ quæ cum alit coquitur in Virginia. Haiti B. Sin 92.

Clas

Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA.

ananas ad. 67

1. BROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica

coarctata. Hort. cliff. 127. Hort. ups. 73. Roy. lugdb. 24.

Carabus brasiliensis, foliis aloës. Baub. pin. 384.

Ananas acostæ. Comm. hort. I. p. 109. t. 57. p. 2 ad 3 p.

2. Ananas aculeatus, fructu pyramidato: carne aurea. Tournefort

3. Ananas aculeatus, fructu conico carne aurea. Pluk.

4. Ananas lucide virens, folio vix ferrato. Dill. elth. 25.

Ananas non aculeatus Pitta dictus. Plum. spec. 20.

Habitat in Nova Hispania, Surinamo.

2. BROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, racemo terminali.

Bromelia foliis aculeatis, racemo laxo terminali. Hort. cliff. 129.

Ananas americana sylvestris altera minor. Pluk. mant. 29.

Pinguin. Dill. elth. 320. t. 240. f. 311.

Habitat in Jamaica, Barbados.

3. BROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, panicula diffusa.

Bromelia foliis spinosis oblique recurvis, fructibus dispersis racemosis.

Karatas foliis altissimis angustissimis & aculeatis. Plum. gen. 10.

Habitat in America meridionali.

4. BROMELIA foliis ferrato-spinosis obtusis, spicis alternis.

Kaida h. m. 2. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Caulis ramorum arborum.

Haida Raddi h. m. 2. 7. 6.

actinguentes sunt.

Ananas 2. 67. 2. 6. 6. 6.

Jajama. hisp.

aberas. gum.

Jajama. Raman.

anana. nanas. Rupa

5. 2. 61.

Jajama. 3. ananas specis

Pinguin

Pinguin. 5. ad. 67. 2. 6. 6.

Benjama. vici.

Karatas.

Karatas.

3. 6. 6. 6.

Caraguata. arango.

82

Pinguin ad

67.

ad 3. ad. 67. 2. 6. 6.

ad 3. ad. 67. 2. 6. 6.

ad 3. ad. 67. 2. 6. 6.

ad 3. ad. 67. 2. 6. 6.

ad 3. ad. 67. 2. 6. 6.

Carinata foliis alternis angustioribus & aculeatis Plum.
Subacida infima autem. Baumer. Kaccum

citronda terre hama
congruata Bot. III. 193.
? Karst ad 67.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 287

Renealmia spica multiplici, flore albo. Plum. gen. 37.
β. Renealmia, spica multiplici, alia angustifolia. Plum. gen. 37.
Habitat in America calidiorē.

3. RENEALMIA foliis linearibus reclinatis, scapo simplici imbricato, spica simplici.
Renealmia non ramosa squamata, & floribus niveis. Plum. gen. 37.
Habitat in America meridionali.

Renealmia ad 3.
monostachia.
~~Kamambaya~~ ad 67.

4. RENEALMIA foliis subulatis scabris, pedunculis unilifloris. Roy. lugdb. 25.
Viscum caryophylloides minus, foliis pruinae instar candidantibus, flore tripetalo purpureo, semine filamentoso. Sloan. jam. 77. hist. I. p. 190. t. 121. f. 1. Raj. suppl. 406.

β. Viscum caryophylloides minus, foliorum imis viridibus apicibus subrubicundis, flore tripetalo purpureo, semine filamentoso. Sloan. jam. 77. hist. I. p. 190. t. 122.
Habitat in Jamaicae arboribus.

5. RENEALMIA filiformis intorta. Hort. cliff. 129. Gron. virg. 36. Barr. equin. 99. Roy. lugdb. 25.
Viscum caryophylloides tenuissimum e ramis arborum musci in modum dependens, foliis pruinae instar candidantibus, flore tripetalo, semine filamentoso. Sloan. jam. 77. hist. I. p. 191. t. 122. f. 2. 3. Raj. suppl. 406.

usneoides: +
Kamambaya mang

Culcitra, ramis arborum innascens, caroliniana, filamentis lanugine tectis. Pluk. alm. 126. t. 26. f. 5.
Camanbaya. Marcgr. bras. 46. Pet. gaz. t. 62. f. 12.
Habitat in Virginiae, Jamaicae, Brasiliae arboribus.

Synonymique de The S. Lett.

BURMANNIA.

Burmanna ad

1. BURMANNIA spica gemina. Burm. zeyl. 50. t. 20. disticha. f. 1. Fl. zeyl. 128.
Burmanna spica duplici. Hort. cliff. 128. Roy. lugdb. 125.
Habitat in Zeylonae paludosis

54
}

2. BURMANNIA flore gemmino.
Burmanna flore duplici. Hort. cliff. 128.
Burmanna scapo bifloro. Gron. virg. 36.
Habitat in Virginiae paludosis;

biflora.

15 aprile flor. 2. 2 ped. fol. 7. 2 ped. plara. / Diapry folior. long. anuq. compressa
15 aprile flor. 2. 2 ped. fol. 7. 2 ped. plara. / Diapry folior. long. anuq. compressa
 HEXANDRIA MONOGYNIA. 289
 LEUCOJUM. — *aericonion*

1. LEUCOJUM spatha uniflora, stylo clavato.
 Leucojum. Hort. cliff. 13. Hort. ups. 74. Roy. lugdb. 35.
 Leucojum bulbosum vulgare. Baub. pin. 55.
 Oliganthemum. Reneal. spec. 99. t. 100.
 Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ umbrosis pra-
 tis, ad rivulos.
2. LEUCOJUM spatha multiflora, stylo filiformi. Læst.
 Leucojum bulbosum autumnale. Baub. pin. 56.
 Leucojum bulbosum autumnale tenuifolium. Clus. hist.
 1. p. 170. *min. sect 4. 2. g. f. 26.*
 Leucojum bulbosum majus s. multiflorum. Baub. pin.
 55.
 Habitat in Lusitania. 2

aericonion ad 57.
vernam. x
Leucojum. Theophr.
bulbosum
Pocunoyi
campulobulbosum. } gall
oliganthemum. Ren
Saffarina. Dion
Polyphyra. Dion
antiqua
aericonion ad 57
aericonion. Min. cl.
Leucovario linon ad 57
harillobulbosum. Syne.

NARCISSUS.

1. NARCISSUS spatha uniflora, nectarii limbo rotato
 brevissimo. Hort. ups. 74. *1. fist. florum raro 2. tunc. c. d.*
 Narcissus foliis ensiformibus, floris nectario rotato bre-
 vissimo. Hort. cliff. 134. Roy. lugdb. 35. Sauv.
 monsp. 17.
 Narcissus albus: circulo purpureo. Baub. pin. 48.
 Narcissus medio purpureus. Dod. pempt. 223.
 Narcissus medio purpureus multiplex. Baub. pin. 54.
 Habitat in Gallia Narbonensi, Italia. 2
2. NARCISSUS spatha uniflora, nectarii limbo campa-
 nulato erecto petalo æquale.
 Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario longitu-
 dine petalorum. Hort. cliff. 134. Hort. ups. 74. Roy.
 lugdb. 35. Sauv. monsp. 17.
 Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. Baub. pin.
 52.
 Narcissus luteus sylvestris. Dod. pempt. 227. f. 12.
 Habitat in Angliæ, Hispaniæ, Italiæ nemoribus. 2
3. NARCISSUS spatha uniflora, nectario turbinato ma-
 ximo, genitalibus declinatis.
 Narcissus foliis subulatis, nectario maximo patulo, ge-
 nitalibus declinatis. Hort. cliff. 134. Roy. lugdb. 35.
 Narcissus montanus alter, flore fimbriato. Baub. pin.
 53.
 Narcissus montanus juncifolius, calyce aureo. Baub.
 pin. 53.

Jonquilla
Narcissus ad 57
poeticus.
Balticus. gall.
Costam
Bulbocodium
Narcissus ad
Pseudo Nar-
cissus. Min. cl.
Bulbocodium
Min. cl.
Bulbocodium
coquiton. Paris.
cyber. samit.
ayota gall.
Bulbocodium
Bulbocodium
chyp. bon ad 57
Riflette. gall
Narcissus ad

Linnæus ad Ant. } narcissus luteus contortus...
Linnæus cada }
serotinus }
Catamen }
Jong }

290 HEXANDRIA MONOGYNIA.

Pseudo-Narcissus juncifolius 2, flavo flore. *Clus. hisp.* 1. p. 166.

Habitat inter Ulyssiponem & Hispalim. 2

Narcissus ad 57
serotinus.

4. NARCISSUS spatha uniflora, nectario brevissimo sexpartito. *Læsl.*

anemone Limonia Theophr.
Orniyat.

Narcissus albus autumnalis minimus. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elys.* 2. p. 64. f. 8.

Narcissus serotinus. *Clus. hist.* 1. p. 162.

Narcissus autumnalis minor. *Clus. hisp.* 251. t. 252.

Habitat in Hispania, 2 et in Mahone. *Hort. ups.* 75.

Jongquilla.
Jongquilla ad 57

5. NARCISSUS spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Hort. ups.* 75.

Narcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monsp.* 19.

Narcissus juncifolius luteus minor. *Bauh. pin.* 51.

Narcissus juncifolius, oblongo calyce, luteus major. *Bauh. pin.* 51.

Rambon 23p

Narcissus juncifolius minor & 2. *Clus. hist.* 1. p. 60.

Habitat inter Hispalim & Gades inter Guadalopam & Toletum in uliginosis. 2

Jonguille ad

6. NARCISSUS spatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Hort. ups.* 74.

Tazetta
Doney
Quetta

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe brevioribus. *Hort. cliff.* 134.

Roy. lugdb. 35,

Narcissus medio-luteus, copioso flore: odore gravi. *Bauh. pin.* 50.

Nargis, arab.
Nargis et Nargisi. Cel.

Narcissus luteus polyanthos lusitanicus. *Bauh. pin.* 50.

Dargiers
ou Algien

Narcissus flore pleno, 1. 2. *Clus. hist.* 1. p. 50.

Habitat in Gallia Narbonensis, Lusitaniae, Hispaniae maritimis. 2

PANCRATIUM.

Pancratium ad 57
+ zeylanicum.

1. PANCRATIUM spatha uniflora, petalis reflexis. *Fl. zeyl.* 126.

Narcissus zeylanicus, flore albo hexagono odorato. *Herm. lugdb.* 691. t. 693. *Comm. hort.* 1. p. 75. t. 38.

2-4p.

Catalli-pola. Rheed mal. 11. p. 40.

Habitat in India. 2

Pancratium mexicanum.

2. PANCRATIUM spatha biflora. *Hort. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 34.

Ocio xochitl. munda i ocote xochitl.

in fl. tigris. Radix boni fol. glaberrima. fl. nigra rubra medio albo et varietate. 7. ante 4. p. p. p. 1.

Albuland ad 75

HEXANDRIA
 Pancratium mex
 cl. 299. t. 22
 Habitat in Mex
 PANCRATIUM
 Hort. cliff. 13
 Narcissus americ
 odorato. Comm
 Narcissus totus a
 us. Sloan. Jam
 t. 27. p. 4. t. 2
 Habitat in Jama
 PANCRATIUM
 liliis lingulatis.
 Narcissus maritim
 Lilio-Narcissus a
 p. 365. f. 4. t.
 Hemerocallis va
 Habitat in Hispa
 fra Monspelium
 PANCRATIUM
 staminibus nec
 Lilio-Narcissus p
 t. 5. t. 5.
 Habitat in Jama
 PANCRATIUM
 bus, staminibus
 Narcissus illyric
 1. p. 17. t. 8
 Lilionarcissus he
 t. 16. f. 1.
 Habitat in Hyr
 PANCRATIUM
 vofis.
 Narcissus ambo
 Comm. hort.
 Habitat in Amb
 CRINUM foli
 planis. cu. uny
 p. yanna-pola-ta
 Habitat in Asiae
 in lata angula.
 in late. Baer
 in late. Baer
 in late. Baer

Theophrast. 7. c. 13. In chersoneso Taurica et genus bulbifera...
 y. p. 308. } ^{lancem habent liliis nimirum tunica, ita ut sit media inter}
 ? *Panicatum* Lin. p. 235 } ^{partem mediam internatungna mandilium et internatungna. Remanent}
 ? *omithyalum* L. p. 242 } ^{partem totam et alia videntur. Lanatum et et non eruditum uti lanatum.}
 202
 y. dicitur Lili. p. a. c. Bulbifera Euphorbia Clus. qui est omnium alium p. 208;
HEXANDRIA MONOGYNIA.

Folia. 3. f. 4. digitos transversos lata, a basi sensim
 attenuata. Antheræ filiformes, lineares, incumbentes,
 longitudine dimidii filamenti s. corollæ.

Tanghekoli ad 57.
asiaticum.
indianum 2 fl.
 Fl. ad 10 umbell. ^{lucida / quamvis}
 Tubo longo glaucoq. angusto. ^{tubo parvo longioribus}
 candido venter rub.
 Bacca glb. 2 p. m. ^{olabo} *Fanghekoli*.
^{habitu} *Habitat in Malabaria, Zeylona. 4 adripes Bulbiferum*
^{aud. filiarum angusta 1/2 ped. caput amplexu subtus fl. abiq. od.}
 americanum 3.
Tanghekoli ad.

2. CRINUM foliis carinatis. Fl. zeyl. 127.
 Lilium zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. Herm.
 lugdb. 682. t. 683. ^{Belutta p. Bali.}

3. CRINUM corollarum apicibus introrsum ungviculatis.
 Crinum. Hort. cliff. 127. Hort. upf. 76. Roy. lugdb. 37.
 LilioAsphodelus americanus sempervirens maximus
 polyanthus albus. Comm. rar. 14. t. 14. Dill. elth.
 194. t. 160. f. 195.

β. LilioAsphodelus americanus sempervirens minor albus.
 Comm. rar. 15. t. 15.
 Habitat in America. 4 Bacang. Ruybr. 6. 2. 69.

africanum 4. CRINUM foliis sublancolatis planis, corollis obtusis.
abumon ad 54.
 Polianthes floribus umbellatis. Vir. cliff. 29. Hort. cliff.
 126. Roy. lugdb. 27. ^{Stigma 1. aut. cap. ovul. 2 gam. unguis}

Hyacinthus africanus tuberosus, flore cæruleo umbella-
 to. Breyn. prodr. 1. p. 39. icon. 23. t. 10. Comm.
 hort. 2. p. 133. t. 67. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19.
 f. 4. ^{Stam 6. apic. tubo calicis fimbriae lani. Sta. sed. calic. inf. flum}

Hyacintho affinis, tuberosa radice, africana, umbella cæ-
 rulea inodora. Pluk. alm. 187. t. 195. f. 1.
 Habitat in Æthiopia. 4. ^{Hyacinthi. fol. opp. alii variis fl. in harnipi}

AMARYLLIS.

1. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, stami-
 nibus declinatis. Hort. cliff. 135. Roy. lugdb. 36.
 Narcissus autumnalis major. Clus. hist. 1. p. 164.
 Colchicum luteum t. majus. Bauh. pin. 69.
 Habitat in Hispania, Italia, Thracia. 4

Atamisco ad 57.
Atamisco 2. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, pistillo
 declinato. Hort. cliff. 135. Gron. virg. 36. Roy.
 lugdb. 36.

LilioNarcissus virginienensis. Catesb. car. 3. p. 12. t. 12.
 LilioNarcissus liliflorus carolinianus, flore albo singu-
 lari cum rubedine diluto. Pluk. alm. 220. t. 43. f. 3.
 LilioNarcissos indicus pumilus monanthos albus. Mo-
 ris. hist. 2. p. 266. f. 4. t. 24. f. 4.
 Habitat in Virginia. 4 *spata 2 valoy*

3. AMA-

Hunt Institute for Botanical Documentation

ly de ungu. diforta belladonna Linn. spatha oval 2 ad 4 flora. } • amaryllis ad
rubi calori bus. inter (ing. laun. pili) busque pro vitaris domaty. } 57

HEXANDRIA MONOGYNIA. 293

3. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, genitalibus declinatis. Hort. cliff. 135. Hort. ups. 75. ^{formosissima. • 57}
Act. stockh. 1742. p. 93. t. 6. Roy. lugdb. 36. ^{Rubi. Caly. c. 49.}
LilioNarcissus jacobæus, flore sanguineo nutante. Dill. ^{Ly St Jacques}
elth. 195. t. 162. f. 196.
Narcissus jacobæus major. Rudb. elys. 2. p. 89. f. 10.
Habitat in America meridionali. 4

4. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis. Hort. cliff. 135. ^{amaryllis ad}
Roy. lugdb. 36. ^{Bella donna. hortul.}
LilioNarcissus polyanthos, flore incarnato: fundo ex luteo albescente. Sloan. jam. 115. hist. I. p. 244. Seb. ^{amaryllis Linn.}
thes. I. p. 25. t. 17. f. 1. ^{Konopocinar. Haiden}
Lilium rubrum. Merian. surin. 22. t. 22. ^{Li. v. v. gall. Dillen}
Habitat in Caribæis, Barbados, Surinama. 4

5. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus strictis. Hort. ups. 75. ^{amaryllis ad}
Amaryllis spatha multiflora, corollis æqualibus patentissimis revolutis, genitalibus longissimis. Hort. cliff. 131. ^{Sarniensis. • X}
Roy. lugdb. 36. ^{Guanciana. gall.}
Narcissus japonicus, rutilo flore. Corn. canad. 157. t. 158. Rudb. elys. 2. p. 23. f. 14. ^{Sakian Japon}
Lilium sarniense. DuRoi. monogr. t. I. 2. ^{Libra. Linn.}
Habitat in Japonia, nunc in Sarniæ insula Angliæ. 4

6. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, scapo tereti ancipiti. Roy. lugdb. 36. ^{zeylanica. • 57}
LilioNarcissus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea striato. Comm. hort. I. p. 73. t. 73. ^{Zeylanica ad.}
LilioNarcissus africanus, scillæ foliis, flore niveo linea purpurea striato. Ehret. pict. 5. f. 2. ^{Zeylanica}
Habitat in Zeylona. 4

7. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, scapo compresso longitudine umbellæ. ^{longifolia. •}
Roy. lugdb. 36. ^{Lilium africanum humile}
Lilium africanum humile, longissimis foliis, polyanthos saturato colore purpurascens. Herm. parad. 195. t. 195.
Habitat in Æthiopia. 4

8. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis inæqualibus, foliis lingviformibus. ^{orientalis.}
Büttn. canon. 215.
Amaryllis spatha multiflora, foliis ovato-oblongis obtusis. Roy. lugdb. 37.
Li-

? amaryllis
9 longifolia.
Lin. p. 237

amaryllis cap. rari vel cap. spata
floribus luteis sub aequalibus
19 Juli flor de Bononia. 2 ab. bre. atq. ciliat. sed cum corallo breviss. vna
conspicua rari staminea varicilata. adbas pedic. rarior. ac basi cornu.
294 staminea declinata.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

LilioNarcissus indicus maximus sphaericus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Moris. hist. 2. p. 568. f. 4. t. 10. f. 35.*

Narcissus indicus orientalis. *Swert. flor. 31. f. 1.*
Habitat in India. 4

guttata

9. AMARYLLIS spatha multiflora, foliis ciliatis, LilioNarcissus sphaericus aethiopicus, foliis guttatis & ciliis instar pilosis. *Pluk. alm. 220.*

Lilium africanum sphaericum, floribus obsolete puniceis minoribus, foliis guttatis ad margines ciliis instar pilosis, bulbo longo. *Herm. lugdb. 375.*

Habitat in Aethiopia.

abandium ad. 54.

abandium adans
54
Sua rari gnaeum
varietati coisiani

BULBOCODIUM

1. BULBOCODIUM foliis lanceolatis. *Roy. lugdb. 41.*
Bulbocodium. Hort. cliff. 133.

Colchicum vernum hispanicum. *Baub. pin. 69. Rudb. elys. 2. p. 128. f. 2.*

Colchicum vernum. *Clus. hist. 2. app. 203.*

Habitat in Hispania. 4 1 ad 2 ped. plant. 1. april. flor. p. 4 colchici minimi. fl. colchici ad minima. fl. ad tabern. sept. 13.

serotinum.

2. BULBOCODIUM foliis subulato-linearibus. *Roy. lugdb. 41.*

Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico: intus albo extus squalide rubente. *Raj. angl. 3. p. 374. t. 17. f. 1.*

Pseudo-Narcissus gramineo folio. *Baub. pin. 51. prodr. 27. Rudb. elys. 2. p. 64. f. 9.*

Habitat in Alpibus Helvetiae, Angliae. 4

aphyllanthus ad. 47.

Chub.
• monspeliensis
aphyllanthus lob
17929

APHYLLANTHES

1. APHYLLANTHES. *Hort. cliff. 493. Sauv. monsp. 8.*

Aphyllanthes monspeliensium. *Lob. adv. 190. Baub. hist. 3. p. 336.*

Caryophyllus caeruleus monspeliensium. *Baub. pin. 209. Moris. hist. 2. p. 562. f. 5. t. 25. f. 12.*

Habitat Mospelii prope Castelneuf locis montosis saxosis sterilibus. 4. 1 ad 2 ped. plant. 20 maii flor. Radix repum junai. fol. reddet. tantum erecta rigida cyperus. junia. novosa. alio vna. atq. conca. vna. 4. 4. Stalita. vna.

ALLIUM

* Foliis caulinis planis.

1. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspидatis, radice laterali.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaerice congestis, radice laterali solida. *Hall. all. 5. Per-*

Pomum ad. 50

Ampelagra
sum. meth.
caum. L.

Pomum ad.

Scordosporum latifolium / pontanum
Mediterraneum. Mich. gen. 2. 24. f. 5. stem. lata. Saugpoda.
M. vna. vna.

HEXAN
Porum radice la
recto, umbella
Allium sphaerico
alterum. Baub
Habiat in Orien
Habiat in Orien
Habiat in Orien
ALLIUM cau
tricuspидatis, r
med. 165.
Allium staminibu
bus sphaerice
nata. Hall. al
Porum radice
Hort. cliff. 13
Porum commu
Porum sativum
Habiat in Oryp
Habiat in Oryp
ALLIUM cau
bosa, staminib
Porum caule
umbella glob
Gmel. sibir.
Habiat in Sibir
ALLIUM cau
bosa, staminib
med. 163.
Allium foliis c
Roy. lugdb. 3
Allium radice
Allium montan
74. nov. h. sat
Allium anguinu
Habiat in Alpi
Habiat in Alpi
ALLIUM ca
ribus hirsutis
Allium foliis r
floribus umb
Allium foliis l
stigiata. Roy.
Moly angustifo
Moly dioscori
Habiat in Af
fol. vna. vna
Saugpoda. vna
Do floras ab

allium angustifolium umbellatum fl. caeruleo Herb. Decr. in hinc

HEXANDRIA MONOGYNIA. 295

Spatha umbellae in comu se 3 ad 4 longiorum erectum terminata.
Porrum radice laterali solida, foliis linearibus, caule erecto, umbella subglobosa. Roy. lugdb. 40.

Allium sphaerico capite, folio latiore f. Scorodoprasum alterum. *Baub. pin. 74. Rudb. elys. 2. p. 151. Ann. bot. 2. 15. f. 12.*

Habitat in Oriente, inque insula Holms Anglia. 2. 4. p. 1. pt. ten 20 mai flon

2. ALLIUM caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspидatis, radice tunicata. Hort. upf. 77. Mat. med. 165.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaerice congestis, radice tunicata cauli circumnata. Hall. all. 5.

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. Hort. cliff. 136. Roy. lugdb. 40.

Porrum commune capitatum. Baub. pin. 72.

Porrum sativum latifolium. Baub. pin. 72.

3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspидatis corolla longioribus.

Porrum caule tereti folioso, foliis linearibus planis, umbella globosa, staminibus corolla longioribus. Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13. & 14. f. 1.

Habitat in Sibiria.

4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis corolla longioribus. Mat. med. 163.

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. Roy. lugdb. 39.

Allium radice oblonga reticulo obducta. Hall. all. 17.

Allium montanum latifolium maculatum. Baub. pin. 74. *Ann. bot. 2. 15. f. 16.*

Allium anguinum. Cam. epit. 329.

Habitat in Alpibus Helvetiae, Italiae. 2. 1. 1. p. 1. pt. ten 15 mai flon

5. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis.

Allium foliis radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. Hall. all. 15.

Allium foliis lanceolato-linearibus, florum umbella fastigiata. Roy. lugdb. 39. *allium angustif. umbellat. fl. albo. 2. p. 1.*

Moly angustifolium umbellatum. Baub. pin. 75.

Moly dioscoridis. Clus. hist. 1. p. 192.

Habitat in Africa, Italia, Hispania. 2. 1. 1. p. 1. pt. ten 15 mai flon

Sol. 3 radice angusta 1 ped. T 4 late circumscissa limbo 6. AL hirsuta. Scapus flon. cylind. ten fortibus ruber, apice v. umbella 30 flon. albi longipedunculati.

Porum ad 50

Porrum. flon flon.

gethyll. graec. Min. humol. Rusl. nra bor. Dior. theys nra 6608

Fin San nianika

yy ruddis. kyy rudd. 2. 1. 1. p. 1. pt. ten 15 mai flon

xy rone vor. theys xap tov. Kai souira

5. Kai souira

vineve. Porrum ad.

Victorialis ad

Victorialis. Geln. p. 1. 1. p. 1. pt. ten 15 mai flon

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

ad 50.

Bauvauz etau. Aug. p. 8. 2. 70. f. 1. Bulbifer glob. 2. p. 1. caule plurimu.
ampullosis. f. flis ampullositate p. rad. radii instructi.
scapus umbellae. 6. flom. supra alb. ut. v. v. d. p. 3. fl. cap. p. p. p. d.

296 HEXANDRIA MONOGYNIA.

? p. allii. ? p. omithogali
all. allium
microbulbiferum
umbelliferum
Moly ad +
p. fl.

6. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminibus simplicibus. *Bulbifer allii? involucri*
Allium caule tereti, propagine ex ala. *crass. p. 110.* Hort. cliff. 137.
Roy. lugdb. 39. Sauv. monsp. 18.
Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. Hall. all. 19.

varietas est flore albo
scapo rubente. fructu minore.
brevis viridi.

Moly latifolium liliflorum. Baub. pin. 75. *Mon. 4. p. 7. 13*
Moly indicum, flore purpureo. Swert. Fl. 61. *f. 70.*

obliquum.
~~allium ad 50~~
Moly ad

Habitat - - - 21. p. 15. mai. flom 20. hunc part.
fol. 5. radical. amplioribus. 2. rad. 3. angula. carina. scapus nudus. cyl. 2. p. 1. v. i. d.
7. ALLIUM caule planifolio umbellifero, staminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis.
Allium radice tunicata, foliis planis linearibus caulinis, capitulo umbellato. Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9.
Habitat in Sibiria.

ramosum.
~~allium ad~~
Moly ad,

Caulis bipedalis, teres. Folia alterna, plano-canaliculata, obliqua: Vaginis teretibus. Umbella globosa; Spatha globosa, acuminata. Petala ovata, erecta, concava, flava carina viridi. Filamenta albida, corolla duplo longiora. Antherae luteae. Germen subglobosum.

Moly ad
roseum.
in f. 6. 7. 20.
geb. 5. com.
a. ille for. p. v.

8. ALLIUM caule subplanifolio umbellifero, staminibus subulatis longioribus; umbella globosa, foliis linearibus subconvexis.
Allium scapo nudo tereti fere, foliis semicylindricis, staminibus corolla longioribus. Gmel. sib. 1. p. 52. t. 9. f. 1.
Habitat in Sibiria. G. Demidoff.

Caulis ferme bipedalis, teres. Folia alterna, planiuscula, canaliculata, subtus convexa, margine obtusa. Umbella globosa. Petala ovata, purpurascencia carina saturatiore. Filamenta purpurea, corolla parva longiora. Antherae violaceae. Germen subrotundum: maculis 3, viridibus & medio caule ex ala folio opposita. Ramus nudus, longitudine caulis.

allium ad
sativum.
X. 6. p. 0. 20. v. Thuy. h. d. p.
Charm. } arab.
Thum. }
Knobloch. } Arab. Rau.

9. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella fastigiata, staminibus corollam æquantibus, foliis lævibus. + *filamenta lutea.*
Allium foliis ensiformibus, radice bulbillis stipata, floribus amplis umbellatis. Sauv. monsp. 42.
Allium sylvestre f. Moly minus, roseo amplo flore. Magn. monsp. II. t. 10.
Habitat Monspelii in vineis.

X. caucasorum lob.
wae b. }
Moly latifolium - Indicum. C. D. P. 75.
allium quod caucasorum moly Indicum vocatum lob. Imper. 866.
Mon. h. det. 2. 13 f. 11. id est sub. jussional in me ac 6. 12. mon. h. det. 11.
ut, umbella vulgo scitili ad terram palestina pro floribus bulbis edit.

10. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspидatis. Hort. ups. 76. Mat. med. 164. Al-

HEXANDRIA MONOGYNIA.

allium sativum radice simplicis C.B. 74.
molyza
hippan-aegypticum Ant.

allium cypricum Theop. } *ulpicum Pin*
aphro/corodan
anti/corodan

Allium radice bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. Hort. cliff. 137. Roy. lugdb. 39.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. Hall. all. 1.

Allium sativum. Bauh. pin. 73. Mon. 4. Jul. 2. 15. f. 9.

Allium. Cam. epit. 328.

Habitat in Sicilia. 21. *in f. Pors. 1. 2. 2. 1. indalea d'oro un' f. uha*
cupulata angustina. Bulbis tunicatis oculis etiam vaginatis ad cavum. 1. vaginam constant.

II. ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, staminibus tricuspideis. Hort. ups. 77.

Scorodoprasum. *guadi.* +
Porrum. d. 50
Ophioscorodan cordi-
lon.
Porrum ad

Allium capitulo bulboso erecto, foliis planis subcrenatis, vaginis ancipitibus. Fl. suec. 266. It. æl. 60.

Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis læviter serratis. Hall. all. 3.

Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpurascente. Bauh. pin. 74. Rudb. elys. 2. p. 155.*

β. Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, scapo ante maturitatem contorto, Hall. all. 2.

Allium sativum alterum f. Allioprasum caulibus summo circumvoluto. Bauh. pin. 73.

Moly ad
rub.

Allii genus Ophioscorodon dictum quibusdam. Bauh. hist. 2. p. 559.

Porrum radice laterali cordata solida, pedunculo revoluta, capite bulbifero. Hort. cliff. 136.

Habitat in Oelandia, Dania, Pannonia.

12. ALLIUM caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mutica, staminibus tricuspideis. It. scan. 227.

arenarium.
Porrum ad.

Porrum planifolium, staminibus alterne trifidis, umbella bulbifera. Rupp. hall. 154. t. 2. f. 2.

Habitat in Thuringia; in Falstria Scaniae.

13. ALLIUM caule planifolio bulbifero, staminibus subulatis. *Spatha umbellae apica 2 cornis in cornu longissimum striatum*

carinatum. d
Elaphobrum

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. Hall. all. 24. t. 1. f. 2.

allium d.
Moly ad.

Ampeloprasium proliferum. Lob. ic. 156.*

β. Allium montanum bicorne angustifolium, flore dilute purpurascente. Bauh. pin. 74.

Allium f. Moly montanum 2. Clus. hist. 1. p. 195.

Habitat in Germania. *facit du 18 Calaboty. 24. 2. 1. ped. folia capra*
up. med. cordis Scapo vagin. semipl. carinata lœvia. Scapo est folio longitudo
** Foliis caulibus teretibus.*

Cera d. 50.

14. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspideis corolla longioribus.

Spherocephala. f. f. f.
lon.
Ai-
aitle f. f.

gethyoides. Col. { Allium mont. bicorne f. enaltds. c. B. p. 75.
 s. moly montanum 3 dist.
 J'ai a entrade les 4 especes de Cera foga de Michuli. par la pelle / scandoprasum
 Z. 24 f. 1. 2. 3. 4. 298
 J'ai entrade son Bonheur qui la p. 11 / scandoprasum Z. 24 f. 3. B. C.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, radice multiplici, floribus sphaerice congestis. Hall. all. 7.
 Porrum caule tereti folioso, foliis linearibus planis, umbella globosa, staminibus corolla longioribus. Gmel. fib. 1. p. 56. t. 13. & 14. f. 1

Allium montanum, capite rotundo Bauh. pin. 75. Rudb. elys. 1. p. 157. f. 7. Mor 4 Sat. 214 f. 4.

Allium f. Moly montanum, purpureo flore. Clus. hist. 1. p. 195.

Allii genus forte Scorodoprasum alterum, Bauh. hist. 2. p. 564.

Scorodoprasum montanum juncifolium, capite rotundo dilute janthino, floribus paucis. Mich. gen. 25. t. 24. f. 2. herb. hall. 1220.

Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia. In monte Calvarii 1. Jul. flor.

descendens.
 Cera ad 50

15. ALLIUM caule subteretifolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspидatis. Hort. ups. 78.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite suave rubente sphaerico non bulbifero, radice laterali. Hall. all. 8.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite sphaerico non bulbifero atropurpureo. Hall. all. 9. t. 1. f. 1.

Allium f. Moly latifolium, capite sphaerico, flore purpureo. Rudb. elys. 2. p. 160. f. 20.

Moly atropurpureum. Rudb. elys. 2. p. 165. f. 13. Habitat in Helvetia.

moschatum.
 Cera ad

16. ALLIUM caule teretifolio subnudo umbellifero, umbella fastigiata, petalis truncatis, staminibus tricuspидatis. Læfl.

Allium foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. Hall. all. 14.

Moly moschatum, capillaceo folio. Bauh. pin. 76. prodr. 28. t. 28. Rudb. elys. 2. p. 166. f. 14. * Sauv. monsp. 10.

Habitat in GalloProvinciæ, Narbonæ, Hispaniæ apricis elevatis.

flavum.
 Cera ad

17. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus subulatis.

Allium umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni, foliis teretibus. Hall. all. 21.

Chenoprasum
 ad 50

Allium montanum bicorne, flore pallido odore. Bauh. pin. 75.

Al-

HEXAAN
 Allium f. Moly
 Habitat in Panno
 ALLIUM cau
 cuspidatis.
 Allium staminibu
 pite bulbifero,
 Allium sylvestre
 Allium campestr
 majus. Bauh.
 Porrum sylvestre
 Porrum sylvestre
 Habitat in Germ
 ALLIUM ca
 semiteretibus f
 Allium umbella
 bus. Hall. all.
 Cera capitulo bu
 vemangularibu
 Porrum radice f
 Roy. lugdb. 4
 Allium montan
 Habitat in Suec
 * Foliis
 20. ALLIUM f
 nis, staminibu
 Porrum scapo r
 te, foliis enf
 Gmel. fibir. 1
 Habitat in Sibi
 ALLIUM f
 tus convexis
 bus subulatis
 Allium caule
 hinc paullo c
 f. 2.
 Allium foliis
 Roy. lugdb.
 Allium radice
 non bulbifer
 all. 16. n.
 Allium mont

HEXAANDRIA MONOGYNIA. 299

Allium f. Moly montanum 4. Clas. hist. 1. p. 216.
Habitat in Pannonia.

Dilepa ad 50.

18. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspидatis.

*vineate.
xalapartis. magi
calabotij*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite bulbifero, radice multiplici. Hall. all. 4.

Allium sylvestre campestre purpurascens. Baub. pin. 74.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus. Baub. pin. 74.

Porrum sylvestre vinearum. Baub. pin. 72.

*ampulyratum. Multa
ex. Inu.*

Porrum sylvestre, gemino capite. Baub. pin. 72.

*epitha ampulyratum
est Calabotij.*

Habitat in Germania. *juvenda 13 Elaphobiscum, 2. 3. juv.*

19. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis.

*oleraceum.
καλαϊδος.*

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus. Hall. all. 23. f. 4.

Solida. Inu.

Cepa capitulo bulbofo prolifero, foliis semiteretibus non vangularibus scabris fistulosis. Fl. suec. 265. *

super ad

Porrum radice solida, caule erecto, capitulo bulbifero. Roy. lugdb. 40. Gort. gelr. 69.

Scherooppa

Allium montanum bicorne, flore exalbido. Baub. pin. 75. *Mon. 4. Sect. 2. 14. f. 3.*

Cornicapalmya. ad

Habitat in Suecia, Germania.

* Foliis radicalibus, scapo nudo.

20. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus planis, staminibus tricuspидatis. Hort. upf. 80.

*nutans.
allium ad.*

Porrum scapo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante, foliis ensiformibus: hinc paullo convexioribus. Gmel. sibir. 1. p. 55. t. 18.

Pannin.

Habitat in Sibiria.

21. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus subtus convexis laevibus, umbella subrotunda, staminibus subulatis. Hort. upf. 79.

senescens.

Allium caule ancipiti teretiufculo, foliis ensiformibus: hinc paullo convexioribus. Gmel. sibir. 1. p. 53. t. 11. f. 2.

allium ad 50

Allium foliis linearibus, florum umbella subglobosa. Roy. lugdb. 39.

Scherooppa

Allium radice bulbosa, foliis gramineis, umbella erecta non bulbifera, vaginis brevissimis. Hall. helv. 297. all. 16. n. 2.

Moly. g. adam.

Allium montanum, foliis narcissi, majus. Baub. pin. 75. Habi-

Schoenoprasum

allium tenuifolium bicorne Linn. C.B. Des in Linn.

300 nudus HEXANDRIA MONOGYNIA.

Scapus flor fls 1. longim, compressus anag. umbella 40 flor cavum

Habitat in Sibiria, Sicilia. 21. 1 ped. fol. 5 radical basi angul.

Petala erecta, a se invicem aebiscentia s. distantia, ca-

allium ad 50 angulosum.

22. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus ca-

Schoenoprasum

naliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata.

Hort. ups. 79. *

Cepa scapo nudo subangulato farcto, foliis linearibus

subtus angulosis, staminibus corolla brevioribus. Gmel.

sibir. 1. p. 58. t. 14. f. 2.

Allium radice senescente lignosa transversa, umbella e-

recta. Hall. all. 16.

Allium petraeum umbelliferum. Bauh. hist. 2. p. 564.

t. 564.

Allium montanum, foliis narcissi, minus. Bauh. pin. 75.

Habitat in Sibiriae humidiusculis.

Folia interdum subtus vix angulata, at Scapus superne

parum angulato-striatus; Petala interiora apice paten-

tia, omnia lateribus conniventia.

Confer Allium sylvestre f. Moly minus, violaceo am-

plo flore. Magn. monsp. 21. 1 ped. fol. 3 radice uti 22.

ad miana. scapus flor subtus folis long. umbella 50 flor. violac

23. ALLIUM scapo nudo semicylindrico, foliis lan-

ceolatis petiolatis, umbella fastigiata.

Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraco,

bulbo setis obvallato. Fl. succ. 263. It. gotl. 169. *

Allium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis.

Roy. lugdb. 39. Hall. all. 18. Gmel. sib. 1. p. 49.

Allium foliis lanceolatis, umbella laxa. Hort. cliff. 27.

Allium sylvestre latifolium. Bauh. pin. 74.

Allium urinum. Fuchs. hist. 739. Cam. epit. 330.

Habitat in Europa septentrionalioris nemorosis. 21 in her

24. ALLIUM scapo nudo triquetro. fl. plana.

Allium caule triangulo. Tournes. inst. 385. Roy. lugdb.

39. caule 3. gmm. spathe 2 phylla 2 in 2 val. 7 floribus pendul.

Moly parvum, caule triangulo. Bauh. pin. 75.

Moly caule & foliis triangularibus. Park. par. 142. t.

143. f. 4. Stam. tenuia colore inserta. 15 martii flor.

Habitat in Hispania. et Mahona. Yrpid.

25. ALLIUM scapo nudo inferne ventricoso longiore

foliis teretibus. Hort. ups. 77. Mat. med. 166.

Allium staminibus alterne trifidis, caule ad terram ven-

tricoso. Hall. all. 10.

Cepa scapo nudo ventricoso foliis longiore, radice de-

pressa. Hort. cliff. 137. Roy. lugdb. 40.

Ce-

Vitroalita
allium ad 50
urinum.
Sibiria
Hungary
Ramus
Species est ornithogali.
Elicarmi.
calce huc in 1 petal
staminib. calce inserti.

triquetrum.
Cepa
Cepa ad
Cepa
Sibiria
Bassal
Matz. } and
Cepa
Sibiria } japon.

HEXAN
Cepa vulgaris.
Cepa. Cam. epi
Habitat in Galan
Cepa fls 1. longim
ALLIUM fo
laris sessilibus,
Allium foliis ra
umbellatis. R
Allium foliis lan
Moly latifolium
Moly flavo flor
Moly montanu
Habitat in Hun
Petala patentia,
erecta. fol. 2-3
glauca erecta f
ALLIUM
bus ventricof
Allium staminib
Hall. all. 11
Cepa scapo lon
dice oblonga
Cepa oblonga
Habitat in
18. ALLIUM
lato-filiform
Cepa scapo lon
latis filiform
Porrum sectiv
Schoenoprasur
Cepa scapis f
Gmel. sib. 1
Cepa parviflor
Habitat in alp
Haller hal
19. ALLIUM
liformibus,
p. 61. t. 1
Habitat in Si
20. ALLIUM
Moly humile