

S. N. A.

SPECIMEN ACADEMICUM.

S STENS

34.

CHINENSIA
LAGERSTRÖMIANA.

QVOD,

ANNVENTE NOB:a FACULTATE MEDICA:
IN R. ACADEMIA UPSAL.

PRÆSIDE.

VIRO NOBILISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
D:n D. CAROLO LINNÆO.

S:æ R:æ MAI.TIS ARCHIATRO. MED. ET BO.
TAN. PROF. REG. ET ORDIN. ACAD. IMPER.
MONSPEL. STOCKHOLM BEROL TOLET ET
LIPSAL. SOCIO.

UT ET

EQUITÆ DE STELLA POLARI

PUBLICÆ DISQVISITIONI SUBMITTIT
JOHANNES LAURENTIUS ODHELIUS.

W. G.

IN AUDIT. GUSTAV. D. DECEMB. MDCCCLIV.

H. A. M. C.



HOLMIAE, Impressit Direct. & Typogr. Magn, Duc, Finland,
JACOB MERCKELL.

4848
VIRO
NOBILISSIMO et CONSULTISSIMO
D. MAGNO LAGERSTRÖM,

Regii Collegii Commerciorum Consiliario, Societatis Mer-
catorum India Orientalis Directori, Regiae Acad.
Societ. Stock. Membro,

et

Reg: Societatis Liter. Ups. Socio:

Patrono certissimo.

In finita summi Numinis sapientia, in rebus infinitis, ex plen descer-
te, insigniter qui delector, eorumque pariter labores maximo
semper cultu prosequor, qui circa operum divinorum contem-
plationem, ut omnino decet, non segniter, quemadmodum re-
liquum vulgus, sed probe ac laudabili industria versantur;
hanc utique mirum est, quod specimen qualemunque publicum
editurus, in celebre Nomen LAGERSTRÖMIANUM, nec
tamen fortuito incidit, quod etiam hac ipsa pagella, quan-
tum potero, honorificentissime compellatum velim. Scilicet, ita
se res habet: Omnia magna atque eximia non possunt non
quemlibet curiosum spectatorem in admirationem rapere, si que
data qualibet occasione, memoriam in animis intelligentium
renovare, inquit; amorem sui jucunde allucere. Longe, fateor,
majora sunt, Nobiliss. LAGERSTRÖMI, tua in rem literari-
am, ut cetera cuncta fileam, merita, quam ut obtuso calamo
meo digne enumerari, ne dum condecorari queant. Sed, que-
modocum videbis, nec tantam molem humeris hisce meis im-
ponendam unquam judicavii. Ero omnium maxime contentus
si quorundam saltem enumeratione, Tuo, quem longe maxi-
mum inter mortales meruisti, honori, aliqua ratione fitare,
Et aliorum utilitati meaque voluptati non nihil inservire valcam
mansurus quoad vixero.

Nobilissimi Nominis Tu*s*

elens obsequientissimus

Joh. Laur. Odhelius.

- D. LAURENTIO ODHELIO.**
Amplissimo & Consultissimo Viro
Supremi Regii Dicasterii ADSESSORI Aequissimo
Patruo, filiali amore & reverentia ad cineres usque colendo,
Viro Consultissimo
Territoriarum Holmiam versus septentrionim spectantium
JUDICI Gravissimo
- D. JONÆ ODHELIO.**
Patruo, omni animi submissione perpetim prosequendo,
Viro Plurimum Reverendo & Praeclarissimo
- D. Mag. CLEMENTI HELIN.**
Ecclesiarum, quæ Deo in Grenna smolandorum colliguntur
PASTORI vigilissimo.
Avunculo exoptatissimo.
- D. THORDERO ODHELIO.**
Antehac Lycei Holmensis Correctori Laudatissimo, jam PASTORI designato Flodensium in W. Gothia meritissimo
Patruo, summa, qva decet, obsequentia, semper diligendo,
- D. PETRO HELIN.**
Speciatæ Fidei Viro
MERCATORI Holmensium Per Celebri
Avunculo Dilectissimo.
- D. SAMUELI HELIN.**
Notæ Integritatis Viro
Holmensium pariter MERCATORI Conspicuo
Avunculo Carissimo.
- I**nfantili etati meæ grane quoddam fatum imminere visum est, cum Dilectissimi Optimique Parentes inopinata ehen! morte, mature nimium mihi met eriperentur. At vestra indulgentia, vestrisque curis & impensis factum est, ut mi-

mitiorem fortunae habitum experiri licuerit, unde nihil omnino prater solum paternum nomen apud vos desideratur; quod etiam vobis publice heic tribuere & possum & debo. Quid vero jam pro innumeris beneficiis Parentibus meis redditurus sim, plane nescio. Tenuis haecce opella, quam vobis consecrare audeo, sit inculpati amoris mei gratiaque mentis tessera non intermoritura. Accipiatis illam precor, sicuti datorem ejus semper soletis, benigna & serena fronte. Ego vero, quoad spiritum duxero, omni animi veneratione sum permansurus

Ampliss. Consult. Plr Reverend, &
Spectat. Nominum Vestrorum

cuius humillimus

Joh. Laur. Odhelius.

Min kära Cousin

För Ert ogemena wett och lyckeliga Snille är ej nog beskrifwa någon del af Naturens alster i hembygden, utan åtagen Er den mödan underrätta oss om de fällsyntaste Foglar, Wäxter och Naturalier som Chinæiska landet framwisa kan. Till ett Er få anständigt företagande önskar jag Er ej allenast lycka, utan ock en Ehr möda och besvär vård wedergållning. Förblifwer

Min kära Cousins

Uprigtna Bror
Joh, Laur, HELIN.



Cientiæ pro ratione seculorum & temporum volvuntur & mutantur, ita ut una ætate hæc, alia autem ætate alia scientia hominibus magis arrideat. Multorum opera ad id fastigium ascendunt scientiæ, ut ex onere tandem suo sæpenumero vacillent. Cognitio naturæ, quæ hominibus præscribit, quicquid ipsum in hac vita necessitatibus inserviat, earum ex numero scientiarum est, quæ novissimis hisce temporibus insignia cepit incrementa. Quæ hujus pars est, zoologia, quæque antehæc omnium minime exculta fuit, præsenti seculo, & maxime intra viginti annorum spatiū, caput attollere cœpit, ut summo in pretio habita sit. Id ipsum opera Artedii, Reanhurii, Cassebeji, Wilkes, Roeselii, Edwardi, Frischii, abunde testatum eunt. Præcipue vero minimorum animalium indoles & natura, quando cum iisdem usque ad plantas in Polypis, & ad lapides in Coralliis, itum fuerit, in censum venere. Hinc universis & honore & ingenio claris, in deliciis esse

A

cœpe-

cœperunt rerum naturalium **Musea**, idqve non
immerito, qvum isthæc omnium evidentissime stu-
penda miracula Omnipotentis hominibus ante ocu-
los ponant.

Hanc scientiam Nostrates non minus, ac aliæ
nationes, feliciter colunt, imprimis cum nuperri-
me ipsa R:a Majestas, ipsi Auctoritatem conciliave-
rit; Scilicet **Rex** noster Potentissimus in arce
Ulrichsdahl, maximum, qvod orbis, unqvam vide-
rit, Museum instruendum curavit varii generis
Quadrupedidus, *Avibus*, *Amphibiis*, *Piscibus*; Ast
Regina nostra clementissima; tantum in arce
Drottningholm adparatum instituit *Insectorum*, *Conchyliorum*,
Coralliorum, *Crystallerumqve*, ut facile dubites,
an qvid ultra cogitari possit. Ne plures memo-
rem, qvi singuli in id incumbunt, ut qvam plu-
rima qvisqz creatoris miracula promere queant.
Regis Regniqve Senator, Illustrissimus Comes, C. G.
TESSIN, eam instituit *Conchyliorum*, *Lapidumqve* col-
lectionem, qvacum certe paucissimæ comparari pos-
sint; cuius *Museum Tessinianum* præterito anno ty-
pis mandatum, præstantissimos certe lapides in-
sinuat. Cubicularius Regius D:n DE GEER in
Leuffstadio suo tantum coegit numerum, tum ani-
malium exoticorum, cum Insectorum, indigenorum
præprimis, ut nemo in his ipsi palmam præripiat;
ut præteream illi dudum in possessiorem cessisse &
Iones aviarii Rudbeckii filii, & prelo olim destinatos
Campos Elysses Rudbeckii Patris.

MUSEUM Academiæ nostræ Upſaliensis, a
 N. D. Præſide adoratum, non infimum locum
 meretur, accedentibus *Museo Principis, Amphibiis*
Gyllenborgianis, Suriramensibus Grillianis, Chinensibus La-
gerströmianis. alios ut fileam, qvi huic collectioni
 cumulum addidere. Priora ista oculis eruditæ orbis
 ab aliis dudum ſubjecta ſunt, at meum proposi-
 tum circa considerationem **Chinensium La-**
gerströmianorum, in præſenti versabitur,
 mihi ſufficeret, ſi eam Benevoli Lectoris attentio-
 nem circa hæc mea experiri mihi liceat, qvam il-
 li, qvi cætera ante me ediderunt, ſibi gratulati ſunt.

§. II.

D:n⁹ MAGNUS LAGERSTRÖM, Collegii com-
 mercialium Consiliarius, Director ſocietatis mercatoria
 indæ orientalis, Reg. Acad. Scient. Stockholm Membrum,
 & R:æ Societatis Scient. Ups. Socius, qvi primis inde
 ab annis, ſolida in omni eruditionis genere, jecit
 fundamenta, acerrimo insuper ingenio præditus,
 omnia ſua publicæ utilitati destinavit, qvod aliis
 commemorandum relinqvo, qvi egregii viri merita
 vivis coloribus delineare ſuscipiunt; mihi ſufficiat,
 in memoriam revocare optimi viri merita in no-
 stram Acadamiam, nostramque Scientiam.

Anteqvam noſtrates non ita pridem manum
 Rebus ad ſcientiam naturalem ſpectantibus admove-
 re incœperunt, debuimus qvæcumqve nova in hiſce
 ſacris detegerentur, ab exteris nationibus, com-

merciis per indias servantibus, mutuari, uti in pri-
 mis ab actis Gallorum, Anglorum aliorumque; insti-
 tuta autem *societate indie Orientalis* apud Gotoburgenses,
 ne otiosi in his diutius pessiteremus spectatores, ani-
 mum subiit desiderium experiundi, qva ratione
 nostrates etiam, aliquid ad scientiam conferre pos-
 sent; cum itaqve Regiae Cancellarie simulque Regiae
 tunc temporis Scientiarum Academiæ Præses, Ex-
 cellentissimus Comes D:9 C. G. Teffin, qui scientias
 elegantiores apud nos omni semper favore promo-
 vere nunquam intermisit, cum societate Indica
 convenit, ut qvotannis cum navibus liceret mittere
 juvenem, Naturæ sacris initiatum, in indias, socie-
 tatis hujus impensis; qvod qvamvis ut initio inven-
 tum, ita tamen facile evenit, opera & favore Am-
 plissimi nostri Lagerströmii, qui nunquam societatis
 indicæ negotiis defuit, & non modo summo favore
 amplexus est ejusmodi naturæ curiosos, sed & in man-
 datis dedit Navium Gubernatoribus, ut his infervi-
 rent qvacumq; liceret ratione, ut finem obtinerent
 propositam; imo qvod magis est, jussit societati
 subjectis sociis, suis propriis impensis emere qvæ-
 cumque in china occurerent singularia & portento-
 sa, ad locupletandam scientiam præstantissimam.
 Ipsi itaqve imprimis debemus, qvæ Ternströmius,
Torenius, *Bradius*, & instar omnium *Osbeckius*, ob-
 servarunt & ex indiis conquisiverunt, in Re naturali.
 Qvæcunque obtinuit, ipse publico consecravit, par-
 tim ea mittendo ad museum Academicum, ad
 N. D. Præsidem, ad Acad. Reg. scientiarum, imo
 etiam ad ipsius Regis nostri serenissimi museum.

Qvum

Qvum autem omnia ea recensere, qvæ in augmentum musei Academicici generosa manu contulit vir eximius, mihi nimis prolixum esset, acqviecam tantum in consideratione earum, qvæ unica Arca musei asservantur, inde depromturus præcipua, ita tamen ut seponam, non modo qvæ ante descripta sunt in Amphibiis Gyllenborgianis, Museo Principis, Surinamensisbus Grillianis, & Musei Regii tomo primo, sed & ea omnia, qvæ ad prelum parata & destinata, Tomo 2:o Musei Regis, ut & Museo Serenissimæ Reginæ, ne falcem in alienam messem injiciam; reliqua qvæ in cæteris arcis musei asservantur, aliis enumeranda relicturus.

Plantas indicas easq; plurimas & rarissimas, qvas partim *siccas* dudum speciebus Plantarum interuit N. D. Præses, partim vivas horto Academico ejusque hybernaculis intulit, qvales sunt, *Cocos*, *Phoenix*, *Cycas*, *Saccharum*, *Pentapetes*, *Hibisci varii*, *Sanguis draconis*, *Bombæ*, *Arum chinense*, *Fagara*, *Conyza*, *Amaranthi*, &c. in nullo horto Ivecico antea vias, siccо pede transeo.

Botanicon chinense, lingva & typis chinensisbus impressum, constat XXXVI voluminis in octavo, qvorum duo figuræ continent, in primis plantarum, nec non nonnullas animalium & lapidum, in singulis paginis quatvor, iconibus cubæ simillimis, reliqua vero continent naturam & usus plantarum, quo Bibliothecam N. D. Præsidis auxit Mæcenas artis nostræ; hoc ut lubenter

explicarem , vetat characteres & lingua , mihi prorsus ignota.

Pretiosissimus simul occurrit *Lapis De Goa* , qvem a D:o Lagerström , N. D. Præfes dono accepit , cujus vires in morbis variis , multo cum successu expertus est.

Cornu itidem Rhinocerotis , in quo summa Artis vestigia chinensium relucet , in sculptis imaginibus Persicæ , Melpili , Sagittariæ , Nelumbi , Potos , Labruscæ , cum Igvanis . tam eximiis , ut vix simile unquam viderim , inter stupenda N. D. Præsidis collectanea , ab optimo nostro mæcenate missum ;

Conchylia varia . umbilicos veneris , Nautios pulcerrime inscriptos , cum aliis plurimis mitto ; sed mihi sufficiat in presenti , adferre ea qvib⁹ scientiam naturalem in primis locuplitari sciam.

Plantas itidem medicas omnes , qvæ in officinis pharmaceuticis chinensium affervantur , adferri suis impensis curavit illustris Lagerstrom. Erant hæ omnes decerptæ a tenellis ramulis nuper germinantibus , & absqve fructæ floreque exsiccatis , qvæ numero circiter mille erant diversæ ; singuli pugilli quantitate & mensura. Chinenses , qui imprimis simplicibus delectantur medicamentis , in eo certe nostris feliores , norunt sine Medici auxilio ex officinis suis in qvocumqve morbo , poscere propriam plantam instar specifici ; cujus saepius solum infusum hauriunt , qvod si frustrari eos

contigerit, fatum suum exspectant. Hoc exprimento illustris vir cordatis medicis aperuit, quantum lucri medicinæ accederet, si Medicus solida eruditione Machaonia & Botanica instruētus, hæc medicamenta sibi redderet familiaria, qvibus Res medica, de medicamentis specificis etiamnum incognitis, in ægrotantium salutem, tam multa acquireret, qvam doleret se carere, si ignota essent omnia ea, qvi beneficio seculi hodie cognita sunt. Hinc medico omni, imprimis vero Regiis Collegiis Medicis commendamus, ut nulli parcant labori nullis-que sumtibus, anteqvam hæc notitia ipsis evadat notissima.

Ex his & aliis plurimis observationibus, sati superqve patet, qvid ad augmentum scientiarum videatur deesse. institutis stipendiis publicis & privatis, studiosi exoticas adeundi qvottannis Academias, occasionem habuere, sibi familiares reddendi scientias varias, eoque eruditii evadere; qvum vero pleræqve scientiæ apud nos tam feliciter ac apud exteris florent, in votis esset, ut aliquis fortunæ bonis valens, ejusmodi daret stipendia naturæ curiosis, qvi eorum ope adire possent nationes extra Europam degentes, quas dicimus barbaras; unde certe longe majora in omnibus disciplinis practicis, redundarent Europæis augmenta, qvam hic rite explicare liceat; & insimul natio nostra non minus qvam ipse instituor famam, nullo tempore succubituram, attingeret,

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

1. MANIS squamosa.

Descripta & delineata, in actis Academiæ regiæ scientiarum Holmenfis, 1749 Tab. VI, Fig. III.

CLASSIS II.

AVES.

2. PSITTACUS (macrourus) viridis, pectore sanguineo, gula nigra.

e China attulit D:9 Petrus Ofbeck.

Corpus magnitudine turtulis, totum supra, unicolor Abdomine, nitidissime viride. Tectrices alarum in medio flavescentes.

Rostrum incarnatum. *Gula nigra.*

Pectus & Collam. subtus rubra.

Remiges virides, latere interiori fuscæ.

Cauda cuneiformis, corpore longe brevior; *Rectricibus* supra viridissimis, subtus flavescentibus.

3. PSITTACUS (minutissimus) brachiurus, viridis, pectore urrhopygioque coccineis, vertice cœruleo.

Edv. p. 6. tab. 6.

Corpus magnitudine passeris: Capite, Collo, Dorso, Abdomine, Femoribus, Alis, cauda viridibus.

Rostrum plumbeum, figura ut in congeneribus; *Vertex* capitis macula rotunda, cyanæa notatus.

Pectus ante sternum macula rotunda, coccinea, saturatissima, ornatum.

Urrhopygium pennis coccinæis, longitudine fere cœdæ, tectum.

Remi-

*Remiges virides, immaculatae, lateribus occultatis,
magis fusciscentibus.*

Cauda brevissima, rotundata, virens.

Pedes pallidi, figura ut in congeneribus.

Mira & singularis admodum proprietes hujus aviculae, qvod dum somnum capit, suspendat se pendulam omnino, altero pede, sub ramo, ne aves rapaces nocturnae hanc facile observent; & sic a natura conservatur.

4. **RAMPHASTOS** (*cornutus*) *fronte offea, plana,
antice bicorni. Calao Petib. GAZ. 43, t. 28. f. 6.
& t. 81. f. m.*

Rostrum hoc, inter maxima omnium est avium, si erassitatem praesertim attendamus, leve tamen admodum, utraqve maxilla arcuatum, dorso cultratum, ut in congeneribus, colore incarnatum, verius apicem praesertim; mandibulae extrosum ferratae; *Nares* pone rostrum, & non in ipsis mandibulis; supra caput *Calvaria* nuda, oblonga, planiuscula, in duos angulos anterius prominen^ts, & hocce os mandibulae superiori tam accretum, ut contiguum unum evadat, postice vero ad occiput valde gibbum, & rotundatum, ubi totum cranium a parte superiori tegit. Rostrum præterea ad basin mandibulae inferioris nigrum, & sub prominentiis anticis calvariæ, atrum. Lingua abest, ut an pennacea nec ne, dijudicare non possum. Tempora capitis, sive regio circa oculos, pennis tecta, nigra est. Ex figura nostri, ferraturis mandibularum & levitate,

te, hanc speciem generis Ramphastos judico,
quoniam lingua abest. Petiver, unum anti-
cum & duos posticos in suo pingit digitos.

5. ISPIDA (viridis) *supra ferruginæa.*

hanc avem e China attulit D:9 O'sbeck.

Rostrum nigrum, crassiusculum, cultratum, pa-
rum arcuatum.

Ferruginæa sunt Caput supra, Dorsum inter hu-
meros & alæ subtus.

Viridia, sunt Pectus & Alæ supra.

Coeruleæ sunt Gula, Urrhopygium & Cauda supra.

Aldomen pallido virescens.

Remiges supra virides, margine anteriori & sub-
tus ferruginei, apice nigri; remigum omnium
rachis ferruginæa & omnes remiges subtus fulci.

Rectrices XII æquales, intermediis duabus longio-
ribus, attenuatis, omnes apice obtusi, emar-
ginati, præter intermedios duos, omnesque su-
pra coerulecentes, margine interiori fulci sed
extimus Rectrix utroque margine fuscus est.

Pedes nigri, tetradyctyli, digitis tribus primori-
bus coadunatis, ultra medium absque membrana.

6. SITTA, (ano sanguinæ,) *palpebra inferiori*
purpurea.

Käukai Kann *chinensis*

e China attulit D9 Petrus O'sbeck.

Rostrum nigrum, modice cultratum, maxilla su-
periore intra apicem utrinque emarginata.

Caput supra nigrum, lateribus & gula album

Dor-

Dorsum Griseo fulcum.

Collum subtus cinetum fascia fusca.

Pectus & *Abdomen* subcineræa.

Ani regio sangvinæa.

Alæ rotundatae Remigibus fuscis.

Rectrices sub aquales, minus rigidi nigricantes,
exterior apice interiori alba.

Pedes nigri, tetradyctyli, postico crassiori.

7. PELECANUS (*cauda forcipata*) niger, capite ab
domineq; albis.

Albitros Grew. mus. t. 6. f. 1.

Man ofvar, Sloan. Jam. 1. p. 30.

Edw. t. 88.

Magnitudo fere anseris, *Dorsum* fusco ferruginæum.

Alæ ferragineæ, Remigibus nigris, longissimis, ut
inter extremitates alarum VI pedes sint.

Cauda forcipata: *Rectribus* XII, nigris.

Caput album, *Gula* unda, *Pectus* & *abdomen* alba.
Rostrum fuscum, capite longius, edentulum, api-
ce incurvo, superioris maxillæ admodum arcu-
to & acuto.

Pedes tetradyctyli, parvi, digitis omnibus com-
muni junctis membrana. Avis in insula Ascensio-
a D:o P. Olbeck capta, ubi homines accedentes
metuere neicit, qvod commune est avibus, altum
mare & insulas ejus inhabitantibus,

8. PELECANUS (*piscator*) rostro serrato, cæda cuneiforme.

* Anseri bassano affinis fusca avis. Sloane Jam.

Raj. av. 191.

Catesb. carol. I. p. 87. t. 87.

G. Anseri basilano congener cineræo albus. Sloan. Jam. pref. 31. t. 6. f. 1. Raj. aves 191.

Bubbi chinensis.

hujus duo adiunt sexus.

MAS (α) totus niger, abdomine canescente.

FOEMINA (β) tota albida, remigibus nigris.

Rostrum utrisque gibbum, in fœmina præcipue sanguinæum, margine tenuissime retrorsum ferrato,

Gula nigra.

Corpus magnitudine anatis majoris.

Pedes sanguinæi, magni, tetradactyli, digitis omnibus communi membrana junctis, ungvis inter medii margo interior dilatatus & fere pectinatus.

Ale utriusque sexus subtus albicant.

Rectrices caudæ XIV, interioribus sensim longioribus, in fœmina etiam parum fuscescentibus.

hanc D^o Petr. Ofbeck e China adduxit.

Quantum ex Peregrinatoribus per chinam, eorum que diariis, conjicere licet, haec illa sit avis, quam chinenses domitam in naviculis suis conservant, & ad pisces capiendos quotidie emittunt, quos domino suo adfert, quum eos ob annulum collo impositum deglutire nequeat; singulare piscaturæ genus!

9. STERNA (*stolida*) nigra, fronte albicante, cauda cuneiformi.

Hirundo marina major, capite abbo, Sloan. Jam. I. t. 6. f. 2.

Ca.

Catesb. carol. I. p. 88. t. 88.

Passer stultus Hernandez.

Corpus magnitudine sternæ marinæ, totum fuscum;

Frons a rostro ad verticem capitis cineræo albicans.

Remiges nigræ.

Rectrices nigræ, qvarum laterales paulum breviores.

Rostrum subulatum, parvum, declive, apice compressum, carina vix manifeste gibba; *Nares* oblongæ, perviæ.

Pedes tetradaetyli, digitis tribus membrana palmatis.

10. PROCELLARIA (capensis) albo fuscog. varia.

Edw. t. 90.

Columba capensis vulgo.

Pintados Lusitanis.

est avis gregaria pelagica, ad elevationem XXIX graduum australium, inter Caput bonæ spei & novam Hollandiam obvia, ubi naves & puppim sequitur. Capta a D:o O'beck.

Magnitudo columbæ.

Caput totum nigrum.

Dorsum & *rectrices* alarum albicantia, maculis sparsis, fuscis. *Subtus* tota avis, *Collo*, *Pectore* & *Abdomine* alba.

Remiges primores nigri, latere interiori albi; *Remiges* secundarii albi, apicibus nigris.

Cauda integra; *Rectricibus* XIV, a basi ultra medium albis, & dein apicem versus nigris.

Rostrum atrum, subtus cylindrico depresso; *maxilla* superiori apice adunca; inferiori apice compressa,

i. pressa, canaliculata, obtusa. Nares supra medium rostri, instar cylindri truncati
Pedes tridactyli, palmati; *ungibus* nigris; *Digitus* posticus nullus, sed ejus loco tantum ungvis.
Rostrum & *Pedes* eorumque figura, evidenter docent, hanc avem ad genus Procellariæ pertinere.

ii. TURDUS (*chinensis*) griseus, subtus ferrugineus,
linea alba ad cutem capit is

Whämmaj *chinensis*.

• *China* attulit D^rg Osbeck.

Magnitudo turdi vulgaris, supra rota grisea, subtus ferruginea.

Ale rotundatæ; *Remigibus* subtus tuscis, extrorsum griseis, *lineolis* transversis tuscis vix manifestis.

Cauda rotundata tusscens, fasciis transversis, numerosis, obsoletis, saturatius fuscis.

Ab oculis versus occiput *lineola* alba, e pennis albis pluribus, pulchre notant hanc avem.

Rostrum & *Pedes* pallidi.

12. TURDUS. (*hoematodos*) ater, pectore coccineo.

Mus. Reg. 18.

Edw. ornith. f. p. 82. t. 82.

Magnitudo est statura Turdi aut Sturni,

Corpus atrum, subtus gula & pectus abdomen usque ruberrima, ut & flexura alarum antica.

Rostrum nigrum, modice convexum, fere ut in Sturno, longius & acutius quam in congeneribus, ut figura rostri proprius accedat ad turdos, quam

ad

ad emberizas. Rostrum maxilla superior, basi angulo acuto, capiti inserta, & quasi ad basin curva, fere ut in loxiis, sed rostrum magis angustum quam in loxiis nobis cognitis; Nares juxta basin superne tectae quasi tamula convexa; vibræ nullæ.

Remiges nigri, immaculati.

Rectrices XII. fere æquales, nigri, immaculati, sed duo intermedii angustiores & apice fere letacei. *Pedes* pallide fusci, ungvis posticus reliquis paullo longior & validior; ungvis intermedius margine interiori latior, digitus laterales & ungues minores inter se æquales.

Avicula est speciosissima colore atro & coccinæ.

13. LOXIA (*Cardinalis*) rubra, fronte nigra.

Willub. ornith CCXLV t. 44. f. 2.

Coccothraustes capensis ruber, rostro hiante, Pet. GAZ. 16. f. 16. t. 7.

Coccothraustes rubra, Catesby Carol. I. p. 38- t. 38.

Erisch Anes I. t. 4. f. 1.

Coccothraustes indica cristata. Albin, ornits I. t. 57.

Magnitudo loxiæ curvirostræ. *Corpus* fere totum sanguinem;

Frons, rostrum undique cingens, nigra,

Dorsum fusco rufescens.

Remiges fusco rufescentes, margine utroque purpurecentes.

Caput, Pectus, Abdomen & Pennæ sub cauda coccinæ.

Cauda longa, integra, vel *Rectrices* laterales paulo breviores, omnes fusco purpurecentes. Ro-

Rostrum incarnatum, crassissimum, gibbum, fronte calva; *Nares* ad basin rostri patulæ; *Vibrizæ* in cumbentes nigræ, ad basin rostri.

Caput non cristatum, licet pennæ tectrices versus occiput longiores sint, quas avis terrefacta erigit cristæ instar.

14. LOXIA (*erythrocephala*) *nigra*, capite gulaque coccineis, pectore abdomineque albis.

Magnitudo *fringillæ*. *Corpus* maximam partem nigrum, uti *Dorsum*, *Alæ* cum remigibus, & *Cauda* cum restringibus.

Caput supra & subtus coccinæum.

Jugulum sive *Collum* subtus itidem coccineum.

Pectus, *Abdomen*, *Femora*, *Collum* maximam partem alba,

Remiges margine anteriori minutissimo & vix manifesto albi;

Rectrices æquales, quorum exteriores utrinque IV. apice albo & extima margine laterali magis fusco quam nigro.

Rostrum pallidum, breve & convexum, ut in congeneribus, *Nares* ante basin patulæ, & postice margine gibbo cinctæ, basis rostri in maxilla superiori, sinu obtuso capiti insertum, ut caput ad basin rostri nonnihil calvum evadat.

Pedes pallidi; *Unguis* posticus validior & magis compressus.

15. LOXIA (*sangvinirostris*) *rostro pedibusq; sangvineis* corpore supra griseo, subtus pallido.

Corpus magnitudine ligurini.

RE-

Rostrum crassum, saturate sanguineum, angulo nudo fronti insertum. Nares ad basin rostri semitectæ.

Frons plumis minimis nigris tecta, ut & gula,

Caput, Collum, Dorsum & Ale supra fulco grisæa.

Pectus & Abdomen albido flavescentia.

Flexura ale albido flavelcens.

Remiges fulci, margine exteriori vix manifeste flavelcente.

Rectrices sub æqvales, margine exteriori minime flavescente, & interiori vix manifeste albicante.

Pedes pallidius quam rostrum incarnati, Digihi laterales æqvales, posticus crassior.

16. LOXIA (oryzæ) fusca, temporibus albis,
Loxia remigibus rectricibusq; nigris Mus. Ræg. 18.

Edw. t. 41.

*Corpus magnitudine passeris canariensis, fuscum,
tempora alba, Abdomen & femora grisæa.*

Remiges nigricantes

Rectrices æqvales, nigri.

Rostrum crassissimum, angulo recto frontem capitis intrans, incarnatum. Nares ad basin rostri quasi a postico parte rostri, antice ruga rostrum exarantes.

Pedes pallidi, angues compressi.

Pennæ tectrices interiores Caudæ, albicantes.

fertur hæc avis mire distruere agros oryza consertos, in java & ad Caput Bonæ spæi.

17. LOXIA (flavicans) flava, dorso virecente, capite fulvo

C

Cor-

Corpus magnitudine passeris canariensis.

Caput, Collum, Pectus, Abdomen, Femora, Urrhopygium,
colore sulphuræo sive flavo, picta sunt.

Caput supra pallide fulvum,

Luteo virescentia sunt dorsum, alæ & cauda, alo-
rum flexura anterior, margine & subtus flavissima.

Remiges fulci, margine externo & interno sulphuræo.
Rectrices fulci, utraque margine flavescentes.

Rostrum brevissimum, convexum & crassum, ma-
xilla superiori sinu caput intrante.

Pedes pallidi, Ungue posteriori validiori.

23. LOXIA (cœrulæa) viridi cœrulæa, remigibus re-

fricibusque nigris.

Edu. Ornith. t. 125.

Magnitudo pyrrhulæ, vel fere curvirostræ.

Corpus, Capite, Dorso, Collo, Pectore, Abdomi-
ne, tectum plumis. fasciis, apice viridi coeruleis,
ita ut fulcus color ubique occultetur a pennis in-
cumbentibus, color autem coeruleus quasi viridi
intime mixtus, ita ut præsertim in capite, diffi-
cile sit determinare, utrum prævaleat color viri-
dis, aut cœruleus.

Regio inter rostrum & oculos nigra.

Rostrum breve, plumbeum, crassum, fronti an-
gulo nudo insertum. *Neres nudæ, subrotundæ,*
Kibrizæ ad latera rostri paucæ.

Pedes pallidi.

Remiges nigri, immaculati.

Rectrices longiusculi, sub æquales, nigri, im-
maculati.

19. LO-

19. LOXIA (fuscata) remigibus a tertia ad novam, basi omnioto albis.

Magnitudo passeris canariensis, adeoq; in suo genere facile minima.

Corpus supra fuscum, Capite, Collo, Dorso, Alis, Cauda; subtus vero pallidum, scilicet Gula, Collo subtus & Pectore cinerescentibus. Abdomine albidum Ani regione & tectricib; inferiorib; caudæ alba. Remiges fuscæ vel potius nigricantes, remex primus totus nigricans, tantum margine tenuiore versus basin albido.

Remiges 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. nigricantes, sed ab basin omnes toti albi; reliqui remiges nigricantes, sed latere tenuiori a basi ad medium albi. *Rectrices nigricantes, sub æquales, apice parum & vix manifeste obsoleti.*

Rostrum breve, crassissimum, plumbeum, basi insertum fronti angulo nudo; Nares subrotundæ ad basin rostri, & a parte rostri postica; Vibræ parvæ, vix manifestæ.

Flexura alaruim, vix manifeste, præsertim subtus, albicans.

Pedes pallidi, Digitis lateralibus inter se æqualibus posticus vero ungue crassiori.

20. EMBERIZA (mixta) grisea, pectore gulaque cœruleis, abdomine albo.

Corpus magnitudine ligurini.

Rostrum pallidum, crassiusculum, minus tamen quam in loxiis, Maxilla inferior ad latera baseos valde gibba; maxilla superior basi nonnihil compressa.

prella, angulo acuto capiti inserta; *Nares* subrotundæ, a parte postica maxillæ; *vibrizæ* nigræ, *Colo* corporis supra in capite, *Collo*, *Dorso*, *Alis*, griseus, cum interlucentibus hinc inde subcærulecentibus pennis, ut mihi dubium sit, numne color griseus mutetur in cœrulæum. *Caput* ad aures, *Gula*, *Pectus* & *Flexura alarum* viridi cœrulea; *Abdomen* album, tectum pennis ad basin fuscis.

Femora grisea, cum sparsis pennis coerulecentibꝫ. *Remiges* fuscis, omnes margine tenuiore albicante, sed primores margine exteriori tenuissimo, & vix manifeste coerulecente.

Pedes pallidi, digitis longiusculis, lateralibus, postico crassiore,

CLASSIS IV.

PISCES.

21. **LOPHIUS** (*tumidus*) *pinnis dorsalibus tribus*,
Mus. reg. 56.

It. Wgoth. 137. t. 3. f. 5.

Corpus lividum, pictum maculis, sive characteribus albis, fuscisque, non modo ad latera, sed & in ipsis pinnis.

Pinna supra caput, mollis, subulata, & ante hanc pinnum seta parva, cum ramento terminali;

Pinna supra pectoralis mollis, unico radio.

Pinna *dorsalis* proprie sic dicta, radiis XII, molibus quorum duo posteriora bifidae

Pinnae Pectorales, pone ventrales brachio instructæ, radiis x. pedes palmatos referentes.

Pin-

Pinnae ventrales basi coalitæ, radiis V.

Pinna ani radiis VII. duobus primis indivisis mollibus.
Pinna Caudæ rotundata; radiis IX, bifidis, extimo utrinque indiviso.

*Corpus, sed præsertim abdomen, & Gula, ramen-
tis cutaceis, adiposum, denticuli in ore acerosi.*

22. **BALISTES** (*capistratos*) *lineis nigris ab oculis
radiantibus.*

*Corpus ovatum, oblongum, compressum, tectum
sqvamis rhombeis, scabris in quincuncem dispositis
cinereum, subtus albidum & magis scabrum.*

Ab oculis, lineæ nigræ undique radiant.

*Linea latiuscula nigra, a naribus versus pinnas
pectorales, descendens & alia ejusdem latitudinis,
ab apice labii superioris, versus pinnas pectora-
les, cum priori parallela.*

*Pinna dorsalis prior, radiis 3 squamosis, quorum
primus major & antice scaber.*

*Pinna dorsalis posterior antice acuminata radiis
XXX, mollibus.*

*Pinnae pectorales radiis XVI. ante hos aculeus an-
trorum protensus.*

*Pinna ventralis longitudinalis, ad basin muricata,
radiis XIV. spinosis, brevibus.*

Pinna ani radiis XXVIII mollibus.

Pinna caudæ bifurca, acuminata, radiis XII.

Verrucæ nullæ ad latera caudæ.

*Plurima habet communia cum *Balistæ* rigente. Mus.
Reg. 58.*

23. OSTRACION (*hiapidus*) *tetraodon*, *ventricosus*,
corpore toto muricato,

In *amoenitatibus academicis*, vol. I: p. 330. t. 4.
f. 4. *piscis* huic maxime affinis describitur, plane autem distincta specie, hic enim corpore non levi est, non compresso, & ad nares insuper lamellis gaudet, totaque structura differt.

Corpus ovatum, *ventricolum*, *tectum undique excepto ore & cauda*, *setis rigidissimis*, *brevissimis obtusisculis*, *unde admodum scabrum*, *insuper supra fuscum*, *subtus pallidum*.

Labia crassa dentes tegunt.

Dentes primores duo, & totidem infra, uti in gliribus.

Oculi rotundi, *palpebris crassissimis*.

Narium loco, utrinque duo ramenta cutacea, mollia, oblonga compressa, parallela.

Pinna dorsi, *versus caudum sita*, *radiis VIII. vel IX.*, *mollibus, ramosis*.

Pinnæ pectorales brevissimæ, *latæ & obtusæ*, *radiis XVII. vel XVIII.* *sitæ pone riman respirationi dicatam*.

Pinne ventrales nullæ.

Pinna ani *opposita pinnæ dorsi*, *eiusdemque magnitudinis*, *radiis X.*

Pinna Gauda rotundata, *radis X.*

Cauda brevis, *pone pinnas dorsi & ani*.

Piscis hic itaque proxime convenit Ostracioni ventricoso; *Mus. Reg. I. p. 59.*

24. SCÆNA (*fasciata*) *fasciis decem*, *maculaque opercularum fuscis*.

Cor-

Corpus lividum, fere uti parallelogramma extensum fasciis transversis, plusquam x fuscis.

Caput a tergo maculatum, & macula fusca ad extremitatem operculorum branchialium.

Pinna dorsalis radiis XX, qvorum XIII primores breviores, spinosi.

Pinne pectorales radiis XI.

Pinne ventrales radiis VI, primo spinoso; duo in letam exeuntes.

Pinna ani radiis XXVIII. primis XV spinesis, brevioribus, omnibus simplicibus.

Pinne cande radiis XVI.

25. CHÆTODON (pinnatus) grisæus, fascia frontali apiceq; caudæ albis. Mus. Reg. 64. t. 33. f. 6.
in hoc pisce *Pinna dorsi*, *ani*, & *ventrales*, longissimæ. & ipsa cauda longiores, solis pinnis pectoralibus parvis; in pinna dorsi vero, radios molles vix ultra XXX, in nostro specimine observo.

26. CHÆTODON. (argenteus) pinnis ventralibus ex spinis duabus.

Corpus figura zei nomeris, mus. Reg. 67, compressum ut in *Plevronecta*, latius quam longum, testum squamis parvis, levibus, minimo argenteis. *Oculi sangvinei.*

Maxillarum margines, *dentibus* vix conspicuis, *flexilibus*, *exasperati*. *Opercula branchiarum argentea*, *levia*.

Membrana branchiostega, *radiis VI.*

Pinna dorsalis, squamis tecta, falcata, constans
ra-

radiis xxxii, qvorum 1. 2. 3. spinesi & sensim breviores, 4 simplici molliori longo, reliquis sensim brevioribus ramosis.

Pinne pectorales ovatae, radiis xvi, mollibus, qvorum 12. sensim breviiores.

Pinne ventrales nullae, qvorum loco *spine* duæ, breves, rigidæ.

Pinna ani magnitudine & figura dorsalis, talcata, & squamis tecta, constans radiis xxxii, qvorum 1. 2. 3. breves, sensim longiores, validi spinosi. 4 longior simplex, mollis, 5 inter longissimas cum sequentibus brevioribus ramosis.

Pinna caudæ biturca, radiis xvii.

27. SCOMBER (*tabellatus*) *linea laterali* *squamis lati* *pinnata*.

Scomber linea laterali curva, tabellis osseis muriata, corpore lato & tenui, Gron. act. Ups. 1744. p. 36. Membrana branchiostega radiis vi.

Pinna dorsi anterior radiis viii, rigidis & spinosis.

Pinna dorsi posterior radiis xxxiv.

Pinne pectorales radiis xviii, primo brevissimo & adnato.

Pinne ventrales radiis vi. primo indiviso.

Pinna ani radiis xxx, praeter spinas duas primores brevissimas, spinolas, crassiores, spatio remotas.

Pinna cande radiis xvii.

Corpus supra angulo acuto carinatum;

Linea lateralis, a capite ad caudam extensa, singularis omnino, squamis lateralibus utrinque eniformibus, pinnata, hæc in medio deorsum curvata, & deinceps

& dein magis carinata, spinis subulatis imbricatis,
ut pīcīs postice tetragonus evadat.
Os interne scabrum.

Opercula branchiarum levia.

Oculi magni, a parte postica membrana lata nicti-
tante, instructi, qvæ dimidium fere oculi ocupat.

28. GOBIUS (nebulosus) *pinna ani radiis novem.*

Membrana branchioſtega radiis v.

Lingua obtula levis. *Dentes* in utraqve maxilla par-
vi acuminati, *Oculi* a tergo capitisi.

Pinna dorsi anterior radis vi, acuminatis, mollibus,
simplicibus,

Pinna dorsi posterior radiis xi.

Pinne pectorales oblongæ, radiis circiter xx.

Pinna ventralis radiis x, antice membranula con-
nexa, ut fere infundibuliformis,

Pinna ani radiis ix.

Pinna Caudæ integra, rotundata, radiis ix.

Pīcīs totus una cum pinnis, nebulosus.

29. GOBIUS (pectinirostris) *dentibus maxillæ inferio-*
ris horizontalibus Fig. 3.

Corpus molle squalamis vix conspicuis & fere nudum.

Membrana branchioſtega radiis iii.

Maxilla superior, *dentibus* acerosis, minutissimis,
exasperata, sed nullis ad basin, *Canini* utrinqve iii.
longiores; *Primores* nulli.

Maxilla inferior fere plana, Margine ciliata, *Den-*
tibus fetaceis, horizontalibus, patentibus extra ma-

xillam, obsfuscusculis & tere marginatis, Canini duo inflexi; Primores nullæ.

Lingua nuda.

Pinna dorsalis anterior, punctis albis adpersa, radiis v, simplicibus, mollibus in setas excurrentibus. *Pinna dorsalis posterior*, radiis xxvi mollibus, simplicibus, ad basin maculis albis & nigris, versus apicem vero, fascia longitudinali alba.

Pinne pectorales, radis xix mollibus.

Pinne ventrales sub pectoralibus, postice connexæ, ut unum omnino constituant, constantes radiis xii.

Pinna ani ab ano ad caudam tere extensa radius xxv.

Pinna caudæ acuminata, radiis xv.

Oculi in vertice capitis admodum approximati.

30. MYSTUS (altus) corpore obato.

Corpus figura cyprini compressum.

Membrana branchiostega radiis v.

Pinne dorsi in medio dorsi, radiis xiv.

Pinne pectorales, radiis xiii.

Pinne ventrales, radiis viii.

Pinna ani radiis xxviii. distincta a pinna caudæ.

Cauda bifurca radiis xxi.

Abdomen a gula anum usque carinatum, & ferratum denticulis xxx.

Maxilla superior, apice obtuso & breviori est.

Affinitate iungitur cum mysto seqventi, quamvis specie diversissimæ, uterque Clypeo affinis est, licet membrana branchiostega differt.

31. MYSTUS (ensiformis) corpore ensiformi Fig. 12.

Membrana branchiostega radiis ix.

Ca-

Caput leve, superne inæqvale, *Or* interne scabrum;
Maxilla superiores capite longiores membranaceæ,
ensiformes antice denticulatæ.

Branchiae IV, singulari modo introrsum pectinatae.

Pinna dorsi in anteriori parte corporis, radiis XII,
mollis, lanceolata.

Pinnae pectorales longissimæ, radiis XVII, longitudine
pertingentes ad apicem pinnæ dorsalis.

Pinnae ventrales brevissimæ, radiis VI.

Pinna ani ab ano ad caudam extensa, & cum pin-
na caudæ coadunata, linearis, radiis LXXXIV.

Pinna caude integra, radiis XI.

Corpus album, maxime compressum, levc; Abdo-
men a capite ad anum carinatum & serratum den-
ticulis seu spinis minmis.

Piseis malacopterygius, figura cultri.

32. CYPRINUS (auræus) *Mus. Reg.* p. 77. *Act. Stocck.*
1740. p. 403. t. I. f. 3. 8. *Fn. Sp.* 331. T. 2.
hunc piscem omnium fulgidissimum, a China vivum
ad terri curavit & diu alit, Nobilissimus D. Lagerström.

CLASSIS V.

INSECTA.

33. CANCER (retusus) *brachiurus*, fronte rotusa; te-
stæ lateribus transversim striatis Fig. 10.

Corpus magnitudine pomi, totum cum testa & pe-
dibus rufescens, maculis pallidis.

Testa totundata, convexa, vertice dorsi transversim
D 2 quasi

qvasi rima depressa notato. *Latera testæ levia, striis transversis, qvasi antrorium imbricatis.*
Caput supra verrucosum, Antice valde retusum, cum duobus punctis prominulis in disco, margine interiori obtuso, obsolete crenulato. Pone singulum oculum margo testæ dupli denticulo notatus, alias integer.

Antenne brevissimæ, vix manifestæ.

Brachia brevissima, trigona, rugis imbricata, angularis inferioribus dentata.

Corpus supra verrucosum, latere interiori spina ova-to lanceolata auctum.

Chele rubræ, parvæ, supra duobus tribusve angularis muricatis.

Digitæ obtusi, intus excavati, extus transversim infra apicem linea punctati.

Pedes utrinque qvatuor, Femoribus compressius sculis ad apicem subdentatis. unges simplices, subulati, acuti, lateribus quadritariam aculeati.

Cauda arcte inflexa, simplex.

34. JULUS (fuscus) pedibus utringue cxxviii.

Corpus crassitie pennæ cygneæ, spitameum, constans segmentis lividis LXIV, margine fulcis.

Pedes pallidi, cxxviii. parium.

Antennæ clavatæ, articulis vi.

35. JULUS (crassus) pedibus utringue xcvi.

Corpus crassitie digitæ, pallidum, constans segmentis XLVIII, magne flavescentibus, instructum pedibus xcvi parium, pallidis, sive flavescentibus.

Antennæ flavescentes, capitatae, articulis vi.

36. JULUS (ovatus) *pedibus utrinque XX. Fig. 4.*

Corpus tere ovale, livido fulcescens, glaberrimum, tectum segmentis XII, quorum primum & ultimum segmentum quartam globi partem refert.

Caput obtusum, fulcum, punctis excavatis adpersum. Antenne filiformes, crassiusculæ, articulis VI subglobosis constantes.

Pedes utrinque XX, compressi, terminati ungve inciso, cum spina erecta a tergo.

CLASSIS VI.

VERMES.

37. HIRUDO (muricata) *Mus. Reg. 93. t. 8. f. 3.*

Animalculum in museo Regio descriptum & delineatum, sicco pede transeo.

38. NEREIS (cœrulæa) *Mus. Reg. 1. p. 93.*

Color huic omnino æneus.

Corpus refert julum, pedibus innumeris utrinque notatum.

39. NEREIS (sacculo induta.) *Fig. 5.*

Hoc animal maxime singulare, quasi medium inter hirudinem & nereiden, coeruleum, nitidum, altera extremitate attenuatum, cylindricum breve.

Corpus constat cylindro crassiore, induto membranæ pellucidæ, laxæ nec adhærenti, decussatim striato. Cujus membranæ altera extremitas, animali interiori longior, ventricosa, longitudinaleiter striata.

40. PHYSIS (pelagica) *Fig. 6.*

Animal hoc in altissimo tantum pelago occurrit,

& natat, Nautis, quibus notissimum dictum *Bydevinis Seglare*. Hoc qvod in museo reservatur, tota structura ita a reliquis animalibus omnibus differt, ut viX describi queat, optamus itaq; ut aliquis vivum animal examinaret & delinearet; sed cum non omnibus liceat adire Corinthum, in structura externa conqvieicendum.

Corpus oblongum, inflatum, membranaceum fuscum dorso carinato, crenato; altera extremitate obtutum, & tere cavum; altera vero terminatum rostro attenuato, recurvato; e medio ventris exit seta longissima, crassitie fili, basin versus crassior & rugola, cæterum laevis.

41. TETHYS (*mentula*) *Mus. Reg. I. p. 93.*
Descriptio data est in museo Regio.

42. MENTULA (*marina*) *cylindrica striis annularibus, glande striis longitudinalibus elevatis.*

Corpus pallidum, penem qvodammodo referens.

Truncus longitudine & crassitie pollicis, cinctus striis annularibus XL.

Basis ipsa constat rugis cxI terminalibus, papillis subulatis, mollibus.

Glans ovalis exaratum striis xxiv, muricatis; Os glandis cinctum ruga seu fulco profundo, in cuius centro concavitas, cincta Ungvibus XII, incurvis, prominet rostro cylindrico, radiis composito.

43. MEDUSA (*orbicularis*) *orbicularis, supra plana, subtus sulcata, villosa. Fig. 7. 8.*

Rarissimum animal, ex indiis allatum, gelatinoso car-

cartilagineum, magnitudine seminis lupini majoris. Corpus orbiculatum, planum, integerimum, supra (fig. 7.) substriatum striis tuberculatis, ut tulercula annulos concentricos obsoletos referant; subtus (fig. 8.) convexum, centro concavo fulcillum a centro versus marginem, & totum subtus tecum quasi vellere mollissimo, & papillis lateris. Animal hoc, exceptis villis subtus, quoad magnitudinem, crassitatem figuram, strias, sulcos, reliquaque omnia, petrificato PORPITES (fig. 9.) dicto, & in amoen. acad. 1. p. 91. t. 4. f. 5. depicto, tam simile, ut ectypum suo Protypo non melius responderet. Nemo igitur inficias forsitan ibit, quin Porpites sit petrificatum hujus animalis, quamquam ex india allatum sit, & porpites apud nos vulgatissimus. Generationem itaque porpitorum, ex materia calcarea, stellas madreporae simplicis implente non opus est fingere; inde enim porpites, nec in latere interiori concavitatem centralem, nec in latere superiori, radios obsoletos vel puncta annularia concentrica, si natus esset; de quo in museo Tessiniano p. 96. ad *Helmintholithem Porpitam*: Protypus hujus est medusa parva, figura & magnitudine omnino Porpitae. Animalculum ex india orientali, inter sargazo lectum, allatum est museo Horti academicici upsalensis transmissum, a N. D. Lagerström consiliario commerciorum, ut de lapide hoc, dubium in posterum, non sit.

44. ASTERIAS (lunata) semiorbiculata Fig. 14.
Corpus depresso, referens lunam dimidiatam, cum suis

suis cornibus, adspersum undique punctis obsoletis,
absque oris aut ani vestigio.

45. ASTERIAS (decacnemos) *radiata, radiis V. geminatis,*
superioribus pinnatis, inferioribus filiformibus.

Stella chinensis perelegans, dupliciter radiata.
Pet. GAZ. T. 4. f. 6.

Stella marina decacnemos fimbriata. *Barrel t. 1282 f. 1.*

Corpus baseos vix manifestum, exteriorans Radios superiores & interiores x. Radii superiores x, digitales, per parva, ad basin conjuncti, singuli radii alternatim imbricati radiati secundum totam longitudinem, radiis numerosissimis, sensim attenuatis, imbricatis; Radii inferiores breviores, filiformes, articulati, simplicissimi, angustiores.

46. CHITON (punctatum) *corpo punctato, testis octo.*

Corpus ovale, album, adspersum punctis excavatis. Testae VIII, transversim oblongae, lateribus rugosae, fuscæ, limbo fusco, absque angulis.

47. PENNULA (phosphorea) *rachi summitate undique pinnata.* *Mus. Reg. I. p. 96.*

Corpus sanguineum referens pennam avis constans Rachi longitudine digiti, crassitie pennæ anserinæ, interne cylindrica, glabra, basi mollissima pallidiore, superne scabra, pinata, Radiis parallelis, compressis, approximatis, numerosissimis, secundis, latere in teriori radiis minoribus, pectinatis, hiradu-
in-

inferne minores sunt, & sursum sensim maiores, molles.

Dubius hærerem, utrum hoc corpus vegetable vel animale esset, si non inseqventem speciem, Lophio tumido insertam, parimodo ac Lernæa carassi *fn. s. b.* 1282, & basi sua ad partem dimidiam corpus Lophii oblique penetrasse, vidissim; unde verisimile concludere possum, animal, & fertulariis affine, esse, quanquam non articulatum. Shavius hanc in fundo maris, circa oras barbariæ, abundanter reperiri, ibique candelæ instar, per noctes lucere, ut pisces supernatentes & videri & numerari queant, commemorat; unde, hanc pennam, campanis urinatoriis loco candelæ inferire posset.

48. PENNULA (fagittata) rachi apice nuda Fig. 3.

Corpus, vix pollicis transuersi longitudine, refert pennam seu potius fagittam pennatam, cuius Rachis cylindrica, baseos longior, levis, teres, inserta Lophio tumido, sumitas vero radiata brevior, levis, angustior, pinnata utrinque radiis patentibus, simplicibus, filiformibus, pluribus. Apex nudus, obtusiusculus.

49. POLYPUS (mirabilis) *Maf. Reg. I. p. 96. t. 19. f. 4.*

hic pennæ phosphoreæ admodum affinis, albus tamen:

Basis levis & parva; *Rachis* in dorso sulcatus & *Radii* lunares, breves, pectinati, mollissimi, subrotundi, albi, distantes.

50. POLYPVS (conglomeratus) Fig. I.

Crassities caudis pennæ tenuioris est, consistentia fili, longitudine pollicis, qvi basi tanquam radice adnectitur corpori solido, apex vero dividitur in ramos plurimos, inordinatos, brevissimos, irregularis, minime articulatos, qvi iterum subdividuntur in ramulos pari ratione multifidos, summis apicibus obtusis, crassitaculis, conniventibus.

Inter polypos hodie cognitos hic maximus est, nec ex aqua dulci extractus, sed de Pelago, cujus genuinam figuram exhibere non licet, nisi ex specimine vivo, qvod nobis deest.

51. MADREPORA (*polygona*) *aggregata*, *stellis cylindricis duodecim radiatis*, *cum intermixtis majusculis, conuexis, cavis.* Fig. 15.

hæc, ingentem valvam matricis perlarum, a latere exteriore, crassitate pollicum duorum, undique tegit; & constat stellulis parvis, intus dissepimentis XII, in loculamenta XII, distinctis, inter quas aliæ stellæ majores, paulo magis elevatae, in centro foramine ovali hiantes, & intus omnino cavæ, cavitate cylindrico ad testam usque pervia. Corallium adeo peregrinum se nobis sifit, ut nullum autorem in memoriam revocemus, qvi hujus mentionem fecerit.

Postquam historici naturales recentioris ævi, observarunt, madreporas a vermibus vel medusis, in societate viventibus, construi, minus alienum foret si conjiceremus, in hoc corallio, prout apud formicas & apes, diversos esse sexus; & animalia stellas majores inhabitantia, foecunda, & in minoribus, neutra, esse, qvod heic tantum monemus,

ut

ut si oculati spectatores incident in eandem Ma-
dreporam vivam, non prætermittant in hanc rem
acutius inquirere.

52 CORALLIUM (*chinense*) *albastrinum*, *polimor-
phon* Fig. 1.

Lapis hic a sinensibus, in vasculis & tapeziis illo-
rum, in petrarum rupitumque perforatarum spe-
ciam, depictus, ubique occurrit.

Lithologis incognitam adeo speciem lapidis e china
huc transferri curavit, N. D9. Lagerström; con-
stat non rupe sed lapide libero, spicami magnitu-
dine, crasso & variæ strukturæ, ut duo vix similia
reperiantur. Albidus est, semipellucidus ut ala-
bastrum, cum aqua forti non effervesces, quo
a reliquis differt coralliis; præterea nec poros nec
stellas habet, & cultro radi potest; substantia in-
terna homogenæa, impalpabilis & æqualiter com-
pacta, ut tophus non sit; hinc inde maculæ in-
æquales fulcæ, cum aqua forti effervescentes, in
superficie externa occurrunt: levis plerumque est,
interdum rugis subparallelis, inæqualibus, notatus.
Ossi aliquantum similis, notabili tamen pondere,
& omnino lapidæus. In littoribus a mare ejectus
reperitur; & cavitates illius a zoopltyis exsculptas
esse, valde probabile videtur.

REGNVM VEGETAB LE
CLASSIS XXIV. CRYPTOGAMIA.

A' GÆ

53. FUCUS (*tendo*) *spec. Plant.* 1162 n. 27.

Fucus indicus teres, setam pilcatoriam referens,
longissimus Plukken. *Alm* 160. t. 18 f. 8, *Fucus*

Fucus hic crassitie setæ suillæ, pallidus, longitudine VI vel VII pedum, teres, subdiaphanus, tenacissimus, instar tendinis, basi angustissimus, & fere capillaris, apice vero crassiore terminato granulo subovato mucilaginoso.

Singulare est productum mari, & quasi ab ipsa natura hominibus loco fili destinatum, qvo & chinentes summa cum utilitate, utuntur; qvod in fila contorquent triplicata, tanti roboris, ut manibus vix ac ne vix qvidem, a validissimo queant rumpi, qvorum specimina simul misa, in museo asservantur. Planta hoc tempore, botanicis minus est cognita.

TABULA

1	Polypus	<i>glomeratus</i>	50
2	Fucus	<i>tendo</i>	53
3	Gobius	<i>pectinirostris</i>	29
4	Julus	<i>ovatus</i>	36
5	Nereis	<i>sacculo induta</i>	39
6	Phylsis	<i>palagica</i>	40
7	Medusa	<i>orbicularis</i>	43
8	cadem.		
9	Porpites	<i>lapia</i>	43
10	Cancer	<i>retusus</i>	33
11	Corallium	<i>chinense</i>	52
12	Mystus	<i>ensiformis</i>	31
13	Pennula	<i>sagittata</i>	48
14	Asterias	<i>lunata</i>	44
15	Madrepora	<i>polygona</i>	51



