

4345
D. D.

D. D.

PLANTÆ SURINAMENSES,

177
BS

QVAS,

Venia Experient. Facult. Medicæ,
In Reg. Acad. Upsaliensi,

PRÆSIDE

Viro Nobiliss. atque Generoso,

D:NO DOCT. CAROLO
LINNÉ,

S. R. M. ARCHIATR. EQ. AUR. DE STELLA POL. MED. ET BOTAN.
PROF. R. O. ACAD. PARIS. PETROPOL. IMPER. N. C. HOLM. UPS.
LOND. ANGL. FLOR. BEROL. MONSP. TOLOS. BERN. EDINE. ROTER.
NIDROS. CELL. PHILADELPH. ZELAND. MEMBRO. ET EDINB. ASS.

*Publice Ventilandam Offert
Stip. Reg.*

JACOB ALM,
Uplandus.

In Auditorio Carolino Majori, Die XXIII. Junii,
Anno MDCCCLXXV.

Horis, ante meridiem, solitis.

UP SALIAE,
Typis EDMANNIANIS.

Kompl.

Rådmannen i Upsala Stad,
Herr ANDERS ALM,

Samt

Fru MARGARETA ALM,
Född HIULBERG.

Mine Huldaste Föräldrar.

*V*ist vore nu min fägnad stor
Om, jag min hulda Far och Mor
Nog vårdigt kunde prisa;
Men dygden loford ej begår,
Min vördnad åfven större år,
Ån jag med ord kan visa.

Med tacksam hand jag tecknar glad,
Så kåra namn på dessa blad,
Min trogna önskan blifver,
At Gud, som evig godhet bar,
Min hulda Mor, min kåra Far,
Beständig fällbet gifver.

Mine Huldaste Föräldrars.

Lydigste Son:
JACOB ALM.



Scientia crevit in dies, & inventuris inventa non obstant.

SENECA.

Felicitas scientiae botanicæ hujus seculi per disciplinam systematicam maxima cepit incrementa, ubi plantas ex interna structura, seu metamorphosi cognoscimus, atque inde eas in Clases Genera & Species distinguimus. Superiori seculo sufficere videbatur, si plantas Doctissimi C. Bauhini nominibus determinare quis posset; & quamvis vix plures, quam Europeæ plantæ, tum essent cognitæ, memoria tamen in nominibus detectorum vegetabilium exprimendis ac retinendis vacillabat. Hinc Botanicam scientiam quisque abhorrebat, cum tot nominibus memoria servandis vix ullus parem se judicabat. Proprio igitur pondere hæc cecidisset scientia, nisi methodum plantas ad propria Genera reducendas detexissent Botanici, unde introductus canon: *quæcunque plantæ Fructificatione convenient, Genera quoque convenient: & quæcunque Genere convenient, nomine quoque convenient.* Postmodum Botanici ad plantas Asiacæ, Africæ & Americæ remotissimas sua extenderunt pomoeria, atque ex earundem fructificatione plurima nova formarunt genera; unde Botanica scientia eam adepta est facilitatem, ut ope systematis, planta quævis quoties requiratur proprium quasi nomen daret. Plantas exoticas hoc ævo solicite conquisiverunt Botanici, maxime cum earum plurimæ in hortos nostros Botanicos nondum potuerint inferri; sed speciminibus ex-

A 2

sic

siccatis, contortis, & mutilatis fuerit saepe adquiescendum, e quibus partes fructificationis minutissimæ, optimas subministraturæ notas characteristicas, vix potuere investigari.

REX noster potentissimus atque clementissimus
GUSTAVUS III.tius, qui felicitati patriæ omni studio prospicit, & artes ac scientias propensissimo fovet studio, circa finem anni proxime præterlapsi, suspendam collectionem plantarum Indicarum, maxime ex Surinamo & finitimis in America regionibus Nob. D:no Præsidi gratiosissime donare dignatus est, ut orbi rarissima hæc detergentur naturæ miracula. Omnes hæc plantæ modo singulari & non antea a me viso conservatae erant, nimirum vivæ fuerant in solo natali decerptæ, eodemque momento in spiritu vini reconditæ, unde partes fructificationis etiam minimæ lucide explorari potuerunt, ac si in ipsa stirpe fuissent conspectæ, solo colore in petalis parum mutato. Hæc vero citra controversiam optima est plantas in usum Botanicum conservandi methodus, sed simul sumtuosa, uti hæc collectio, quæ pluribus spiritus vini doliis fuit injecta.

Mihi vero cum cæteris discendi cupidis maxima erat voluptas thesaurum adeo pretiosum intueri atque examinare, ad quem variae factæ sunt observationes, Botanicorum ut speramus, attentione dignæ. In his tredecim nova sunt Genera ^{a)}), quadraginta aut quinquaginta novæ species, quas omnes adcuratius examinare, descri-

^{a)} Nova Genera:	Ignatia.	Sophia.
	Pentstemon.	Gustavia.
	Vireta.	Unxia.
	Dodecas.	Ægopreum.
	Drupina.	Luffa.
	Symphonie.	Pubeta.
		Margaritaria.

scribere & cum erudito orbe communicare mihi nimis
operosum & hoc in loco sumtuosum foret. Breves igitur
has observationes botanicas Tuo B. L. candori hu-
millimus commendabo.

MONANDRIA.

Canna	91. <i>angustifolia</i> .	Weglopers Hagel-
Curcuma	89. <i>nova</i> .	Warimbo.
Myrrhina	64. <i>nova</i> .	Merian sur. t. 54.
	120. <i>nova</i> .	
Costus	136. <i>arabicus</i> .	Alpinia Jacq. amer. t. 1. Spica strobili Abietis simillima.

TRIANDRIA.

Tamarindus	45. <i>indicus</i> .	Stamina monadelpha tri- andra.
Commelina	25. <i>communis</i> .	
Cyperus	28. <i>obscurus</i> .	
	21. <i>obscurus</i> .	

TETRANDRIA.

Cistus	38. <i>trifoliatus</i> .	Scandit superatque altissimas arbores. Flos ruber. Fructus maturus niger.
Scoparia	83. <i>dulcis</i> .	Sibisibi. Pellit Bufones ex hortis.

PENTANDRIA.

Heliotropium	43. <i>indicum</i> .	Frequens in hortis nostris.
Convolvulus	144. <i>pentaphyllus</i> .	Scandens. Foliola integerima, pedicellata. Pedunculi longi, ramosi. Stigmata duo, obtusa. Capsulæ obtusæ.
Conocarpus	160. <i>racemosus</i> .	Jacq. amer. 80. t. 53. Folia opposita, petiolata, ovalia, coriacea. Stamina 5. stylus 1. Stigma simplex.

Mussænda	166.	<i>formosa.</i>	Jacq. amer. t. 48. Frutex.
Ignatia	98.	<i>nova.</i>	Sarmamentum scandens. Flos longus, albus, odore jasmini. Fructus magnitudo pugni, non esculentus.
Coffea	164.	<i>arabica.</i>	Sativa in America.
Chiococca	124.	<i>racemosa.</i>	
Cestrum	57.	<i>vespertinum.</i>	Frutex. Uſus pro foco.
Solanum	172.	<i>scandens.</i>	Calyx brevissimus, vix divisus, gibbus. Petala linearia. Folia inermia, ovata. Florescentia subumbellata.
	128.	<i>racemosum.</i>	Jacq. amer. 50. t. 36. Pedunli nutantes, apice crassiores. Flores Fructusque cærulei.
	11.	<i>subinerme.</i>	
	163.	<i>mammoſum.</i>	
	127.	<i>novum.</i>	
	20.	<i>obſcurum.</i>	Mer. surin. t. 6. Fruticosum, spinosum. Folia angulata, tomentosa, utriaque aculeata. Racemi secundi. Calyces inermes.
Pentstemōn	141.	<i>Chelonoides.</i>	Herba tripedalis. Flores lutei in altis arenosis.
Heliconia	88.	<i>Bibai</i>	Wilde Bananas. Herba 12-pedalis.
	13.	<i>nova.</i>	Papegojen Beck.
Allamanda	34.	<i>cathartica.</i>	Ducat beurſte. Apocynum scandens, amplissimo flore luteo. Plum. icon t. 29.
Plumieria	7.	<i>alba.</i>	Flores ambrosiaci, Cephala-giam excitantes.

Cer-

*) 7 (*

Cerbera	26. <i>Thevetia.</i>	Nuces pro crepitaculis s. crepundiis Americanorum sylvestrium.
Echites	78. <i>angularis.</i>	Jacq. amer. t. 53. an? Corolla annulo elevato circum umbilicum.
	126. <i>nova.</i>	Arbor. Folia opposita, ova- ta, subpetiolata, costata. Corolla alba. Stigma vin- cæ. Inflorescentia brevis, fasciculata e spicis. Fructus ignotus. Decoctum contra Siphilitidem.
Virecta	77. <i>virens.</i>	Floreus rubescentes ore al- bo. Herba tenera. Locus subhumidus.
Eryngium	9. <i>sætidum.</i>	Slangengras. Decoctum antifebrile.

HEXANDRIA.

Tillandsia	169. <i>lingulata.</i>	Parasitica.
Pontederia	137. <i>rotundifolia.</i>	Palustris.
Crinum	37. <i>americanum.</i>	
Amaryllis	98. <i>dubia.</i>	Mer. surin. t. 22. Corolla basi laciniarum barbata.
Aloë	118. <i>perfoliata.</i>	Vera, officinalis, ex Afri- ca adducta.
Achras	75. <i>Sapota.</i>	Sapotillie. Arbor pulchra, 26-pedum, lactescens. Flos albus. Fructus sapidissimus.

OCTANDRIA.

Paullinia	103. <i>pinnata.</i>	Fructus ruber. Locis siccis arenosis.
-----------	----------------------	--

EN.

ENNEANDRIA.

Laurus	50. <i>Cinnamomum. Sylvestre. adductum 1756</i>
Anacardium	31. <i>occidentale.</i> Calyx supra Receptaculum carnosum, pyriforme; in- fra Germen nucis, dorso af- fixa.

DECANDRIA.

Cassia	167. <i>javanica.</i> 39. <i>bicapsularis.</i> 19. <i>alata.</i> 89. <i>Thora.</i> Poinciana 18. <i>pulcherrima.</i>	Folia maxima, eglandulo- sa, 20 juga, utrinque ho- lofericea. Siliquæ bipedales, crassitie brachii tenuioris. Mer. Surin l. 32. Folia biju- ga tantum, glandula rotun- da inter infimum par. Bra- cteæ ventricosæ, subim- bricatæ. Siliqua teres, longa. Planta pedum 11. Flores lutei Slaperò. 12-pedalis. Emmenagoga: Tinctura ex Herb. M. iiij. Sem. Num. 20. Dos. uncia j. Folia pinnata, foliolis 5, petiolo communi biarticu- lato. Racemi simplices, Flores hermaphroditi. Fru- ctus 5 - cocci. divaricati: coccis monospermis. Folia subpetiolata, ovalia, 5-nervia, ciliata, lævia. Ra- cemi floribus sessilibus, se- cundis, subapetalis, rotun- dis, lævibus.
Quassia	<i>amara</i>	Jus-
Melastoma	11. <i>nova.</i>	

Jussiaea	168. <i>erecta.</i>	Caulis terres, simplex. Folia alterna, petiolata, obovata, glabra. Palustris. Annuæ.
Malpigia	95. <i>obscura.</i>	Kirsten. Rami horizontales. Folia emarginata. Flores rubicundi. Baccæ acidæ cum saccharo gratissimæ.
	92. <i>obscura.</i>	Arbor. Petala lutea, crustacea. Flores inflexi, racemosi, parvi.
	33. <i>bannisterioides.</i>	Folia suprema obtusa. Calyx interior 5-valvis. Petala lutea. Baccæ trifidæ, quod singulare, submucicatæ.
Triopterus	86. <i>jamaicensis.</i>	Germina tria, alata, alis loco petalorum.
Phytolacca	66. <i>oclandra.</i>	Katalio. Flores albi. Fructus ruber.

DODECANDRIA.

Rhizophora	48. <i>Mangle.</i>	Jacq. amer. t. 89. Folia opposita, petiolata, costata.
Blakea	97. <i>triplinervia.</i>	Mispel. Differt a Bl. trinervia. Foliis tripalinervis, costatis, arbore 16 pedali. Flos luteus, intus albus. Fructus luteus, sapidus. Stamina desinunt in antheras, nec antheræ filamentis impositæ.
Dodecas.	158. <i>nova.</i>	
Euphorbia	82. <i>canescens.</i>	In siphilitide infusum.

ICOSANDRIA.

Plinia	5. <i>petiolata.</i>	Karsebom. Fructus ruber, sapidus. Flores pedunculati polyandriæ. Petala variant 4 & 8. an sexu?
Psidium	40. <i>pyriforme.</i>	Kajave.
Cactus	51. 110. <i>epidendrum.</i>	
	134. <i>triangularis.</i>	
	130. <i>tetragonus.</i>	

POLYANDRIA.

Mammea	73. <i>americana.</i>	Mammebom. Arbor alta, pyramidalis. Fructus fulvus, magnitudine capitis infantis, sapidus; potius Polygamia monoica.
Marcgravia	62. <i>umbellata.</i>	Receptaculum post casum floris integrum, nec quinquelobum.
Lecythis	165. <i>Ollaria.</i>	Folia integerrima, serrata. Flos Fructusque singulares.
Bixa	106. <i>Orellana</i>	Rofu.
Annona	102. <i>muricata.</i>	Wilde sursat. Mer. surin. t. 14. Calyx cordatus. Fructus muricatus, aculeis recurvis, non esculentus.
	60. <i>obscura</i>	Sursat. Calyx cordatus. Fructus muricatus.
	38. <i>obscura.</i>	Wilde Canelbam. Calyx cordatus. Fructus strobili squamis acutis.
	38. <i>squamosa.</i>	Tame Canelbum. Calyx lancelatus. Fructus Rubi squamis obtusis, sapidus. Folia foetida.
		61.

61. discreta.

Bijrcébom. Calyx linearis.
Fructus acini discreti, pe-
dunculati, aromatici, sapi-
dissimi. Folia ligustri. An-
nonæ vera species.

DIDYNAMIA.

Phlomis 29. *nepetifolia.*

Bignonia. 78. *dubia.*

Citharexylon 92. *cinereum.*

Crescentia 32. *Cujete.*

Lantana 8. *Camara.*

Avicennia 94.177. *nitida.*

Drupina 148. *cristata.*

Brada.

Folia binata s. ternata. Ca-
lyx bifidus. Corolla lutea.

Parasiticum, scandens.

Kalabashenbom.

Surinamæ The. Infusum
foliorum florumque sapidis-
simum, sudoriferum.

Karwabom Mirabilis in fo-
co flamma & colore. Coty-
ledones duplicatæ: interio-
ribus pilosis. Flos albus.

Herba sesquipedalis, simili-
lima Besleriaæ cristatæ.

TETRADYNAMIA.

Cleome 16. *pentaphylla.* Ulrica. Infusum potum s. suc-
cus injectus pellit Ascarides.

MONADELPHIA.

Symphonia 69. *nova.*

Malaqvibom. Arbor altissi-
ma succo flavissimo intra
corticem. Flos ruber, glo-
boſus. Semina picta.

Urena 113. *americana.*

Diversa a Uren. sinuata.

Sophia 21. 18. *carolina.*

Bergnaut. Petala flava. Sta-
men septemfidum filamen-

		tis rubris. Stylus ruber. Fru- ctus cucumeri similis. Semina esculenta.
Gustavia	132. <i>augusta.</i>	Arbor alta, floribus albis, magnis. Specatissima.
Hibiscus	80. <i>tiliaceus.</i>	Folia cordata, subrotunda, ferrata, supra nitida. Ad Rivos.
	55. <i>esculentus.</i>	Ochno. Calyx exterior fo- liolis setaceis remotis; inte- rior circumscissus. Flos lu- teus. Fructus coquitur ut cocholada in gelatinam.
	71. <i>fraternus.</i>	Calyx exterior foliolis mu- cronatis. Flos luteus. Folia trifida.
	147. <i>fororius.</i>	Calyx exterior foliolis cu- cullatis. Caulis subscandens, fultus arboribus.
	151. <i>salicifolius.</i>	Frutex ro-pedalis. Flores lu- tei.
	140. <i>cancellatus.</i>	Herba procumbens, diffusa.
Gossypium	97. <i>religiosum.</i>	Catoenbom Gossypium ar- boreum. Mer. surin. t. 10.
DIADELPHIA.		
Erythrina	93. <i>crista galli.</i>	Mangonie. Arbor altissima ungve ante foliola. Flores inflati.
Securidaca	145. <i>volubilis.</i>	Folia ovata, obtusa, subpe- tiolata. Fructus cultratus dorso lateribusque baseos cristatus.
Pterocarpus	59. <i>ovalis.</i>	Bebelan. Radix succo rubro. Flores albi. Locus humidus. Pte-

Pterocarpus 121. *lunatus.*

Marsing. Arbor spinosa. Flores violacei albique. Fructus Medicaginis differt a genere staminibus, convenient stractura.

Crotalaria 56. *dagittalis.*

Flores cærulei.

Dolichos 58 *ensiformis.*

Lowrango pisies. Adducta ex Africa.

Cytisus 117. *Cajan.*

Legumen concatenatum ex globis magnitudine pruni.

Coronilla 157. *monilis.*

Indigo.

Indigofera 116. *tinctoria.*

POLYADELPHIA.

Theobroma 149. *Cacao.*

Cacabom. Calyx pentaphyllos, lanceolatus. Petala 5, fornicate, obovata, petiolata: lacinia terminali patula. Stamina fertilia, solitaria, sub singulo petalo interne; anthera quadruplici. Stamina alia 5, alterna, germini adpresla, castrata. Germen superum. Stylus simplex.

Citrus 115. *decumanus.*

Pompelmos.

Hypéricum 85. *cajense.*

Arbor foliis scabris. Calyx striatus. Corolla alba, intus barbata. Filamenta apice barbata. Bacca succo fulvo tinctorio. Semina numerosa.

2. 101. *alium.*

Bingwormbom. Frutex. Calyx lævis. Corolla lutea, intus lanata. Fructus purpureus. Semina pauca. Folia glabra. Succus sub cortice pellit serpiginem.

SYN-

SYNGENESIA.

Eupatorium	153. <i>scandens.</i>	Caulis volubilis.
Conyza	42. <i>arborecens.</i>	Herba.
Unxia	105. <i>camphorata.</i>	Campher plantin. Herba bipedalis, odore emplastri. In balneis sudoriferis pro rheumaticis.
Coreopsis	15. <i>baccata.</i>	Herba 8-pedalis, similis Heliantho. Flos luteus. Fructus Rubi figura, acinis baccatis globosis; semina nigra angulata.
Lobelia	12. <i>obscura.</i>	Herba 4-pedalis, lactescens. Flos ruber, Hispanis antidi-senterica. Inter olera surinamensium editur, si credere fas est.

GYNANDRIA.

Epidendrum	17. <i>pusillum</i>	Folia ensiformia, subcarnosa. Fructus globosus: angulis 6, membranaceis.
	110. <i>absque flore.</i>	
	154. <i>absque flore.</i>	
Passiflora	49. <i>quadrangularis.</i>	Markulba. Maxima. Fructus sapidissimus.
	152. <i>dubia.</i>	Caulis viridis. Folia ovata, biglandulosa. Involucrum o. Fructus sapidissimus.
	74. <i>dubia.</i>	Caulis rubicundus, glaber. Folia ut in præcedente, cui simillima.
	76. <i>vespertilio.</i>	Fructus minus sapidus.
	86. <i>fætida.</i>	Frequens in hortis nostris.

Arum

Arum	24. nova.	Krastraijers. Stamina pistilis approximata. Fructus umbilicatus. Rubefaciens, corrosivus.
	122. nova.	Mockemocke. Folii aures longitudine folii. Stamina approximata pistillis. Flos albus, extus ruber. Baccæ umbilicatae, monospermæ.
	128. <i>cannifolium</i> .	Parasiticum arborum. Folia tripedalia. Spatha obtusa.
MONOECIA.		
Ægopricum	162. novum.	Arbor foliis annuis. Amenta subpaniculata Betulina.
Anguria	81. <i>lobata</i> .	Calyx luteus; dentibus subulatis petalis clausus. Stamina 2. Styli 2. Fructus ovalis, laevis, amarissimus.
Sagittaria	36. <i>pugioniformis</i> .	Folia subulato-ensiformia. Fructus globosi.
Quercus?	106. <i>dubia</i> .	Fructus nucleo bifariam fissili. Flos non visus.
Hurra	1. <i>crepitans</i> .	Sandkokers. Arbor altissima pro asperibus. Succus in oculis illapsus excœcat post ostiduum.
Hippomane	133. <i>biglandulosa</i> .	Bollitrie.
Jatropha	14. <i>gossypifolia</i> .	Poppeties. Uſus pro ematibus.
	70. <i>Curcas</i> .	Purgatiōnoten. Fructus carnosus, globolus, nec angulatus.
Ricinus.	35. <i>communis</i> .	Karpata.
Plukenetia	146. <i>volubilis</i> .	Fructus supra albus angulis biyerrucosis. Luf.

Luffa	28. <i>arabum.</i>	Flores pollyadelphi, pentandri. Genere distinguenda a Momordicis. Medulla pro filtratione.
Cucurbita	129. <i>tagenaria.</i>	Ejer Calabaz. Similis ovo anserino. Usus pro scarificatione.
	30. <i>nova</i>	
DIOECIA.		
Cecropia	47. <i>peltata.</i>	Wilde papaije. Caulis annulatus, scaber, fistulosus. Spatha distincta pro quovis folio & pro pedunculis 2 apice umbellatis amentis.
Carica	4. <i>Papaja.</i>	Papaje. Pedes 20-alta. Fruktus magnitudine capitis infantis.
Musa	7. <i>paradisiaca.</i>	Marmolade dosies. Arbor magna, Flos albus, sexfidus, reflexus. Stylus superne crassior. Fructus pubescens.
Pubeta	119. <i>nova</i>	Rote bolties. Polyandra, monadelpha. Folia 4-juga: glandula inter singula.
Mimosa	43. <i>Inga.</i>	Polystachia Jacq. amer. 263. Flores decandra, apetala. Pedicelli partiales gemini. Flores omnium copiosissimi.
	112. <i>Entada.</i>	an Mas? Stylus 1. Folia opposita, adjecto fructu sequentis feminæ.
Margaritaria	41. <i>oppositifolia.</i>	an Femina? Styli 4 f. 5. Folia alterna. Fructus 4-f. 5-coccus mar-
	<i>alternifolia.</i>	

margaritaceus. Utrum hæ
ambæ sexu s. specie distincta,
non dicam.

- Ficus 159. *trigonata*. *Plum. icon. t. 132. f. 1.*
 42. 53. *perforata*. *Plum. icon. t. 122. f. 2.*

CRYPTOGAMIA.

Ophioglossum 67. scandens.

PALMÆ.

- Cocos 114. 84. *nucifera* Röker not. Masculi: Petala 3.
Stam. 6. Feminei: Calyx imbricatus squamis 9, obtusissimis.
Germen superum. Stylus o. Stigma 3-fidum.
-

GUSTAVIA *augusta*, supra nominata pag. 12:ma plane nova & genere & specie est arbor, in tota hac collectione speciosissima. Flores magni, Alabastri candoris, cum ipsa Magnolia certat, sed corona nectarea ex filamentis coalitis, antheris aureis condecorata superat, ut inter arbores longe amoenissimas jure numeretur; ideoque ejus descriptionem & figuram adjiciam.

GUSTAVIA.

- CAL.** nullus. *Receptaculum* supra margine cinctum, plaznum, latum, calvum.
COR. *Petala*. VIII. basi leviter connexa, ovata, sessilia, magna.
STAM. *Filamenta* numerosissima, petalis breviora, basi connata in coronam erectam. *Anteræ* parvæ, oblongæ, erectæ.
PIST. *Germen* inferum, turbinatum, supra planum calvum inter stamina & stylum. *Stylus* conicus, brevissimus, persistens. *Stigma* obtusum.
PER. *Fructus* subglobosus, truncatus, VI locularis, supra marginatus.
SEM. plura, fabacea, ovalia, lævia, basi aucta appendice cartagineo contorto.

GUSTAVIA *augusta*.

- Arbor* ramis crassiusculis, altitudine 20 f. 30 pedum. *Folia* alterna, subsessilia, confertiuscula, superne lato-lanceolata, basi angustiora, spithamea s. pendalia, costata, subferrata, glabra. *Pedunculi* terminales, 2 f. 3, uniflori, uniarticulati. *Flos* speciosissimus albus, Petalis apice rubris, major Nymphææ albæ, calvus inter stamina & stylum. *Antheræ* flavæ. *Stylus* minutus, flavus. *Fructus* pyriformis, fronte calva, sexlocularis. *Semina* unilocularia, magnitudine Pistaciorum, ova-ta, plura in singulis loculis, corculo bifido, cum appendice extus, ut in violis, serpentino, cartagineo, contortuplicato.



vt. 38
H:

Lionne Plante Surinamens. Aug. 23/6 1775.



2

Buitaria

5

C. Berggrift Sculpsit

C. Nordwall delin.

